



FRANCHE-COMTÉ

Réunion des observateurs de la LPO Franche-Comté



Emmanuel Cretin & Samuel Maas,
Samedi 26 février 2011,
Pierrefontaine-les-Varans.



Sommaire

- L'Atlas des oiseaux nicheurs de France : déclinaison en Franche-Comté
 - Cadre général
 - Résultats de 2 années de prospection :
 - Au niveau régional
 - Au niveau départemental
 - Quelques illustrations...
- Point sur la Codification
- L'enquête « Anatidés Limicoles 2010 – 2011 »
- L'enquête « Espèces allochtones 2011 »
- Enquêtes à venir



FRANCHE-COMTÉ

Atlas des oiseaux nicheurs de France *2009 - 2012*






Atlas des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine

- Dernier atlas période 1985-1989. Objectif d'actualisation des connaissances
- Atlas initié par LPO France, SEOF et collaboration MNHN
- Durée de l'atlas 2009-2012
- **Coordination régionale LPO Franche-Comté avec coordinateurs départementaux et de mailles**

Coordination

- 172 mailles en FC
- DOUBS : Emmanuel Cretin – 45 mailles
- JURA : Jean-Philippe Paul & Thierry Petit – 54 mailles
- HAUTE-SAONE : Frédéric Maillot – 49 mailles
- TERRITOIRE de BELFORT : Bernard Marconot – 24 mailles





Atlas des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine

- Dernier atlas période 1985-1989. Objectif d'actualisation des connaissances
- Atlas initié par LPO France, SEOF et collaboration MNHN
- Durée de l'atlas 2009-2012
- Coordination régionale LPO Franche-Comté avec coordinateurs départementaux et de mailles
- **Obsnatu la base support de l'atlas en Franche-Comté (outil de saisie)**



FRANCHE-COMTÉ

Obsnatu la base: outil de saisie, de consultation et de coordination

Pour participer à l'atlas il faut au préalable créer un compte sur le site Internet de la LPO Franche-Comté





Atlas des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine

- Dernier atlas période 1985-1989. Objectif d'actualisation des connaissances
- Atlas initié par LPO France, SEOF et collaboration MNHN
- Durée de l'atlas 2009-2012
- Coordination régionale LPO Franche-Comté avec coordinateurs départementaux et de mailles
- Obsnatu la base support de l'atlas en Franche-Comté (outil de saisie)
- **Données régionales valorisées quotidiennement sur le portail national dédié à l'atlas**



FRANCHE-COMTÉ

Obsnatu la base alimente le portail national

Visiteur Anonyme

beta

LPO SEOF

ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

Accueil

Les partenaires

Introduction

- Consulter
- Participer
- Information
- Les liens

email : mot de passe :

mémoriser le mot de passe [Me connecter](#)

[J'ai perdu mon mot de passe]

L'atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine est un projet collectif initié par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et la Société d'Études Ornithologiques de France, avec la collaboration scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle.

Actualités

lundi 24 janvier 2011 avinevs

Bilan complet des inventaires dans les Pyrénées-Atlantiques Vous trouverez en téléchargement (lien ci-dessous), concernant les Pyrénées-Atlantiques, [...](#)


lundi 24 janvier 2011 avinevs

Quand le plastique est symbole de puissance L'ornement des nids par les oiseaux avec des objets divers est connu depuis longtemps. Une étude réalisée [...](#)

mercredi 8 décembre 2010 avinevs

La Tourterelle turque en Europe Vör Fågelvärld a publié dans son dernier numéro un article consacré à l'implantation de la [...](#)

Etat d'avancement






FRANCHE-COMTÉ

Obsnatu la base alimente le portail national

www.atlas-ornitho.fr

Ex : mésange bleue
+1200 mailles nouvelles
+800 mailles
en repro certaine



2009

2009-2011

Atlas des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine

- Dernier atlas période 1985-1989. Objectif d'actualisation des connaissances
- Atlas initié par LPO France, SEOF et collaboration MNHN
- Durée de l'atlas 2009-2012
- Coordination régionale LPO Franche-Comté avec coordinateurs départementaux et de mailles
- Obsnatu la base support de l'atlas en Franche-Comté (outil de saisie)
- Données régionales valorisées quotidiennement sur le portail national dédié à l'atlas
- **Bilan de la prospection atlas en 2009, en 2010 (mise en lumière des mailles à prospecter dès le printemps 2011)**
- **Zoom départemental (bilan prospection, organisation, enquête limicoles et anatidés, coordination)**

Atlas des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine

- Dernier atlas période 1985-1989. Objectif d'actualisation des connaissances
- Atlas initié par LPO France, SEOF et collaboration MNHN
- Durée de l'atlas 2009-2012
- Coordination régionale LPO Franche-Comté avec coordinateurs départementaux et de mailles
- Obsnatu la base support de l'atlas en Franche-Comté (outil de saisie)
- Données régionales valorisées quotidiennement sur le portail national dédié à l'atlas
- Bilan de la prospection atlas en 2009, en 2010 (mise en lumière des mailles à prospecter dès le printemps 2011)
- Zoom départemental (bilan prospection, organisation, enquête limicoles et anatidés, coordination)
- **Méthodologie de prospection (protocole, objectifs à atteindre, calendrier prospection, espèces à rechercher, codes atlas etc)**
- **Mise à disposition d'un package pour chaque coordinateur de maille**



FRANCHE-COMTÉ

Comment participer ?

Calendrier et méthodes de prospection

Méthodologie

Des dates et des lieux

- **Un calendrier** très simplifié s'étendant finalement assez peu (grosso modo de début février à fin juin).
- **Des périodes plus favorables** pour détecter chacune des espèces.
- **Des lieux**, certaines espèces sont ubiquistes (présentes un peu partout) mais d'autres sont liées à un habitat plus ou moins particulier.

Méthodologie

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

C'est la période la plus favorable pour :

- nos oiseaux sédentaires ;
- les migrateurs partiels qui sont les premiers à réoccuper leur territoire ;
- et quelques grands migrateurs déjà de retour.



Le chant peut être beaucoup plus rare lorsque la couvaison a débuté, il est donc intéressant de faire du terrain de bonne heure en saison (et de bonne heure le matin...).

Méthodologie

A ne pas manquer

- **Nid de rapaces diurnes** : profiter de l'absence de feuilles
- **Les rapaces nocturnes** : Grand-duc (dès janvier), Hulotte, Chevêche, Effraie, Hibou moyen-duc... (*février-mars*)
- **Les pics** : épeiche, épeichette, mar, vert, cendré et noir (*surtout mars*)
- Le **CinCLE plongeur** (TER Université/LPO FC 2011)
- **Corbeau freux et Choucas** (repérer les colonies avant les feuilles (*début avril*))

Méthodologie



Changement d'Avril :

- arrivée assez massive d'une bonne part des migrateurs « vrais » ;
- installation assez rapide ;



attention aux oiseaux dont beaucoup ne font que transiter (traquet motteux, tarier des prés, pipit farlouse, bergeronnette printanière...)

Méthodologie

- **Début avril :**
Torcol fourmilier, Bergeronnette printanière, Rougequeue à FB et Rossignol ;
- **Mi-avril :**
Locustelle tachetée, Fauvette babillarde, Rousserolle effarvate & turdoïde, Tarier des prés, Pouillot siffleur, Pipit des arbres ;
- **Fin avril :**
Loriot d'Europe, Tourterelle des bois, Fauvette des jardins, Faucon hobereau.



FRANCHE-COMTÉ

Méthodologie

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Arrivée des migrateurs les plus tardifs :

Bondrée apivore, Caille des blés, Engoulevent, Gobemouche gris, Pie-grièche écorcheur, Hypolaïs polyglotte, Rousserolle verderolle, Râle des genets, Blongios nain



début de l'envol de pas mal d'espèces de passereaux (intéressant pour les indices certains)

Méthodologie

Les graphes « quand la voir »

Carte par mailles 10km x 10km des oiseaux nicheurs : Quand la voir

Les cartes par mailles permettent une restitution des données de Obsnatu la base par carrés de 10x10km. Elles sont établies de façon dynamique à partir des informations fournies par chacun des participants inscrits sur Obsnatu la base. Vous avez donc accès à des bilans détaillés année par année mais aussi à des bilans qui font état des connaissances sur les 10 dernières années et sur la durée d'étude de l'Atlas national. Vous constatez des lacunes, pas étonnant car l'outil vient d'être mis en ligne. Il permettra de combler les défauts de prospection rapidement en dynamisant le réseau des contributeurs. Alors participez à Obsnatu la base!

[\[Téléchargez les mailles pour GoogleEarth\]](#) [\[Afficher l'espèce sur www.atlas-ornitho.fr\]](#)

[liste des contributeurs](#)

[Synthèse Atlas](#)

Rougequeue à front blanc

[Affichez](#)


Carte espèce

Fiche espèce

Quand la voir

Les galeries

Nombre de données, par décade, sur l'ensemble des années (1989-2009)



Méthodologie

Lire régulièrement les brèves atlas !




brève atlas semaine 5 - 2011

le Cincle plongeur

→ Carte Atlas des Oiseaux Nicheurs 2009-2012.

→ Il est signalé comme nicheur dans 41% des mailles depuis 2009, dont plus de 1/3 présente un indice seulement possible. Le cincle plongeur est sédentaire et fidèle à ses sites de nidification. Il est donc très probable de revoir le cincle au même endroit d'une année sur l'autre.

→ Répandu en Franche-Comté, cette espèce niche uniquement sur les cours d'eau, généralement dans les zones de relief où le courant est rapide. Il peut également nicher, plus ponctuellement, sur certaines rivières plus lentes. Les couples se forment au mois de janvier et installent leur nid au dessus de l'eau pour une première ponte dès février, dans les anfractuosités des murets et des ponts de pierre. Ainsi, aux abords des cours d'eau, vous pourrez apercevoir son vol direct et rapide au ras de l'eau, ses "révérences" répétées lorsqu'il est posé et en prêtant l'œil les premières parades.



© Christophe Crimmes




© Laurent Déforêt

la Chouette hulotte

→ Carte Atlas des Oiseaux Nicheurs 2009-2012.

→ Signalé comme nicheur dans 80% des mailles depuis 2009, dont 42 % présente un indice possible. La chouette hulotte est sédentaire et nocturne. Des promenades nocturnes, à 8 jours d'intervalles permettent un passage facile au code probable. L'utilisation de la repasse (diffusion de son chant), peut faciliter sa détection mais « avec modération ».

→ Commune en Franche-Comté et cavernicole, elle affectionne particulièrement les forêts de feuillus âgées (vieux chênes). Elle fréquente également les parcs et les bocages. Notre « chat-huant » des campagnes peut s'entendre très tôt dès le mois de janvier/février par des nuits claires. Les premiers œufs peuvent être pondus dès le début du mois de mars.



Voir sur le site : rubrique « observer », puis « atlas » les Brèves atlas : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20125

Méthodologie

Voir sur le site, rubrique « observer », « atlas », la page atlas des oiseaux nicheurs :

une liste simplifiée des espèces potentielles et de leurs habitats

Zones humides : bords de rivières, étangs, prairies humides et marais...	
Espèces	Période
Bergeronnette des ruisseaux	mai-juin
Canard colvert	toute l'année, moins en aout
Cygne tuberculé	mars-mai
Foulque macroule	mars-avril
Bergeronnette printanière	mai
Bruant des roseaux	mai-juin
Cincle plongeur	mars-avril
Gallinule poule-d'eau	mars-avril
Grèbe castagneux	avril-mai
Grèbe huppé	avril-mai
Héron cendré	colonie, avant feuilles; mars-avril
Hirondelle de rivage	juin
Martin-pêcheur d'Europe	mars-mai
Râle d'eau	fin avril-mai
Rousserolle effarvate	mai-juin
Aigrette garzette	mai
Bécassine des marais	mai-juin
Bihoreau gris	mai-juin

Méthodologie

En croisant les habitats et les périodes de visite

- En résumé il faut cibler des lieux représentatifs des habitats que nous avons détaillé et les parcourir plusieurs fois (idéalement, une fois chaque mois de mars à juillet)
- Sans oublier des sorties crépusculaires ou nocturnes pour quelques espèces particulières.

Méthodologie

Coordinateur de maille : un accompagnement par le coordinateur départemental

- Fourniture d'une carte de la maille
- Un tableur Excel avec toutes les données de la base pour les espèces les moins communes déjà connues sur la maille
- Une liste des espèces, de leur habitat, de leur détectabilité et de leur potentialité de présence sur la maille
- Un document reprenant les grandes lignes de ce diaporama.
- Une mise en ligne d'un ensemble de documents d'accompagnement de l'Atlas.



FRANCHE-COMTÉ

*Atlas des oiseaux nicheurs de France
2009 – 2012 : quelques résultats*




Résultats régionaux

Bilan mi-
parcours :
394
observateurs
128.000
données
171 espèces
nicheuses

Pression d'observation :
forte faible

Nombre d'espèces maximum : 113
Nombre de mailles visitées : 202
Durée de prospection : >10000h




Généré en 0.52 sec

Courtesy NASA/JPL-Caltech

Résultats régionaux

Le nombre moyen d'observateurs par maille a doublé entre 2009 et 2010 !






FRANCHE-COMTÉ

Résultats régionaux

Evolution du nombre de données :

2009 : 50.500 et 2010 : 77.700

soit + de 128.000 données




Résultats régionaux

Comment évaluer l'état d'avancement ?

- **L'indice de diversité** *basé sur le nombre d'espèces par maille et regroupé en 3 classes ;*
- **L'indice de reproduction** *basé sur l'attribution du code Atlas. 3 classes sont calculées : $i = (\text{probable} + \text{certain}) / \text{nb total d'espèces}$;*
- **L'indice qualité de prospection** *qui est une synthèse des 2 indicateurs précédents.*

Résultats régionaux

L'indice de diversité :




Résultats régionaux

L'indice de diversité :

classe 1 : de 1 à 39 esp.

classe 2 : de 40 à 79 esp.

classe 3 : + de 80 esp.



Résultats régionaux

L'indice de reproduction :


classe 1 : inférieur à $1/3$

classe 2 : entre $1/3$ et $2/3$

classe 3 : + de $2/3$ esp (prob+certain)/total

Résultats régionaux

L'indice de reproduction :



Résultats régionaux

L'indice qualité :


classe 1 et 2 : maille à faire

classe 3 : 1 des 2 objectifs est atteint

classe 4 : maille bien prospectée

Résultats régionaux

L'indice qualité :







FRANCHE-COMTÉ

Résultats départementaux


Le Doubs : indice de diversité



Fin 2010



Saison 2009






FRANCHE-COMTÉ

Résultats départementaux

Le Doubs : indice de reproduction




Légende :




Fin 2010

■ 1 ■ 2 ■ 3



Saison 2009

■ 1 ■ 2 ■ 3






FRANCHE-COMTÉ


Résultats départementaux

Le Doubs : indice qualité




Fin 2010

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4



Saison 2009

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4






FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

AUTOUR DES PALOMBES




Autour des palombes,
Thierry Petit ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

BERGERONNETTE GRISE




Bergeronnette grise,
Alfred Naal ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

BUSARD SAINT-MARTIN




Busard St Martin,
Samuel Maas ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

CHOUCAS DES TOURS




Choucas des tours,
Patrice Correia ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

FAUCON CRECERELLE




Faucon crécerelle,
Thierry Petit ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

GRIMPEREAU DES BOIS




Grimpereau des bois,
Patrice Correia ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

HIRONDELLE DE FENÊTRE




Hirondelle de fenêtre,
Samuel Maas ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

MERLE A PLASTRON




Merle à plastron,
Bernard Marconot ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

MESANGE HUPPEE





Mésange huppée,
Alfred Naal ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations...

PIC MAR



Pic mar,
Alfred Naal ©.



FRANCHE-COMTÉ

Quelques illustrations... de rapaces nocturnes !






FRANCHE-COMTÉ

...les rapaces nocturnes

EFFRAIE DES CLOCHERS




Effraie des clochers,
Jean-Claude Desprez ©.



FRANCHE-COMTÉ

Rapaces nocturnes

CHEVECHE D'ATHENA




Chevêche d'Athéna,
Thierry Petit ©.



FRANCHE-COMTÉ

Rapaces nocturnes

CHEVECHETTE D'EUROPE



© Jérôme Salvi


Chevêchette d'Europe,
Jérôme Salvi ©.



FRANCHE-COMTÉ

Rapaces nocturnes

CHOUETTE HULOTTE




Chouette hulotte (juv),
Daniel Gillet ©.



FRANCHE-COMTÉ

Rapaces nocturnes

CHOUETTE DE TENGMALM




Chouette de Tengmalm,
Fotolia ©.



FRANCHE-COMTÉ

Rapaces nocturnes

GRAND-DUC D'EUROPE




Grand-duc d'Europe,
Fotolia ©.



FRANCHE-COMTÉ

Rapaces nocturnes

HIBOU MOYEN-DUC




Hibou moyen-duc (juv),
Serge Galliou ©.



FRANCHE-COMTÉ

Rapaces nocturnes

PETIT-DUC SCOPES



Petit-duc scops,
Jean-Louis Corsin (www.oiseaux.net) ©.



FRANCHE-COMTÉ

Point sur la Codification



Codifier ces observations dans la Obsnatulabase

- Les codes appliqués sont standardisés au niveau européen (EBCC)
- 16 codes pour traduire un grand panel de comportements des oiseaux
- 3 niveaux d'indice de nidification

- possible
- probable
- certain

- Bien décrire son observation en champ remarque (en particulier pour les codes 7-8-11-12)

Point sur la Codification

Noter l'indice **le plus fort**



Rappel : objectifs par maille 10x10 :

- à minima 80 espèces
- avec des indices probables ou certains pour les 2/3
(soit 50 d'entre elles si 80 espèces)

Point sur la Codification

Conseils et astuces

Un bon moyen d'obtenir un indice probable pour une espèce est de la contacter au même endroit à 8 jours d'intervalle au moins pendant sa période de nidification.

Il est plus intéressant donc de passer plusieurs fois dans le même secteur au cours du printemps que de multiplier trop les sites, il vaut mieux 1 fois un code probable pour une espèce que 10 fois un code possible.

Point sur la Codification

Paramétrage de la base

- Pour chaque espèce, une période de nidification est programmée, durant laquelle la base vous demandera de préciser un code de nidification.
- Si l'espèce est dans son habitat (cf liste jointe), mettre un code 2 à minima.

Point sur la Codification

NIDIFICATION POSSIBLE

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification (code EBCC n°1)

- Attention aux espèces coloniales (hérons, corbeaux freux, martinet et hirondelles en dehors du bâti...Éloignées parfois du lieu du nid (ne pas mettre de code)
- Indice très faible peu pris en compte pour les rapaces à grand territoire, très intéressant d'essayer de trouver un site de nid (milans, busards...)
- Attention aux migrants (groupe de pinson, de mésange bleue en mars, groupe de geais jusqu'en avril, ce sont des oiseaux en habitat favorable parfois mais clairement pas cantonnés ou ils nicheront.
- Attention aux tairiers des pré et bergeronnettes printanières transitant chez nous jusque fin mai.

Point sur la Codification

NIDIFICATION POSSIBLE

Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction (code EBCC n°2)

- Ne pas codifier les chanteurs automnaux (Chevêchette, rouge-gorges, mésanges, troglodyte...)
- Attention aux migrateurs pouvant chanter en migration (il sera bon de confirmer un chanteur de pouillot fitis d'avril un peu plus tard, on obtiendra en plus un code probable 5)

Point sur la Codification

NIDIFICATION PROBABLE

Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction (code EBCC n°3)

- Attention aux anatidés migrateurs souvent en couple aux printemps, il faudra vérifier leur cantonnement pour un code probable (mettre plutôt un code 2 si l'habitat est assez favorable)
- Attention aux binômes pour les espèces sans différence mâle/femelle, on en fait trop rapidement des couples parfois. Bien vérifier qu'il n'y ait pas d'agressivité entre les oiseaux voir des attitudes suggérant un appariement.

Point sur la Codification

NIDIFICATION PROBABLE

Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit (code EBCC n°4)

- Le fameux code permettant un indice probable assez facilement, multiplier les visites sur les mêmes sites.
- Pour quelques espèces recherchées par la repasse (rapaces nocturnes, pics...), si une réponse est obtenue sans chant spontané auparavant un code 5 peut être appliqué à cette observation.
- Code 5 aussi pour 2 cht proches se répondant nettement.
- Pour les espèces très communes, 5 cht dans un secteur restreint peut se traduire par un code 5

Point sur la Codification

NIDIFICATION PROBABLE

Parades nuptiales ou accouplement ou échange de nourriture entre adultes (code EBCC n°5)

- Occasion de lire ou relire les *Géroudet* qui décrit magnifiquement la biologie et les parades de nos oiseaux

Point sur la Codification

NIDIFICATION PROBABLE

Fréquentation d'un site de nid potentiel (distinct d'un site de repos) (code EBCC n°6)

- Ne s'applique quasiment qu'aux oiseaux cavernicoles et aux rapaces, hérons, grand corbeau proches d'une ancienne aire. Aussi pour les oiseaux rupestres (habitat très localisé et espèce très spécialisée), martinet à ventre blanc, faucon pèlerin, hirondelle de rocher...
- Attention une fauvette à tête noire dans un buisson, un canard en bordure d'une roselière cela ne fonctionne

pas.

Point sur la Codification

NIDIFICATION PROBABLE

Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte (code EBCC n°7)

- A utiliser avec grande prudence, beaucoup de cris sont interprétés comme de l'inquiétude, c'est parfois vrai mais non lié à la reproduction.
- Attention au geai qui vous a détecté, au tarier pâtre qui a un cri de contact quasi en permanence, aux rouges-queues également.

Point sur la Codification

NIDIFICATION PROBABLE

Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main) (code EBCC n°8)

- Pour le bagage uniquement ou la découverte d'un cadavre frais que l'on peut inspecter

Point sur la Codification

NIDIFICATION PROBABLE

**Construction d'un nid, creusement d'une cavité
(code EBCC n°9)**

Point sur la Codification

NIDIFICATION CERTAINE

Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention (code EBCC n°10)

- S'applique surtout aux limicoles feignant une blessure.
- Parfois aux passereaux quand vous êtes placés trop près d'un nid et qu'un adulte vous tourne autour de façon très proche et souvent en criant, il est sage de s'éloigner rapidement
- Pour un passereau n'hésitant pas à harceler une corneille, un rapace dans le but de détourner l'attention...

Point sur la Codification

NIDIFICATION CERTAINE

Nid utilisé récemment ou coquilles vides (oeuf pondu pendant l'enquête) (code EBCC n°11)

- Ne s'applique qu'au nid utilisé assez récemment, ne pas codifier à l'automne.
- Possibilité d'utiliser ce code lors du nettoyage d'un nichoir assez tard en saison (mettre une date fictive (15 mai par exemple) et préciser la date réelle du nettoyage en champ remarque.

Point sur la Codification

NIDIFICATION CERTAINE

Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) (code EBCC n°12)

- Pour les nidicoles on ne met plus ce code pour l'observation d'un jeune isolé, il faut que la famille soit encore formée, idéalement que les adultes nourrissent encore (certaines espèces se dispersent assez rapidement et s'éloignent du lieu de nidification), tolérance un peu plus forte pour les espèces très communes.

Point sur la Codification

NIDIFICATION CERTAINE

- Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n'ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver (code EBCC n°13)**
- Bien vérifier pour les cavernicoles qu'un adulte entre dans la cavité/nichoir et n'en ressort plus (signant la couvaison) (début de saison surtout), avant cela on est plutôt sur du code 7 (site de nid potentiel) ou 10 si construction du nid

Point sur la Codification

NIDIFICATION CERTAINE

Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes (code EBCC n°14)

- Adulte avec becquée (attention aux oiseaux venant de capturer une proie et qui s'envole avec à cause de votre présence)
- Si l'adulte rejoint un nid avec jeunes mieux vaut utiliser le code 19 (phénologie de la reproduction mieux décrite)
- Si l'adulte nourrit des jeunes déjà volant mieux vaut utiliser le code 13 (phénologie de la reproduction mieux décrite)

Point sur la Codification

NIDIFICATION CERTAINE

Nid avec oeuf(s) (découverte fortuite, ne pas chercher à voir le contenu d'un nid)

(code EBCC n°15)

Nid avec jeune(s) (vu ou entendu)

(code EBCC n°16)

Point sur la Codification

99 Espèce absente malgré des recherches

Important à préciser : prospection assidue négative (par repasse par exemple ; information importante !!)

30 Possible

40 Probable

50 Certain

En de très rares circonstances voir avec un coordinateur départemental si aucun des 16 codes ne semblent convenir



FRANCHE-COMTÉ

L'enquêtes Anatidés Limicoles nicheurs 2010 - 2011



FRANCHE-COMTÉ



Office National
de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Bilan 2010 et perspectives 2011

anatidés : 10 espèces dont 6 avec résultats fiables en 2010.

Espèce Anatidés	Région Franche-Comté		
	Effectif (année*)	Tendance**	Fiabilité
Cygne tuberculé	> 153 c	?	1-2 ★
Canard chipeau	10 c	+	3
Sarcelle d'hiver	4-5 c	+	3
Sarcelle d'été	6 c	?	2 ★
Canard souchet	1 c	+	3
Nette rousse	5-6 c	+	3
Fuligule milouin	36-41 c	?	2-3
Fuligule morillon	61-63 c	?	2-3
Eider à duvet	1 c	+	3
Harle bièvre	85-87 c (2009-2010)	+	3

Doubs	
Effectif (année*)	Tendance**
>45 c	?
0 c	=
2 c	+
3 c	?
0 c	=
3 c	+
16-18 c	?
20-22 c	?
0 c	=
65-67 mâles (2009-2010)	+

2 espèces pourraient être mieux connues : Cygne tuberculé et Sarcelle d'été

Bilan 2010

Limicoles : 6 espèces dont 3 avec résultats fiables en 2010.

Espèce Limicoles	Région Franche-Comté		
	Effectif (année*)	Tendance**	Fiabilité
Echasse blanche	0 c	0	3★
Petit Gravelot	> 42 c	? ★	2
→ Vanneau huppé	81-96 c (2006-2010)	-2	3
Bécassine des marais	35-47 c	-1	2
Courlis cendré	120-134 c (2006-2010)	-1	3 ★
→ Chevalier guignette	1 c	?	1-2

Doubs	
Effectif (année*)	Tendance**
0 c	0
> 9 c	?
26-31 c	-2
31-35 c	-1
22-25 c	-1
1 c	?

★ Le Vanneau huppé présente une tendance méritant une attention forte et annuelle

★ Le Chevalier guignette et le Petit Gravelot mérite une évaluation plus fine

→ Partenariat avec ONCFS



FRANCHE-COMTÉ

L'enquêtes Espèces allochtones

2011



Espèces allochtones

- Dernière enquête en 2006 (publication dans Ornithos et régionalement dans Obsnatu) ;
- Coordination régionale : D. Michelat (LPO FC) ;
- Espèces invasives en FC :

Cygne noir,
Bernache du Canada,
Bernache nonnette,
Ochette d'Égypte,
Tadorne casarca,

Canard mandarin,
Canard carolin,
Faisan vénéré,
Perruche à collier.



FRANCHE-COMTÉ

Enquêtes à venir...



Enquêtes à venir...

- Indicateur Rapaces : une réflexion *régionale* est engagée entre la LPO FC et l'UMR Chrono-Environnement pour la mise en place d'un suivi par transect (continuité du ROPRE)

Contact :

samuel.maas@lpo.fr

03.81.50.59.51



Enquêtes à venir...

- Pie grièche grise : l'hiver 2011-2012 verra se lancer une enquête *nationale* sur fond d'Atlas hivernant

Contact :

jean-philippe.paul@lpo.fr

03.81.50.69.49



Thierry Petit©.

Enquêtes à venir...

- Enquêtes Hironnelles : en 2012, reconduction de l'enquête *nationale* hironnelle de fenêtre et rustique de 2007

Contact :


Pôle Connaissance & Conservation LPO FC

03.81.50.43.10



Enquêtes à venir...

- Atlas des oiseaux de France :
 - 2 printemps : 2011 et 2012
 - 2 hivers, 2011-2012 et 2012-2013





FRANCHE-COMTÉ

Merci de votre écoute...



À vous ! 

