



Liste
rouge
des vertébrés
terrestres de
Franche-Comté



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

Busard des roseaux // *Circus aeruginosus*

Statut

Nicheur très rare et migrateur en Franche-Comté

Menace		Protection nationale	Directive Oiseaux	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
UICN France	UICN Franche-Comté				
VU	EN (critère D)	oui	Annexe I	oui (nidif)	4

Répartition et populations

En France, la population nicheuse de Busard des roseaux est estimée à près de 2000 couples localisés à quelques grandes régions (surtout régions côtières et nord-est du pays).

La Franche-Comté est en marge de la distribution nationale et présente de faibles superficies d'habitats favorables à l'espèce. Si l'espèce était apparemment plus répandue il y a quelques décennies, sa distribution générale n'a guère évolué depuis 30 ans, restreinte aux basses plaines alluviales du Jura et à quelques marais ou étangs sporadiques. On trouve ainsi le Busard des roseaux nicheur régulier sur quelques étangs de Bresse jurassienne et en basse vallée du Doubs. Il est devenu rare ou occasionnel ailleurs (marais de Vy-le-Ferroux en Haute-Saône, étang du Pasquier dans le Jura et bassin du Drugeon dans le Doubs notamment). La population régionale est très faible et correspond à moins de 5 couples connus annuellement pour seulement 2 ou 3 réguliers dans le bas Jura. L'historique de la population régionale est peu documenté mais la population n'excédait pas 10 couples dans le Jura à la fin des années 1980.


Habitat et écologie

Le Busard des roseaux est inféodé aux zones humides et niche souvent dans les phragmitaies. L'adaptation aux friches et zones cultivées n'a pas encore été constatée en Franche-Comté mais les migrateurs s'attardant dans ces milieux font parfois illusion. Les nicheurs régionaux sont installés en queue d'étang, en marais ou en roselière d'annexe fluviale. En migration (de mars à mai puis d'août à octobre essentiellement), l'espèce s'observe dans tous les milieux ouverts pour chasser. L'importante période de migration et la relative fréquence de l'espèce dans la région à cette période rendent parfois délicate la détection des cantonnements potentiels de nicheurs.

Le régime alimentaire est méconnu dans la région mais l'espèce est en général éclectique et même charognard, ce qui lui permet d'être moins lié que les autres busards aux fluctuations de ses ressources alimentaires.




Busard des roseaux femelle © Eric Ferry



Nidification de l'espèce en France
© Nouvel inventaire des oiseaux de France
Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition du Busard des roseaux en Franche-Comté en période de nidification (Atlas 2009-2012)





Liste
rouge
des vertébrés
terrestres de
Franche-Comté



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

Busard des roseaux // *Circus aeruginosus*

Menaces et priorités de conservation

Dans la région les Busards des roseaux sont essentiellement au sein des Zones de protection spéciale du réseau Natura 2000 où la problématique et les enjeux naturels liés à son habitat principal - la roselière - sont pris en compte (Bresse jurassienne, Basse vallée du Doubs, vallée de la Saône, Bassin du Drugeon, etc.). La conservation ou la restauration de sites potentiels ou anciennement occupés comme l'étang du Pasquier (Jura) ou le marais de Saulnot (Haute-Saône) pourraient bénéficier localement à l'espèce. La conservation de l'espèce à notre échelle se joue donc essentiellement dans la conservation stricte des zones humides et notamment des phragmitaies importantes et inondées, lieu de nidification d'un important cortège avifaunistique menacé au niveau national.

Rédaction : Jean-Philippe Paul - Mise à jour : avril 2011



Busard des roseaux mâle © Frédéric Maillot

Roselière, milieu de nidification
© Annie Thévenet et Corinne Petitcolin

