



Liste
rouge
des vertébrés
terrestres de
Franche-Comté



FRANCHE-COMTÉ

Cigogne noire // *Ciconia nigra*

Statut

Nicheur ancien et suspecté, migrateur, hivernant occasionnel en Franche-Comté

Menace		Protection nationale	Directive Oiseaux	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
UICN France	UICN Franche-Comté				
EN	DD	oui	Annexe I	Oui (nidif.)	1

Répartition et populations

En France, la population de cette espèce emblématique est tantôt bien suivie tantôt soumise à une certaine confidentialité. Ceci ajouté aux cas de nidification occasionnels ou suspectés et non confirmés conduit à une fourchette assez large de 20-40 couples répartis entre le nord-est de la France (notamment Champagne-Ardenne, Lorraine et Bourgogne) et l'Anjou. La tendance générale serait à l'accroissement constant mais très lent en France comme dans la plupart des pays d'Europe. Néanmoins, cette espèce reste rare partout et la situation peut localement être moins positive.

En Franche-Comté, la Cigogne noire est un migrateur assez fréquent observé un peu partout en très petit nombre. En revanche, concernant les indices de nidification, son statut se situe entre le mythe et la réalité. Bien que l'espèce ait fait son retour en France en tant que nicheur au milieu des années 1970 par notre région (secteur de Poligny), aucun nid n'y a été découvert depuis. Seul un fort indice a été obtenu en 1996 en Bresse avec l'observation d'un jeune fraîchement volant fin juin au bord d'un étang. Cette observation prend tout son sens car elle avait été précédée et suivie de cas d'hivernage dans le même secteur. Depuis, la Cigogne noire est redevenue un mythe entretenu à juste titre par les observations répétées en des lieux favorables (surtout en Forêt de Chaux dans le Jura et dans le nord de la Haute-Saône/Territoire de Belfort) et/ou par les rares observations estivales du mois de juin (3,25 % des observations). La population actuelle est donc inconnue mais un couple (voire davantage) peut nicher à l'insu des observateurs, au moins occasionnellement, d'autant que notre région favorable et géographiquement voisine des départements occupés. Les potentialités d'installation sont en outre augmentées par l'accroissement du nombre de migrateurs survolant notre région, comme cela a pu être observé dans d'autres régions (cols pyrénéens, Rhône-Alpes). La moyenne du nombre de données par an est passée de 28 sur la décennie 1991-2000 à 84 sur la décennie 2001-2010.


Habitat et écologie

La Cigogne noire niche de façon isolée au cœur de vastes forêts mûres de plaine. Elle s'installe beaucoup plus rarement dans des massifs modestes ou en bocage. L'espèce choisit généralement la branche latérale d'un gros chêne pour installer son nid imposant. Les secteurs de gagnage, pouvant se situer à 10 km du site de nid, voire davantage, sont constitués de petites rivières, ruisseaux, fossés et étangs forestiers ou prairiaux.

Migratrice, la Cigogne noire est observée surtout de mars à mai (pic printanier mi-mars) et en août-septembre. Les données estivales sont rares et peuvent concerner des erratiques comme des nicheurs méconnus. Les données hivernales, occasionnelles, pourraient évoquer la sédentarité d'oiseaux nicheurs. L'arc jurassien semble présenter la particularité d'un passage pré-nuptial au moins aussi important que le passage post-nuptial alors que ce dernier est en général nettement supérieur ailleurs en France.




Cigogne noire © Daniel Bouvot



Nidification de l'espèce en France
© Nouvel inventaire des oiseaux de France
Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition de la Cigogne noire en Franche-Comté en période de nidification (Atlas 2009-2012).






Liste rouge des vertébrés terrestres de Franche-Comté



FRANCHE-COMTÉ

Cigogne noire // *Ciconia nigra*



Phénologie de la Cigogne noire en Franche-Comté

Menaces et priorités de conservation

La grande rareté de l'espèce explique sa vulnérabilité à toute échelle. Une gestion forestière qui évite d'abaisser l'âge d'exploitation joue un rôle important dans les potentialités de reconquête de l'espèce. De même une quiétude absolue et une préservation de la structure paysagère aux abords du nid devront accompagner la découverte éventuelle d'un nid franc-comtois.


Concernant les zones de gagnage, la diversité et la conservation des petites zones humides (ruisseaux, mares, prairies etc.) sont des facteurs essentiels à la qualité générale d'un habitat accueillant pour la Cigogne noire. Enfin, tout risque de collision ou d'électrocution doit être évité dans un rayon de 15 km autour du site de nid et 1,5 km de part et d'autre des ruisseaux utilisés pour l'alimentation des nicheurs.

L'Office national des Forêts et la LPO Franche-Comté assurent un échange d'informations effectif, parfois très localement, ce qui permet une veille intéressante sur les observations (notamment intraforestières).

Rédaction : Jean-Philippe Paul – mise à jour : juin 2011



Cigogne noire © Annie Thévenet et Corinne Petitcolin



Habitat type de la Cigogne noire © Julien Ait El Mekki

