



Liste  
rouge  
des vertébrés  
terrestres de  
Franche-Comté



UNION EUROPEENNE



PRÉFET  
DE LA RÉGION  
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

# Fuligule milouin // *Aythya ferina*

## Statut

Nicheur rare, migrateur et hivernant en Franche-Comté

Menace		Protection nationale	Directive Oiseaux	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
UICN France	UICN Franche-Comté				
LC	VU (critère D)	Chasse	Annexes II,1 et III,2	oui (nidif. et hiver. >200 ind.)	4

## Répartition et populations

En France, le Fuligule milouin niche surtout dans les régions d'étangs d'une large moitié nord du pays : Dombes, Forez, Brenne, etc. La population actuelle est estimée à moins de 3500 couples après des déclinés avérés localement (Bretagne, Dombes et Alsace par exemple).


En Franche-Comté, le Fuligule milouin occupe deux pôles principaux : la dépression du Haut-Doubs et la Bresse jurassienne. Dans le Haut-Doubs, il niche depuis une vingtaine d'années au bord des lacs de Remoray et Saint-Point. Il était noté nicheur dans la partie jurassienne du Dugeon dans l'atlas des oiseaux nicheurs du Jura en 1993. Dans cet ouvrage, la population bressane (Jura) est évoquée avec une estimation d'une cinquantaine de couples à la fin des années 1980. Ailleurs l'espèce peut nicher isolément et occasionnellement. L'enquête Anatidés nicheurs de 2010 donne la situation suivante : au moins 16-18 couples dans le Doubs (probablement plus de 20), 20-23 couples dans le Jura, absent ou à confirmer ailleurs. Avec près d'une cinquantaine de couples en Franche-Comté, la tendance est délicate à évaluer du fait de deux événements contraires : une apparition assez récente dans le Haut-Doubs et une possible régression depuis 30 ans en Bresse (parallèle au déclin en Dombes). Le suivi des nichées (femelles suivies) est un élément d'appréciation de la population mais il sous-estime probablement la réalité dans les zones peu accessibles (vastes zones humides ou régions à grand nombre d'étangs). En effet, la discrétion des oiseaux et le faible taux de réussite de la reproduction sont deux facteurs compliquant à souhait l'évaluation des effectifs de ce canard.

## Habitat et écologie

Le Fuligule milouin niche sur les rives des lacs et étangs ceinturés de végétation (phragmites, laïches) ou bordés d'un marais. Il se nourrit de mollusques, d'invertébrés et de végétation aquatique en plongeant quelques secondes sous l'eau. Ce canard se reproduit généralement tardivement et les premières familles sont en général notées début juin dans la région.




Fuligule milouin © Daniel Bouvot



Nidification de l'espèce en France  
© Nouvel inventaire des oiseaux de France  
Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition du Fuligule milouin en Franche-Comté en période de nidification (Atlas 2009-2012)





Liste  
rouge  
des vertébrés  
terrestres de  
Franche-Comté



UNION EUROPEENNE




PRÉFET  
DE LA RÉGION  
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

# Fuligule milouin // *Aythya ferina*



Phénologie du Fuligule milouin en Franche-Comté


## Menaces et priorités de conservation

L'avifaune de Bresse jurassienne semble suivre en partie les évolutions de celle de la Dombes voisine. Aussi le fort déclin qui a touché le Fuligule milouin dans les années 1970 – 1980 en Dombes invite à une prudence objective concernant le statut de l'espèce dans le Jura, d'autant que la Bresse comtoise ne semble accueillir que la moitié des effectifs annoncés à la fin des années 1980. La conservation du Milouin passe par la conservation des ceintures végétales des zones humides de la région, en plaine comme en altitude. Sa dynamique de population européenne et l'importance internationale des effectifs en transit et en hivernage en Suisse, Alsace et Rhône-Alpes voisines semblent des éléments cruciaux pour l'avenir de cette espèce dans la région.

Rédaction : Jean-Philippe Paul – mise à jour : juin 2011



Fuligule milouin © Jean-Claude Desprez



Habitat type du Fuligule milouin © Marc Giroud

