



# Liste rouge des vertébrés terrestres de Franche-Comté



FRANCHE-COMTÉ

# Héron pourpré // *Ardea purpurea*

## Statut

Nicheur très rare, migrateur rare, pas d'hivernage connu en Franche-Comté

| Menace      |                    | Protection nationale | Directive Oiseaux | Déterminant ZNIEFF | ORGFH |
|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| UICN France | UICN Franche-Comté |                      |                   |                    |       |
| LC          | CR                 | oui                  | Annexe I          | oui (nidif)        | 2     |

## Répartition et populations

En France, la population nicheuse de Héron pourpré est estimée à moins de 2000 couples d'après le dernier recensement de 1994. Les effectifs se concentrent en Camargue, avec des fluctuations importantes selon les années, sur la façade atlantique (Grand Lieu, sud de la Vendée et Charente-Maritime), dans la Brenne, en Rhône-Alpes (Dombes et Forez).

Hôte des zones humides et des marais à roselières (*Phragmites* sp.), le Héron pourpré est devenu un nicheur très rare en région Franche-Comté à l'image de son statut national et européen : entre 1990 et 2010, sur 257 données de nidification certaine ou probable, les deux tiers proviennent de Bresse jurassienne, un quart de la Basse vallée du Doubs et 6 % du marais de Vy-le-Ferroux en Haute-Saône.

La population nicheuse régionale a subi un déclin important au cours des quarante dernières années : elle est désormais limitée à une petite vingtaine de couples dont 85 % se distribue en Bresse alors qu'elle comptait environ 250 couples dans les années 60 dont plus d'une centaine pour la seule colonie de Petit-Noir.

Depuis une dizaine d'années, cette petite population relictuelle se maintient avec des oscillations d'effectifs importantes d'une année sur l'autre. L'espèce n'a pas été retrouvée récemment en Haute-Saône et elle se confine uniquement en basse vallée du Doubs et en Bresse, dans le Jura.


## Habitat et écologie

Le Héron pourpré est étroitement lié aux marais de basse altitude pourvus d'une végétation aquatique abondante et dense (roselières à *phragmites* sp. essentiellement). En Franche-Comté, les milieux occupés sont essentiellement des roselières de bordure d'étangs à vocation piscicole. Marginalement, il occupe une roselière d'annexe fluviale et un marais colonisé par les saules.

Migrateur transsaharien, il arrive sous nos latitudes aux alentours de la mi-avril. Le nid est construit dans les roseaux, exceptionnellement dans un saule (cas à Vy-le-Ferroux). La reproduction s'achève en août date à laquelle les jeunes émancipés se dispersent.




Héron pourpré © Jean-Baptiste Mérimot



Nidification de l'espèce en France © Nouvel inventaire des oiseaux de France Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition du Héron pourpré en Franche-Comté en période de nidification (Atlas 2009-2012)







# Liste rouge

des vertébrés terrestres de Franche-Comté



UNION EUROPEENNE



avec le Fonds Européen de Développement Régional




Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET  
DE LA RÉGION  
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

# Héron pourpré // *Ardea purpurea*



Phénologie du Héron pourpré en Franche-Comté

## Menaces et priorités de conservation

A l'instar de nombreuses autres espèces, la dégradation ou la destruction des milieux de reproduction est l'une des causes majeures de régression du Héron pourpré en France.

Outre cette menace, le Héron pourpré semble subir durablement l'effet des sécheresses qui sévissent sur ses quartiers d'hivernage africains. De récentes études ont en effet montré un lien relativement fort entre les années de sécheresse en Afrique et les effectifs nicheurs recensés les années suivantes en Europe qui expliqueraient les fluctuations interannuelles très prononcées chez cette espèce d'Ardéidé.

Sa préservation en Franche-Comté passe par la gestion conservatoire des étangs à roseaux de Bresse et des quelques zones de marais (Vy-le-Ferroux par exemple, hors Natura 2000). L'inscription en 2006 au sein du réseau Natura 2000 de la région des étangs de Bresse du nord est une condition indispensable mais malheureusement insuffisante pour garantir la pérennité des biotopes qu'il occupe. Le récent changement des pratiques piscicoles (vidange tôt en saison à partir du mois de juin) enregistré sur certains étangs de Bresse constitue en effet une menace supplémentaire à prendre au sérieux. La gestion conservatoire délicate d'annexes fluviales, comme le « Mération » en basse vallée du Doubs à Petit-Noir (Jura), est indispensable à cette espèce comme au cortège paludicole associé.

Rédaction : Christophe Morin – mise à jour : avril 2011



Héron pourpré © Jean-Marc Gérard

Roselières, milieu de nidification  
© Annie Thevenet et Corinne Petitcollin

