











# Marouette ponctuée // Porzana porzana

#### Statut

Nicheur et migrateur très rare en Franche-Comté


Menace		Ductostics	Divantiva	Dátawainant	
UICN France	UICN Franche- Comté	Protection nationale	Directive Oiseaux	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
DD	CR	oui	Annexe I	oui (nidif)	2
	(critère D)				

### Répartition et populations

En France la Marouette ponctuée est un nicheur très sporadique localement régulier mais globalement rare. La population nationale méconnue est estimée à quelques centaines de couples maximum. Il semble que la situation actuelle soit le fruit d'un net déclin de l'espèce qui était répandue au début du 20ème siècle.

En Franche-Comté, on dispose de 365 observations depuis 1990 (17 données par an) dont 60% sont attribuées à la nidification. L'apparition de l'espèce est fluctuante et s'échelonne de fin mars à fin septembre avec de rares données de février, octobre et novembre.

La vision des années 1990 qui considérait la Franche-Comté comme principale bastion français de l'espèce est à relativiser fortement aujourd'hui. L'espèce occupe régulièrement les zones humides d'altitude (Bassin du Drugeon et lac de Remoray surtout, parfois l'Orbe) et ponctuellement quelques sites sporadiques de plaine (Bresse, basse vallée de l'Ognon, Saône et affluents). Le site majeur est le Bassin du Drugeon qui accueille des effectifs très fluctuants : entre 0 et 9 chanteurs depuis 1990 pour une moyenne d'environ 2 chanteurs par an seulement. Le secteur des lacs Saint-Point et Remoray accueillent de 0 à 4 chanteurs selon les années. Ailleurs dans la région, les cas de nidification sont ponctuels, irréguliers et ne concernent qu'un chanteur. Au final, la population régionale fluctuante est en moyenne de 6 chanteurs par an ; 2008 est la meilleure année récente avec 12 chanteurs.




Marouette ponctuée © Jean-Philippe Paul



Nidification de l'espèce en France O Nouvel inventaire des oiseaux de France Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition de la Marouette ponctuée en Franche-Comté en période de nidification (2000-2010)





## Liste rouge des vertébrés terrestres de Franche-Comté












# Marouette ponctuée // Porzana porzana



Nombre de chanteurs de Marouette ponctuée en Franche-Comté par année (2000-2010)

### Habitat et écologie

La Marouette ponctuée est un Rallidé inféodé aux milieux inondés, surtout les cariçaies mais parfois les roselières claires ou les prairies humides. Le nid est toujours entouré d'eau. Les observations directes sont rares et le principal indicateur de présence en période de nidification est le chant, crépusculaire et nocturne, rarement diurne (un « huit » répété et très puissant) qui a lieu d'avril à juin. L'autre période privilégiée est la fin de l'été lorsque les abords exondés des zones humides sont fréquentés par les rares migrateurs ou nicheurs locaux qui parcourent la vase à la recherche de nourriture (invertébrés et végétaux divers).

#### Menaces et Conservation

La dégradation ou la disparition des habitats humides est sans conteste une cause de déclin dans les régions où la Marouette ponctuée niche, migre ou hiverne. En Franche-Comté, elle a toujours été rare dans la période récente et la tendance d'évolution des effectifs n'est pas claire. Sa grande rareté est en outre une menace en soit et la conservation des sites occupés est indispensable. Aujourd'hui, la quasi-totalité des sites régionaux occupés par l'espèce sont en zone gérée (réseau Natura 2000, gravière de Pagney) et/ou protégée (APB, Réserve naturelle nationale). Maintenir l'effort de conservation ou de restauration de la qualité des habitats est l'action minimum pour accompagner les phénomènes plus globaux qui influent sur cette espèce (climat, état des zones d'hivernage et de transit, dynamique des populations européennes).

Rédaction: Jean-Philippe Paul - mise à jour: mars 2011

