



Liste
rouge
des vertébrés
terrestres de
Franche-Comté



FRANCHE-COMTÉ

Phragmite des joncs // *Acrocephalus schoenobaenus*

Statut

Nicheur très rare et migrateur rare en Franche-Comté

Menace		Protection nationale	Directive Oiseaux	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
UICN France	UICN Franche-Comté				
LC	EN (critère D)	oui	-	oui (nidif)	4

Répartition et populations

Le Phragmite des joncs niche surtout au nord-ouest d'une ligne Bordeaux – Strasbourg avec une incursion dans l'est du pays de la haute vallée du Rhône à la haute vallée de la Saône.


En Franche-Comté, le Phragmite des joncs a semble-t-il toujours été rare ces 50 dernières années mais il devait nicher et remplacer la Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*) en altitude avant 1950. Dans la période récente, ce passereau paludicole a toujours été confiné à la vallée de la Saône et à ses affluents (bas Doubs, Ognon et surtout Durgeon) et à quelques localités sporadiques de Haute-Saône, de Bresse ou du Sundgau. La région de Vesoul est aujourd'hui le bastion régional régulier de cette espèce. La population régionale n'excède peut-être pas une vingtaine de chanteurs dont quelques-uns seulement sont détectés annuellement. Espèce fluctuante à l'échelle européenne, le Phragmite des joncs maintient sa position marginale dans notre région sans qu'une tendance nette ne se dégage.

Habitat et écologie

Le Phragmite des joncs est un passereau typique des marais et bords de cours d'eau ou lacs riches en végétation palustre : joncs, laïches, phragmites, massettes et petits buissons. Il fréquente plus volontiers les phragmites lors de ses haltes migratoires. Insectivore et migrateur au long cours, il est présent dans la région de fin mars à mi-septembre avec un pic fin avril (détection des nicheurs au chant) et fin août (migrateurs observés parmi les buissons et phragmites).




Phragmite des joncs © Jean-Luc Patula



Nidification de l'espèce en France
© Nouvel inventaire des oiseaux de France
Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition du Phragmite des joncs en Franche-Comté en période de nidification (Atlas 2009-2012)





Liste rouge

des vertébrés terrestres de Franche-Comté



UNION EUROPEENNE




PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

Phragmite des joncs // *Acrocephalus schoenobaenus*



Phénologie du Phragmite des joncs en Franche-Comté

Menaces et priorités de conservation

L'espèce semble avoir été largement plus commune et répandue en France au début du 20ème siècle. La destruction des zones humides et notamment des zones palustres est sans doute une raison principale du déclin général. Par la suite, de fortes fluctuations ont touché les populations d'Europe de l'ouest suite aux sévères périodes sèches en zone sahélienne. Les tendances sont hétérogènes selon les lieux mais il paraît difficile d'imaginer un retour significatif de l'espèce en Franche-Comté sans une restauration significative des zones humides à formations basses en bordure des plans d'eau et rivières de plaine. L'essentiel des effectifs régionaux sont en zone gérée ou protégée du fait des habitats occupés : Arrêté de protection de biotope de la plaine de Pusey, Vaivre-et-Montoille et Vesoul, réseau Natura 2000 (Vallée de la Saône, Basse vallée du Doubs) et gravière de Pagney en vallée de l'Ognon (Jura).

Rédaction : Jean-Philippe Paul- mise à jour : mai 2011



Phragmite des joncs © Samuel Maas

Milieu de nidification du Phragmite des joncs
© Christophe Mauvais

