



Liste
rouge
des vertébrés
terrestres de
Franche-Comté



UNION EUROPEENNE



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

Pipit spioncelle // *Anthus spinoletta*

Statut

Nicheur rare, migrateur, hivernant en Franche-Comté

Menace		Protection nationale	Directive Oiseaux	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
UICN France	UICN Franche-Comté				
LC	CR (critère D)	oui	-	oui (nidif)	

Répartition et populations

En France, le Pipit spioncelle niche sur les sommets des massifs montagneux : Vosges, Jura, Alpes, Corse, Massif Central et Pyrénées. Peu commun, sa population nationale est estimée à moins de 20 000 couples. C'est un hivernant répandu en plaine, notamment grâce à une transhumance en provenance des Alpes et d'Europe centrale.


En Franche-Comté, on ne dispose que de 34 observations en période de nidification depuis 1990 dont 13 depuis 2000. Sans surprise, ce sont les chaumes vosgiennes et les pâturages d'altitude du Haut Jura et du Haut-Doubs qui rassemblent les rares indices de nidification entre 1 100 et 1 460 mètres d'altitude. Depuis 2000, seul le massif du Mont-d'Or, dans le Doubs, fournit des observations régulières en période de nidification. La dernière mention dans les Vosges comtoises date de 2004 au Ballon d'Alsace à Lepuix, Territoire de Belfort. Ce passereau d'altitude semble de plus en plus difficile à observer en tant que nicheur dans notre région où l'on ne détecte généralement pas plus de un à deux couples annuellement. Si sa distribution a toujours été naturellement restreinte, ses effectifs ont pu quant à eux être estimés à moins de 50 couples dans les années 1980. Sa situation alpine semblant globalement stable, on peut faire le parallèle entre la situation négative franc-comtoise et les mentions de déclin notées en dessous de 1000 mètres dans le Jura et les Préalpes suisses.

Habitat et écologie

Le Pipit spioncelle est un passereau insectivore qui occupe les pelouses et pâturages humides ponctués de rochers ou arbrisseaux, au-delà de la limite supérieure des arbres. Aux altitudes inférieures de sa distribution, il recherche les pâturages extensifs et vastes. Les rares indices de nidification sont surtout notés de mai à août, période à laquelle les nombreux migrateurs et hivernants (présents d'octobre à mars surtout) en provenance d'Europe centrale sont absents.




Pipit spioncelle © Samuel Maas



Nidification de l'espèce en France
© Nouvel inventaire des oiseaux de France
Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition du Pipit spioncelle en Franche-Comté en période de nidification (2002-2011)





**Liste
rouge**
des **vertébrés**
terrestres de
Franche-Comté



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

Pipit spioncelle // *Anthus spinoletta*

Menaces et priorités de conservation

Au vu de sa situation totalement marginale dans notre région, il est possible que cet oiseau de haute montagne disparaisse rapidement si des évolutions globales de sa population influencent ne serait-ce que légèrement sa distribution altitudinale. Dans le contexte de cette grande inertie, éventuellement climatique, les leviers d'action pour la conservation de ce pipit sont faibles. Le réseau Natura 2000 comprend l'ensemble des sites occupés par cette espèce et intègre théoriquement des objectifs favorables à l'espèce. Citons notamment le maintien de la qualité des pelouses d'intérêt communautaire et pâtures d'altitude, dans un contexte si possible préservé d'une trop forte activité touristique qui perturbe été comme hiver les oiseaux et les habitats déjà très localisés.

Rédaction : Jean-Philippe Paul – mise à jour : mars 2011



Pipit spioncelle © Thierry Petit

Pelouse d'altitude, habitat type du Pipit spioncelle
© Guillaume Petitjean

