

LES OISEAUX DE LA VIENNE

Ce document présente la liste des 245 espèces qui ont été observées au moins une fois dans la Vienne de 1973 à 1991. Les noms français et latins des espèces ainsi que leur classification se réfèrent à la "Liste LPO des oiseaux de l'Ouest Paléarctique" (1990).

La première colonne mentionne le nom de l'espèce, lequel peut être suivi de l'un des symboles suivants :

- * : espèce nicheuse régulière
- ** : espèce nicheuse "exceptionnelle"
- † : espèce nicheuse "disparue" (?)

Les deux colonnes suivantes indiquent respectivement le statut et l'abondance de l'espèce dans la Vienne.

STATUT

Oiseaux nicheurs

- S : "sédentaire", espèce qui peut être observée toute l'année.
- E : "estivant", visiteur d'été .

Oiseaux non nicheurs

- H : "hivernant", visiteur d'hiver.
- M : observé lors des migrations post/pré-nuptiales.
- A : "accidentel" dans notre département vu la distribution et les moeurs de l'espèce.
- ? : espèce dont l'origine sauvage est douteuse.

Ici, "été" et "hiver" sont à prendre au sens large.

ABONDANCE

Les effectifs départementaux de chaque espèce ont été estimés suivant une échelle logarithmique de base 10.

Nombre d'individus	Classe d'abondance
0 < N ≤ 10	X : "très rare"
10 < N ≤ 100	R : "rare"
100 < N ≤ 1000	P : "peu commun"
1000 < N ≤ 10000	C : "commun"
10000 < N	T : "très commun"

COMMENTAIRES

Pour donner une idée concrète des ordres de grandeurs, sachant qu'il faut environ 50 quadrats (1/2 carte au 25000^e) pour couvrir la Vienne, une espèce nicheuse commune répartie uniformément dans tout le département, est représentée par 10 à 100 couples sur chaque quadrat.

H,S/E,S/S,H/M,H/M,E : indiquent le statut principal puis le statut secondaire lorsqu'un tel statut est reconnu dans notre département. Ceci s'applique aux espèces dont les effectifs sont très variables au cours de l'année ou/et correspondent à des populations bien distinctes. Leur indice d'abondance peut ne pas changer de classe pour autant.

Deux indices d'abondance séparés par un tiret signalent des espèces dont les effectifs varient notablement suivant les années. L'absence de toute indication dans les deux colonnes signale que la dernière observation est antérieure à 1984. L'abondance des Perdrix et du Faisan de Colchide, faussée par les lâchers massifs effectués par les chasseurs, n'est pas indiquée.

Le terme "occasionnel" (O) est réservé aux espèces non nicheuses qui ne sont pas observées tous les ans. Certaines n'ont été observées qu'une seule fois.

Le terme "exceptionnel" s'applique à des espèces hors ou en limite de répartition, dont au moins une tentative de nidification (réussie ou non) a été constatée depuis 1985.

Si une espèce "accidentelle" est nécessairement d'observation "occasionnelle", l'inverse n'est pas vrai. Aussi, au vu de leur statut local et national, seules 25 espèces sont considérées accidentelles. Ceci souligne le caractère très improbable de leur observation dans notre département, pour des raisons propres à chaque espèce. Il peut s'agir d'oiseaux pélagiques amenés par une tempête, d'hivernants poussés par un hiver rude, d'erratisme juvénile, etc...

Le terme "disparu" est à prendre au conditionnel. Il concerne les espèces dont au moins un cas de nidification est connu pour la période 1973-1984 et aucun depuis. Si pour certaines espèces cela reflète bien leur dynamique actuelle, pour la majorité la frontière disparue/exceptionnelle est bien mince, la période prise en compte étant trop courte. Le cas de la Cisticole des joncs est particulier : cette espèce est disparue suite aux hivers rigoureux 1985/1986. Le temps devrait y remédier, patience...

Chaque espèce étant à elle seule un cas particulier, aucune classification de ce type ne saurait traduire parfaitement la diversité de notre avifaune. Aussi les indications concernant le statut et surtout celles concernant l'abondance, sont à prendre avec beaucoup d'indulgence. Il s'agit là avant tout d'une première liste de référence, qui ne demande qu'à s'améliorer.

Pour conclure, sachez que parmi les 245 espèces ici recensées, environ les 2/3 peuvent être observées chaque année dans la Vienne, à condition de les rechercher au bon endroit et au bon moment... Bonnes observations !

Plongeon catmarin	H	O
Plongeon arctique	H	O
Plongeon imbrin	H	O
Grèbe castagneux *	S	C
Grèbe huppé *	S	R
Grèbe jougris	H	O
Grèbe esclavon	H	O
Grèbe à cou noir	M	O
Océanite culblanc	A	O
Grand Cormoran	H	X
Butor étoilé †	H	O
Blongios nain †		
Bihoreau gris	M	O
Aigrette garzette	M	O
Grande Aigrette	A	O
Héron cendré *	S	P
Héron pourpré *	E	X
Cigogne noire	M	O
Cigogne blanche	M	O
Spatule blanche	A	O
Flammant rose	?	O
Cygne tuberculé	S,H	O
Oie des moissons	M,H	O
Oie rieuse	A	O
Oie cendrée	M,H	P-C
Bernache cravant	A	O
Tadorne casarca	?	O
Tadorne de Belon	H	O
Aix mandarin	?	O
Canard siffleur	H	R
Canard chipeau	H	R
Sarcelle d'hiver *	H,S	P,X
Canard colvert *	H,S	C
Canard pilet **	H	R
Sarcelle d'été	M	X-R
Canard souchet **	H	R
Nette rousse	A	O
Fuligule milouin *	H,S	P,X
Fuligule à bec cerclé	A	O
Fuligule myroca	A	O
Fuligule morillon	H	X-R
Fuligule milouinan	A	O
Eider à duvet	H	O
Macreuse brune	H	O
Garrot à oeil d'or	H	O
Harle piette	H	O
Harle huppé	H	O
Harle bièvre	H	O
Bondrée apivore *	E	P
Milan noir *	E	R
Milan royal	M	X
Pygargue à queue blanche	A	O
Circète Jean-le-Blanc *	E	X
Busard des roseaux *	S	X
Busard Saint-Martin *	S	P
Busard cendré *	E	P
Autour des palombes *	S	R
Epervier d'Europe *	S	P
Buse variable *	S	C
Aigle botté	M	O
Aigle de Bonelli	A	O
Balbusard pêcheur	M	X
Faucon crécerelle *	S	C
Faucon kobez	M	O
Faucon émerillon	H	R
Faucon hobereau *	E	R
Faucon pèlerin	H	O
Perdrix rouge *	S	
Perdrix grise *	S	
Caille des blés *	E	C
Faisan vénéré	?	O
Faisan de Colchide *	S	
Râle d'eau *	S	R
Marouette ponctuée	A	O
Râle des genêts *	E	X
Poule d'eau *	S	C
Porphyron bleu	?	O
Foulque macroule *	H,S	C,P
Grue cendrée	M	P-C
Outarde canepetière *	E	P
Echasse blanche	M	O
Avocette élégante	M	O

Oedicnème criard *	E	C
Petit Gravelot *	E	R
Grand Gravelot	M	R
Gravelot à collier inter.	M	O
Pluvier guignard	A	O
Pluvier doré	H	P-T
Pluvier argenté	H	O
Vanneau huppé *	H,S	T,P
Bécasseau maubèche	M	O
Bécasseau sanderling	M	O
Bécasseau minute	M	O
Bécasseau de Temminck	M	O
Bécasseau tacheté	A	O
Bécasseau cocorli	M	O
Bécasseau variable	M	X
Bécasseau combattant	M	R
Bécassine sourde	M	O
Bécassine des marais **	H	R-P
Bécasse des bois *	H,S	R
Barge à queue noire	M	X-R
Barge rousse	M	O
Courlis corlieu	M	O
Courlis cendré *	S	R
Chevalier arlequin	M	R
Chevalier gambette	M	R-P
Chevalier stagnatile	M	O
Chevalier aboyeur	M	X-R
Chevalier culblanc	M	X-R
Chevalier sylvain	M	X
Chevalier guignette †	M	P
Labbe "s.p."	A	O
Mouette pygmée	A	O
Mouette rieuse *	H,S	P,R
Goéland railleur	A	O
Goéland cendré	H	O
Goéland brun	H	O
Goéland argenté	H	O
Mouette tridactyle	A	O
Sterne caugek	M	O
Sterne pierregarin **	M	X
Sterne arctique	A	O
Sterne naine	M	O
Guifette moustac	M	X-R
Guifette noire	M	X-R
Guifette leucoptère	A	O
Pigeon colombin *	H,S	P
Pigeon ramier *	H,S	T
Tourterelle turque *	S	C
Tourterelle des bois *	E	C
Coucou geai	A	O
Coucou gris *	E	C
Chouette effraie *	S	C
Petit-Duc scops *	E	X
Chouette chevêche *	S	P
Chouette hulotte *	S	C
Hibou moyen-duc *	S	C
Hibou des marais	M	O
Engoulevent d'Europe *	E	P
Martinet noir *	E	T
Martin-pêcheur d'Europe *	S	P
Guépier d'Europe	M	O
Huppe fasciée *	E	C
Torcol fourmilier *	E	X
Pic cendré †	A	O
Pic vert *	S	C
Pic noir *	S	X
Ric épeiche *	S	C
Pic mar *	S	P
Pic épeichette *	S	P
Cochevis huppé *	S	C
Alouette calandrelle **	E	X
Alouette lulu *	S	R
Alouette des champs *	S	T
Hirondelle de rivage *	E	C
Hirondelle rustique *	E	T
Hirondelle de fenêtre *	E	C
Pipit rousseline *	E	R
Pipit des arbres *	E	T
Pipit farlouse *	H,S	T,R
Pipit spioncelle	M	O
Bergeronnette printanière	M	R

Bergeronnette flavéole	M	O
Bergeronnette des ruiss. *	S	P
Bergeronnette grise *	S	C
Cincla plongeur *	S	X
Troglodyte mignon *	S	T
Accenteur mouchet *	S	T
Rougegorge familier *	S	T
Rossignol philomèle *	E	T
Rougequeue noir *	E,S	T,R
Rougequeue à front bl. *	E	P
Tarier d'Europe **	M	R
Tarier pâtre *	E,S	C,P
Traquet motteux *	E	R
Merle à plastron	M	O
Merle noir *	S	T
Grive litorne	H	C
Grive musicienne *	S	C
Grive mauvis	H	C
Grive draine *	S	C
Bouscarle de Cetti *	S	R
Cisticole des joncs †		
Locustelle tachetée *	E	P
Locustelle lusciniolide *	E	X
Phragmite aquatique	A	O
Phragmite des joncs *	E	R
Rousserolle effarvatte *	E	P
Rousserolle turdoïde †	M	O
Hypolaïs polyglotte *	E	T
Fauvette pitchou *	S	R
Fauvette orphée †		
Fauvette grisette *	E	T
Fauvette des jardins *	E	C
Fauvette à tête noire *	E,S	T,R
Pouillot de Bonelli *	E	C
Pouillot siffleur *	E	C
Pouillot véloce *	S	T
Pouillot fitis *	M,E	C,X
Roitelet huppé *	S	P
Roitelet triple-bandeau *	S	C
Gobemouche gris *	E	C
Gobemouche noir †	M	O
Mésange à longue queue *	S	C
Mésange nonette *	S	C
Mésange huppée *	S	P
Mésange noire *	H,S	R
Mésange bleue *	S	T
Mésange charbonnière *	S	T
Sitelle torchepot *	S	C
Tichodrome échelette	H	X
Grimpereau des jardins *	S	C
Mésange remiz	A	O
Loriot d'Europe *	E	C
Pie-grièche écorcheur *	E	P
Pie-grièche grise †	H	O
Pie-grièche à tête rous. *	E	R
Geai des chênes *	S	T
Pie bavarde *	S	T
Choucas des tours *	S	C
Corbeaux freux *	H,S	T,C
Corneille noire *	S	C
Etourneau sansonnet *	S	T
Moineau domestique *	S	T
Moineau friquet *	S	P
Moineau soulcie †		
Pinson des arbres *	S	T
Pinson du Nord	H	P-C
Serin cini *	E,S	C,P
Verdier d'Europe *	S	C
Chardonneret élégant *	S	C
Tarin des aulnes	H	P
Linotte mélodieuse *	S	T
Sizerin flammé	H	O
Beccroisé des sapins	H	O
Bouvreuil pivoine *	S	C
Grosbec casse noyaux *	S	P
Bruant jaune *	S	T
Bruant zizi *	S	C
Bruant fou	A	O
Bruant ortolan *	E	R
Bruant des roseaux *	H,S	P,R
Bruant proyer *	S	T