



Premier cas de nidification de la Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) dans la Vienne

François Lecomte, Katia Lipovoï

LPO Vienne, ZI République 2
Espace 10, Bât D2, 86000 Poitiers

Introduction

La Bergeronnette printanière est une espèce de milieu ouvert nicheuse dans beaucoup de régions de France ; en Poitou-Charentes elle niche dans le département de Charente-Maritime et de la Charente (rare), dans la Vienne aucune donnée de nidification n'avait encore été enregistrée avant 2000. Cette année là 2 individus sont vus le 25 mai dans les Sablières du Puits des Chasses sur la commune de Craon et un couple est observé plusieurs fois (fin mai et juin) toujours sur cette commune dans un champ de pois ; mais il n'y eu, à l'appui, aucune preuve de nidification. L'année suivante un suivi du secteur est effectué durant les mois de mai et juin.

Biologie, écologie lors de la reproduction

Le milieu de prédilection de la Bergeronnette printanière était les prairies et les milieux humides... mais si dans certaines régions de France elle reste fidèle à ce biotope (Loire Atlantique, Vallées de la Loire et la Vilaine, Marais Breton, Marais Vendéen...), elle colonise peu à peu les cultures agricoles. Philippe J. Dubois qui estime l'effectif national compris entre 60 000 et 95 000 couples, précise que cet effectif s'explique par la dynamique résultant de la colonisation des milieux cultureux depuis le début des années 1980. L'accroissement des populations a été particulièrement prononcé dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, l'île de France, la Champagne-Ardenne, le Centre (Beauce) et, dans une moindre mesure, à peu près partout ailleurs, à l'exception de l'Ouest... Et Philippe J. Dubois de noter : « En effet, les grandes plaines de cultures du Poitou-Charentes, par exemple, sont encore à l'écart de cette colonisation. Pour combien de temps encore ?... »... Et enfin il précisait « Il n'empêche que, localement, des diminutions ont été également notées, souvent en relation avec la disparition du milieu prairial ».

La Bergeronnette printanière « type » (*motacilla f. flava*) arrive en France au cours du mois d'avril. Les mâles sont sur place les premiers et se cantonnent rapidement en émettant leur chant. C'est la femelle qui quelques jours

plus tard choisera l'emplacement du nid. La ponte commence en général à la mi-mai, parfois dès la fin d'avril, et se poursuit durant le mois de juin. Les éclosions ont lieu en juin après une incubation de 12 à 13 jours et les jeunes sont nourris par les deux parents. Après la sortie du nid, à l'âge de 11 à 12 jours, les jeunes sont encore nourris quelques temps par le mâle et la femelle. Après leur émancipation ils se regroupent dès le début du mois d'août dans des dortoirs pouvant atteindre jusqu'à des milliers d'oiseaux... Les bergeronnettes nous quittent dès la fin août et en septembre. Leur zone habituelle d'hivernage s'étend au sud du Sahara, du Sénégal au Kenya (B. LANG, 1994).

Chronologie des observations

Dans la Vienne, la Bergeronnette printanière est observée en migration de fin mars à début mai et de la fin août à fin septembre.

Nous n'avons pris en compte que les observations réalisées entre les deux périodes de passage migratoire.

2000

A Craon, dans une ancienne sablière, 2 bergeronnettes printanières « type » sont notées le 25 mai.

2001

A Craon, 2 bergeronnettes printanières « type » sont observées sur le même site qu'en 2000 à partir du 1er mai.

Le suivi régulier du site montre que l'effectif augmente à partir de la fin mai : le 26 mai, 3 oiseaux de type «centratlantique» sont notés le 6 juin 7 adultes sont présents sur le site. Des transports de nourriture sont observés le 5 juin et le 9 juin 3 couples nourrissent.

A Cuhon, 1 individu est vu en vol le 30 mai.

2002

Le site de Craon n'a pas été suivi mais des présences sont notées dans d'autres communes :

A Saulgé un mâle de type «centratlantique» est observé en nourrissage à l'étang Borbou.

A Venduvre du Poitou 2 individus sont notés les 20 et 21

juin. A Villiers 1 mâle est observé dans un champ d'avoine le 15 juin ; ainsi qu' 1 mâle et 1 femelle dans un champ de blé.

Discussion :

En 2001 la reproduction de la Bergeronnette printanière a été prouvée dans le département de la Vienne sur la commune de Craon, sans toutefois que le succès reproducteur n'ait été vérifié. L'espèce avait déjà été noté sur ce même site, mais aucune preuve n'avait été apportée faute de suivi.

En 2002 l'espèce a occupé d'autres secteurs du département.

Mis à part le site de Saulgé, la Bergeronnette printanière niche dans des secteurs particulièrement secs composés de champs de céréales et d'anciennes carrières où se reproduit également le Pipit rousseline (*Anthus campestris*).

Observateurs :

Pierre Guignard, François Lecomte, Benoît Van Hecke, Cédric Mroczko.

Références bibliographiques :

- DUBOIS P. J. 2001. Les formes nicheuses de la Bergeronnette printanière en France . Ornithos 8 - 2. pp : 49-54
- LANG B. 1994. La Bergeronnette printanière, in YEATMAN-BERTHELOT D. et JARRY G., Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989. SOF pp : 482-483.

