

# Bilan du comptage des Ardéidés nicheurs dans la Vienne en 2007

François LECOMTE

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes  
86000 Poitiers



## Introduction

L'année 2007 est à nouveau, après 2000, l'année du 9<sup>e</sup> recensement des hérons nicheurs en France, recensement coordonné par le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) et visant à mieux cerner l'évolution des populations de hérons arboricoles. Dans le département de la Vienne, cela concerne principalement les colonies de Héron cendré *Ardea cinerea* et de Héron pourpré *Ardea purpurea*.

Dans ce département, zone marginale pour la nidification du Héron pourpré, la population nicheuse a diminué de 50% entre 1977 et 2000 (GILARDOT et RIGAUD, 2000). Les 3 principales colonies de Héron pourpré dans la Vienne se situent sur l'étang de Beaufour, sur les étangs des secteurs de Pressac et sur ceux du camp militaire de Montmorillon. Les deux premiers sites, d'accès libre, sont suivis régulièrement par des bénévoles et, pour le camp militaire, les dénombrements sont seulement réalisés les années où nous obtenons les autorisations indispensables pour effectuer des inventaires naturalistes en partenariat avec le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes (CREN).

Dans la Vienne, le Héron cendré est nicheur certain depuis 1977 et il a vu ses effectifs croître plus ou moins régulièrement depuis 30 ans. Au cours de ces années de reconquête, la population était d'abord localisée sur 4 sites puis, à la fin des années 1990, les colonies triplèrent sans pour autant augmenter les effectifs.

## Méthodes


Le décompte des héronnières, réalisé par des bénévoles, s'est déroulé de fin mars à la mi-juillet sur les secteurs de nidification connus dans le département et sur des zones où sont observés régulièrement des individus en période de reproduction, afin de découvrir d'éventuels nouveaux sites. Le recensement des nids de Héron cendré s'effectue soit à distance respectable en mars, soit, si cela n'est pas possible, en mai, en passant sous la héronnière au moment où les juvéniles sont prêts à l'envol ou ont déjà quitté le nid. Pour le Héron pourpré, la même méthode est appliquée plus tardivement, en juin et juillet.

## Résultats et discussion

### 1 - Le Héron pourpré

Le *Graphique 1* nous indique que la population des secteurs de Beaufour-Pressac a atteint en 2007 des effectifs comparables quoique légèrement supérieurs à ceux du début des années 1980, avec un accroissement régulier des colonies depuis 3 ans.

Sur le camp militaire, la population a été multipliée par 3 depuis 1999 et par 2 depuis 2003. En réalité, la croissance du nombre de couples nicheurs n'y est pas aussi importante : en 2007 la méthode de recensement par une fouille systématique des bosquets de saules et de la roselière a permis un décompte



Graphique 1 : Couple de Hérons pourprés nicheurs dans la Vienne

exhaustif de la colonie (comm. pers. Julien VENTROUX) ; par contre, en 1999 et 2003, la méthodologie utilisée n'avait pas permis d'accéder à l'ensemble de la saulaie et de la roselière.

La population nicheuse de la Vienne représente 2 à 2,25 % de la population française qui a été estimée entre 2 000 et 2 200 couples nicheurs en 2000 (BirdLife, 2007).

## 2 - Le Héron cendré

Le *Tableau 1* fait apparaître un accroissement de la population de plus de 74 % ; 6 nouvelles colonies ont été découvertes avec un effectif bien plus important que les 2 colonies qui ont disparu. Les nouveaux sites reproducteurs peuvent être dus soit à une meilleure prospection, soit à un réel accroissement de la population. Fait particulièrement significatif : les effectifs de la colonie de l'étang de Beaufour ont été multipliés par trois.

La population nicheuse de la Vienne représente 1,3 à 1,5 % de la population française qui a été estimée entre 25 000 et 32 000 couples en 2002 (BirdLife, 2007).

## Conclusion

Le Héron pourpré voit ses effectifs progresser, mais le fait de nicher seulement sur 4 sites le rend très vulnérable à toute modification des milieux qu'il fréquente. Il est indispensable de pérenniser les roselières et les saulaies des zones humides qui les abritent si l'on veut maintenir la population à ce niveau de dynamisme.

Le Héron cendré voit ses effectifs croître fortement et ne semble pas menacé.

Les autres espèces de hérons comme le Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, le Blongios nain *Ixobrychus minutus*, l'Aigrette garzette *Egretta garzetta* et le Bihoreau gris



*Nycticorax nycticorax*, observés, plus ou moins régulièrement chaque année pendant la période de nidification, ne nous ont pas apporté de preuve de reproduction, mais le Héron garde-bœufs, de plus en plus présent en nombre en période de nidification, pourrait bien être notre troisième espèce nicheuse de Héron dans la Vienne.

## Remerciements

Les remerciements vont à tous les observateurs de l'enquête Hérons, pour leur motivation et le temps passé sur le terrain : Sébastien BAILLARGEAT, Roger BOUARD, Raphaël BUSSIÈRE, Pascal CAVALLIN, Bruno FLEURANT, Daniel GILARDOT, Éric JEAMET, Loïc JOMAT, M. KASTNER, Jean LANGOUMOIS, Mathilde LEFRÈRE, Alain MÉTAIS, Régis OUVRARD, Julien VENTROUX et Thomas WILLIAMSON.

## Bibliographie

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2007). Species factsheet : *Ardea purpurea*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 11/12/2008.
- ROCAMORA G. et YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d'études ornithologiques de France / Ligue pour la protection des oiseaux. Paris : 560 p.
- GILARDOT D. et RIGAUD T. (2000). Les Ardéidés nicheurs de la Vienne en 2000 et l'évolution de leurs effectifs depuis 1977. L'Outarde N°41 : 47-52.
- RIGAUD. et GRANGER M. (1999). Le Livre rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes. LPO Vienne / Poitou-Charentes Nature. Poitiers, France.

Communes	Lieux-dits	Comptage couples nicheurs en 2000	Comptage couples nicheurs en 2007
Asnières-sur-Blour	Étang des Vieilles Forges	4	0
Bellefonds	La Maraiche		13
Brion	Trois Fontaines	2	0
Coulombiers	La Pazioterie	26	44
Leigné-les-Bois	Les Ribatoux		35
Trois-Moutiers	La Mothe Chandener	4	Non prospecté
Lhonnaizé	Étang de la Forge		14
Millac	Étang du Molessard	4	10
Millac	Jousseau Ile de Brebaille		Non prospecté
Mouterre-sur-Blourde	Étang Font Champierre	3	8
Oyré	Les Parjolets		22
Pressac	Étang Bergère	84	74
Saulgé	Étang de Beaufour	45	136
Smarves	Bois de Saint-Pierre	9	19
Usson-du-Poitou	Étang Beauregard		1
Usson-du-Poitou	Étang de la Pétolée	59	56
Vouneuil-sur-Vienne	Bois du Fou	17	15
	TOTAL	257	447

Tableau 1 : Dénombrement des couples de Hérons cendrés nicheurs en 2000 et 2007 en Vienne




Figure 1 : Répartition des colonies de Hérons cendrés dans la Vienne en 2007