

Synthèse des données ornithologiques du 15/08/10 au 14/08/11

Coordinateur : Raphaël BUSSIÈRE

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes

86000 POITIERS



La rédaction de cette synthèse a été assurée par :

Colette BOULLAH : ANATIDÉS, PHASIANIDÉS, PODICIPÉDIDÉS, CHARADRIIDÉS, CAPRIMULGIDÉS, CINCLIDÉS, TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS, TURDIDÉS, MUSCICAPIDÉS, ÆGITHALIDÉS et PARIDÉS.

Raphaël BUSSIÈRE : STERNIDÉS, CUCULIDÉS, CORACIIDÉS, BOMBYCILLIDÉS, TIMALIIDÉS et LANIIDÉS.

Marie-Noëlle et Bernard COUTURAUD : LARIDÉS, PICIDÉS, CERTHIIDÉS et ORIOLIDÉS.

Jean-Claude DESCOMBES : MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS.

Cédric FAIVRE : ACCIPITRIDÉS, PANDIONIDÉS, FALCONIDÉS, TYTONIDÉS, STRIGIDÉS, MOTACILLIDÉS et RÉMIZIDÉS.

Régis OUVRARD : ARDÉIDÉS, THRESKIORNITHIDÉS, RÉCURVIROSTRIDÉS, COLUMBIDÉS, APODIDÉS, HIRUNDINIDÉS et CORVIDÉS.

Yann PICHON : CICONIIDÉS, RALLIDÉS, GRUIDÉS, ALAUDIDÉS, SITTIDÉS, TICHODROMIDÉS, STURNIDÉS et FRINGILLIDÉS.

Cyrille POIREL : OTIDIDÉS, BURHINIDÉS, SCOLOPACIDÉS et EMBÉRIZIDÉS.

Johan TILLET : PHALACROCORACIDÉS, ALCÉDINIDÉS, SYLVIIDÉS et PASSÉRIDÉS.

Liste des observateurs :

AIRAUT Vivien (AirV) - ALBERT Nathalie (AlbN) - ALEXANDRE Jean-François (AleJ) - ALEXIS Rodolphe (AleR) - ALLARD Michel (AllM) - ARMOUET Alain (ArmA) - ARNAULT Marie-Andrée (ArnM) - AUGUIN Anthony (AugA) - AURAT Michel (AurM) - BACLE Jérémy (BacJ) - BAILLARGEAT Sébastien (BaiS) - BALLIAU Jean-Michel (BaJ) - BARCQ Sylvie (BarS) - BARDET Michel (BarM) - BARON Yves (BarY) - BARRÉ Patrick (BarP) - BASQUE Lucien (BasL) - BAXTER Alan (BaxA) - BEAULIEU Jacques (BeaJ) - BERNARD Francis (BerF) - BERNARD Maurice (BerM) - BERNARDIN Mathieu (BerMa) - BERTEAU Jack (BerJ) - BERTON Louissette (BerL) - BESSAT Frédéric (BesF) - BEZARD Evelyne (BezE) - BILLAUD Jean-François (BilJ) - BODIN Aymeric (BodA) - BOENISCH Jean-Louis (BoeJ) - BOILEAU Patrice (BoiP) - BOIREAU Alain (BoiA) - BOIS Monique (BoiM) - BOISSINOT Alexandre (BoiAl) - BONNET Romain (BonR) - BONNET Timothée (BonT) - BONNIER Bernard (BonB) - BOUARD Roger (BouR) - BOUDOIRE Damien (BouD) - BOUIN Jean (BouJ) - BOULLAH Alain et Colette (BouAC) - BOUTIFARD Vincent (BouV) - BRAGUIER Antoine (BraA) - BRAMARD Michel (BraM) - BRANCIFORTI Julian (BraJ) - BRASSEUR Sylvie (BraS) - BRAUD Clément (BraC) - BRILLAND Yann (BriY) - BRISSONNET Adrien (BriA) - BRISSONNET Jérôme (BriJ) - BROSSET Audrey (BroA) - BROUCKE Bernard (BroB) - BROUCKE Hélène (BroH) - BRUNET Julien (BruJ) - BUSSIÈRE Raphaël (BusR) - CABIROL Rémi (CabR) - CAIGNEAUX Roland (CaiR) - CAMPANA Jean-Baptiste (CamJ) - CAUPENNE Michel (CauM) - CHANTEMARGUE Romain (ChaR) - CHAPLAIN Anne-Sophie (ChaA) - CHAUSSEBOURG Marie-José (ChaM) - CHEVRIER Jean-Jacques (CheJ) - CODARINI Sylvain

(CodS) - CODET Gilles (CodG) - COTTET Régis (CotR) - COUTEAU Jean-Guy (CouJ) - COUTUREAU Bernard et Marie-Noëlle (CouBM) - DAGUET Michel (DagM) - DAIRON- (CAIGNEAUX Clémence (DaiC) - DALLIER Jacques (DalJ) - DARAS Jeanine (DarJ) - DAUBERT Daniel (DauD) - DAVID Sylvie (DavS) - DE BAETS Martin (DebM) - DELECOUR Vincent (DeV) - DELLIAUX Christine (DeL) - DELORD Cathy (DeL) - DESCHAMPS Chantal (DesC) - DESCHAUME Nicole (DesN) - DESCOMBES Jean-Claude (DesJ) - DEVERGNE J. (DevJ) - DORFIAC Matthieu (DorM) - DOUET Sarah (DouS) - DUBOIS Adélie (DubA) - DUBOIS Thierry (DubT) - DUBREUIL Didier (DubD) - DUCEPT Samuel (DucS) - DUCLOS Franck (DucF) - DUPAS Louis (DupL) - DURAND Florian (DurF) - DUVERGER Anne (DuvA) - DZUGAN Isabelle (Dzul) - EVRARD Pierre-Paul (EvrP) - FAIVRE Cédric (FaiC) - FAUCONNET Damien (FauD) - FAUPIN Grégory (FauG) - FILLON Bruno (FilB) - FLEURANT Bruno (FleB) - FORDHAM Peter (ForP) - FOSSÉ Alain (FosA) - FRÉMOND Alain (FreA) - GAILLARD Brigitte (GaiB) - GARDEY Laureline (GarL) - GARGOT René (GarR) - GAUDUCHON Véronique (GauV) - GAUTHIER Sophie (GauS) - GÉHIN Lydie (GéHL) - ENTRIC Alain (GenA) - GILARDOT Daniel (GilD) - GILET Vincent (GilV) - GIRARD Claudine (GirC) - GIRAUD Isabelle (GirI) - GIUDICE René (GiuR) - GLAIN Françoise (GlaF) - GOULIER André (GouA) - GRACIEUX Céline (GraC) - GRANDRY Colette (GraCo) - GRANGER Michel (GraM) - GRANSAGNE Ernest (GraE) - GRECK Nicole (GreN) - GRÉGOIRE Nicole (GréNi) - GRELLIER Freddy (GreF) - GRIARD Benjamin (GriB) - GUERIN Thierry (GueT) - GUILLAUME Patricia (GuiP) - GUILLÉ Daniel (GuiD) - GUILLERMET Claire (GuiC) - HAINAULT Michel (HaiM) - HAMILTON John (HamJ) - HARRIS Florence (HarF) - HERPIN Jean-Luc (HerJ) - HIERNARD Simon (HieS) - HOLTHOF Eric (HoLe) - ISSA Nidal (IssN) - ISTIN Bertrand (IstB) - JAHAN Maxime (JahM) - JARDIN Georges (JarG) - JEAMET Eric (JeaE) - JIGUET Frédéric (JigF) - JOMAT Émilien (JomÉ) - JOMAT Loïc (JomL) - JONQUET Christine (JonC) - KAESTNER Martine (KaeM) - LAHOREAU Joëlle (LahJ) - LANCEREAU Jean-Paul (LanJP) - LANGOUMOIS Jean (LanJ) - LASSALLE Frédéric (LasF) - LAURENT Guy (LauG) - LAURENT Thibault (LauT) - LE GUEN Anthony (LegA) - LECOMTE François (LecF) - LEFEBVRE François (LefF) - LEJEUNE Annie (LeJA) - LEROUX Alain (LerA) - LIÉGEOIS Bernard (LiéB) - LIOT Adélaïde (LioA) - LIPOVOÏ Dounia (LipD) - LIPOVOÏ Katia (LipK) - LIQUOIS Aurore (LiqA) - LOUET Brigitte (LouB) - LOUSTE Eva (LouE) - LUCIANO Céline (LucC) - LUCK Chris (LucC) - LYON Typhaine (LyoT) - LYONNET Thibault (LyoTh) - MAILLARD Willy (MaiW) - MARDON Jérôme (MarJ) - MARQUIS Claire (MarC) - MARTIN Alain (MarA) - MARTIN Georges (MarG) - MASSON Michel (MasM) - MAURIN Audrey (MauA) - MÉNARD Catherine (MénC) - MERCERON Bruno (MerB) - MERCIER Julie (MerJ) - MÉRIGEAULT Evelyne (MérE) - MÉROT Julien (MérJu) - MÉTAIS Alain (MétA) - MICHEL Sylvie (MicS) - MILARET Vincent (MilV) - MINET Nicolas (MinN) - MOLLET Loïc (MoLL) - MOREAU Christian (MorC) - MOREAU Gaëlle (MorG) - MOREAU Michel (MorM) - MOREAU Patrice (MorP)

- MORIZET Yohan (MorY) - MORON Nicolas (MorN) - MOUSSET Basile (MouB) - MULLER David (MuLD) - NADAL Yann (NadY) - NEDELLEC Sébastien (NedS) - NIORTHE Dominique (NioD) - NOEL Andrew (NoeA) - OCAMPO Victor (OcaV) - ODEIDE René (OdeR) - OLMIER Sylvain (OliS) - OUVRARD Régis (OuvR) - PAPILLON Reine (PapR) - PEIGNAULT Alain (PeiA) - PERROIN Morgan (PerM) - PERSUY Alain (PerA) - PICHARD Adeline (PicA) - PICHON Claudie (PicC) - PICHON Yann (PicY) - PIERRE Morgan (PieM) - PINIER Rodolphe (PinR) - PLAT Pierre (PlaP) - PLISSONNEAU Fabienne (Plif) - POIREL Cyrille (PoiC) - POIS Bernadette (PoiB) - POISSON Olivier (PoiO) - POUVREAU Olivier (PouO) - PRATT Alban (PraA) - PRÉDOT Tony (PréT) - PRÉVOST Olivier (PréO) - PRINTEMPS Thierry (PriT) - RAITIÈRE Willy (RaiW) - RANSDALE Nick (RanN) - RÉGNIER Maud (RégM) - RENAUD Guy (RenG) - RENAUDET Ludovic (RenL) - RENOUST Aurélie (RenA) - RIBARDIÈRE Annie (RibA) - RICHARD Emmanuel (RicE) - RICHET Jean-Michel (RicJ) - RODENBURG-BASTIAAN Jacqueline (RodJ) - RONDEAU Jean-Louis (RonJ) - ROYER Denis (RoyD) - SABOURIN Laurent (SabL) - SALVAUDON Line (Sall) - SAVIN François (SavF) - SEILLER Benoît (SeiB) - SELIER Yann (SeiY) - SENEAL Angéline (SenA) - SÉVELLEC Tristan (SévT) - SLÉZAK Josée (SléJ) - SMITH Mike (SmiM) - SUDRAUD Julien (SudJ) - THERY Paul-Mickaël (TheP) - THIAUDIÈRE Jean-Claude (ThiJ) - TILLET Johan (TilJ) - TILLET Serge (TilS) - TOUVENET Sylvain (TouS) - TOUYA Fabien (TouF) - TROTTEREAU Michel (TroM) - TROUBAT Stéphane (TroS) - VAN-HECKE Benoît (VanB) - VAN-HECKE Paul (VanP) - VASSEUR Marie-Blanche (VasM) - VENTROUX Julien (VenJ) - VERICEL Emmanuel (VerE) - VINCENT Sébastien (VinS) - WAMBERGUE Eloi (WamE) - WELLS Barry (WelB) - WILLIAMSON Thomas (WiT) - WOOLFORD Anna-Maria (WooA) - ZUNINO Fabien (ZunF).

Liste alphabétique des étangs de la Vienne cités dans la synthèse :

Étang Baro, Mauprévoir
 Étang Bergère, Pressac
 Étang Delage, Saulgé
 Étang de Beaufour, Saulgé
 Étang de Beauregard, Iteuil
 Étang de Chez Séguier, Pressac
 Étang de Combourg, Pressac
 Étang de Fondeube, Availles-Limouzine
 Étang de Maupertuis, Coulombiers
 Étang de Piau, Journet
 Étang de Villeneuve, Nouaillé-Maupertuis
 Étang de l'Écotière, Bellefonds
 Étang de la Boussarderie, Pressac
 Étang de la Pétolee, Usson-du-Poitou
 Étang de la Verrerie, Le Vigeant
 Étang des Bonshommes, Châtellerault
 Étang des Brandes de la Châtre, Lathus-Saint-Rémy
 Étang du Léché, Saulgé
 Étang du Plantis, Journet
 Étang du Tinturier, Leignes-sur-Fontaine
 Étang Neuf, Pressac

Légende

nom français (*)

nom scientifique (*)

statut dans le département de la Vienne (**)

Pinson des arbres*Fringilla coelebs***S****((999-166-582))**

Un comptage en période de migration a donné 5 539 ind. le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL). Des groupes d'hivernants d'au moins 300 ind. sont observés de novembre à mars, jusqu'à 800 ind. le 23/12/10 à Aslonnes (JomL). Les premiers chants sont entendus le 20/02/11 à Saint-Cyr (HolE) et la construction d'un nid est observée le 05/03/11 à Sérigny (AleJ). Des transports de nourriture ont été signalés le 13/05/11 à Plaisance (RenL), le 24/05/11 à Vouneuil-sous-Biard (BusR) et le 14/07/11 à Brion (CouBM), constituant les seules preuves de nidification de l'espèce avec l'observation d'un juvénile le 08/06/11 à Saulgé (BouAC).

nombre d'observations,
nombre de communes et
nombre de lieux-dits

(*) : d'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011.

(**) : Statut dans le département de la Vienne.

S : Espèce observable tout au long de l'année.

E : Espèce observée uniquement en période de reproduction.

M : Espèce observée uniquement en période de migration.

H : Espèce observée en hivernage.

A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition.

? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse.

ANATIDÉS**Cygne tuberculé *Cygnus olor* S, H (348-43-83)**

Présent tout au long de l'année dans une grande moitié est du département, le plus souvent en couples ou en petits groupes avec des maxima à l'automne : jusqu'à 18 ind. sur la Vienne à Châtellerauld le 14/10/10 (BoiA), 15 ind. à Dangé-Saint-Romain le 07/11/10 (BusR et TilJ) et 15 ind. à Bonneuil-Matours le 23/11/10 (ChaM). La nidification est prouvée sur 8 sites, les premières femelles vues au nid sont signalées le 26/03/11 à l'étang Baro (BusR et BouV), puis le 09/04/11 à l'étang de l'Écotière (HolE) et le 16/04/11 à l'étang du Tinturier (LiéB), mais les premiers poussins sont vus le 27/04/11 à l'étang de Beaufour (RanN) qui accueille la famille la plus nombreuse : 7 poussins y sont comptés le 01/05/11 (PoiC).

Oie des moissons *Anser fabalis* M, H (7-1-2)

Un groupe de 5 ind. a été observé du 26/11/10 au 11/12/10 à l'étang de Beaufour et dans un chaume de maïs proche (RanN et al.).

Oie rieuse *Anser albifrons* M, H (1-1-1)

Rarement observée dans notre département. Un groupe de 9 ind. s'est posé pendant seulement une vingtaine de minutes sur le plan d'eau de Saint-Cyr le 04/01/11 (TilJ et al.).

Oie cendrée *Anser anser* M, H (104-34-50)

Observée essentiellement lors de la migration

postnuptiale, avec des troupes importantes le 10/11/10, jusqu'à 800 ind. dans l'après-midi, signalées à Chasseneuil (BouJ), Château-Larcher (JomL), Liniers (ChaM) et Saint-Cyr (TilJ). Des petits groupes sont signalés aussi sur l'axe passant par Saulgé (RanN et al.) pendant tout le mois de décembre. Le premier vol pré-nuptial, 20 ind., est signalé le 02/02/11 à Biard (BouV) et quelques groupes importants sont vus dès la mi-février : 120 ind. le 12/02/11 à Biard (BouV), 150 ind. le 14/02/11 à Gouex (AnoN) et 100 ind. le 14/03/11 à Châtellerauld (AlIM). Un groupe de 25 ind. est signalé encore le 27/03/11 à Beaumont (AnoN). À noter l'observation d'un individu présent du 03/01/11 au 03/05/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ et al.).

Bernache nonnette *Branta leucopsis* M (3-2-3)

Un groupe de 17 ind. est découvert le 03/01/11 à Ayrion dans un champ de blé en plantules au milieu d'un groupe de 300 Vanneaux huppés et d'une centaine de Pluviers dorés (RicJ). Le groupe est revu le 05/01/11 dans un chaume de maïs avec 19 ind. comptabilisés (HolE). Les oiseaux stationneront jusqu'au 07/01/11 (TilJ).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* ? (6-4-5)

Signalée à Tercé avec 1 ind. les 02/10/10 (HolE) et 08/01/11 (MorC), à Lathus-Saint-Rémy avec 2 ind. le 09/10/10 et 1 ind. le 01/05/11, à Chouppes le 13/12/10 (TilJ) et à Lusignan avec 1 ind. le 16/01/11 (HaiM).

Canard mandarin *Aix galericulata* ? (3-3-3)

Un couple est noté le 14/10/10 à Saulgé (RanN), 1 mâle le 10/02/11 à Coussay-les-Bois (DesC) et 2 mâles le 09/03/11 sur le Clain à Naintré (ArnM).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* S (20-8-11)

Aucune reproduction n'est avérée pour 2010, mais un ind. de première année est observé à plusieurs reprises durant la deuxième quinzaine d'août, le 15/08/10 à Vendevre-du-Poitou (BusR et TilJ) puis le 22/08/10 à Champigny-le-Sec (BusR) et le 24/08/10 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Quelques observations de 1 à 4 ind. pendant les mois d'hiver, notamment 3 mâles le 09/12/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ et TheP), 4 adultes le 19/12/10 dans la carrière inondée de Vaux-sur-Vienne (TilJ), 1 ind. le 04/01/11 à la sablière de Gouex (LioA) et 2 ind. le 15/01/11 à l'étang de l'Écotière (PapR). Au printemps, un couple est de nouveau repéré le 05/04/11 à la station d'épuration de Sèvres-Anxaumont (BusR), mais le mâle sera revu pour la dernière fois le 19/04/11 (BusR). Sur les bassins de Champigny-le-Sec, un couple sera présent du 08/04/11 (LiéB) au 11/05/11 (FaiC) sans reproduction constatée.

Canard carolin *Aix sponsa* ? (1-1-1)

Un individu a été signalé le 17/01/11 dans le bourg d'Ingrandes (LanJ).

Canard siffleur *Anas penelope* H, M (59-11-17)

Le premier migrateur est décelé le 02/10/10 avec la présence d'une femelle sur les bassins de Vendevre-du-Poitou (FauG). Les plus gros effectifs sont mentionnés à l'étang du Léché avec 13 ind. le 15/12/10 (LegA) et à l'étang de Fondeube avec 9 ind. le 24/12/10 (BusR). Les derniers migrateurs pré-nuptiaux sont observés vers la mi-mars avec 4 couples en escale le 17/03/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ et TheP) et 3 ind. le 19/03/11 à l'étang de l'Écotière (HolE).

Canard chipeau *Anas strepera* H, S (185-19-29)

Comme en 2010, la nidification est avérée, cette fois par l'observation de 6 poussins, fin juillet, à l'étang de Beaufour (HolE et LecF). Les rassemblements hivernaux signalés sont plus importants que l'année précédente avec jusqu'à 18 ind. le 28/11/10 à l'étang de l'Écotière (ChaM et HolE), 33 ind. le 10/12/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ), 43 ind. le 19/12/10 au barrage de Jousseau à Millac (BusR), 18 ind. le 15/01/11 à l'étang de Piau (GilD et VenJ) et encore 24 ind. le 14/03/11 à l'étang de Beaufour (RanN).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* H, S (299-22-43)

Les migrateurs post-nuptiaux sont observés en groupes conséquents à partir de la fin août, 25 ind. le 25/08/10 à l'étang de la Bergère (MérJu) et 17 ind. le 25/08/10 à l'étang de Combourg (MérJu). Si des petits groupes

sont observés durant tout l'automne et l'hiver à la réserve ornithologique de Saint-Cyr, avec un record de 61 ind. le 18/12/10 (TilJ), c'est dans les secteurs de Pressac et de Saulgé que les effectifs les plus importants sont comptés, jusqu'à 412 ind. à l'étang de Chez Séguier le 12/12/10 (BusR) et 150 ind. à l'étang de Beaufour le 31/12/10 (RanN).



Sarcelle d'hiver

Canard colvert *Anas platyrhynchos***H, S (824-113-284)**

Les effectifs augmentent dès la fin du mois d'août avec un maximum de 700 ind. le 31/08/10 à l'étang de Combourg (BouR) et ils resteront nombreux tout l'automne, sans doute suite à des lâchers d'élevage. La reproduction est prouvée sur 33 sites. Les canetons sont observés ici et là dans le département, de fin mars à mi-août, les 10 premiers le 31/03/11 à Pleumartin (DesC), puis 11 le 13/04/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR), 11 le 17/04/11 à Chasseneuil-du-Poitou (PicY) et le dernier poussin le 11/08/11 à l'étang de l'Écotière (GilD).

Canard pilet *Anas acuta***M (47-6-13)**

Des individus vus à l'unité, lors du passage post-nuptial, ont été signalés le 29/08/10 à l'étang de Beaufour (BusR), le 30/09/10 à Pressac (SmiM), le 30/10/10 à l'étang Bergère (MérJu) et le 08/10/10 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). L'espèce est régulière en période hivernale avec notamment 2 ind. le 12/12/10 à Saint-Cyr, 3 ind. le 15/01/11 à l'étang de Combourg (DorM) et 1 ind. le 15/01/11 à l'étang du Plantis (GilD et VenJ). La remontée s'amorce le 19/02/11 avec l'observation d'un groupe de 14 ind. à l'étang de Beaufour (BaiS). La dernière mention répertoriée est celle d'un couple présent le 13/04/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* M, E (3-2-3)

Observation de 3 ind. le 29/08/10 à l'étang de Beaufour (BusR). En période pré-nuptiale, un mâle est signalé le 21/03/11 à Lathus-Saint-Rémy (RanN) et deux mâles le 29/04/11 à l'étang du Léché (RanN).

Canard souchet *Anas clypeata* H, M (96-15-21)

À l'automne, les effectifs les plus importants ont été observés à l'étang de Beaufour, avec 18 ind. le 26/10/10 (RaN), et à Saint-Cyr, avec 16 ind. le 21/11/10 (LecF). Lors de la migration printanière, le souchet affectionne les mêmes sites. On signale 10 ind. le 30/03/11 à l'étang de Beaufour et, sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr, 17 ind. le 13/03/11 et 22 ind. le 06/04/11 (TiIJ et al.). Un couple a stationné du 06/05/11 au 27/05/11 à l'étang de la Pétolée avec parade notée le 22/05/11 (BusR). Aucune reproduction n'a été prouvée en 2011.

Nette rousse *Netta rufina* H, E (29-4-6)

Observée principalement en période hivernale sur trois sites : 3 mâles, puis seulement 2 à partir du 10/12/10, ont séjourné du 04/12/10 (MinN) au 09/01/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ et al.), 1 mâle le 11/12/10 sur la Vienne à Cenon-sur-Vienne (GuiD) et 1 mâle le 31/01/11 au Grand Étang de Lathus-Saint-Rémy (GuiP). Un mâle est observé ponctuellement le 21/04/11 à l'étang de Beaufour, site où l'espèce avait niché avec succès en 2005 (RaN).

Fuligule milouin *Aythya ferina* H, S (218-21-39)

Les groupes les plus importants sont notés en hiver et lors de la remontée printanière avec notamment 50 ind. le 26/12/10 à l'Isle-Jourdain (RaN), 133 ind. le 07/01/11 à Saint-Cyr (LyoT), 210 ind. le 10/02/11 à l'étang de Beaufour (PlaP) et 97 ind. le 20/03/11 à l'étang de Combourg (BusR). La reproduction n'est prouvée que dans le secteur de Saulgé : 2 couples et 2 femelles avec respectivement 5 et 3 poussins à l'étang Delage et 3 femelles accompagnées respectivement de 6, 6 et 5 poussins le 31/05/11 à l'étang du Léché (RaN), enfin 1 femelle avec 8 poussins le 20/06/11 à l'étang de Beaufour (RaN).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* H, M (6-2-3)

Un mâle a séjourné du 01/11/10 au 07/11/10 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (SabL et al.) et 1 ind. du 10/02/11 au 14/02/11 à l'étang de Beaufour (BouR et ThiJ).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* H, S (169-17-26)

Les rassemblements des mois d'hiver ont été notés surtout à Saint-Cyr, avec 31 ind. le 27/12/10 (TiIJ et al.), à Saulgé, avec 23 ind. le 19/02/11 à l'étang de Beaufour (BailS) et à Lathus-Saint-Rémy avec 18 ind. le 01/04/11 (RaN). Seuls deux sites sont avérés pour la reproduction, l'étang de Beaufour, où 5 canetons ont été vus le 21/06/11, et l'étang du Léché, qui a abrité une nichée de 8 canetons vus le 13/07/11 (RaN).

Macreuse brune *Melanitta fusca* H, M (3-1-2)

Trois femelles, une adulte et deux de première année,

sont observées au plan d'eau de Saint-Cyr du 21 au 25/12/10 (TiIJ et al.).

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula* H, M (28-3-4)

Une femelle a été observée à de nombreuses reprises au plan d'eau de Saint-Cyr entre le 27/12/10 et le 15/01/11 (TiIJ et al.). À l'étang de Beaufour, un mâle en plumage nuptial et deux ind. de type femelle ont séjourné du 31/12/10 au 25/01/11 (RaN et al.). À noter une observation ponctuelle de deux femelles adultes présentes le 15/01/11 à Saint-Léomer (GilD et VenJ).

Harle piette *Mergus albellus* M (1-1-1)

Une femelle adulte est observée le 04/01/11 à l'étang de Beaufour (PlaP).

Harle huppé *Mergus serrator* M (4-1-2)

Une femelle est observée ponctuellement le 17/11/10 au plan d'eau de Saint-Cyr en compagnie d'un groupe de Grèbes huppés (TiIJ et TheP) ; 2 ind. séjourneront du 31/12/10 au 02/01/11 sur ce même site (HolE et al.).

Harle bièvre *Mergus merganser* H, M (60-7-12)

Présence du 02/11/10 au 08/03/11 au plan d'eau de Saint-Cyr avec un maximum de 22 ind. comptabilisés le 28/12/10 (TiIJ). À noter également le stationnement d'une femelle du 24/12/10 au 30/12/10 à l'étang de Maupertuis (RenG). Trois autres sites où l'espèce a été observée ponctuellement au cours de l'hiver : l'étang de Fondeube avec 4 ind. le 19/12/10 (BusR), la Vienne à Civaux avec 9 ind. le 13/02/11 (LegA) et l'étang communal de Montreuil-Bonnin avec 15 ind. le 17/02/11 (BoiAl).

PHASIANIDÉS**Perdrix rouge *Alectoris rufa* S (140-76-132)**

Un cas de nidification certaine à ajouter aux 2 déjà signalés en 2010 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux et Coussay-les-Bois : 12 jeunes accompagnés par 2 adultes vus à Yversay le 04/09/10 (DubT). En 2011, 5 poussins sont observés le 09/07/11 à Curzay-sur-Vonne (FosA). Deux petits rassemblements ont été notés à l'automne et en hiver, probablement suite à des lâchers pour la chasse.

Perdrix grise *Perdix perdix* S (72-44-63)

Les groupes les plus importants sont signalés en automne et en hiver, notamment 9 ind. le 15/10/10 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TiIJ) et 20 ind. le 15/01/11 à Vendeuve-du-Poitou (AleJ). En 2010, la nidification est prouvée à Vendeuve-du-Poitou avec l'observation de 8 jeunes le 24/08/10 (TiIJ) et en 2011, ce sont 8 jeunes volants signalés le 05/07/11 à Thuré (AleJ).

Caille des blés *Coturnix coturnix***E (113-51-104)**

En 2010, la dernière observation date du 28/08 à Massognes (TiLS). En 2011, les premiers chants se font entendre le 07/04 à Rouillé (RenG). Les contacts auditifs s'intensifient au mois de mai, qui représente 60 % des données répertoriées. Aucune preuve de nidification n'a été signalée.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus***S (193-75-145)**

Les contacts auditifs représentent 25 % des données recueillies. Deux preuves de reproduction sont relevées : 1 couple avec un jeune le 09/09/10 à Archigny (OuvR) et 1 mâle avec 3 jeunes le 09/07/11 à Saint-Sauveur (DesJ).

PODICIPÉDIDÉS**Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*****S (174-46-66)**

70 % des données concernent des observations sur des étangs. Ils accueillent les effectifs les plus importants avec 15 ind. le 27/08/10 à l'étang du Tinturier (LiéB), 13 ind. le 01/10/10 à l'étang du Léché (BouR) et 17 ind. le 26/10/10 à l'étang de Beaufour (RanN). L'espèce est présente également dans les bassins de décantation, avec notamment un effectif maximum de 8 ind. relevé le 08/10/10 à Venduvre-du-Poitou (TiIJ et BusR). Les rivières (10 % des données) sont également appréciées par l'espèce. Un groupe de 4 ind. est noté sur la Vienne à Millac (BusR), effectif maximum relevé en rivière. Un couple construit son nid le 05/04/11 à Saint-Julien-l'Ars (BusR) ainsi que le 10/04/11 à Saint-Pierre-d'Exideuil (BaxA). Des jeunes sont présents le 02/06/11 à Archigny (OuvR), le 20/07/11 à Mignaloux-Beauvoir (PouO) et le 24/07/11 à l'étang de Beaufour (RanN).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* S (434-37-69)

La nidification est confirmée en 2010 sur de nombreux plans d'eau du département. Des jeunes sont encore observés en septembre, voire jusqu'en novembre pour certaines nichées, avec des jeunes visibles, notamment le 06/11/10 à Saint-Cyr (TiIJ). Les rassemblements postnuptiaux ne sont guère significatifs, on n'observe que 3 groupes de 10 à 15 ind., à l'étang de Maupertuis le 20/08/10 (BusR), à l'étang de Beaufour le 29/08/10 (BusR) et à l'étang du Léché le 26/09/10 (BouR). Au plan d'eau de Saint-Cyr, un rassemblement commence à se constituer fin novembre avec un groupe de 22 ind. le 24/11/10 (TiIJ) pour culminer le 26/12/10 avec 98 ind. (BusR) et les effectifs diminuent fortement à la mi-janvier où seulement 11 ind. seront comptabilisés (LyoT). Au printemps, une première parade est signalée le 09/04/11 à l'étang de Beaufour (CouBM) et les premiers poussins, le 10/04/11 à

l'étang de Beauregard (BusR). D'autres seront observés ici et là dans le département au cours de l'été.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* M (1-1-1)

Un ind. est observé le 30/01/11 au lac de Jousseau à Availles-Limouzine, en compagnie d'un groupe de 18 Grèbes huppés (LegA et PraA).

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis***M (15-6-8)**

L'espèce est observée d'août à novembre sur 4 sites : 1 ind. le 21/08/10 à l'étang du Tinturier (LiéB), 2 ind. le 08/10/10 à l'étang de Maupertuis (BouR), 1 ind. du 15/10/10 au 27/10/10 à la sablière de Saulgé (RanN) et 1 ind. le 17/11/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ et TheP). Au printemps, 1 ind. est signalé le 11/03/11 à l'étang de Beauregard (JomL) et 1 ind. le 26/03/11 à l'étang de la Verrerie (BusR et BouV). À l'étang de Beaufour, 2 à 6 ind. séjournent du 14/03/11 au 04/04/11, avec une parade nuptiale observée le 04/04/11 (RanN).

PHALACROCORACIDÉS**Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*****S (621-88-102)**

Les observations sont notées principalement en hiver avec des regroupements de 150 ind. le 02/12/10 à Pressac (RicE) et un dortoir de 155 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr le 12/12/10 (TiIJ). Les effectifs record concernent des groupes lors de la migration pré-nuptiale notamment le 18/03/11 avec respectivement 140 ind. et 155 ind. à Valdivienne (DubT), et 210 ind. à la Chapelle-Viviers (DubT)

Les poissons-chats sont les prises les plus notées lors des actions de pêche, notamment à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL et TiIJ) ainsi que qu'au lac de la forêt de Châtellerault (DupL).



Grand cormoran

ARDÉIDÉS**Butor étoilé *Botaurus stellaris* M (1-1-1)**

Un individu est observé pendant trois jours autour du 25/12/10 sur le terrain militaire de Montmorillon (GouA).

Blongios nain *Ixobrychus minutus* E (3-1-1)

Un couple nicheur est observé au Grand Étang de la Puye du 10 au 12/08/11, produisant 3 jeunes (OuvR et al.).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* E, M (20-13-14)

Dernière observation en 2010 notée le 26/11 à Marigny-Chemereau (BraJ), et première observation en 2011 le 19/03 à l'étang de l'Écotière (HolE). Nidification possible à l'étang de l'Écotière avec l'observation d'un adulte le 19/03/11 et le 17/06/11 (HolE), et de 2 ind. de première année le 11/08/11 (GilD).

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* S (149-61-102)

Présent toute l'année. Les mois de décembre, janvier, février et mars concentrent la majorité des observations. Pendant ces quatre mois, les effectifs moyens par regroupement sont croissants : un maximum de 8 ind. le 19/12/10 à Smarves (RoyD), de 13 ind. le 20/01/11 à l'étang Bergère (MérJu), un minimum de 13 ind. le 19/02/11 à Sommières-du-Clain (GréNi), de 12 ind. le 04/03/11 à l'étang de Combourg (MérJu). La reproduction est prouvée à l'étang de Beaufour avec la découverte d'un nid contenant 3 jeunes le 14/07/11, mais l'observation de 7 jeunes le 30/07/11 laisse supposer un, voire deux autres couples reproducteurs (RanN).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* S (261-46-82)

Présente toute l'année avec une nette diminution du nombre d'observations de février à avril. Le caractère grégaire de l'espèce se manifeste avec des effectifs supérieurs à quatre en janvier, mai, juin, juillet et août. Notons, par exemple, 12 ind. le 15/01/11 à Dangé-Saint-Romain (LiéB), 8 ind. le 20/05/11 (RanN) et 10 ind. le 29/07/11 à l'étang de Beaufour (LecF), ou encore 14 ind. le 07/08/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (HolE). La reproduction est prouvée à l'étang de Beaufour par la présence d'un couveur le 01/07/11 dans la héronnière avec les Hérons cendrés (PlaP).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* M, H (575-71-203)

Les observations sont de plus en plus fréquentes dans le département tout au long de l'année, même si elles se concentrent entre octobre et mars. Durant cette

période, à noter le comportement grégaire de l'espèce avec 45 observations regroupant 5 ind. ou plus, et 15 observations regroupant 15 ind. ou plus. L'effectif le plus important est noté le 08/11/10 à Saulgé avec 38 ind. (RanN). L'espèce est régulièrement observée dans des prairies, probablement à la recherche d'alimentation comme d'autres Ardéidés, comme cet individu en compagnie d'un Héron cendré le 13/10/10 à Montreuil-Bonnin (SevT), ou encore 6 ind. dans une jachère le 04/12/10 à Saulgé (PlaP). À noter 1 ind. présent du 08/07/11 au 03/08/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ et al.) bagué par Loïc et Pierrick Marion comme jeune au nid au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) le 16/05/11.

Héron cendré *Ardea cinerea* S (1029-154-446)

À noter apports de matériaux, parades nuptiales et 36 nids déjà occupés à l'étang de la Pétolée le 25/02/11 (AleJ), ou encore 31 nids notés le même jour à l'étang de Beaufour (VenJ). La héronnière la plus importante compte 63 nids occupés le 06/04/11 à Coulombiers (BouR). Les premiers jeunes au nid sont signalés le 23/04/11 à l'étang de la Pétolée (BusR) et à Millac (BusR). Le plus gros effectif est de 85 ind. à l'étang de la Pétolée le 25/02/11 (AleJ).

Héron pourpré *Ardea purpurea* E (122-26-49)

Dernière observation en 2010 notée le 22/09 à Saulgé (RanN), et première observation en 2011 le 02/04 au Vigeant (BusR). La reproduction est prouvée à l'étang Baro, à l'étang de Beaufour, à l'étang de Combourg et à l'étang Neuf avec un minimum de 14 couples au total. La plus grande colonie regroupe environ 18 ind. le 17/05/11 à l'étang Neuf (MérJu).

CICONIIDÉS**Cigogne noire *Ciconia nigra* M (24-12-21)**

En 2010, la migration postnuptiale a amené plusieurs observations d'oiseaux de première année : 4 ind. le 25/08 à Pressac (MérJu), 1 ind. le 30/08 à Moulismes (RanN), 1 ind. le 30/08 à Pressac (RaiW) et 1 ind. le 01/09 à Mauprévoir (MérJu). Le premier oiseau de 2011 est noté le 10/04 à l'étang de Combourg (FleB) ; l'effectif maximum concerne 4 ind. vus en vol le 28/07 à Biard (BouV). Trois observations sont répertoriées en période de nidification : 1 adulte le 06/06 à Thollet (RanN), 1 adulte le 26/06 à Brigueuil-Chantre (WelB) et 1 ind. le 03/07 à Marigny-Chemereau (ChaA).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M (67-37-56)

Près de 500 oiseaux sont notés en septembre, dont un vol de 69 ind. le 06/09/10 à Poitiers (CaiR), alors que la plupart des groupes ne dépassent pas la vingtaine d'individus ; la migration postnuptiale est

observée jusqu'au 20/09/10 à Saint-Cyr (JomL). Quelques oiseaux sont observés posés en décembre et en janvier ; le passage pré-nuptial débute avec le mois de février, le maximum contacté est de 150 ind. le 26/02/11 à Pressac (SmiM). Deux mentions sporadiques de l'espèce ont lieu en mai avec 1 adulte le 20/05/11 à l'étang de la Pétolee (BusR) et 1 autre le 22/05/11 à Poitiers (PicY).

THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche *Platalea leucorodia* A (1-1-1)
Deux ind. sont observés le 04/01/11 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (BraA).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore *Pernis apivorus* M, E (60-40-53)

Lors de la migration postnuptiale, un groupe de 6 ind. est contacté le 01/09/10 (MérJu). Le dernier migrateur a été vu le 25/09/10 à Vellèches (JomL). De retour d'hivernage, l'espèce est observée pour la première fois le 20/04/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (GraM). À partir du mois de mai, les contacts deviennent de plus en plus fréquents. Le premier comportement territorial est mentionné le 04/06/11 à Coulombiers (NadY). Les parades nuptiales sont notées le 16/06/11 à Vouillé (LerA) et le 18/06/11 à Château-Larcher (JomL).

Milan noir *Milvus migrans* E (246-68-151)

La migration postnuptiale a permis de contacter un groupe de 10 ind. le 21/08/10 à Cherves (BusR et TilJ). Cette espèce migratrice est généralement vue jusqu'à fin septembre ; cependant, 2 ind. tardifs ont été notés respectivement le 17/11/10 à Queaux (BusR) et le 30/12/10 à Saint-Cyr (LiéB) ! La première mention de l'année 2011 date du 01/03 à Saint-Sauveur où deux individus sont observés avec transport de matériaux (Desc). Trois preuves de reproduction certaine ont été répertoriées durant la saison 2011. Un couple a niché à côté de l'étang de Beaufour (BouAC) et deux aires ont été trouvées à Archigny (OuvR).

Milan royal *Milvus milvus* M (29-23-26)

Les observations sont régulières d'octobre à avril. La première donnée date du 02/10/10 à Sommières-du-Clain (CouBM). Deux groupes importants sont notés respectivement le 10/10/10 à Brigueuil-le-Chantre avec 24 ind. (WelB) et le 26/10/10 avec 12 ind. (RanN). Plusieurs observations sont réalisées en hiver notamment : 1 ind. le 05/01/11 à Jouhet (LyoT), 1 ind. le 07/01/11 à Ayron (TilJ) et 1 ind. le 17/02/11 à Haims (DaJ). Les données printanières débutent le 03/03/11 avec 1 ind. à Saint-Sauveur (VenJ).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* E (70-34-57)

La dernière observation de ce migrateur transsaharien en 2010 est notée le 22/09 à Saulgé (RanN). Il est vu pour la première fois en 2011 le 23/03 à Bournand (CodS). Malgré sa taille imposante il est très discret et aucune preuve de reproduction n'a été signalée en 2011. Un comportement territorial est quand même noté le 08/04/11 à Quincay (VanB).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* S (69-35-51)

Espèce contactée durant toute la période considérée, la plupart du temps à l'unité. À noter un groupe de 5 ind. le 09/08/11 venu en dortoir avec les Busards Saint-Martin et cendrés à Vouzailles (LerA). Aucun indice de nidification probable ou certaine n'a été noté.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* E, S (743-165-531)

Présent toute l'année dans le département de la Vienne. Lors des rassemblements en dortoir au mois d'août, un groupe de 34 ind. a été noté le 18/08/10 à Archigny (FauG). Lors de la période de reproduction, 11 couples ont été suivis en plaine agricole du Haut-Poitou produisant 19 jeunes à l'envol (VanB, DelC et al.) et 4 couples localisés au Pinail (AugA et al.).

Busard pâle *Circus macrourus* M (1-1-1)

Une seule mention pour ce migrateur venu de l'Est de l'Europe. Un mâle a été observé le 04/09/10 à Cissé, posé au sol et en chasse (DubT).

Busard cendré *Circus pygargus* M, E (329-79-226)

Espèce présente dans le département pendant la période de reproduction. Différents dortoirs de Busards ont été localisés et suivis dans les plaines du Neuvilleois-Mirebalais durant le mois d'août 2011. Parmi les oiseaux présents dans ces dortoirs, 53 à 67 % sont des Busards cendrés, les autres sont des Busards Saint-Martin. Un effectif maximum cumulé de 137 ind. est atteint début août (LerA et al.). Les 2 derniers migrateurs sont vus le 06/10/10 à Jazeneuil (FaiC). Au retour de l'hivernage, le premier oiseau a été vu le 02/04/11 à Saint-Sauvant (RenG). Le premier couple nicheur est noté le 27/04/11 aux Trois-Moutiers (Print). Les premiers poussins sont vus le 30/05/11 à Pouant (GriB).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* S (39-31-36)

Fait intéressant : les données proviennent presque toutes du sud du département. Un oiseau cantonné est contacté à deux reprises, les 30/12/10 et le 22/01/11, à Chenevelles dans le cadre des transects « Atlas des Oiseaux en hiver » (OuvR). Un seul indice de reproduction certaine est noté le 23/04/11 à Dissay avec un adulte sur l'aire (HolE).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* S (294-111-212)

Espèce sédentaire contactée régulièrement durant la période considérée. Cependant, son extrême discrétion durant la période de nidification n'a permis de détecter qu'un seul indice de reproduction certaine le 15/05/11 à Archigny avec un transport de nourriture (OuvR).

Buse variable *Buteo buteo* S (957-182-680)

Rapace commun vu à toutes les périodes de l'année. Le premier cantonnement sur un nid est noté le 23/03/11 à Saulgé (RanN). Un transport de nourriture est signalé le 25/06/11 à Chenevelles (OuvR).

Aigle botté *Aquila pennata* M, E (2-2-2)

Un oiseau en phase claire est contacté le 19/09/10 à Pressac (RanN). En 2011, un oiseau en phase sombre est observé le 11/07/11 à Payré (AnoN).

PANDIONIDÉS

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* M (33-20-22)

Espèce observée uniquement en période de migration. Le premier migrateur postnuptial est noté le 26/08/10 à l'étang de Maupertuis (JomL). Deux individus sont observés au barrage de Jousseau le 05/09/10 (FleB). Le dernier oiseau migrateur est noté le 27/10/10 à Béruges (BouV). Le fait marquant est la découverte d'un oiseau vu en train de transporter des branchages le 15/01/11 au Vigeant (HolE). Vraisemblablement le même individu est contacté le 17/01/11 à Saint-Martin-l'Ars en train de recharger un ancien nid (VenJ). Cette tentative de nidification n'ira pas plus loin. Le premier oiseau de retour de ses quartiers hivernaux a été noté le 15/03/11 à Lusignan (BonT).

FALCONIDÉS

Faucon crécerellette *Falco naumanni* A (1-1-1)

Espèce extrêmement rare et menacée dont l'aire de répartition se situe dans le sud de la France. Un mâle adulte est observé le 21/04/11 à Jazeneuil (VenJ).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* S (769-168-528)

Le premier accouplement est noté le 23/03/11 à Bonneuil-Matours (LiéB). Les premiers jeunes à l'envol ou sur le point de l'être sont vus le 05/06/11 à Neuville-de-Poitou (MérE). L'année 2011 aura permis de relever 18 cas de reproduction certaine pour ce rapace commun dans le département.

Faucon kobez *Falco vespertinus* A (2-1-1)

Une femelle est observée les 13 et 14/05/11 au niveau de l'aéroport de Biard (BouV). Ce rapace est un migrateur qui est très peu vu dans notre département.

Faucon émerillon *Falco columbarius* H (46-29-39)

Le premier oiseau est vu le 21/09/10 à Château-Larcher (JomL). Les données concernent en général des oiseaux isolés. Une donnée datant du 09/10/10 mentionne 2 migrateurs à Château-Larcher (JomL). Les données sont peu nombreuses mais régulières sur la période hivernale. La dernière observation de 2011 date du 17/04/11 à Saint-Cyr (DubT).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* E (137-63-103)

Oiseau migrateur présent uniquement pendant la période de reproduction. Le dernier oiseau de 2010 est noté le 15/10/10 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TilJ). Il faut attendre le 16/04/11 à la Chapelle-Bâton pour avoir la première donnée printanière (JomL). Le premier accouplement est noté le 06/05/11 à Buxerolles (HolE). Aucun indice de reproduction certaine n'a été noté en 2011.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* H, S (56-28-36)

De novembre à février, l'espèce est notée à l'unité sur 13 communes. En 2011, 5 couples cantonnés «en milieu naturel» ont été recensés, totalisant 8 jeunes à l'envol (JeaE et al.). Les premières couvaisons ont lieu dès le 12/03 (JeaE) et les premières éclosions constatées dès le 17/04 (JeaE). Un mâle est présent les 05/04 (BouR) et 12/05 (BouR) à la centrale nucléaire de Civaux, mais on ne dispose d'aucun indice de reproduction de l'espèce sur ce site. Des attaques infructueuses ont été relevées, le 22/08/10 à Maisonneuve sur un groupe de Vanneaux huppés (TilJ), le 04/09/10 à Cissé sur un Pigeon ramier (DubT), le 11/10/10 à Coulombiers sur un groupe d'Étourneaux sansonnets (BouR) et le 20/11/10 à la Grimaudière également sur un groupe d'Étourneaux sansonnets (ArmA). À noter l'observation d'un mâle ayant un étourneau ou un merle dans les serres le 03/01/11 à Latillé (VenJ).

RALLIDÉS

Râle d'eau *Rallus aquaticus* S (23-9-13)

Cette espèce discrète a été notée en toute saison dans le département et sa nidification est soupçonnée à l'étang de Beaufour, pour la troisième année consécutive (RanN). À Marigny-Chemereau, elle est jugée probable sur deux sites (BraJ). Elle est également notée possible au Grand Étang de la Puye (DubT et OuvR) et à Nouaillé-Maupertuis (AlbN).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*
S (471-96-194)

Hors saison de reproduction, la Gallinule n'a été observée qu'en faibles effectifs, sauf pendant une période de gel où des groupes plus conséquents se sont formés, comme 23 ind. le 17/12/10 à Chauvigny (TiJ), 14 ind. le 19/12/10 à Vivonne (BusR) ou 13 ind. le 16/12/10 à Poitiers (BusR). La nidification de l'espèce a été prouvée dans 20 communes et soupçonnée dans 29 autres (nidification jugée possible ou probable). Les premiers poussins ont été vus le 30/04/11 à Beaumont (HoIE), les plus tardifs le 11/08/11 à la Puye (DubT) ; les nichées les plus fournies n'avaient que 4 poussins (OuvR et DesC).

Foulque macroule *Fulica atra*
S, M (623-56-112)

En période internuptiale, la Foulque macroule a souvent été observée en groupes comptant plusieurs dizaines d'oiseaux, avec un maximum de 312 ind. le 25/12/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (HoIE), de 250 ind. le 26/09/10 à l'étang de Beaufour (BouR), ou encore de 200 ind. le 26/09/10 à l'étang de Combourg (BouR). Ces grands rassemblements hivernaux se désagrègent à partir de février. L'espèce a été trouvée nicheuse certaine dans 18 communes ; le premier adulte couvant a été noté le 31/03/11 à Liglet (CouBM), et le dernier le 14/05/11 à Archigny (OuvR). Les plus grosses couvées comptent 6 poussins, comme le 24/05/11 à Lhommaizé (BasL) ou le 29/05/11 à Saulgé (RanN). C'est en juin qu'a été signalé le plus grand nombre de nichées.

GRUIDÉS

Grue cendrée *Grus grus* **M (252-76-160)**

18 000 grues ont été observées pendant la migration postnuptiale. Les premières de l'automne 2010 sont aperçues le 30/09/10 à Buxerolles (KaeM) ; la vingtaine d'observations en octobre ne concerne que de faibles effectifs et il faut attendre la deuxième quinzaine de novembre pour voir arriver des groupes importants migrant vers leurs zones d'hivernage : 1 310 ind. le 18/10/10 à Saulgé (PlaP), 949 ind. le 20/10/10 à l'étang de Beaufour (DebM et al.) et 4 000 ind. le 23/10/10 à Adriers (GraE). Les déplacements vers le sud se poursuivent en décembre et même début janvier avec notamment 450 ind. le 11/12/10 à Millac (BusR), 400 ind. à Saulgé (RanN), et 651 ind. le 12/12/10 encore à Saulgé (BusR et al.). 14 600 oiseaux sont comptés pendant la migration pré-nuptiale, la majorité entre la mi-février et la mi-mars, mais les vols vers le nord-est sont notés dès le 09/02/11 avec 300 ind. à Adriers (GraE). Les plus gros effectifs sont de 1 750 ind. le 26/02/11 à Pressac (SmiM), 735 ind. le 21/02/11 à Archigny (OuvR) et 640 ind. le 08/03/11 à Valdivienne (PinR). La mention la plus tardive est celle d'un oiseau posé le 04/05/11 au Vigeant (BaiS).

OTIDIDÉS

Outarde canepetière *Tetrax tetrax*
E (577-42-217)

Lors du comptage des rassemblements, 86 ind. ont été recensés le 04/09/10 sur 6 communes des plaines du Neuvilleois-Mirebalais. Les plus gros rassemblements sont notés le 08/10/10 : 116 ind. à Craon en limite des Deux-Sèvres (ArmA) et 42 ind. à Angliers (ArmA). Les premiers oiseaux de 2011 sont observés le 23/03 à Frozes (RicJ) et à Cissé (LerA), puis le 25/03 à Saint Sauvant (HaiM). Les deux principaux rassemblements pré-nuptiaux ont été notés le 05/04/11 à Saint-Sauvant (HaiM) et le 17/04/11 à Craon (PoiC) avec respectivement 10 et 15 oiseaux. Seulement deux preuves de nidification réussie ont pu être établies : une femelle et trois jeunes sont observés à 6 reprises dans une jachère à Frozes du 02/06/11 au 20/06/11 (RicJ) et une femelle accompagnée d'un jeune est observée dans un chaume de céréales le 14/07/11 à Vouzailles (DeIC). À noter 5 observations d'ind. de type femelle, réalisées en dehors des zones de reproduction connues : 1 en période pré-nuptiale, le 08/04/11 à Coulombiers (TheP), et 4 en périodes postnuptiales : le 18/08/10 à Pressac (RicE), le 19/08/10 à Archigny (OuvR), le 20/08/10 à Doussay (FauD) et 4 ind. le 04/10/10 à Voulême (DorM).

RÉCURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche *Himantopus himantopus*
M (4-3-3)

Quatre données pré-nuptiales : 11 ind. le 10/04/11 (BusR) et 2 ind. le 16/04/11 (PoiC) à la réserve ornithologique de Saint-Cyr, 2 mâles et 2 femelles le 22/04/11 à l'étang du Léché (RanN) et 1 ind. le 20/05/11 à l'étang de Chez Séguier (MérJu).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*
M (4-1-2)

Observée uniquement au plan d'eau de Saint-Cyr : 35 ind. le 07/11/10 (BouR et al.), 7 ind. le 13/03/11 (MinR) et 15 ind. le 22/06/11 (TiJ).

BURHINIDÉS

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* **E, S (549-93-326)**

Espèce largement répandue dans la Vienne qui constitue l'un des principaux bastions de cette espèce en France. L'œdicnème peut être observé quasiment toute l'année, mais reste occasionnel pendant les mois d'hiver. Les comptages des rassemblements ont eu lieu, en partenariat avec l'ONCFS. Les chiffres sont du même ordre que ceux des années précédentes avec au fil de l'automne une montée progressive des effec-

tifs sur les différents sites de rassemblements : 490 ind. le 04/09/10, 1 011 ind. le 21/09/10, 1 194 ind. le 02/10/10 et 1 587 ind. le 12/10/10. Certains rassemblements avoisinent les 200 ind., comme le 04/10/10 à Vouzailles où 167 ind. ont été dénombrés (RicJ). Le maximum est atteint le 21/09/10 à Venduvre-du-Poitou lors du comptage ONCFS avec 210 oiseaux. Les observations hivernales restent rares : 45 ind. le 24/11/10 à Angliers (ArmA) et un minimum de 2 ind. le 09/12/10 dans un champ de moutarde à Voulême (DorM).

La première observation « printanière » a été réalisée, comme en 2009, le 24/02/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (GauV). Cinq preuves de nidification certaine ont été établies en 2010 : 2 poussins le 10/05/11 à Frozes (RicJ), 2 autres le 23/05/11 à Mazeuil (PoiC), un poussin non emplumé le 27/05/11 à La Grimaudière (WiIT), un adulte couveur le 28/05/11 à Neuville-de-Poitou (WiIT) et un jeune le 17/06/11 à Pleumartin (DesC).

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot *Charadrius dubius*

M, E (160-18-30)

Lors du passage automnal, l'espèce est notée sur deux sites avec un maximum de 5 ind. le 24/08/10 à l'étang de Chez Séguier (MérJu) et une observation ponctuelle de 2 ind. le 24/08/10 à l'étang du Léché (RanN). La dernière mention de 2010 porte sur l'observation d'un oiseau le 22/09 à Saulgé (RanN). Son retour printanier est signalé à la réserve ornithologique de Saint-Cyr, avec 2 ind. le 15/03/11 (TheP). Un maximum de 10 ind. est noté le 01/04/11 sur ce même site (LiéB et HolE). À noter l'observation d'un groupe de 11 ind. posé dans un labour le 04/04/11 à Vouneuil-sous-Biard (BusR). La reproduction est prouvée sur 4 communes : 1 ind. sur nid le 10/05/11 à Valdivienne (WiIT), 2 ind. sur nid le 31/05/11 aux Trois-Moutiers (RaiW), 1 couple avec 1 poussin le 21/06/11 à l'étang du Léché (RanN) et un minimum de 3 couveurs à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR et PoiC).

Grand gravelot *Charadrius hiaticula*

M (10-3-4)

1 à 3 ind. sont observés à plusieurs reprises à l'étang de Chez Séguier du 26/08/10 au 09/09/10 (MérJu et al.). Lors du passage printanier, 1 à 2 ind. sont notés les 03 et 04/05/11 à l'étang du Léché (RanN) et 1 ind. le 27/05/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*

M (5-5-5)

Comme chaque année, à partir de la troisième décade d'août, l'espèce est recherchée dans les plaines agricoles du Haut-Poitou lors de son passage

postnuptial. Après quelques heures de recherche à scruter les immenses parcelles de labour, un groupe de 6 ind. est détecté au sol le 21/08/10 à Champigny-le-Sec (BusR et TilJ). Suite à cette première découverte, le groupe s'envole et ne sera pas retrouvé malgré les recherches jusqu'à la tombée de la nuit. Le 22/08/10, après 4 heures de prospection, un adulte est repéré à la tombée de la nuit à Maillé (BusR et TilJ). Un groupe de 2 immatures est trouvé en pleine journée le 30/08/10 à Moncontour (TilJ). Ces deux oiseaux ont passé la majeure partie de la journée au repos, peu visibles parmi les cailloux et les brumes de chaleur, et se sont activés en fin de journée pour s'alimenter. Un groupe de 7 ind. est découvert le 05/09/10 à Cuhon (BusR), date de la dernière observation de l'espèce. À noter la présence de 2 ind. dans un labour en dehors des sites habituels de suivi le 23/08/10 à Bellefonds (HolE).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

M, H (177-81-151)

Un premier migrateur est observé dans un groupe de Pluviers guignards posé dans un labour, le 05/09/10 à Cuhon (BusR). Des petits groupes sont signalés courant octobre avec un maximum de 130 ind. noté le 31/10/10 à Archigny (OuvR). En décembre, des groupes plus ou moins nombreux sont observés en nourrissage ici et là dans le département. C'est pendant le comptage Wetlands du 15/01/11 que le groupe le plus important est observé avec 600 ind. à Saint-Julien-l'Ars (GilD et VenJ). Lors du recensement de la mi-janvier sur l'ensemble de la Vienne, 1 538 Pluviers dorés hivernants ont pu être dénombrés. Au moment de la remontée printanière, un groupe de 180 ind. survole Pressac en direction du nord-est dès le 24/02/11 (SmiM) et un de 200 ind. survole Oyré le même jour (AleJ). Les passages s'échelonnent jusqu'au 22/03/11 et des bandes en escale sont observées notamment le 07/03/11, 200 ind. à Frozes (RicJ), 400 ind. à Saint-Julien-l'Ars (WiIT) et 100 ind. à Aslonnes (BasL). L'espèce est notée pour la dernière fois le 22/03/11 à Saint-Jean-de-Sauves (DurF).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

H, S (940-170-557)

Des rassemblements importants sont notés en période hivernale, notamment le 15/01/11 avec 2 800 ind. à Coulombiers (LejA) et 3 000 ind. à Sanxay (LejA). Maximum de 3 200 ind. le 27/02/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (HolE). Lors du comptage départemental effectué à la mi-janvier, 19 940 vanneaux ont été recensés. On dénombre encore 2 200 ind. dans un champ le 07/03/11 à Saint-Julien-l'Ars (WiIT) et des vols sporadiques sont signalés régulièrement jusqu'à la mi-mars. Si des couples en parade sont signalés en avril et mai, le seul indice de nidification reste le signalement d'une femelle en position de couvain, le 16/04/11 à Saint-Christophe (AleJ).

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau sanderling *Calidris alba* M (3-1-1)
Observé uniquement lors du passage postnuptial à la réserve ornithologique de Saint-Cyr avec 1 à 2 ind. présents du 22/09/10 (TiJ) au 25/09/10 (HoE).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* M (1-1-1)

Une seule observation pour cette espèce rarement observée dans notre département avec un ind. observé le 27/08/10 à Pressac (BusR), pendant le pic automnal d'observation de l'espèce dans la région.

Bécasseau variable *Calidris alpina* M (20-6-9)
La quasi-totalité des observations concerne des migrateurs au passage postnuptial qui débute le 25/08/10 à Pressac avec 1 ind. (SmiM) et se poursuit jusqu'au 09/10/10 avec un oiseau détecté en migration active à Château-Larcher (JomL). Un maximum de 4 ind. est observé le 27/08/10, en alimentation, à Pressac (BusR). Du 10/11/10 au 12/12/10, 1 à 2 adultes en plumage hivernal sont notés à Saulgé en compagnie de Vanneaux huppés (RanN et al.). La seule observation printanière concerne un adulte en plumage nuptial le 24/05/11 à Saint-Cyr (LioA, TiJ et TheP).

Combattant varié *Philomachus pugnax* M (10-5-6)

Le passage automnal se termine le 15/10/10 au Grand Étang de la Puye (DubT). Maximum de 3 ind. le 27/08/10 à Pressac (BusR). À noter une observation hivernale d'un oiseau le 15/12/10 à l'étang de la Boussarderie (DorM). L'ensemble des observations printanières a été réalisé à l'étang de la Pétolée : 3 ind. le 26/03/11 (BusR et BouV), 1 ind. le 16/04/11 (BusR et JomL) et encore 1 ind. le 24/06/11 (BusR, TiJ et WiT). La migration postnuptiale débute le 01/08/11 avec la présence d'un oiseau à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (HoE).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* M (1-1-1)

Un oiseau est détecté le 26/03/11 à la réserve naturelle du Pinail (HoE).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* H, M (140-23-35)

Observée tous les mois de l'année à l'exception de juin et juillet. La plupart des observations se font à l'automne et en hiver. Les plus gros effectifs comptent 38 ind. le 20/11/10 à l'étang de Beaufour (DebM, LegA et SevT), 28 ind. le 15/01/11 à la Roche-Posay (LiéB) et 17 ind. le 08/03/11 à Mauprévoir (WiT). La dernière observation printanière date du 05/05/11 à l'étang du Léché avec la présence d'un oiseau (RanN). La première observation automnale de 2011 est notée le 10/08/11 à la Puye (OuvR).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* S, H (30-24-29)

La quasi-totalité des observations est réalisée en hivernage entre le 15/10/10 à Mignaloux-Beauvoir (LegA) et le 22/03/11 à Roches-Prémaries-Andillé (RoyD), avec un maximum de 5 ind. le 28/01/11 à Usseau (DevJ). À noter trois observations de croûle : les 27 et 29/04/11 à la Chapelle-Moulière (LiéB) et le 13/05/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (HoE).

Courlis corlieu *Numerius phaeopus* M (3-2-3)

Un oiseau se laisse admirer à faible distance les 03 et 04/09/10 à Chasseneuil-du-Poitou (LiéB). Au passage printanier, un oiseau se nourrit sur un îlot herbeux le 28/04/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP).

Courlis cendré *Numenius arquata* S (101-18-50)

Les observations hivernales sont rares. À noter l'observation d'un groupe de 4 ind. de passage le 11/12/10 à Saint-Cyr (DebM et LegA). Plus de 90 % des observations ont été réalisées en période de reproduction entre le 28/02/11 à Saint-Sauvant (JomL) et le 23/06/11 à Angliers (FaiC), mais aucune preuve de reproduction certaine n'a été établie.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* M (3-2-2)

Une seule donnée lors du passage automnal avec l'observation d'un groupe de 6 ind. le 15/11/10 à l'étang du Léché (RanN). Au passage printanier, l'espèce est notée à l'unité sur deux sites : le 29/04/11 à Usson-du-Poitou (BusR) et le 04/05/11 à l'étang du Léché (RanN).

Chevalier gambette *Tringa totanus* M (21-6-7)

La dernière observation postnuptiale 2010 est notée le 19/09/10 à la Puye (HoE). Le passage printanier débute par l'observation d'un oiseau le 17/03/11 aux Trois-Moutiers (RaiW) et s'achève le 09/06/11 à Vendevre-du-Poitou avec la présence d'un ind. isolé (FaiC). Un maximum de 7 ind. est noté le 01/04/11 à Saint-Cyr (HoE et LiéB). Le passage automnal débute le 29/07/11 à l'étang du Léché (LecF).

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* M (1-1-1)

Un oiseau est observé le 29/04/11 à l'étang de la Pétolée parmi un groupe de Chevaliers gambettes et aboyeurs (BusR).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* M (59-18-24)

Le nombre de contacts printaniers et automnaux est assez équilibré. Le passage postnuptial est plus étalé et, contrairement au passage printanier, les oiseaux sont le plus souvent observés seuls. La dernière observation automnale 2010 est notée le 25/11 à l'étang du Léché (RanN). Le maximum est de 4 ind. présents le 27/10 à Vendevre-du-Poitou (TiJ). Le passage printanier est assez rapide,

Chevalier culblanc *Tringa ochropus***M, H (263-39-70)**

Observé tous les mois de l'année. Le passage automnal est plus marqué et concerne la majorité des données. Souvent observé seul ou en petits groupes n'excédant que rarement 4 ind., à l'exception d'un groupe d'au moins 10 ind. noté le 24/08/10 à Lathus-Saint-Rémy (RanN). Les observations hivernales concernent, quant à elles, un peu moins de 10 % des observations.

Chevalier sylvain *Tringa glareola* M (43-9-13)

La dernière observation automnale 2010 est notée le 12/09 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (HoE). Le maximum est de 5 ind. présents le 24/08/10 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN). Le passage printanier a débuté le 10/04/11 par une observation d'un ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR et GirI) et s'est achevé le 20/05/11 par deux observations : 2 ind. à Pressac (MérJu) et 1 ind. à l'étang de la Pétolée (BusR). À noter un maximum de 6 ind. observés le 03/05/11 à l'étang du Léché (RanN). La première observation automnale 2011 a été réalisée le 08/07 lors d'une sortie du groupe Jeunes à Saint-Cyr (TiIJ, LouE et BouV).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos***M, H (277-52-87)**

Observé tous les mois de l'année à l'exception de janvier et février. À noter lors du passage automnal, l'observation d'un groupe de 7 immatures le 20/08/10 à l'étang de Maupertuis (BusR) et un effectif record de 19 ind. le 30/08/10 à l'étang de Chez Séguier (WilR). La première observation pré-nuptiale est réalisée le 22/03/11 à Brion (CouBM) et la dernière le 05/06/11 à l'étang de Maupertuis (BouR). Lors de ce passage, les effectifs ne dépassent jamais la dizaine d'individus. Les oiseaux sont souvent observés seuls ou par petits groupes. L'effectif maximum est observé les 5, 12 et 17/05/11 à l'étang du Léché avec au moins 9 ind. (RanN).

LARIDÉS**Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus*****M, H (266-53-106)**

Espèce présente toute l'année, mais les effectifs les plus importants sont notés durant la période hivernale. Le plan d'eau de Saint-Cyr accueille un dortoir de laridés dès le mois d'octobre avec un millier de mouettes comptabilisées le 01/10/10 (TheP). Un maximum de 6 000 ind. est atteint le 10/12/10 (TiIJ), puis 4 200 ind. seront dénombrés le 29/01/11 (JomL). À noter l'observation d'un groupe de 1 000 ind. le 10/02/11 (DesC) et de 2 000 ind. le 03/03/11 (VenJ) à Saint-Sauveur. En période de reproduction, l'espèce est vue à l'unité ou en petits groupes, mais aucune reproduction n'est constatée.

Goéland cendré *Larus canus***H (14-3-3)**

La quasi-totalité des données provient du plan d'eau de Saint-Cyr. L'espèce est notée du 02/12/10 avec 3 ind. (TiIJ) jusqu'au 05/01/11 avec 1 ind. (HoE). Un maximum de 4 ind. est atteint deux fois, le 03/12/10 (HoE) et le 29/12/10 (TiIJ) toujours au plan d'eau de Saint-Cyr. À noter l'observation d'un oiseau de deuxième année posé au sol avec un groupe de Mouettes rieuses le 12/12/10 à la déchetterie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TiIJ) et de 3 ind. posés dans un semis de blé avec une centaine de Mouettes rieuses le 04/01/11 à Saint-Sauveur (TiIJ).

Goéland leucopnée *Larus michahellis***M, H (61-24-30)**

Dès juillet, des groupes sont repérés essentiellement dans la partie nord du département avec notamment 47 ind. le 19/07/11 à Moncontour (ArmA). Un rassemblement de 63 ind. est noté le 30/09/10 à Ceux-en-Loudun (ArmA). En hiver, l'espèce est observée majoritairement le long de la Vienne d'Availles-Limouzine jusqu'à Dangé-Saint-Romain. L'espèce est présente en dortoirs dès le 02/11/10 au plan d'eau de Saint-Cyr et jusqu'au 05/02/11 (GarR) avec un maximum de 154 ind. dénombrés le 04/01/11 (TiIJ). Aucun contact de l'espèce en période de nidification, mis à part un adulte observé le 02/05/11 sur la Vienne à Châtelleraut (MinN).

Goéland argenté *Larus argentatus* H (13-6-6)

Présent du 07/11/10 à Vaux-sur-Vienne (BusR et TiIJ) au 19/02/11 à Châtelleraut (LegA). Un maximum de 14 ind. est atteint le 02/01/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (LegA).

Goéland brun *Larus fuscus***H (30-9-9)**

Première observation le 28/09/10 avec 2 ind. à Coulombiers (BouR). Il faut attendre le mois de décembre pour observer de nouveau l'espèce avec la présence de 19 ind. en dortoir au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ). Un maximum de 86 ind. est dénombré le 04/01/11 sur le même site (TiIJ). À noter le contrôle d'un oiseau danois de troisième année le 05/01/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TiIJ).

STERNIDÉS**Sterne pierregarin *Sterna hirundo*****E, M (89-12-25)**

L'espèce est notée jusqu'au 17/08/10 avec l'observation d'un oiseau au plan d'eau de Saint-Cyr (DubT). Le retour est amorcé dès le 31/03/11 par la présence d'un adulte au même endroit (MinN). D'avril à juin, l'espèce est observée sur 6 communes, de préférence sur les étangs et lacs mais aussi sur les rivières notamment avec 2 adultes le 17/04/11 sur la Vienne à Châtelleraut (DupL), le 05/05/11 avec 3 adultes sur

la Creuse à Port-de-Piles (DesC) ou un couple le 08/05/11 sur la Creuse à la Roche-Posay (DesC). Un couple a stationné du 04 au 13/04/11 à l'étang de Maupertuis (BouR). Un maximum de 6 ind. a été dénombré les 20/04/11 (LiéB) et 24/04/11 (BusR et PoiC) au plan d'eau de Saint-Cyr. Aucune reproduction constatée en 2011, même si un couple a tenté de s'installer dans la réserve ornithologique de Saint-Cyr, avec offrandes notées les 17/04 (BusR), 02/05 (BouAC) et 24/05 (TheP), apport de matériaux le 02/05 (BouAC), défense de territoire le 08/05 contre des Corneilles noires (BouAC) et accouplement le 18/05 (TheP).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

M (28-6-8)

La dernière mention de 2010 date du 08/09 à Bonnes avec l'observation de 2 ind. (ChaM). Le passage pré-nuptial est amorcé le 26/03/11 au plan d'eau de Saint-Cyr où l'espèce sera vue à 13 reprises jusqu'au 19/05/11 (TilJ), avec un maximum de 10 ind. le 13/04/11 (TheP). À noter l'observation de 2 ind. en pêche le 10/06/11 à Pressac (SmiM). Les premiers mouvements postnuptiaux débutent le 07/08/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (HolE).

Guifette noire *Chlidonias niger*

M (21-5-8)

Lors du passage postnuptial, l'espèce est observée sur 5 sites du 28/08/10 à Saint-Cyr (BoiA) au 07/10/10 sur ce même site (TilJ) avec un maximum de 2 ind. le 25/09/10 (TilJ). Un oiseau de première année a stationné du 03 au 05/10/10 à l'étang de Maupertuis (BouR), alors que l'espèce est notée ponctuellement à l'étang de Combourg le 01/09/10 avec 4 oiseaux de première année (MérJu), et à l'étang de Beaufour le 20/09/10 avec 3 ind. (RanN). Le retour printanier s'étale du 27/04/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (TheP) au 18/05/11 sur ce même site (TilJ). Un maximum de 4 ind. est noté le 11/05/11 à Civaux (GuiP).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

M (1-1-1)

Une seule observation d'un oiseau de première année en pêche avec 3 Guifettes noires le 07/10/10 sur le plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ).

COLUMBIDÉS

Pigeon colombin *Columba oenas*

H, S (126-51-79)

Les regroupements postnuptiaux sont observés fin septembre avec 2 groupes de 45 ind. le 26/09/10 à Archigny (OuvR). Ils sont notés régulièrement jusqu'à la fin de l'hiver avec un dernier groupe de 20 ind. le 05/03/11 à Antran (LanJ). Notons ce groupe de plus de 2 000 ind. le 03/12/10 à Mauprévoir (LegA). Des

groupes sont dénombrés en migration active, avec notamment 81 ind. le 09/10/10 et 31 ind. le 10/10/10 à Château-Larcher (JomL). Un couple utilisant une loge de Pic noir a fait l'objet d'un suivi en forêt domaniale de Moulière (CouBM).



Pigeon colombin

Pigeon ramier *Columba palumbus*

H, S (832-159-537)

Les rassemblements hivernaux sont observés à partir du 20/10/10 avec 100 ind. à Coussay-les-Bois (DesC) et ce jusqu'au 31/03/11 avec 200 ind. à Coulombiers (BouR). Les plus importants sont notés à Pressac le 18/11/10 avec 3 000 ind. (SmiM), à Mauprévoir le 20/11/10 avec deux vols de 3 200 et 1 700 ind. (BusR) et au Vigeant le 24/12/10 avec 3 700 ind. (BusR). Notons également quelques groupes d'une cinquantaine d'individus en période de nidification comme, par exemple, environ 50 ind. le 24/05/11 à Coulombiers (BouR) et plus de 50 ind. le 03/07/11 à Saint-Benoît (BouAC). En 2010, la dernière nidification est notée le 10/09 avec un individu couvant à Chauvigny (DubT). En 2011, les premiers nicheurs sont rapportés le 22/01 à Coulombiers avec un transport de matériaux (NadY) et le 03/02 à Vouillé avec un nourrissage (LecF).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

S (422-113-217)

Des regroupements hivernaux de 10 à 50 ind. sont observés à partir du 24/10/10 avec 30 ind. à Coulombiers (BouR) et ce jusqu'au 02/04/11 avec 20 ind. à Pouillé (BodA). Notons à deux reprises des

effectifs supérieurs, avec 105 ind. le 06/11/10 à Vendeuve-du-Poitou (TiIJ) et environ 80 ind. le 11/02/11 à Colombiers (DupL). La reproduction commence précocement avec un accouplement observé le 16/01/11 à Sainte-Radegonde (DubT) et la construction d'un nid constatée le 17/01/11 à Poitiers (CouBM). L'emplacement du nid est parfois inapproprié comme ce couple qui a placé le sien dans une gouttière à Poitiers le 16/04/11 (HarF). L'échec de cette nidification sera confirmé le 26/04/11 (HarF).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*
E (243-82-163)

En 2010, les derniers individus sont observés le 18/09 avec 2 ind. à Dissay (HoIE) et le 21/09 avec également 2 ind. à Château-Larcher (JomL). En 2011, les premiers chanteurs se font entendre le 11/04 à Saint-Cyr (BriA), le 14/04 à Dissay (BriA) et à Vouneuil-sur-Vienne (LiéB). Seuls quelques indices de nidification possible ou probable sont rapportés pour cette espèce. Deux regroupements postnuptiaux ont été notés : 66 ind. le 25/08/10 à Bellefonds (HoIE) et environ 25 ind. le 06/09/10 à Pressac (SmiM).

CUCULIDÉS

Coucou gris *Cuculus canorus* **E (337-99-230)**
Dernière mention de 2010 avec l'observation d'un juvénile le 04/09 à Moulismes (RanN). En 2011, le premier chanteur est entendu le 12/03 à Château-Larcher (JomL). 95 % des données recueillies concernent des chanteurs ! En période de nidification, l'espèce est notée sur 88 communes. Un jeune est observé le 11/07/11 à Payré (RenG) et un autre le 14/07/11 à Vouneuil-sur-Vienne (DavS).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers *Tyto alba* **S (162-77-134)**
Pas moins de 24 données concernent des oiseaux retrouvés morts sur le bord des routes, suite à des collisions routières. Une seule donnée de reproduction certaine est notée à Adriers où un couple occupe un nichoir (GilD). Le 15/05/11, 4 jeunes sont nés et il reste 3 œufs non éclos (GilD).

STRIGIDÉS

Petit-duc scops *Otus scops* **E, M (3-3-3)**
Trois contacts auditifs de mai à août : le 07/05/11 à Chauvigny (BoiP), le 22/05/11 à Neuville-de-Poitou (GehL) et le 03/08/11 à Nalliers (PliF).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua*
S (130-61-94)
Le premier chanteur est entendu le 17/02/11 à

Chauvigny (DubT). Deux preuves de nidification ont été relevées : un couple niche sous un toit d'une maison d'habitation à Vernon (RenG) et un nichoir est occupé à Lavoux (ChaM).



Chevêche d'Athéna

Chouette hulotte *Strix aluco* **S (107-51-82)**

Cette chouette forestière est présente toute l'année. De ce fait, les contacts sont réguliers bien que peu nombreux. Le premier chanteur est entendu le 07/02/11 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (AleJ). De par ses mœurs nocturnes et sa discrétion pendant la nidification, aucune preuve de reproduction n'a été relevée pendant la saison 2011.

Hibou moyen-duc *Asio otus* **S (43-22-25)**

Oiseau sédentaire qui se regroupe en dortoirs lors de la période hivernale. Plusieurs de ces dortoirs ont été notés : 8 ind. le 11/12/10 à Saint-Julien-l'Ars (LegA), 8 ind. le 14/01/11 à Nalliers (GirC) et enfin un dortoir de 13 ind. le 29/01/11 à Magné (TouS). Les premiers jeunes, tombés du nid, sont notés le 15/05/11 à Vellèches (LanJ).

Hibou des marais *Asio flammeus* **S (23-9-11)**

Nicheur rare dans le département, la majorité des observations concerne des oiseaux hivernant ou en migration. Un seul dortoir a été suivi durant l'hiver 2010/2011 à Craon avec un effectif maximum de 16 ind. le 27/02/11 (RicJ).

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*
E (35-16-31)

Dernière mention le 12/09/10 à la réserve du Pinail (LiéB) et premier chant printanier entendu le 21/04/11 sur ce même site (BusR). Son chant se fait entendre dans les différents massifs forestiers jusqu'à la

mi-août : dans le massif de Moulière le 20/05/11 (LecF), dans le bois de Château-Larcher le 05/05/11 (CouBM), dans le bois de Charroux le 17/05/11 (MérJu), dans la forêt de Châtellerault le 25/05/11 (BoiA), dans la forêt de Mareuil le 28/05/11 (DalJ) et dans la forêt de Vouillé le 07/07/11 (BerJ). Il se montre rarement, mais on l'entend, le plus souvent à la tombée de la nuit, parfois en plein jour comme à Bonneuil-Matours le 28/05/11 ou le 14/06/11 (WilT).

APODIDÉS

Martinet noir *Apus apus* E (123-48-91)

Dernière observation estivale en 2010 notée le 26/08 à Poitiers (JomL). Une observation tardive de 4 ind. est relevée le 24/10/10 à Brion (LegA). En 2011, le premier oiseau est observé le 31/03 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TiJ). En chasse, les effectifs les plus importants sont d'environ 70 ind. le 19/04/11 à Poitiers (BusR), de 80 ind. le 29/06/11 à Chauvigny (DubT), de 100 ind. le 23/05/11 à Aslonnes (BasL), ou encore de 400 ind. en 4 ou 5 groupes distants de quelques centaines de mètres le 29/05/11 à Jaunay-Clan (MinN). Peu de cas de nidification certaine : quatre sites sur Poitiers et un sur Vouillé.

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* E, H (372-68-135)

Une seule donnée de reproduction certaine sur la Charente le 26/04/11 à Civray avec un ind. quittant un terrier en criant (SavF). 38 % des données de l'espèce proviennent de la réserve ornithologique et du plan d'eau de Saint-Cyr, 38 % concernent les étangs, lacs et sablières en eau et uniquement 24 % représentent des observations sur les rivières du département. L'espèce fréquente également des stations d'épuration comme celle d'Availles-Limouzine (SavF), Nieuil-l'Espoir (CouBM) et Savigny-Lévescault (CouBM).



Martin-pêcheur d'Europe

MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* E (44-17-30)

En 2010, les derniers oiseaux postnuptiaux ont été vus dans les premiers jours de septembre : 5 ind. le 03/09 à Saulgé (RanN), un vol de plus de 40 ind. le 04/09 au-dessus de Nalliers (TiJ et GraC) et 8 ind. le 05/09 à Angles-sur-l'Anglin (HolE).

En 2011, les 12 premiers arrivants se sont fait remarquer le 02/05 à Vicq-sur-Gartempe (LahJ). Cette année de reproduction dans la Vienne aura été exceptionnelle puisque 91 couples ont été notés nicheurs, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2010, ceci sur 14 sites comptant de 1 à 33 couples. Sur ces 14 sites, 11 sont localisés sur les berges des rivières de la Gartempe et de la Creuse, regroupant 80 % des couples, et 3 dans des carrières (DesJ). Le guêpier fait toujours preuve d'une grande fidélité à ses sites de reproduction du moment que son environnement n'est pas perturbé. Un groupe de 20 ind. survole en tournoyant le bourg de Coussay-les-Bois le 06/08 (DesC).

CORACIIDÉS

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* A (2-1-1)

Un adulte est découvert fortuitement le 10/07/11 à Payré (FosA). Il passe la majeure partie de son temps à chasser en utilisant comme perchoir les fils électriques et les arbres en bordure de la D7. Il capture des proies soit au sol, soit lors de poursuites aériennes. L'oiseau sera vu uniquement le lendemain de sa découverte (BonR et al.).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée *Upupa epops* E (246-94-175)


Dernière observation de 2010 notée le 12/09 à Frozes (RicJ). En 2011, le premier oiseau a été vu le 09/03 à Champagné-Saint-Hilaire (MarC) et le premier chant entendu le 22/03 à Marçay (DelC). Un accouplement sur une branche de chêne a pu être observé le 17/04 à Moussac (JeaE). Par la suite, 6 preuves de nidification, dont 3 couples vus avec des jeunes, ont été notées entre le 12/05 à La Bussière (PerM) et le 16/07 à Marigny-Chemereau (BraJ).

PICIDÉS

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* M, E (14-10-13)

Dernière observation de 2010 notée le 03/10 à Brigueil-le-Chantre (WeiB). L'arrivée printanière est détectée le 18/04/11 à Coussay-les-Bois (DesC) et à la Chapelle-Moulière (CouBM). Quelques observations

sont répertoriées d'avril à juin, lors de la période de chant, notamment en forêt de Châtellerault (BoiA), de Saint-Léomer (VenJ), de Saint-Sauvant (RenG) et à Valdivienne (WiT). Un seul cas de nidification certaine a été relevé avec un transport de nourriture le 05/05/11 à La Chapelle-Moulière (CouBM). Les autres données concernent des mâles chanteurs isolés.



Pic cendré *Picus canus* E (4-4-4)

Espèce rare avec seulement 4 observations ponctuelles : 1 ind. entendu le 16/01/11 à Liniers (TiIJ), 1 femelle le 13/02/11 à Sérigny (AleJ), 1 ind. le 05/03/11 à Prinçay (AleJ) et une femelle le 21/05/11 à Vouneuil-sur-Vienne (EvrP). Aucune reproduction constatée.

Pic vert *Picus viridis* S (665-143-406)

En période hivernale, il n'est pas rare de l'apercevoir aux mangeoires comme cet oiseau noté le 01/12/10 à Biard (BouV). Les chants sont très nombreux de mars à mai. Un seul cas de nidification certaine est relevé avec un jeune sortant la tête de la loge le 13/06/11 à Châtellerault (DupL).

Pic noir *Dryocopus martius* S (171-69-134)

Deux cas de nidification certaine : 1 mâle sort de sa loge puis y retourne le 27/04/11 à Liniers (CouBM) et un autre mâle nourrit 3 jeunes le 13/05/11 à Châtellerault (LanJ). Une femelle est observée se nourrissant de fourmis volantes au pied d'un chêne le 29/05/11 à Vouillé (CouBM).

Pic épeiche *Dendrocopos major* S (652-140-442)

Plusieurs preuves de nidification certaine sont rapportées. Un couple nourrit sa progéniture dans une loge le 16/05/11 à Mairé (DesC). Des cris de jeunes, émis depuis leur loge, sont entendus dans la dernière décade du mois de mai dans les communes suivantes : Aslonnes (BasL), Biard (CouBM), Béruges (LiéB), Saint-Maurice-la-Clouère (CouBM) et Sénillé (DupL). Les derniers nourrissages sont notés le 27/05/11 à Chauvigny (DubT) et le 31/05/11 à la Chaussée (PoiC).

Pic mar *Dendrocopos medius* S (51-25-40)

Espèce présente presque exclusivement dans les massifs forestiers importants. Les chants sont entendus du 29/01/11 à Naintré (DupL) au 01/04/11 à Vouillé (CouBM).

Pic épeichette *Dendrocopos minor* S (99-49-85)

La majorité des données se rapporte à des individus isolés. À noter trois observations d'oiseaux se nourrissant de galles de cynips sur un noyer le 27/03/11 à Chauvigny (DubA et DubT) et sur un rosier le 03/01/11 à Chalandray (TiIJ). Un ind. est vu à la mangeoire les 27 et 28/02/11 à Poitiers (ForP). Aucune nidification certaine détectée. Cependant, des parades sont notées le 17/03/11 aux Trois-Moutiers (RaiW) ainsi que des comportements nuptiaux répétés les 05/03/11 à Liniers (CouBM), 08/04/11 à Mignaloux-Beauvoir (CouBM) et 20/04/11 à Savigny-Levescault (CouBM). Un couple est cantonné le 28/05/11 à Liglet (CouBM) et le 19/05/11 à Lésigny (DesC).

ALAUDIDÉS

Cochevis huppé *Galerida cristata* S (85-55-73)

Observé toute l'année, avec un maximum de 10 ind. le 24/10/10 à Vernon (BeaJ) ; les chanteurs sont entendus en toute saison, mais avec une recrudescence en avril. Une seule preuve de nidification certaine avec un transport de nourriture le 30/05/11 à Jaunay-Clan (NadY). Noté nicheur probable à Chauvigny (GiLD), Maillé (LiéB), Montamisé (HolE), Raslay (PriT) et Vouzailles (HolE).

Alouette lulu *Lullula arborea* S, M (139-41-94)

Contactée toute l'année, elle a aussi été entendue chantant en toute saison. Quelques observations de plus de 10 oiseaux sont notées en décembre, avec un maximum de 30 ind. le 03/12/10 à Pressac (SmiM) et le 30/12/10 à Chenevelles (OuvR). Aucune preuve de nidification certaine n'a été obtenue, mais elle est soupçonnée à Archigny (OuvR), Lhonnaizé (BasJ), Moulismes (RanN) et Valdivienne (WiT).

Alouette des champs *Alauda arvensis* S, M, H (484-142-378)

Observée toute l'année, les effectifs les plus importants sont notés en automne et en hiver, comme 677 ind. en migration le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL), 400 ind. dans un labour le 02/12/10 à Dissay (TiIJ), ou encore 350 ind. le 04/12/10 à Archigny (HolE). Le premier chant est entendu le 11/02/11 à Colombiers (DupL). Le transport de nourriture a prouvé la nidification certaine à Bignoux (CouBM) et à Bonneuil-Matours (OuvR).

HIRUNDINIDÉS**Hirondelle de rivage *Riparia riparia*****E (89-27-43)**

En 2010, la dernière mention est celle d'un oiseau présent du 20 au 26/11/10 au plan d'eau de Saint-Cyr (PoiC, TheP et TilJ). En 2011, le premier individu est observé le 12/03 à Châtellerault (LanJ). La reproduction est prouvée sur 8 communes : Châtellerault, Gouex, Jouhet, Naintré, Poitiers, La Roche-Posay, Sillars et Valdivienne. Les colonies dénombrées : 27 terriers le 12/05 à Châtellerault (BoiA), plus de 50 couples le 24/05 à Gouex (BasL), environ 10 couples le 06/05 à Jouhet (LyoTh), plus de 30 terriers le 23/05 à Poitiers (GilD), plus de 30 couples le 08/05 à La Roche-Posay (DesC), et enfin, à Valdivienne plus de 70 terriers le 16/04 (BoiP) et 685 couples (WilT) sur deux sites différents. À noter que les colonies de Châtellerault et de Poitiers se sont établies dans des tas de terre sur des chantiers de construction.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica***E (493-137-325)**

À l'automne 2010, les observations rapportées sont quasi-quotidiennes pour s'arrêter brutalement le 18/10 avec 8 ind. à Coulombiers (GilV), 3 ind. à Pressac (SmiM) et 5 ind. à l'étang de Beaufour (RanN). Une donnée tardive concernant 1 ind. le 04/11/10 à Montmorillon (GilD). Notons les rassemblements postnuptiaux de 2010 : 200 ind. le 19/08 à Jouhet (DubT), 1 500 ind. le 29/08 à Sillars (BusR), 900 ind. le 04/09 à Tercé (HolE) et 1 400 ind. le 19/09 à Coulombiers (BouR). En 2011, la première observation a lieu le 09/03 avec 1 ind. à l'étang de Maupertuis (FreA). À compter du 11/03/11, les données sont quotidiennes. L'espèce est notée nicheuse certaine dans 25 communes. La construction de nids est constatée à partir du 17/04/11 à Valdivienne (BoiP).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum***E (162-73-106)**

En 2010, les dernières Hirondelles de fenêtre sont comptabilisées au cours de leur migration le 09/10 avec 44 ind. de 7h50 à 11h50 et le 10/10 avec 11 ind. de 10h15 à 10h45 à Château-Larcher (JomL). Notons des poussins toujours au nid le 18/09/10 à Poitiers (LecF). Les premières observations printanières de 2011 sont notées le 12/03 avec 2 ind. à Chasseneuil-du-Poitou (MinN) et le 13/03 avec 1 ind. à Vivonne (JomL). Le nombre d'observations augmente dans la deuxième quinzaine de mars : 35 ind. le 19/03 à Bonneuil-Matours (ChaM), 30 ind. le 28/03 qui retrouvent leurs logis à Gençay où la municipalité a installé des tablettes sous les nids (CheJ). L'espèce est notée nicheuse certaine dans 28 communes.

MOTACILLIDÉS**Pipit rousseline *Anthus campestris*****E, M (10-7-7)**

Le dernier oiseau migrateur a été contacté le 22/09/10 à Aslonnes (JomL). Il faut attendre le 19/04/11 pour voir 3 oiseaux à Valdivienne (WilT). À noter un groupe de 4 ind. le 08/05/11 à Archigny (HolE). L'espèce est observée jusqu'en juin, à Monthoiron le 02/06/11 avec 3 ind. (OuvR), à Avanton le 26/06/11 avec 2 ind. (RoyD) et à Archigny le 26/06/11 avec 2 individus (HolE).

Pipit des arbres *Anthus trivialis***E, M (185-70-135)**

Lors du passage postnuptial, 66 migrateurs ont été comptabilisés le 21/09/10 à Château-Larcher en 2 heures de temps (JomL). Le dernier oiseau migrateur est vu le 10/10/10 dans cette commune (JomL). Le premier oiseau de retour d'hivernage est noté le 05/03/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (HolE). Le premier mâle chanteur est entendu le 20/03/11 à Mauprévoir (BusR). Un transport de nourriture est noté le 16/05/11 à Pressac (SmiM).

Pipit farlouse *Anthus pratensis***H, S (229-84-149)**

Oiseau fréquent en période de migration et en hiver, il se fait plus rare en période de reproduction. À noter un groupe de 200 ind. qui décolle d'un semis le 08/10/10 à Coulombiers (TilJ). 460 migrateurs sont comptabilisés en 4h de comptage le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL). Le premier chanteur est entendu le 10/04/11 à Vouneuil-sur-Vienne (HolE).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta***M, H (61-11-24)**

Les 2 premiers migrateurs sont notés le 11/10/10 à l'étang du Léché (RanN). Un groupe important de 15 ind. est mentionné le 27/11/10 à Combourg (LegA). Les observations sont régulières sur le bord des étangs, et le dernier oiseau est vu le 26/03/11 à Mauprévoir (BusR).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava***E, M (223-59-179)**

Lors de la migration postnuptiale, les groupes aux effectifs les plus importants sont de 20 ind. le 05/09/10 à Voulême (DorM), de 28 ind. le 08/09/10 à Angliers (LecF) ; 49 migrateurs sont comptabilisés le 21/09/10 à Château-Larcher (JomL). Le dernier oiseau est vu le 20/10/10 à Champagné-le-Sec (BaxA). Les premiers migrateurs de 2011 sont décelés le 02/04 à l'étang de la Pétolée avec l'observation de 3 ind. s'alimentant dans la prairie au pied des vaches (BusR). Les observations s'intensifient à partir de la mi-avril, mais les groupes n'excèdent pas la dizaine d'oiseaux, comme le 10/04/11 à Saulgé (RanN). En période de reproduction, l'espèce est présente

exclusivement dans les plaines agricoles du Haut-Poitou. Deux preuves de reproduction avec un transport de nourriture noté le 04/06/11 à Rouillé (HaiM) et le 01/07/11 à Arçay (DubT).

Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flava flavissima* M (1-1-1)

Une seule donnée printanière pour cette sous-espèce anglaise qui a été vue le 16/04/11 à Millac (BusR).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* S (231-63-141)

10 preuves de nidification certaine sur la période considérée. La première construction de nid est notée le 10/04/11 à Valdivienne (BoiP). Le premier avril, un adulte est vu couvant dans un trou de mur à Nouaillé-Maupertuis le 01/04/11 (AlbN). Le premier jeune voletant alimenté par un adulte est noté au même endroit le 29/04/11 (MinN). Un transport de nourriture est signalé le 02/05/11 à Saint-Benoît (DubT).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* S, H (532-132-284)

En fin d'été, des groupes sont vus le long des étangs, notamment 148 ind. sur les berges de l'étang de Chez Séguier le 27/08/10 (BusR). Le 09/10/10 à Château-Larcher, 212 migrateurs sont comptabilisés en 4 heures de suivi (JomL). 100 ind. sont également vus en halte migratoire dans un labour le 27/10/10 à Jardres (DubT). La reproduction a été prouvée sur 19 communes. Des transports de matériaux sont notés le 10/04/11 à Valdivienne (BoiP) et le 25/04/11 à Saint-Cyr (BusR et HoIE). Les transports de nourriture s'échelonnent du 02/05/11 à Saint-Benoît (DubT) au 25/06/11 à Roches-Prémarie-Andillé (BouAC). À noter une famille juste envolée le 15/06/11 à la Bussière (DubT).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* M, H (14-11-14)

Les données concernant cette sous-espèce s'étaient du 09/10/10 au 25/03/11 avec notamment 2 ind. de type femelle, observés le 22/01/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (HoIE) et quatre données à Poitiers le 04/01/11 (CouBM), le 21/01/11 (NadY), le 08/02/11 (VenJ) et le 15/02/11 (WilT et DubT).

BOMBYCILLIDÉS

Jaseur boréal *Bombycilla garrulus* A (1-1-1)

Observation d'un oiseau le 25/01/11 sur le campus universitaire de Poitiers (BusR). Malgré des recherches, l'oiseau n'a pas été revu les jours suivants (BusR, TheP et TilJ).

CINCLIDÉS

Cincla plongeur *Cinclus cinclus* S (1-1-1)

Un oiseau, remontant la Gartempe, est observé le 11/04/11 à Lathus-Saint-Rémy (VenJ, GraC et al.).

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* S (441-125-315)

Quelques chants sont entendus durant les mois froids, mais c'est à partir de février qu'ils s'intensifient. 8 preuves de nidification ont été répertoriées en 2011. Un nid contenant 2 poussins est découvert le 27/04/11 à Moulismes (RanN). Des transports de nourriture sont notés le 03/05/11 à Archigny (NioD), le 20/05/11 à Plaisance (RenL) et le 24/05/11 à Vouneuil-sous-Biard (BusR). Un apport de matériel est relevé le 26/05/11 à Châtellerault (BoiA). Un couple a construit son nid dans un ancien nid d'Hirondelle rustique et le 16/07/11, un adulte couve à Marigny-Chemereau (BraJ).

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet *Prunella modularis* S (435-103-236)

Visite volontiers les mangeoires durant l'hiver. Les premiers chants sont notés dès la fin décembre, notamment le 29/12/10 à Migné-Auxances (FauG) et à Poitiers (MétA), et le 30/12/10 à Châtellerault (BoiA). La reproduction a été prouvée dans 6 communes. Le premier juvénile est vu le 30/04/11 à Saint-Benoît (BouAC). À noter également 3 jeunes quémendant sur le bitume le 16/05/11 à Poitiers (BusR) et encore 2 jeunes au nid au 06/07/11 à Poitiers (CouBM).

TURDIDÉS

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* S, H (725-135-385)

Fréquente volontiers les mangeoires et se fait entendre en hiver. Les comportements territoriaux deviennent évidents en mars avec jusqu'à 6 chanteurs à la Chapelle-Morthemer le 13/03/11 (BoiP) et 12 à Montmorillon le 23/03/11 (RanN). Des jeunes sont observés à partir de fin avril : le 27/04/11 à Migné-Auxances (LouE), le 05/06/11 à Châtellerault (BoiA), le 30/06/11 à Saint-Benoît (BouAC), le 07/07/11 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM) et le 27/07/11 à Saulgé (RanN).

Rosignol philomèle *Luscinia megarhynchos* E (271-93-216)

Premier chant noté le 01/04/11 à la Puye (GauS) et

pas moins de 188 signalements (69 %) rien qu'en avril, avec 10 chanteurs recensés le 15/04/11 à Bignoux (CouBM), 15 le 16/04/11 à Vouillé (CouBM) et 19 le 17/04/11 à Château-Larcher (JomL). Le chant se fait discret au moment de la nidification et l'oiseau ne pousse plus que des cris d'alarme à l'approche d'un intrus, comme le 01/06/11 à l'étang Baro où un transport de nourriture a été noté 5 jours auparavant (BusR), le 14/06/11 à Availles-en-Châtellerauld (DupL), le 16/06/11 à Sénillé (DupL) ou le 20/06/11 à la Puye (BerJ).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

M (23-9-12)

Lors de la migration postnuptiale, l'espèce est observée à deux reprises : 1 ind. de type femelle le 22/09/10 à Aslonnes (JomL) et 1 mâle les 26 et 29/09/10 à Pressac (SmiM). En 2011, l'espèce est notée pour la première fois le 06/04 à Rouillé (HaiM). Un migrateur est aperçu le 21/04/11 à la réserve naturelle du Pinail (BusR). En période de nidification, les mâles sont repérés par leur chant dans les parcelles de colza : le 17/04 à la Grimaudière (PoiC), le 02/05 à Verrue (GarL), les 24 et 28/05 à Cherves (PoiC et VanB), le 25/05 à Ayron (LerA) ; deux chanteurs sont entendus et vus le 28/05 au Rochereau (LiéB). 1 à 2 ind., dont 1 mâle chanteur, sont observés à 12 reprises entre le 06/04/11 et le 04/06/11 à Rouillé sans que la reproduction soit prouvée (HaiM et RenG).



Gorgebleue à miroir

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

E, S (351-100-205)

Présent toute l'année et ne reste guère silencieux que les mois d'hiver. Les premiers chants sont notés en mars et un couple est cantonné le 13/03/11 à

Archigny (OuvR). Une parade est observée le 26/03/11 à Coulombiers (NadY) et une femelle construit son nid dans un garage le 31/03/11 à Biard, où les petits naitront le 02/05/11 (BouV).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

E, M (199-63-145)

Dernière observation automnale le 14/10/10 à Plaisance (RanN) et premier chanteur le 24/03/11 à Poitiers (BusR). De nombreux chanteurs sont observés un peu partout, mais la nidification est discrète et les indices relativement peu nombreux. Un couple est signalé dans un nichoir le 06/05/11 à Montmorillon (AnoN), des transports de nourriture le 15/05/11 à Quinçay (VenJ), le 20/05/11 à Naintré (LanJ), le 23/05/11 à Châtellerauld (LanJP) et jusqu'au 09/06/11 à Poitiers (LecF). Des jeunes sont vus ici et là, 1 le 10/06/11 à Rouillé (HaiM), 1 le 22/07/11 à Biard (CouBM) et 1 le 25/07/11 à Marigny-Chemereau (BraJ).

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

M (53-28-46)

La première observation postnuptiale est celle d'un oiseau perché sur un fil barbelé le 20/08/10 à Coulombiers (BusR). Des petits groupes sont signalés avec notamment 6 ind. le 25/08/10 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (BusR), 15 ind. le 04/09/10 à Saint-Jean-de-Sauves (BouV et LiéB), 30 ind. le 05/09/10 à Bellefonds (LanJ) et 9 ind. le 20/09/10 à Lathus-Saint-Rémy (RanN). L'espèce est observée pour la dernière fois le 19/10/10 à Saint-Sauvant avec l'observation de 2 oiseaux (BouR). Les observations printanières s'étalent du 10/04/11 au Rochereau (LiéB) au 20/05/11 à Dissay (MinN).

Tarier pâtre *Saxicola torquatus*

S (383-102-232)

Peu signalé en novembre et décembre. Un couple est cantonné le 06/03/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (RoyD) où la construction d'un nid est en cours le 10/03/11 (TheP), et le 09/03/11 à Liglet (CouBM). Des preuves de nidification, transport de nourriture ou jeunes juste volants, ont été notées sur une quinzaine de communes.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

E, M (154-69-126)

Au passage postnuptial, des groupes peuvent être notés en halte avec des effectifs dépassant la dizaine d'oiseaux, notamment 15 ind. le 05/09/10 à Bellefonds (LanJ) et 11 ind. le 05/09/10 à Voulême (DorM). La dernière observation automnale date du 11/10/10 à Béthines (WeiB) et l'oiseau est observé pour la première fois au printemps le 05/03/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (HoIE). Maximum de 16 ind. le 21/03/11 à Lusignan (BonT). Un couple cantonné a fait l'objet d'un suivi du 29/05/11 au 02/07/11 à Dissay où la reproduction a été prouvée (MinN).

Merle à plastron *Turdus torquatus* M (11-11-11)

Rarement observé dans la Vienne. En migration automnale, il est signalé 5 fois, du 14/09/10 au 01/11/10, à Aslonnes (JomL), Château-Larcher (JomL), Leignes-sur-Fontaine (DubT), Mignaloux-Beauvoir (TiIS) et Paizay-le-Sec (AnoN). Lors de la remontée printanière, il est signalé 6 fois en avril, entre le 2 et le 23, à Civray (JomL), Persac (TiIJ), Saint-Cyr (DubT et BriA), Savigny-Lévescault (CouBM), Villiers (LiéB) et Vouneuil-sur-Vienne (LiéB). Maximum de 3 ind. le 14/04/11 à Saint-Cyr (DubT).

Merle noir *Turdus merula* S (798-146-461)

40 % des observations sont notées en décembre et janvier. L'espèce convoite assidûment les pommiers en période hivernale en quête de nourriture. Des effectifs peuvent atteindre la cinquantaine d'oiseaux comme le 04/01/11 à Marçay (PerA). Les premières constructions de nid sont relevées le 12/03/11 à Pressac (SmiM) et le 13/03/11 à Neuville-de-Poitou (VanB). Les premiers transports de nourriture sont notés le 06/04/11 à Savigny-Lévescault (CouBM) et à Vouneuil-sous-Biard (BezE).

Grive litorne *Turdus pilaris* M, H (216-81-166)

Observée du 25/10/10 à Montamisé (CouBM) au 10/04/11 à Saulgé (RanN). Notée souvent en groupes importants et ce dès le 20/11/10 avec l'observation d'une bande de 110 ind. à Saint-Jean-de-Sauves (ArmA). Les groupes deviennent plus importants en hiver avec 500 ind. le 08/12/10 à Monts-sur-Guesnes (TiIJ), 300 ind. le 28/12/10 à Vouneuil-sur-Vienne (TiIJ) et 260 ind. le 15/01/11 à Chenevelles (LiéB).

Grive musicienne *Turdus philomelos* S (383-111-277)

Notée surtout en nourrissage durant l'hiver, parfois en groupes mais n'excédant pas 40 oiseaux. Deux vols migratoires conséquents sont notés les 9 et 10/10/10 à Château-Larcher, avec respectivement 424 et 100 oiseaux (JomL). Le premier chant est signalé le 14/01/11 à Poitiers (BerJ). Deux transports de nourriture sont relevés, un le 27/04/11 à Plaisance (RenL) et un autre le 02/07/11 à Saint-Benoît (BouAC).

Grive mauvis *Turdus iliacus* M, H (129-60-101)

Signalée pour la première fois le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL). Les plus gros effectifs recensés ne dépassent pas la centaine : environ 100 ind. le 03/12/10 à Saint-Germain (PoiC), 70 ind. le 16/01/11 à Vernon (BusR) et 70 ind. le 16/01/11 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (AleJ). La dernière mention de l'espèce au printemps date du 26/03/11 à Saint-Cyr (HoIE).

Grive draine *Turdus viscivorus* S, H (327-103-246)

Signalée toute l'année mais surtout pendant les mois d'hiver, souvent seule ou en très petits groupes.

Quelques petits rassemblements sont observés : 45 ind. le 05/09/10 à Saint-Pierre-de-Maillé (HoIE), 35 ind. le 07/09/10 à Dissay (HoIE), 51 ind. le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL) et 20 ind. le 01/01/11 à Genouillé (GiD). Le premier chant de l'année est noté le 03/01/11 à Lathus-Saint-Rémy (BaiS). Une construction de nid est repérée le 16/04/11 à l'étang de la Pétolée (JomL), un transport de nourriture le 08/05/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (HoIE) et le 23/06/11 à Sèvres-Anxaumont (BusR) ; des juvéniles sont vus le 05/06/11 à Availles-Limouzine (SmiM).

SYLVIIDÉS**Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* S (57-20-33)**

Espèce discrète principalement détectée au chant et entendue tous les mois de l'année. Une unique donnée de reproduction certaine avec un jeune à peine volant le 17/06/11 à Biard (WiT).

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* S (11-8-8)

Premier contact avec 1 ind. observé en vol le 19/03/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (HoIE). Dernier chant noté le 28/07/11 à Vouillé (LerA). Cette espèce sensible au froid n'a été contactée que sur 6 communes pendant la période de reproduction.

Locustelle tachetée *Locustella naevia* E (49-16-28)

Le premier chant est entendu le 01/04/11 à Naintré (DupL). Le Pinail reste le secteur le plus favorable pour l'observation de l'espèce avec 21 données, mais sans de preuve de reproduction certaine. Deux chanteurs sont entendus pour la dernière fois le 17/06/11 en forêt domaniale de Moulière (FaiC).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* M, E (27-6-7)

Lors de la migration postnuptiale, 10 ind. sont observés le 27/08/10 à la Puye (LiéB) et un dernier contact le 31/08/10 à l'étang de Chez Séguier (RaW). Premier chant le 02/05/11 à l'étang Baro (BusR) qui laissera supposer une reproduction probable de l'espèce le 17/05/11 (MérJu) et le 17/06/11 sur le site (BusR et al.).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* M, E (88-22-29)

Dernière observation avec 1 ind. dans les roseaux d'une mare le 02/10/10 à Sommières-du-Clain (CouBM). Retour de migration avec 1 ind. chantant timidement le 16/04/11 au Grand Étang de la Puye (LiéB). 12 preuves de reproduction certaine avec un bel effectif de 20 ind. le 08/06/11 à l'étang de Beaufour (BouAC) et 3 ind. nicheurs dans une phragmitaie du jardin botanique de la Roseraie, le 23/07/11 à Poitiers (LecF).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* E (7-1-1)

Le Grand Étang de la Puye fournit les seules données du département avec 3 ind. détectés le 16/05/11 (CouBM), puis 1 ind. du 06/06/11 au 20/06/11 (BerJ et DubT). L'espèce ne sera pas recontactée par la suite malgré des prospections jusqu'au 14/07/11 (BerJ, OuvR et al.).

Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta* E (158-64-115)

Espèce quittant le département très tôt avec une dernière observation le 19/09/10 à Château-Larcher (JomL). Le retour de l'espèce se fait pendant la deuxième quinzaine d'avril avec 2 mâles chanteurs le 14/05/11 à la Chapelle-Morthemer (BoiP). Malgré son chant facilement détectable, l'espèce est très discrète pendant la nidification. Les preuves de reproduction sont trahies par le transport de nourriture le 21/06/11 à la Chapelle-Moulière (CouBM) et le 05/07/11 à Quinçay (CouBM), alors qu'un couple avec un jeune à peine volant était observé le 15/06/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Fauvette pitchou *Sylvia undata* S (58-7-20)

Notée tout au long de l'année, l'espèce se fait plus discrète en juillet et août avec une seule donnée le 15/08/10 à la réserve naturelle du Pinail (ThiL). Les landes du Pinail, qui concentrent la plus importante population du département, cumulent 86 % des observations. D'autres secteurs de landes offrent des conditions favorables à l'espèce comme des parcelles en forêt de Mareuil à Chauvigny (DubT), les Grandes Brandes à Saint-Léomer (RanN) ou à Vellèches (VenJ).

Fauvette grisettes *Sylvia communis* E (310-88-216)

Une observation tardive d'un ind. le 06/10/10 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Les migrants reviennent pendant les premiers jours d'avril avec 1 ind. observé le 01/04/11 à Vouillé (CouBM). Le même site rassemblera 20 mâles chanteurs le 16/04/11 (CouBM). La première construction de nid s'effectue le 19/04/11 à Pressac (SmiM) et le transport de nourriture pour des jeunes est observé le 15/05/11 à Plaisance (RenL).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* E (67-33-56)

Dernières observations effectuées le 10/10/10 à Saint-Cyr (TilJ) et à Château-Larcher (JomL). Espèce au plumage discret, elle est repérée de nouveau avec 1 ind., le 10/04/11 à Saint-Cyr (BusR et Girl). Pas de preuve de reproduction certaine, mais deux données constituent des preuves probables avec 1 ind. rivalisant avec une Fauvette à tête noire et défaisant un ancien nid de merle pour récupérer des herbes, le 18/04/11 à Quinçay (BerJ). L'autre donnée concerne un ind. alarmant le 05/06/11 à Ayron (VenJ).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* S (525-117-336)

Des passages importants sont notés pendant la deuxième quinzaine de septembre avec notamment 40 ind. le 18/09/10 à Château-Larcher (JomL) et 60 ind. le 22/09/10 à Aslonnes (JomL), révélant le pic de la migration postnuptiale de l'espèce. Quelques données hivernales sur 36 communes du département. Le passage pré-nuptial est nettement marqué à partir de la mi-avril avec 10 ind. le 12/04/11 à Saint-Benoît (BouAC) et 10 ind. le 17/04/11 à Smarves (RoyD). Premier cas de nidification de la saison avec un couple construisant un nid dans un lilas le 13/05/11 à Poitiers (BraM).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* E (70-36-59)

Dernier contact postnuptial constaté le 08/10/10 à Saint-Sauvant (LegA). Le premier migrateur est de retour le 01/04/11 à Vouillé (CouBM). 9 preuves de reproduction probable avec deux observations d'individus ramassant des brindilles sèches ou des petits végétaux le 11/04/11 à Smarves (CouBM) et le 13/04/11 à Liniers (CouBM).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* E (21-10-16)

Dernier ind. observé en compagnie de deux Pouillots véloces le 10/10/10 à Celle-Lévescault (JomL). L'espèce, inféodée aux futaies anciennes de feuillus, est notée à 16 reprises dans la forêt de Vouillé avec un premier ind. le 16/04/11 à Quinçay (BerJ). Deux jeunes à peine volant seront également observés à proximité de leur nid le 04/06/11 à Quinçay (BerJ). La forêt de Moulière ne comptabilise que deux données le 23/04/11 à Dissay (HolE) et le 27/05/11 à la Chapelle-Moulière (CouBM).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* S (426-102-262)

Lors de la migration postnuptiale, les saules bordant le plan d'eau de Saint-Cyr ont attiré un minimum de 28 ind. accompagné d'un Pouillot fitis le 10/10/10 (HolE). L'espèce est notée également en hiver avec 35 données s'étalant du 01/12/10 à Lizant (DorM) au 25/02/11 à Saulgé (VenJ). 3 données de reproduction certaine avec transport de nourriture et une avec 4 juv. venant de quitter le nid et suivant les deux adultes, le 07/07/11 à Quinçay (BerJ). Pressac avec l'observation de 2 jeunes de l'année (SmiM). Le retour printanier débute le 14/04/11 à Saulgé par l'observation d'un mâle en vol (RanN) et s'intensifie à partir de la dernière décade d'avril. 3 cas de nidification certaine : un mâle transporte un sac fécal le 18/06/11 à Château-Larcher (JomL), 2 jeunes quémangent le 12/07/11 à Quinçay (LerA) et un couple nourrit 3 poussins dans le nid situé en haut d'un peuplier le 19/06/11 (BouAC).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* M (44-27-41)

Dernière observation réalisée avec 3 ind. le 17/10/10 à Migné-Auxances (LouE). Les premiers migrateurs sont notés à partir de la mi-mars avec 4 ind. le 11/03/11 à Montreuil-Bonnin (GilV). La migration pré-nuptiale s'étale jusqu'au 29/05/11 avec 3 ind. à Vouillé (CouBM). La redescente s'amorce début août avec 1 ind. le 02/08/11 à Poitiers (HarF).

Roitelet huppé *Regulus regulus* S (139-60-119)

Espèce typiquement forestière, observée principalement dans des conifères, elle est notée tout au long de l'année avec de petits groupes se rassemblant en période hivernale allant d'une dizaine à une quinzaine d'individus. Un secteur autour de Château-Larcher a même permis de comptabiliser 30 ind. le 31/12/10 (JomL).

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* S (205-72-165)

Espèce régulièrement observée aussi bien en période hivernale qu'au printemps. 30 ind. sont dénombrés le 10/10/10 en forêt domaniale de Saint-Sauvant à Celle-Lévescault (JomL). Aucune preuve de reproduction certaine détectée mais 5 données de nidification probable à Marigny-Chemereau (BranJ), Marnay (JomL), Poitiers (PicY), Sèvres-Anxaumont (BusR) et Smarves (CauM).

MUSCICAPIDÉS**Gobemouche gris *Muscicapa striata* E (43-24-33)**

Dernière mention automnale le 06/10/10 à la Roseraie de Poitiers (LecF) et retour printanier signalé pour la première fois le 18/04/11 à Marnay (JomL). Un nid est découvert dans une « boullite » contenant 5 oeufs, le 15/05/11 à Adriers (GilD) et d'autres nids sont repérés : le 16/05/11 à Pressac (MérJu), le 19/05/11 à la Roche-Posay (DesC), le 20/05/11 à Naintré (LanJ), le 20/05/11 à Châtellerault (BoiA) et le 18/06/11 à Genouillé (BerM). Un jeune est nourri par un adulte le 23/07/11 à Brion (CouBM).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* M (55-16-32)

Les migrateurs post-nuptiaux sont notés jusqu'au 09/10/10 à Château-Larcher avec l'observation de deux oiseaux (JomL). Le mois de septembre recueille à lui seul 56 % des données répertoriées. On note le plus souvent de 1 à 3 ind., mais un groupe de 10 ind. est observé le 22/08/10 à Thuré (LanJ) et un autre de 6 ind. le 26/08/10 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM). La migration printanière est beaucoup plus discrète, seulement deux mentions : une femelle le 16/04/11 à Château-Larcher (JomL) et un mâle le 29/04/11 à Poitiers (LipD). En 2011, le premier migrateur post-nuptial est détecté le 08/08 à Poitiers (WIT).

TIMALIIDÉS**Panure à moustaches *Panurus biarmicus* M (1-1-1)**

Espèce notée à l'étang Baro le 13/05/11 : un oiseau présent en bordure d'étang (BusR).

ÆGITHALIDÉS**Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* S (334-111-246)**

Des groupes familiaux importants sont observés à la fin du mois de septembre, 20 ind. le 23/09/10 à Château-Larcher (JomL), et régulièrement durant tout l'hiver, par exemple plus de 30 ind. le 31/12/10 à Poitiers (WIT et BouV). La sous-espèce *Caudatus*, aperçue dans les départements voisins, n'a pas été vue malgré des prospections attentives. Preuves de nidification sur au moins 23 sites. Des constructions de nids notées à Béruges (CouBM), Bonneuil-Matours (DubT), Châtellerault (DupL), Poitiers (LecF), Marçay (JomL), Mignaloux-Beauvoir (BusR), Moulismes (RanN), Nouaillé-Maupertuis (WIT), Pindray (LioT), Pressac (SmiM) et Quinçay (BerJ). Des adultes couvant, de début mars à mi-avril, à Adriers (GilD) et Château-Larcher (JomL). Des transports de nourriture, au moins jusqu'au 23/05/11, à Aslonnes (BasL), Saint-Cyr (BusR) et Saint-Pierre-de-Maillé (DubT). Et quelques jeunes ici et là, de mi-mai à fin juillet : à Châtellerault (BoiA), Coussay-les-Bois (DesC), Jazeneuil (TheP), Mauprévoir (BusR), Migné-Auxances (LouE) et Quinçay (CouBM).

PARIDÉS**Mésange nonnette *Poecile palustris* S (183-66-146)**

Fréquente volontiers les mangeoires en hiver, comme à Vouillé (KaeM), Genouillé (BerM) ou Jazeneuil (TheP) en novembre, ou à Marçay (LegA), Quinçay (AleJ) et Mignaloux-Beauvoir (TilS) en décembre, ou encore à Lathus-Saint-Rémy (BaiS) ou Lusignan (RenG) en janvier et jusqu'à fin février. En mai, des preuves de nidification sont notées sur 4 communes : transport de nourriture à Saint-Pierre-de-Maillé (DubT), à Journet (VenJ) et à Adriers (GilD), et un couple nourrissant 2 jeunes à peine volants est observé le 25/05/11 à Quinçay (CouBM).

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* S (58-25-51)

Présente toute l'année ici et là dans le département, le plus souvent dans des pins. En hiver, l'espèce se mêle volontiers à d'autres espèces, comme cet oiseau vu parmi une ronde de Mésanges bleues, charbonnières,

à longue queue et Roitelets huppés, le 29/01/11 à Nueil-sous-Faye (AleJ). Des groupes d'une dizaine d'oiseaux peuvent être observés le 02/01/11 à Naintré (DupL) et le 03/01/11 à Oyré (DupL). Le reste de l'année, l'espèce est contactée majoritairement à l'unité. Aucune reproduction n'a été relevée.

Mésange noire *Periparus ater* H, S (70-26-45)

Elle est assez rare dans la Vienne, mais observée du 22/09/10 (JomL) au 15/03/11 (WilT), principalement dans les conifères et autour des mangeoires. Souvent seule ou par 2 ou 3, rarement plus, si ce n'est 5 ind. le 21/11/10, à Châtellerault, et 10 ind. dans le même secteur le 02/12/10 et le 09/01/11 (DupL), ou 5 ind. le 27/12/10 à Poitiers (BerF). Un chant est signalé le 04/03/11 à Châtellerault (DupL) et un autre le 15/03/11 à Poitiers (WilT).

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus*

S (757-143-407)

Des groupes importants sont signalés dès septembre : 50 ind. le 22/09/10 à Aslonnes (JomL) et 40 ind. le 23/09/10 à Château-Larcher les 22 et 23/09/10 (JomL). Elle est très présente pendant tout l'hiver et pas seulement sur les mangeoires, même si elle profite largement de la générosité de ses admirateurs, notamment à Château-Larcher qui accueille régulièrement des tablées de 20 à 60 convives de cette espèce (JomL). Elle attire toujours l'attention, en témoignent les nombreuses mentions hivernales, jusqu'à 196 observations postées pour le seul mois de janvier ! Le premier chant noté a retenti le 09/01/11 à la Chapelle-Morthemer (BoiP), un premier couple est signalé le 25/02/11 à l'étang du Léché (VenJ) et un premier nid le 24/03/11 à Poitiers (MorP). Un boîtier de volet roulant (GilD), un rebord de toit (DupL), une cavité d'arbre (BoiP), un lampadaire (DubT), tout est bon, ce qui désole parfois les constructeurs de nichoirs (DupL) L'un d'eux pourtant est comblé avec, à Poitiers, une nichée de 12 œufs qui donneront 10 oisillons le 24/04/11 dont 7 s'envoleront le 15/05/11 (BusR).

Mésange charbonnière *Parus major*

S (838-146-433)

Un premier chant est noté le 28/12/10 à Sèvres-Anxaumont (CouBM), un transport de matériaux le 15/03/11 à Poitiers (CouBM), mais c'est à partir de la troisième décennie de mars que les bâtisseurs s'activent, d'abord le 19/03/11 à Coussay-les-Bois (DesC) et le 24/03/11 à Sillars (WilT), alors que les mâles chanteurs et les couples s'expriment ostensiblement. À Poitiers le 13/04/11, le nourrissage commence dans un nichoir. Les jeunes s'envoleront le 05/05/11 pour laisser la place à une deuxième nichée qui quittera le nid le 19/06/11 (GilD). À Châtellerault, une famille occupe un nichoir dédié au Rougequeue à front blanc (DupL), à Marigny-Chemereau, un nichoir à chevêche (BraJ) !

SITTIDÉS

Sittelle torchepot *Sitta europaea*

S (245-94-193)

Observée tous les mois, l'espèce n'a été trouvée nicheuse certaine qu'à Marigny-Chemereau (BraJ) et nicheuse probable dans 8 autres communes. Le chant est entendu dès la fin décembre.

TICHODROMIDÉS

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*

H (20-1-2)

C'est la commune de Bonneuil-Matours qui a eu la chance d'accueillir les seuls tichodromes signalés dans le département. 2 ind. sont vus le 11/12/10 dans le bourg, en bord de Vienne (BarY). 1 ind. sera observé régulièrement au voisinage de l'église, du 26/02/11 (LiéB) au 22/03/11 (DubT), une femelle comme l'a révélé l'évolution de son plumage, le 04/03/11 (LiéB). L'hivernage de l'espèce est régulier dans la Vienne.



Tichodrome échelette

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

S (274-102-223)

À noter l'observation d'un ind. se nourrissant sous la mangeoire le 01/01/11 à Valdivienne (BoiP). Les premiers chants sont entendus le 14/03/11 à Bonneuil-Matours (DubT). Une construction de nid, avec apport de matériel, est notée le 02/04/11 à Oyré (AleJ) et le 26/05/11 à Pressac (DorM).

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* M (4-3-4)


Au passage postnuptial, 2 ind. s'alimentent sur les

massettes de l'étang Baro, le 17/10/10 (BusR). Les autres données correspondent à la migration pré-nuptiale et concernent un individu le 13/03/11 à l'étang de la forêt de Châtellerault (LanJ), suivi d'un individu le 16/03/11 à l'étang des Bonshommes (DupL), et enfin 2 mâles le 17/03/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TiIJ et TheP).

ORIOOLIDÉS

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* E (183-80-135)

Dernière observation de 2010 notée le 06/09 à Pressac avec l'observation de 2 jeunes de l'année (SmiM). Le retour printanier débute le 14/04/11 à Saulgé par l'observation d'un mâle en vol (RanN) et s'intensifie à partir de la dernière décade d'avril. 3 cas de nidification certaine : un mâle transporte un sac fécal le 18/06/11 à Château-Larcher (JomL), 2 jeunes quémament le 12/07/11 à Quinçay (LerA) et un couple nourrit 3 poussins dans le nid situé en haut d'un peuplier le 19/06/11 (BouAC).



LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* E (120-39-87)

L'observation la plus tardive de 2010 est celle d'un mâle observé le 13/09/10 à Lathus-Saint-Rémy (RanN). Le premier contact de 2011 date du 08/05 à Mauprévoir avec l'observation d'un mâle perché à la cime d'un chêne (BusR). En période de nidification, l'espèce est notée sur 38 communes, mais des preuves de nidification certaine n'ont été constatées que dans 8 d'entre elles ! Les transports de nourriture constituent l'essentiel des données récoltées sur les

communes suivantes : Vouneuil-sur-Vienne (OuvR), Lathus-Saint-Rémy (RanN), Moulismes (RanN), Usson-du-Poitou (BusR) et Vouillé (LerA). Un mâle est retrouvé mort, suite à une collision routière sur la D 729 le 21/06/11 à Moulismes (RanN).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* H (4-3-3)

Observée d'octobre à mars sur 3 sites : 1 ind. le 12/10/10 à Lizant (MaiW), 1 ind. le 17/11/10 à BrigueilHe-Chantre (WelB) et 1 ind. présent du 10/01/11 au 06/03/11 à la Roche-Posay (DesC).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* E (34-14-19)

La dernière mention de 2010 est celle de 2 jeunes de l'année, visibles le 31/08 à Mauprévoir (RaiW). La première arrivée printanière concerne un mâle observé le 23/04/11 à Pressac (SmiM). Les observations se concentrent principalement sur la partie sud/sud-est du département, sauf une donnée se référant à un couple détecté le 23/05/11 à Craon (GarL). En période de nidification, l'espèce est notée sur 14 communes, mais avec seulement deux preuves de reproduction : un couple nourrit 2 jeunes le 24/06/11 à Usson-du-Poitou (BusR, TiIJ et WiT) et un autre est accompagné de 2 jeunes le 14/07/11 à Brion (CouBM).


CORVIDÉS

Geai des chênes *Garrulus glandarius* S (442-129-327)

La densité peut être importante comme sur ces transects en hiver d'environ 3 km à Chenevelles, le 30/12/10 avec 13 ind. (OuvR) et à Orches le 16/01/11 avec plus de 16 ind. (AleJ). Des regroupements printaniers bruyants sont également observés : 16 ind. le 07/03/11 à Vernon (BasL), 8 ind. le 13/03/11 à Moulismes (RanN), 10 ind. le 18/03/11 à Valdivienne et 8 ind. le 14/04/11 également à Valdivienne (BoiP). À partir d'avril, l'espèce devient moins visible et plus discrète pendant la nidification. Les observations d'avril à août représentent 21 % des données répertoriées.


Pie bavarde *Pica pica* S (483-112-271)

Le comptage quasi-hebdomadaire du dortoir du campus universitaire de Poitiers (BusR) montre une croissance régulière des effectifs de 377 ind. le 18/11/10 à plus de 813 ind. le 20/01/11, puis une décroissance jusqu'à 382 ind. le 19/02/11. D'autres dortoirs hivernaux plus modestes sont observés : environ 50 ind. le 20/12/10 à Saint-Benoît (CouBM), 92 ind. le 17/01/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TiIJ) et 50 ind. le 28/01/11 à Coulombiers (TheP). Les premiers nids sont confectionnés à partir de la mi-février : le 13/02/11, le 20/02/11 et 01/03/11 en trois lieux différents sur Poitiers (CouBM).



Pie bavarde

Évolution des effectifs de Pies bavardes sur le campus de Poitiers



Choucas des tours *Corvus monedula*

S (173-69-124)

Des regroupements hivernaux sont notés : 250 ind. en compagnie de Corbeaux freux le 11/12/10 à L'Isle-Jourdain (BusR), ou encore 400 ind. en dortoir le 10/02/11 à Civaux (BaiS). Les colonies d'individus nicheurs dénombrées sont d'environ 55 couples à Chauvigny (DubT), d'un minimum de 13 couples à Saint-Pierre-de-Maillé (DubT) et d'une douzaine de couples à Bonneuil-Matours (DubT et LiéB).

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

S (/273-84-184)

Les plus grands regroupements hivernaux font état de 650 ind. le 19/12/10 à Chiré-en-Montreuil (VenJ), de 3 350 ind. le 04/01/11 à Châtelleraut (LanJ) et de 3 000 ind. le 10/02/11 en dortoir, dans les peupliers des îles de la Vienne à Civaux (BaiS). Des vols importants en fin d'après-midi en direction des dortoirs sont également rapportés, comme par exemple 500 ind. le 27/01/11 à Berthegeon (AleJ). Les plus grandes colonies d'individus nicheurs dénombrées comportent 96 nids à Bonneuil-Matours (OuvR), 60 nids à Vivonne (BraJ), 55 nids à Saulgé (RanN), 94 nids répartis sur trois sites à Chauvigny (DubT) et 53 nids à Montreuil-Bonnin (AleJ).

Corneille noire *Corvus corone* **S (607-141-391)**

Les premières preuves de nidification sont rapportées le 01/03/11 à Poitiers (BouV) et le 12/03/11 à Pressac (SmiM) avec des transports de matériaux. L'effectif maximum est d'environ 1 000 ind. en dortoir le 09/01/11 à Saint-Christophe (AleJ).

Grand corbeau *Corvus corax* **E (13-3-3)**

Un oiseau est entendu, puis vu en vol le 19/01/11 à Pressac (SmiM). Au mois de mars, un couple est découvert dans le département (WitT) et sera présent

sur ce site du 08/03/11 au 07/04/11, affairé à la construction d'un nid (JeaE et BusR). Le couple sera revu seulement le 29/04/11 à 8 km de là, sur un reposoir se lissant mutuellement le plumage.

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

H, S (605-142-374)

Des rassemblements d'au moins 500 ind. sont observés tous les mois entre mi-juillet et mi-mars, avec un maximum de 25 000 ind. le 12/11/10 à la Grimaudière (ArmA). L'espèce est trouvée nicheuse certaine dans 31 communes. Parmi les sites de nidification utilisés, on note des cavités en forêt, des anfractuosités de toitures ou de bâtiments, ou encore des nichoirs à chevêche et à huppe. Les premiers transports de nourriture au nid sont notés le 28/03/11 à Quinçay (VenJ).

Étourneau roselin *Sturnus roseus* **M (3-2-3)**

Deux mentions de cette espèce occasionnelle, venue de l'Est, ont été notées en périodes migratoires : un oiseau de première année repéré le 20/09/10 à Château-Larcher (JomL), et un adulte le 02/05/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BouAC).

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique *Passer domesticus*

S (539-137-295)

38 cas de reproduction certaine. Les trous dans des bâtiments sont les sites de nidification les plus utilisés. Les cas plus étonnants sont à Poitiers celui d'un nid dans un lampadaire le 01/05/11 dans le quartier de Bellejouane (WitT) ou dans une potence de feux

tricolores le 05/05/11 à la Cueilie Mirebalaise (DubT). D'importants groupes hivernaux sont notés dépassant plus de 100 ind. à Aslonnes (JomL), Château Larcher (JomL), Coulombiers (BusR), Roiffé (WiT) et les Trois-Moutiers (WiT). Un dortoir de 220 ind. est observé le 11/08/11 au Grand Étang de la Puye (DubT) avec des vols successifs de petits groupes le matin dans la phragmitaie.

Moineau friquet *Passer montanus* S (46-16-29)

Seulement 3 preuves de reproduction et de nidification certaine ont été référencées. Deux cas concernent des observations à Poitiers avec 2 ind. le 22/04/11 dans le quartier de Saint-Eloi (HoE) et 1 ind. avec transport de nourriture le 07/05/11 dans le quartier de Bellejouane (WiT). Les années précédentes, des cas de nidification dans les villages de la plaine de Neuville-Mirebeau avaient été rapportés, mais pour cette année, un seul cas est noté avec 5 ind. le 27/05/11 à Neuville-de-Poitou (GriB). Deux petits groupes hivernaux sont observés dans des bandes de fringilles et de Moineaux domestiques, avec 10 ind. le 19/12/10 à Coulombiers (BusR) et 30 ind. le 11/02/11 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (AleJ).

Moineau soulcie *Petronia petronia* S (3-2-2)

Malgré des recherches, l'unique site de reproduction connu à Roiffé ne compte plus de couple nicheur. Les fortes suspicions de disparition de l'espèce dans la Vienne semblent se confirmer. Toutefois l'observation d'un ind. le 21/08/10 à Vouzailles (BusR) laisse à penser que l'espèce peut se reproduire dans des secteurs de plaine où des données ont été rapportées au cours de ces dernières années.

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

S (999-166-582)

Un comptage en période de migration a donné 5 539 ind. le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL). Des groupes d'hivernants d'au moins 300 ind. sont observés de novembre à mars, jusqu'à 800 ind. le 23/12/10 à Aslonnes (JomL). Les premiers chants sont entendus le 20/02/11 à Saint-Cyr (HoE) et la construction d'un nid est observée le 05/03/11 à Sérigny (AleJ). Des transports de nourriture ont été signalés le 13/05/11 à Plaisance (RenL), le 24/05/11 à Vouneuil-sous-Biard (BusR) et le 14/07/11 à Brion (CouBM), constituant les seules preuves de nidification de l'espèce avec l'observation d'un juvénile le 08/06/11 à Saulgé (BouAC).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

H (398-101-213)

L'avant-garde des migrateurs est signalée le 09/10/10, tant à Château-Larcher (JomL) qu'à Chauvigny (DubT)

et à Marigny-Chemereau (BraJ). Les bandes de 100 ind. ou plus se rencontrent de novembre à mars avec un maximum de 1 500 ind. le 07/11/10 à Buxeuil (BusR et TiJ). De nombreuses données concernent des oiseaux se nourrissant dans des parcelles de tournesol, sur pied ou labourées ; on les voit régulièrement aux mangeoires. La dernière observation de l'espèce est datée du 02/04/11 à Saint-Benoît (BouAC).

Serin cini *Serinus serinus* E, H (131-52-90)

Peu de mentions de l'espèce entre août et février, avant que les mâles chanteurs ne reprennent de l'activité ; le premier est entendu le 08/02/11 à Poitiers (LecF). Deux preuves de nidification ont été apportées avec l'observation de juvéniles, le 11/07/11 à Marigny-Chemereau (BraJ) et le 23/07/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (BouV). Les derniers chanteurs sont signalés fin juillet.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

S (555-122-274)

Des groupes importants sont observés en hiver avec un maximum de 1 500 ind. le 19/12/10 à Coulombiers (BusR). Le premier chanteur est entendu le 20/02/11 à Naintré (LyoT) et la construction de nids est observée le 08/03/11 à Châtelleraut (AleJ). Des preuves de nidification sont relevées dans 5 communes, avec des jeunes observés le 30/04/11 à Saint-Benoît (BouAC), le 29/05/11 à Coussay-les-Bois (DesC) et le 31/05/11 à Jaunay-Clan (NadY), tandis que des transports de nourriture sont constatés le 12/06/11 à Chenevelles (OuvR) et le 06/07/11 à Saint-Cyr (DubT).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

S (646-129-294)

L'espèce se regroupe volontiers en période hivernale et des bandes de plusieurs centaines d'oiseaux sont relevées à de multiples reprises, avec environ 700 ind. le 11/12/10 à Mazerolles (PlaP) et 800 ind. le 17/12/10 à Bonnes (TiJ). Les premiers chanteurs se font entendre le 24/03/11 à Saint-Cyr (DesN). Des constructions de nids sont observées au plus tôt en avril, le 05/04/11 à Vouneuil-sur-Vienne (DubT) et le 09/04/11 à Quinçay (BerJ), tandis qu'un couple bâtit le sien le 30/06/11 à Dissay (TiJ). La nidification est prouvée 5 fois dans les communes de Châtelleraut (BoiA), Coussay-les-Bois (DesC), Poitiers (LecF) et Saint-Cyr (BoiA et HoE).

Tarins des aulnes *Carduelis spinus*

M, H (277-73-147)

Des groupes sont vus en migration : 51 ind. le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL) et 14 ind. le 18/10/10 à Chauvigny (DubT). De nombreuses observations portent sur plusieurs dizaines d'oiseaux ; le maximum signalé est de 80 ind. le 03/01/11 à Leugny (DupL), où les oiseaux se nourrissent dans

des aulnes. Cette essence est la plus fréquemment mentionnée comme accueillant l'espèce, mais on note aussi des observations dans des bouleaux et des pins, ainsi qu'aux mangeoires. La dernière observation printanière est celle de 2 ind. signalée le 28/03/11 à Vendeuve-du-Poitou (BerJ).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*
S (359-110-236)

Grégaire en dehors de la période de reproduction, la plus grande bande observée comptant 300 ind. le 19/12/10 à Coulombiers (BusR). Le chant est remarqué la première fois le 28/03/11 à Quinçay (VenJ). La construction des nids est observée au plus tôt le 07/04/11 à Bignoux (CouBM) et encore constatée le 02/07/11 à Poitiers (LecF). Des preuves de nidification certaine sont attestées dans trois communes par des transports de nourriture le 07/05/11 à Bignoux (CouBM) et l'observation de jeunes le 19/05/11 à Plaisance (RenL) et le 25/06/11 à Dissay (MinN).

Sizerin flammé *Carduelis flammea*
M, H (4-3-4)

Les rares données sont enregistrées en période d'hivernage : un contact en vol le 16/11/10 à Pressac (BusR), 1 ind. le 30/12/10 à Poitiers (MorP), et deux observations en compagnie d'autres fringilles le 16/01/11 à Vernon (BusR) et le 26/01/11 à Poitiers (DubT).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*
H (7-4-5)

Contacté seulement de septembre à février, à l'unité ou en groupes de faible effectif : 2 ind. entendus dans un jardin le 18/09/10 à Poitiers (WiIT), 2 ind. en vol le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL), 1 ind. en vol le 20/10/10 à Morton (RaiW) et 4 ind. observés dans un épicéa le 27/01/11 à Poitiers (BusR). La dernière mention est celle d'un oiseau le 09/02/11 à Montmorillon (PlaP).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*
S (44-27-38)

La majorité des données provient de l'automne et de l'hiver, souvent suite à un contact auditif, et concerne toujours de faibles effectifs : le maximum est de 5 ind. le 02/11/10 à Saint-Cyr (TiIJ). Un couple a été observé le 26/04/11 à Vouneuil-sous-Biard (CouBM) et des chanteurs ont été entendus en mai ou juin à Montamisé (WiIT), Naintré (BoiA), Pressac (MérJu) et Saint-Cyr (TheP). La nidification de l'espèce n'est toutefois pas prouvée.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*
S (357-89-205)

Observé en toute saison, mais la plupart des données ont été recueillies entre novembre et mars. À cette époque, des groupes de plusieurs dizaines sont

observés, comme 63 ind. le 11/12/10 à Saint-Cyr (HoIE et TiIJ), 32 ind. le 21/01/11 à Dissay (TiIJ), et 58 ind. le 31/01/11 à la Roche-Posay (HamJ). En période de reproduction, un couple est noté le 16/04/11 à Quinçay (BerJ) et la nidification est constatée à 3 reprises, par la présence de juvéniles, le 31/05/11 aux Trois-Moutiers (RaiW), le 04/06/11 à Saint-Benoît (BouAC) et le 14/06/11 à Saint-Cyr (TheP).



Bouvreuil pivoine

EMBÉRIZIDÉS

Bruant jaune *Emberiza citrinella*
S (197-85-153)

En hiver, de petites bandes sont observées avec notamment un groupe de 25 ind. le 19/12/10 à Benassay (VenJ) et une cinquantaine d'oiseaux le 23/12/10 à Mauprévoir (MérJu). Les premiers chanteurs sont entendus le 25/02/11 à Pressac (AleJ) et le 15/03/11 à la Chapelle-Moulière (DubT). Seulement deux cas de reproduction certaine ont été relevés : un transport de nourriture noté le 19/04/11 à Vellèches (VenJ) et le 20/05/11 à Pressac (MérJu). Le dernier mâle chanteur est entendu le 15/07/11 à Coulombiers (TheP).

Bruant zizi *Emberiza cirulus* **S (415-126-320)**

Des groupes plus ou moins importants peuvent se constituer dès la fin de l'été. L'effectif le plus important relevé est celui d'un groupe de 80 ind. le 18/09/10 à Château-Larcher (JomL). La période de chant est particulièrement étalée, puisque les derniers chanteurs ont été entendus jusqu'en octobre - le 18/11/10 à Montamisé (LecF) - et que les premiers de l'année ont débuté dès janvier : le 09/01/11 à Moulismes (LecF) et le 10/01/11 à Poitiers (CouBM). Un accouplement est noté le 10/04/11 à Iteuil (BusR) ainsi que six transports de matériaux dont le premier à Archigny le 03/04/11 (OuvR). Huit cas de nidification certaine ont été établis : la dernière de l'année 2010 concerne la découverte d'un nid contenant trois oisillons le 26/08 à Coussay-les-Bois (DauD) et la première de l'année 2011 un nourrissage le 06/05 à Mauprévoir (BusR).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana***M, E (66-17-51)**

Les premiers oiseaux sont observés les 26 et 27/04/11 à Maillé (RicJ), tandis que les premiers chanteurs se font entendre début mai : le 04/05/11 à Varennes (FaiC) et le 05/05/11 à Saint-Jean-de-Sauves (PoiC). L'ensemble des observations est réalisé sur 17 communes distinctes et concerne essentiellement des mâles chanteurs ; aucun indice de reproduction certaine n'a pu être établi. Le dernier chanteur est noté le 26/06/11 à Champigny-le-Sec (DelC).

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus***S, H (249-66-119)**

La quasi-totalité des observations concerne des migrateurs et des hivernants. En migration, 64 ind. sont notés le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL) et 5 ind. le 10/10/10 à la Puye (HolE). En hiver, des bandes parfois importantes sont observées : 150 ind. le 25/02/11 à Saulgé (VenJ) et 250 ind. le 03/03/11 à Mauprévoir (MérJu). En avril, l'espèce est contactée

à trois reprises jusqu'au 12 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (LiéB, HolE et TheP) et 2 ind. sont observés le 11/04/11 à l'étang de Villeneuve (CouBM). Un mâle chanteur est entendu le 12/05/11 à la réserve naturelle du Pinail (GilD). Le dernier contact printanier est l'observation d'un mâle le 18/05/11 à l'est de la forêt domaniale de Moulière (CouBM).

Bruant proyer *Emberiza calandra***S (298-88-251)**

Présent essentiellement dans les zones de plaines cultivées, le plus souvent observé en groupes d'août à avril avec un maximum de 136 ind. noté le 22/01/11 à Colombiers (MasM). Les premiers chanteurs se font entendre dès le 21/02/11 à Archigny (OuvR) et le 05/03/11 à Craon (LerA). Le dernier chant est entendu le 26/06/11 à Avanton (RoyD). Seulement deux cas de nidification certaine ont été établis : un transport de nourriture le 24/05/11 à Mazerolles (BasL) et un couple avec 2 jeunes observé le 31/07/11 à Archigny (OuvR).



Alouette des champs