


Synthèse des données ornithologiques du 15/08/11 au 14/08/12

Coordinateur : Régis OUVRARD

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes

86000 POITIERS



La rédaction de cette synthèse a été assurée par :

Marie-Noëlle et Bernard COUTURAUD : PHASIANIDÉS, PÉLÉCANIDÉS, PICIDÉS et RÉMIZIDÉS

Dominique CROZIER : TYTONIDÉS, STRIGIDÉS, TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS, ÆGITHALIDÉS, PARIDÉS et SITTIDÉS

Jean-Claude DESCOMBES : MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS

Cédric FAIVRE : ACCIPITRIDÉS, PANDIONIDÉS, FALCONIDÉS, RALLIDÉS et MOTACILLIDÉS

Daniel GILARDOT : ALAUDIDÉS et CORVIDÉS

Régis OUVRARD : GAVIIDÉS, ARDÉIDÉS, GRUIDÉS, COLUMBIDÉS, CAPRIMULGIDÉS, APODIDÉS, HIRUNDINIDÉS, TURDIDÉS, MUSCICAPIDÉS et LANIIDÉS

Yann PICHON : ANATIDÉS, SYLVIIDÉS et CACATUIDÉS

Cyrille POIREL : OTIDIDÉS et BURHINIDÉS

Johan TILLET : PODICIPÉDIDÉS, PHALACROCORACIDÉS, CICONIIDÉS, THRESKIORNITHIDÉS, RÉCURVIROSTRIDÉS, CHARADRIIDÉS, SCOLOPACIDÉS, LARIDÉS, STERNIDÉS, CUCULIDÉS, ALCÉDINIDÉS, CINCLIDÉS, TICHODROMIDÉS, CERTHIIDÉS et ORIOLIDÉS

Julien VENTROUX : STURNIDÉS, PASSÉRIDÉS, FRINGILLIDÉS et EMBÉRIZIDÉS

Liste des observateurs :

AIRAULT Vivien (AirV) - ALBERT Nathalie (AlbN) - ALDEHUELO Nathalie (AldeN) - ALEXANDRE Jean-François (AleJ) - ALEXIS Rodolphe (AleR) - ALLAIN Marie-Claude (AlMC) - ALLARD Michel (AlM) - Anonyme (AnoN) - ANTIC Christelle (AntC) - ARMOUET Alain (ArmA) - AUCLAIR Déborah (AucD) - AUDEVARD Aurélien (AudA) - AUDIDIER Rémy (AudR) - AUGUIN Antony (AugA) - AUGÉARD Dany (AugD) - AYRAULT Brigitte (AyrB) - BACLE Jeremy (BacJ) - BAILLARGEAT Sébastien (BaiS) - BARC Edith (BarE) - BASQUE Lucien (BasL) - BAXTER Alan (BaxA) - BEAULIEU Jacques (BeaJ) - BELLION Loïc (BelL) - BELLION Marc (BelM) - BERTEAUX Dominique (BerD) - BERTEAU Jack (BerJ) - BERNARD Jérôme (BerJé) - BERTON Louissette (BerL) - BERNARD Maurice (BerM) - BERNAL-GALLEGO Pierre-Manuel (BerP) - BERGER Thierry (BerT) - BESSAT Frédéric (BesF) - BEZARD Evelyne (BezE) - BILLAUD Jean-François (BiJ) - BIRARD Julien (BirJ) - BLEYAERT Adeline (BleA) - BLOIS Wilfried (BloW) - BODIN Aymeric (BodA) - BOIREAU Alain (BoiA) - BOILEAU Patrice (BoiP) - BONNIN Alain (BonA) - BONNIER Bernard (BonB) - BON Marie-Line (BonM) - BONNET Romain (BonR) - BOUDOIRE Damien (BouD) - BOULLAH Colette et Alain (BouAC) - BOULLÉ Dominique (BouD) - BOURDIN Laurent (BouL) - BOUVIN Laurent (BouLa) - BOUARD Roger (BouR) - BOUTIFARD Vincent (BouV) - BRANCIFORTI Julian (BraJ) - BRAMARD Michel (BraM) - BRAJARD Michèle (BraMi) - BROUCKE Hélène (BroH) - BUSSIÈRE Raphaël (BusR) - BUTON Franck (ButF) - CABIROL Rémi (CabR) - CAIGNEAUX Roland (CaiR) - CARJAT Didier (CarD) - CATTONI Flavien (CatF) - CAUDART Bruno (CauB) - CAUPENNE Michel (CauM) -

COQUILLEAU Marie-Cécile (CoqM) - CERNON Brigitte (CerB) - CHAMBOLLE Christophe (ChaC) - CHAUVET Etienne (ChaE) - CHAUSSEBOURG Marie-José (ChaM) - CHAGNON Maryline (ChaMa) - CHARROUX Mélissa (ChaMé) - CHANTEMARGUE Romain (ChaR) - CHEVRIER Jean-Jacques (CheJ) - CIMETIÈRE Stéphanie (CimS) - CLAVERY Frantz (ClaF) - CLÉMENT Jean-Michel (CleJ) - CODET Gilles (CodG) - CODARINI Sylvain (CodS) - COHENDOZ Stephane (CohS) - COTTET Régis (CotR) - COUPEAU Didier (CouD) - COURJAUD Francine (CouF) - COUSINEAU François (CouFr) - COUTURAUD Bernard et Marie-Noëlle (CouBM) - COUTURIER Jean-Baptiste (CouJB) - COUTEAU Jean-Guy (CouJ) - CROZIER Sylvie et Dominique (CroSD) - DAGUET Michel (DagM) - DAIRON-CAIGNEAUX Clémence (DaiC) - DALLIER Jacques (DaiJ) - DANO Pascal (DanP) - DAUBERT Daniel (DauD) - DAVIAUD Aurelie (DavA) - DAVID Sylvie (DavS) - DE PARSCAU Arthur (DepA) - DE SÉVÉRAC Michel (DesM) - DEBIAIS Bernard (DebB) - DEBIAIS Jean-Jacques (DebJ) - DECHARTRE Jérémy (DecJ) - DEFORGES Déborah (DefD) - DELLIAUX Christine (DelC) - DELINEAU Jean-Frédéric (DelJ) - DELHOUME Luc (Dell) - DEMOGUE Nathalie (DemN) - DERRIEN Patrick (DerP) - DÉSSERT Camille (DesC) - DESCHAMPS Chantal et Jean-Pierre (DesCJ) - DESCOMBES Jean-Claude (DesJ) - DESCOMBELS Nathalie (DesN) - DESGRANGES Sylvie (DesS) - DEUDON Marie-Claude (DeuM) - DONNADIEU Alain (DonA) - DORFIAC Matthieu (DorM) - DUBUES Antoine (DubA) - DUBREUIL Didier (DubD) - DUBOIS Gaetan (DubG) - DUBOIS Thierry (DubT) - DUCLOUX Alain (DucA) - DUGAST Régis (DugR) - DUPUY Jean-Raymond (DupJ) - DUPAS Louis (DupL) - DURAND Florian (DurF) - DZUGAN Isabelle (Dzul) - ECHAT Raynald (EchR) - ESNAULT Sarah (EsNS) - FAIVRE Cédric (FaiC) - FERRET Freddy (FerF) - FICHET Xavier (FicX) - FILLON Bruno (FilB) - FILLAUD Eric (File) - FISCHER Nadège (FisN) - FLEURANT Bruno (FleB) - FLEUREAU Julien (FleJ) - FORDHAM Peter (ForP) - FOURRÉ Dominique (FouD) - FRANS Anick (FraA) - FRADIN Jeanine (FraJ) - FRADET Solange (FraS) - GABORIT Georges (GabG) - GARCIA-CORRY Anna (GarA) - GARGOT René (GarR) - GAUTHIER Sophie (GauS) - GEFFARD Anthony (GefA) - GÉHIN Lydie (GéHL) - GÉRARD Christian (GerC) - GILARDOT Daniel (GilD) - GILET Vincent (GilV) - GIRAULT Amélie (GirA) - GIRARD Claudine (GirC) - GLAIN Françoise (GlaF) - GODIN Gabriel (GodG) - GODET Marine (GodM) - GRACIEUX Céline (GraC) - GRANGER Michel (GraM) - GRELLIER Freddy (GreF) - GREYO Géraldine (GreG) - GRECK Nicole (GreN) - GRIARD Benjamin (GriB) - GUÉRY Jean-Pascal (GueJ) - GUÉRIN Thierry (GueT) - GUILLAUME Emmanuel (GuiE) - GUILLOU Erwan (GuiEr) - GUILLAUME Patricia (GuiP) - HAINAUT Michel (HaiM) - HAMILTON John (HamJ) - HARRIS Florence (HarF) - HOLTHOF Eric (HoIE) - IRANI Alice (IraA) - ISSA Nidal (IssN) - JAHAN Maxime (JahM) - JALICON Pierre-Yves (JalP) - JAMBU Warren (JamW) - JANOWICZ Delphine (JanD) - JARDIN Georges (JarG) - JEAMET Eric (JeaE)

- JEAN Grégory (JeaG) - JEREMY Anne (JerA) - JOLY Odile (JoIO) - JOLION Perrine (JoIP) - JOMAT Émilien (JomE) - JOMAT Loïc (JomL) - JOMAT Patrick et Sylvie (JomPS) - KAESTNER Martine (KaeM) - KAGEYAMA Monique (KagM) - KIRCHHOFF Clément (KirC) - KREMSER Romuald (KreR) - LACOSTE Jean et Joëlle (LacJJ) - LAHOREAU Joëlle (LahJ) - LANGOUMOIS Jean (LanJ) - LASSALLE Frédéric (LasF) - LAUBIN Alexandre (LauA) - LAURENT Guy (LauG) - LAURENT Thibault (LauT) - LE GUEN Anthony (LegA) - LECELLIER François (LecFr) - LECOMTE François (LecF) - LEFEBVRE François (LefF) - LEJEUNE Annie (LejA) - LEMAÎTRE Jean-Bernard (LemJ) - LENFANT Catherine (LenC) - LEROUX Alain (LerA) - LEYMARIE Alain (LeyA) - LHERIAUD Sébastien (LheS) - LIÉGEOIS Bernard (LiéB) - LIOT Adélaïde (LioA) - LIPOVOÏ Dounia (LipD) - LOUSTE Eva (LouE) - LUCAS François (LucF) - LUCAS Serge (LucS) - LYON Typhaine (LyoT) - LYONNET Thibault (LyoTh) - MAHE Jean-François (MahJ) - MANNANT Gilles (ManG) - MARTIN Christophe (MarC) - MARTIN Georges (MarG) - MARTIN Johnny (MarJ) - MARQUET Lucie (MarL) - MARTINAUD Rémi (MarR) - MASSON Michel (MasM) - MAULNY Maxime (MauM) - MÉNARD Catherine (MénC) - MERCERON Bruno (MerB) - MÉRIGEAULT Évelyne (MerE) - MÉTAIS Alain (MetA) - MÉTAIS Catherine (MetC) - MÉTAYER Guillaume (MetG) - MICHAUD François (MicF) - MICHARDIÈRE Patrick (MicP) - MILARET Vincent (MilV) - MINAULT Gérard (MinG) - MINET Nicolas (MinN) - MOREAU Christian (MorC) - MOREAU Michel (MorM) - MORON Nicolas (MorN) - MOREAU Patrice (MorP) - MOTTEAU Valentin (MotV) - MUGNIER Xavier (MugX) - MULTON Bertrand (MulB) - MULLER David (MulD) - MULLER Doriane (MulDo) - NADAL Yann (NadY) - NEDELLEC Sebastien (NedS) - NIORTHE Dominique (NioD) - NIQUET-MORILLON Isis (NiqI) - NIVET DAYNAC Isabelle (NivI) - NOËL Gérard (NoeG) - NOMINÉ Philippe (NomP) - NOUGIER Paul (NouP) - OCAMPO Victor (OcaV) - ODEIDE René (OdeR) - Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres Équipe Mellois (GODS_Mel) - Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) - OUVRARD Patrice (OuvP) - OUVRARD Régis (OuvR) - PANETIER Marina (PanM) - PAPET Jacqueline (PapJ) - PASQUIER Guillaume (PasG) - PASSERAULT Jean-Michel (PasJ) - PEIGNAULT Alain (PeiA) - PÉLISSIER Anne (PeIA) - PENAUD Mathis (PenM) - PERSUY Alain (PerA) - PERRIN Samuel (PerS) - PEZE Jean-François (PezJ) - PICHON Claudie (PicC) - PICHON Yann (PicY) - PINIER Rodolphe (PinR) - PITERS Stéphane (PitS) - PLAT Pierre (PlaP) - PLISSONNEAU Fabienne (PiIF) - PLUCHON Nicolas (PluN) - POIS Bernadette (PoiB) - POIREL Cyrille (PoiC) - POISSON Olivier (PoiO) - PORTRON Valérie (PorV) - POUVREAU Olivier (PouO) - PRATT Alban (PraA) - PRÉMAUD Jean-Michel (PreJ) - PRÉVOST Jacques (PréJ) - PRÉVOST Olivier (PréO) - PRÉDOT Tony (PrÉT) - PRINTEMPS Thierry (PriT) - PUYDEBOIS Jean-Pierre (PuyJ) - RAITIÈRE Willy (RaiW) - RANSDALE Nick (RanN) - REBEYRAT Xavier (RebX) - RENOUST Aurélie (RenA) -


RENAUD Guy (RenG) - RENAUD Julien (RenJ) - RIBARDIÈRE Annie (RibA) - RICHER Catherine (RicC) - RICHER Jean-Michel (RicJ) - RICHARD Emmanuel (RicE) - ROBIN Denis (RobD) - ROLLAND Yann (RoLY) - ROUFFY Gaëlle (RouG) - ROUVREAU FOURNIER Pierrette (RouP) - ROYER Denis (RoyD) - ROY Guillaume (RoyG) - RUET Pascale (RueP) - SABOUREAU Daniel (SabD) - SABOURIN Laurent (SabL) - SALEIN Frédéric (SaIF) - SAVIN François (SavF) - SEILLER Benoît (SeiB) - SELWA Felix Philippe (SeIF) - SÉNÉCAL Angéline (SenA) - SÉNÉCHAL Cyril (SenC) - SLÉZAK Josée (SléJ) - SMITH Mike (SmiM) - SUDRAUD Julien (SudJ) - TABUTEAU François (TabF) - TANQUERAY Vincent (TanV) - THÉRY Paul-Mickaël (TheP) - THIAUDIÈRE Anne (ThiA) - THIAUDIÈRE Jean-Claude (ThiJ) - TILLET Johan (TilJ) - TILLET Serge (TilS) - TOUVENET Sylvain (TouS) - TOUZÉ Hugo (TouH) - TRANCHAND Bertrand (TraB) - TROTTEREAU Michel (TroM) - TROUBAT Stéphane (TroS) - TURPAULT Alexis (TurA) - VALLEE Didier (VaID) - VALLANTIN Geneviève (ValG) - VALETTE Patrick (ValP) - VAN HECKE Benoît (VanB) - VANDROMME Denis (VanD) - VAN LEEUWEN Nicole (VanN) - VARNIER Joël (VarJ) - VASSEUR Marie-Blanche (VasM) - VAUCELLE Coralie (VauC) - VAUCELLE Maxime (VauM) - VENTROUX Julien (VenJ) - LPO Vienne (VieL) - VIGUÉ Clément (VigC) - VINCENT Sylvain (VinS) - VIRONDEAU Anthony (VirA) - WAMBERGUE Éloi (WamE) - WEDGE Frances (WedF) - WELLS Barry (WelB) - WILLIAMSON Thomas (WiIT) - YOU Théophile (YouT) - ZUNINO Fabien (ZunF)

Liste alphabétique des étangs et plans d'eau de la Vienne cités dans la synthèse :

Étang Baro, Mauprévoir
 Étang de Beaufour, Saulgé
 Étang de Beauregard, Iteuil
 Étang des Brandes de la Châtre, Lathus-Saint-Rémy
 Étang de Combourg, Pressac
 Étang Delage, Saulgé
 Étang de l'Écotière, Bellefonds
 Étang du Léché, Saulgé
 Étang de Maupertuis, Coulombiers
 Étang de la Pétolée, Usson-du-Poitou
 Étang Pétaveau, Journet
 Étang Neuf, Pressac
 Grand Étang de la Puye, la Puye
 Lac de Jousseau, Availles-Limouzine
 Plan d'eau de Saint-Cyr, Saint-Cyr

Préambule :

Dans cette synthèse, les espèces dites "communes" (très communes, communes et assez communes) en Vienne ne sont pas systématiquement décrites par un texte sauf fait marquant. A la fin de l'article, des tableaux synthétisent les données notées sur la base de la LPO Vienne pour la période allant du 15/08/11 au 14/08/12, en termes de statut de nidification et de présence des espèces migratrices ou observables en hivernage ou encore en reproduction.



Légende

Nom français (*)

Nom scientifique (*)

Statut dans le département de la Vienne

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

H, S

(205-39-68)

Présente toute l'année. Un couple est vu le 11/05/12 à l'étang du Léché (BasL) et la nidification est jugée probable le 25/05/12 à Usson-du-Poitou par le comportement d'un mâle (BusR). Une femelle et un jeune de l'année sont aussi vus le 13/08/12 à Sèvres-Anxaumont (BusR).

nombre d'observations,
nombre de communes et
nombre de lieux-dits

(*) : D'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011

S : Espèce observable tout au long de l'année

E : Espèce observée uniquement en période de reproduction

M : Espèce observée uniquement en période de migration

H : Espèce observée en hivernage

A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition

? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse

ANATIDÉS

Cygne noir *Cygnus atratus* ? (17-4-7)

Cette espèce a été rencontrée en milieu naturel à plusieurs reprises : 2 ind. à partir du 19/01/12 puis 1 ind. jusqu'au 4/02/12 à Saint-Cyr (TiIJ et al), 1 ind. du 18/03/12 au 19/04/12 à Chauvigny (BaiS et al), 1 ind. du 1/05/12 au 2/06/12 à Valdivienne (FaiC et al).

Cygne tuberculé *Cygnus olor* S, H (239-44-91)

Oie rieuse *Anser albifrons* M, H (1-1-1)

La seule observation est celle d'un oiseau de première année le 28/10/11 à l'étang de Beaufour (RanN). La présence de cette espèce est très rare dans la Vienne.

Oie cendrée *Anser anser* M, H (60-35-46)

Le premier vol de la migration postnuptiale est vu le 18/10/11 à Fontaine-le-Comte (AnoN) ; les effectifs restent faibles tout l'automne avec un maximum de 48 ind. le 19/12/11 à Saint-Cyr (TiIJ). Peu d'oiseaux sont vus en décembre et janvier, au contraire de février qui rassemble l'essentiel des observations de vols de migration pré-nuptiale, avec au maximum 240 ind. le 15/02/12 à Saint-Cyr (MugX).

Bernache nonnette *Branta leucopsis* M (2-2-2)

Deux observations de cette oie nordique, 1 ind. le 26/12/11 à Vivonne (JomL) noté comme échappé de captivité, et 1 ind. le 28/02/12 à l'étang de Beaufour (FleB).

Ouette d'Egypte *Alopochen aegyptiaca* ? (12-5-10)

Notée dans 5 communes, Availles-Limouzine, Lathus-Saint-Rémy, Montmorillon, Pressac et Saint-Cyr. La nidification a été constatée à Lathus-Saint-Rémy, donnant un jeune (VenJ). Au plus 6 ind. sont vus ensemble comme le 11/09/11 à Pressac (BusR).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* S (31-7-10)

Observé de décembre à juin ; les premiers oiseaux vus sont 2 ind. le 8/12/11 à Saint-Cyr (TiIJ) où l'effectif monte à 5 ind. le 3/01/12 (TiIJ et al). Un couple est présent du 9/04/12 au 3/06/12 à Champigny-le-Sec (BusR et al), parfois en compagnie d'un troisième oiseau adulte. L'espèce a aussi été mentionnée dans les communes suivantes : Avanton, Coulombiers, Journet, Lathus-Saint-Rémy et Saulgé. Aucune nidification n'a été constatée en 2012 malgré la surveillance des sites connus.

Canard mandarin *Aix galericulata* ? (4-3-4)


Il a été signalé dans trois communes : 1 ind. le 15/01/12 à Buxeuil (LanJ), 1 couple le 16/04/12 à Vouillé (BerJ), commune où 4 ind. sont vus le 3/05/12 (PouO), et 1 ind. le 9/06/12 à Iteuil (GodG).

Canard siffleur *Anas penelope* H, M (30-12-18)

La majorité des données s'échelonnent de novembre à mars. Les premiers oiseaux sont 3 mâles le 6/11/11 à Saint-Cyr (MinN). Les effectifs les plus importants restent modestes, avec 9 ind. le 19/12/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ), 6 ind. le 22/02/12 à l'étang du Léché (BasL), 13 ind. le 3/03/12 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN) et 13 ind. le 7/03/12 à Saint-Cyr (TiIJ). À noter aussi une présence tardive : 1 mâle le 1/06/12 à Savigny-Lévescault (MorC).

Canard chipeau *Anas strepera* H, S (108-23-37)

L'espèce est notée tous les mois. Les groupes les plus importants sont de 12 ind. le 30/11/11 à Pressac (DorM), 13 ind. le 13/02/12 à Vouneuil-sur-Vienne (MunX), 26 ind. le 25/02/12 à l'étang de L'Écotière (BusR et al), 17 ind. le 3/04/12 à l'étang de Beaufour (TiIJ). La nidification a été prouvée avec l'observation de 11 poussins le 7/06/12 à l'étang de Beaufour (BasL).



Sarcelle d'hiver *Anas crecca* H, S (205-39-68)

Présente toute l'année. Un couple est vu le 11/05/12 à l'étang du Léché (BasL) et la nidification est jugée probable le 25/05/12 à Usson-du-Poitou par le comportement d'un mâle (BusR). Une femelle et un jeune de l'année sont aussi vus le 13/08/12 à Sèvres-Anxaumont (BusR).

Canard colvert *Anas platyrhynchos* H, S (954-127-357)

Canard pilet *Anas acuta* M (15-5-7)

Le premier oiseau est vu en octobre, 1 mâle le 8/10/11 à Saint-Cyr (FaiC). Peu d'oiseaux sont observés pendant la migration postnuptiale et il faut attendre le cœur de l'hiver pour avoir un groupe conséquent : 17 ind. le 29/01/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (BouAC). Février voit revenir des migrateurs, au plus 15 ind. le 28/02/12 à l'étang de Beaufour (FleB et al). La dernière observation est en mars, 1 femelle le 24/03/12 à Iteuil (FaiC).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* M, E (24-8-10)

Un seul oiseau est vu à la migration postnuptiale, 1 femelle séjournant du 2/09/11 au 18/09/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TiIJ et al). Il faut attendre mars pour voir revenir les migrateurs, le premier est 1 mâle le 10/03/12 à Saulgé (PoiC et al). Les effectifs atteignent 11 ind. le 11/03/12 à Vendeuve-du-Poitou (BusR) et 8 ind. le 16/03/12 à Iteuil (FaiC). Un couple présent du 30/03/12 au 29/04/12 à Pressac (DorM et al) laisse ouverte la question de la nidification de l'espèce : aucun oiseau n'est vu après fin avril.

Canard souchet *Anas clypeata***H, M (93-21-31)**

Vu tous les mois de l'année, les plus grands groupes sont de 58 ind. le 6/12/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TiIJ), 27 ind. le 14/03/12 à l'étang de Beaufour (RenG) et 36 ind. le 5/04/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (MugX). Aucune preuve de nidification pour 2012.

Nette rousse *Netta rufina* H, E (6-4-5)

1 couple stationne quelques jours à partir du 11/11/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC et al), 1 couple est également vu le 25/02/12 à l'étang de L'Écotière (BusR). 3 ind. sont présents le 1/03/12 à l'étang de Beaufour. 1 couple est observé en période de nidification, le 19/06/12 à Saint-Léomer (VenJ).

Fuligule milouin *Aythya ferina* H, S (141-28-54)

La reproduction est prouvée le 7/06/12 à l'étang de Beaufour (BasL), le 19/06/12 à Saint-Léomer (VenJ) et le 27/07/12 à Saulgé (BasJ), à chaque fois par l'observation de groupes familiaux avec poussins. Des indices de nidification probable sont relevés sur 4 étangs de la commune de Saulgé (BasL).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* H, M (1-1-1)

1 mâle est vu le 30/10/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (MarC).

Fuligule morillon *Aythya fuligula***H, S (86-15-27)**

La plupart des observations sont faites de novembre à mai, l'espèce étant toutefois présente toute l'année. Il faut attendre le plein hiver pour avoir des rassemblements relativement importants, comme 15 ind. le 27/01/12 à Adriers (FleB), 22 ind. le 9/02/12 à Saint-Cyr (LiéB), 25 ind. le 29/02/12 à Lathus-Saint-Rémy (RanN). La nidification a été certaine sur deux sites : 7 poussins accompagnent des ind. adultes le 15/06/12 à l'étang de Beaufour (BasL) et 3 poussins sont vus le 27/07/12 à l'étang Neuf (BasL). Des indices de nidification probable ont été relevés le 22/05/12 à Saint-Léomer (VenJ) et le 6/06/12 sur un autre étang de Saulgé (BasL).

Fuligule milouinan *Aythya marila* H (1-1-1)

Une observation peu fréquente dans la Vienne tels ces 2 ind. le 13/11/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC).

Fuligule milouin x Fuligule nyroca A (1-1-1)

1 ind. présentant ce type d'hybridation est observé le 11/11/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC).

Harle piette *Mergus albellus* M (3-3-3)

Les observations sont toutes faites en février : 2 femelles le 12/02/12 à Cenon-sur-Vienne (FleB), 1 femelle le 22/02/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ et al) et 1 femelle le 26/02/12 à L'Isle-Jourdain (BusR).

Harle bièvre *Mergus merganser* H, M (25-4-10)

Les données sont uniquement hivernales. 1 femelle est présente du 29/12/11 au 22/01/12 à Valdivienne (DubT). Le plan d'eau et la réserve ornithologique de Saint-Cyr accueillent plusieurs oiseaux pendant le mois de février : 1 mâle est vu à partir du 1/02/12 (MugX), l'effectif maximal sera de 6 ind. le 14/02/12 (TiIJ). 5 ind. sont vus le 19/02/12 sur la Vienne à Availles-Limouzine (BusR). La dernière donnée est 1 ind. le 26/02/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (ChaM).

PHASIANIDÉS**Perdrix rouge *Alectoris rufa* S (209-90-179)****Perdrix grise *Perdix perdix* S (123-53-114)****Caille des blés *Coturnix coturnix* E (335-80-279)****Faisan vénéré *Syrnaticus reevesii* ? (1-1-1)**

Une observation le 24/02/12 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM) : 1 mâle chanteur suivi de 6 femelles dont 2 répondent à son chant.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* S (231-81-181)**GAVIIDÉS****Plongeon imbrin *Gavia immer* H (18-1-2)**

1 ind. est présent du 16/12/11 au 11/01/12 sur le plan d'eau de Saint-Cyr (TiIJ et al) probablement amené sur le site par une tempête hivernale.

PODICIPÉDIDÉS**Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* S (170-47-69)**

Un maximum de 20 ind. observés le 7/08/12 à l'étang de Beauregard (FaiC).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* S (371-42-90)

Groupe hivernal noté au plan d'eau de Saint-Cyr du 6/02/12 au 11/02/12 avec un maximum de 82 ind. atteint le 8/02/12, alors que le lac était gelé aux trois quarts (TilJ).

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis***M (6-3-4)**

Espèce notée uniquement en fin d'hiver lors de la remontée pré-nuptiale, 1 ind. du 4/02/12 au 8/02/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC, MinN, TilJ) rejoint par un deuxième le 9/02/12 (LiéB). Deux autres données avec 1 ind. le 2/03/12 à l'étang de Beaufour (RenJ) et 1 ind. le 12/03/12 à l'étang de Beauregard (JomL).

PHALACROCORACIDÉS**Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*****S (564-93-231)**

Dortoirs hivernaux les plus importants enregistrés avec 110 ind. le 4/12/11 à Châtellerauld (DupL) et 119 ind. le 9/01/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (PicY). La migration pré-nuptiale est plus marquée au mois de mars, avec des vols successifs comptabilisant 220 ind. le 11/03/12 à Chauvigny (DubT) et 105 ind. le 23/03/12 à Pressac (SmiM).

PÉLÉCANIDÉS**Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* ? (1-1-1)**

Espèce rare en France avec en général moins de 5 observations par an. Pour la Vienne, il s'agit de la première mention. L'oiseau est vu en vol le 24/03/12 à Liglet (CouBM). Après un passage en vol battu, il prend une ascendance et spirale longuement jusqu'à une grande hauteur. Auparavant, 2 ind. ont été notés le 19/03/12 sur un plan d'eau en Corrèze à 160 km de Liglet. Il est possible que l'un d'entre eux soit parvenu jusqu'à notre département.

ARDÉIDÉS**Blongios nain *Ixobrychus minutus* E (3-2-2)**

Une donnée postnuptiale en 2011 concerne 1 ind. de première année le 28/08 à l'étang de Beaufour (BusR). En 2012, un mâle chanteur est contacté du 6 au 14/06 au Grand Étang de la Puye (OuvR). Il ne sera plus observé de l'été malgré une prospection importante sur ce site.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax***E, M (17-13-14)**

La dernière observation en 2011 est notée le 4/09 au Grand Étang de la Puye (OuvR) avec 2 ind. de première année, et la première observation en 2012

concerne 2 ind. adultes le 3/04 à Sillars (BasL). Les 17 observations rapportées sur 13 communes ne permettent pas de statuer sur une possible nidification.

Héron vert *Butorides virescens* A (45-2-3)

Un individu immature de première année est observé quasi-quotidiennement du 24/11/11 au 4/01/12 sur les communes d'Iteuil et d'Aslonnes (NomP et al). Il s'agit de la première mention en Vienne. Lire la note consacrée à cette espèce dans le présent numéro de L'Outarde.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* M (13-2-4)

À noter le séjour d'un individu immature de première année à proximité du Pont Joubert dans Poitiers du 22/08/11 au 9/09/11 (OcaV et al). Une autre mention rapporte la présence d'un ind. le 4/03/12 à Vouillé (AnoN).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* S (72-23-48)

La majorité des données est notée de la mi-octobre à début février avec un maximum de 120 ind. à la Roche-Posay le 24/10/11 (LahJ) et plus de 79 ind. à Pressac le 1/01/12 (LiéB). En dehors de cette période, notons deux observations présentant des effectifs remarquables : 20 ind. le 31/08/11 à Availles-Limouzine (DebJ) et 7 ind. le 6/05/12 à Saint-Cyr (CroSD). Aucun indice de reproduction n'a été constaté.

Aigrette garzette *Egretta garzetta***S (163-37-63)**

L'espèce est observée toute l'année. Hormis ce regroupement hivernal de 31 ind. le 3/01/12 à Dangé-Saint-Romain (DubG), les effectifs les plus importants concernent des rassemblements postnuptiaux : 20 ind. le 25/08/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (ZunF), 17 ind. le 27/08/11 à Jaunay-Clan (TilJ) et 19 ind. le 28/08/11 à l'étang de Beaufour (BusR). La reproduction est notée sur l'étang de Beaufour le 6/07/12 (BasL).

Grande Aigrette *Casmerodius albus***M, H (475-82-249)**

Présente toute l'année avec une nette diminution du nombre d'observations de mai à août. Les effectifs de plus de 20 ind. sont notés en octobre, novembre et décembre : 45 ind. 2/11/11 à l'étang de Beaufour (PlaP), 20 ind. le 6/11/11 à l'étang du Léché (TheP), 30 ind. le 19/11/11 à la Roche-Posay (HamJ).

Héron cendré *Ardea cinerea* S (1046-156-503)**Héron pourpré *Ardea purpurea* E (63-17-31)**

La dernière observation postnuptiale est notée le 30/08/11 avec 1 ind. à Saint-Benoît (FaiC), et la première donnée pré-nuptiale concerne 1 ind. le 30/03/12 à l'étang de Combours (DorM). La reproduction est notée à l'étang Baro, à l'étang de Beaufour, à l'étang du Léché, ainsi qu'à l'étang Pétaveau.

CICONIIDÉS

Cigogne noire *Ciconia nigra* M (20-13-17)
Dernier ind. observé le 24/09/11 à Saint-Léomer (RenJ) et premier ind. le 15/03/12 à Pressac (SmiM). Des données durant le mois de juin laissent présager une nidification possible dans le département pour cette espèce discrète et sensible au dérangement.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M (110-61-101)
Des données tout au long de l'année, une migration postnuptiale marquée par une halte de 101 ind. le 3/09/11 aux Ormes (DubG) et un groupe de plus de 200 ind. le 27/02/12 à Valdivienne (AnoN).

THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche *Platalea leucorodia* A (3-2-3)
1 ind. observé le 6/09/11 à Vaux-sur-Vienne (DubG) et 1 ind. en stationnement le 30/04/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (CouD) et sur le départ le lendemain (MinN).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore *Pernis apivorus* M, E (62-43-57)
Lors de la migration 2011, un groupe de 10 ind. est vu posé dans une luzerne par une journée de vent fort le 2/09/11 à Thuré (LanJ). La dernière observation postnuptiale est notée le 7/09/11 à Rouillé avec 2 ind. (BouV). Il faut attendre le 2/05/12 pour voir 2 oiseaux à Archigny (OuvR). Deux indices de nidification probable ont été notés en 2012 : un transport de matériaux est observé le 5/06/12 à Sillars (BasL) et des cris d'alarme sont entendus le 14/07/12 à Ouzilly (FaiC).



Élanion blanc *Elanus caeruleus* H, M (7-3-4)
Sept données de cette espèce dans le département concernant 2 ind. distincts. Le premier oiseau est vu perché sur le même arbre mort les 1er et 2/10/11 à Craon (PoiC). Le second individu est vu pour la première fois le 6/07/12 (AleR) et sera revu jusqu'au 14/07/12 dans le secteur d'Ouzilly et de Marigny-Brizay. Le 11/07/12, il est vu capturant un petit rongeur après un vol en Saint-Esprit (LiéB).

Milan noir *Milvus migrans* E (271-73-188)
Le dernier oiseau a été vu en vol de migration vers le sud le 19/10/11 à Rouillé (BouV). Le premier contact au retour de migration a eu lieu le 1/03/12 à Saint-Sauveur au dessus de la décharge où 3 ind. ont été vus ensemble (DesC). Le 6/03/12, au même endroit, ce ne sont pas moins de 12 oiseaux qui sont vus groupés (DesC). Un plus grand groupe encore est vu au-dessus de la décharge de Sommières-du-Clain le 10/06/12 où 15 ind. ont été vus (PliF). Deux indices de reproduction certaine ont été notés tous les deux le 30/06/12 au Vigeant (JeaE) et à Saulgé (BouCA).

Milan royal *Milvus milvus* M (25-16-19)
Cette espèce erratique pour notre département est observée à l'automne, puis en mars-avril. Première observation automnale le 16/10/11 à Chauvigny, et dernière le 2/12/11 à Tercé avec 1 ind. (DubT). En 2012, la première observation a lieu à Saulgé le 2/03 (RanN) et la dernière à la Roche-Posay le 10/04 (AnoN) avec 1 ind. à chaque fois. Notons deux groupes de 4 ind. le 6/11/11 à Pressac (SmiM) et au moins 5 ind. le 6/03/12 à Saint-Sauveur, en compagnie de Milans noirs (DesCJ).

Vautour fauve *Gyps fulvus* A (1-1-1)
Espèce très rare en Vienne, toutes les données concernent des individus isolés. Bien souvent, il s'agit de jeunes oiseaux égarés, généralement contactés en été. Le 14/06/12, un ind. est vu sur un pylône électrique à Craon (AnoA).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* E (100-36-78)
Ce migrateur transsaharien est observé régulièrement jusqu'au 17/09/11, date où 2 ind. sont présents à Beaumont (PoiC) et 1 ind. à la Puye (AirV et GauS). Au retour d'Afrique, les 2 premiers oiseaux vus en Vienne sont notés au-dessus de la réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne le 9/03/12 (FaiC). La première parade a eu lieu le 24/03/12 à Chauvigny (DubT). Une seule reproduction certaine est notée au cours de cette année avec un jeune encore au nid le 28/07/12 (VanB).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* S (81-40-67)
Des observations sont faites toute l'année sauf pour les mois de décembre et de juillet. Trois ind. sont

recensés le 16/08/11 à Cherves en dortoir avec des Busards cendrés et Saint-Martin (BusR). La nidification probable d'un couple est notée dans une phragmitaie à Moncontour (ArMA). Elle est certaine à Saint-Léger-de-Montbrillais mais cette fois dans un champ de blé (PriT).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*
E, S (784-159-594)

L'espèce est observée toute l'année. Les effectifs les plus importants sont notés lors des regroupements postnuptiaux en dortoir : 11 ind. le 1/08/12 à Cherves (LerA), 6 ind. le 6/08/12 à Saint-Sauvant (JomL), 8 ind. le 8/08/12 à Vouillé (VenJ).

Busard pâle *Circus macrourus* **M (1-1-1)**
Un ind. a été contacté le 14/04/12 à Cherves. Il s'agissait d'un ind. de deuxième année (MarL, PoiC, WiT).

Busard cendré *Circus pygargus*
M, E (459-93-321)

En 2011, les observations sont régulières jusqu'au 4/09 avec 1 immature de 1re année à Champigny-le-Sec (BusR) ; le dernier ind. est vu le 18/09 à Dissay (GarR). En 2012, les premières observations sont faites le 25/03 à Saint-Martin-l'Ars (PréO) et le 26/03 à Cissé (LerA). Elles deviennent très fréquentes à partir du 3/04. Le premier cas de nidification est noté le 7/05/12 à Saulgé (BasL). Des ind. mélaniques sont vus à Archigny (OuvR), Bournand (PriT), Cherves (LerA, BouV, BouAC), Massognes (LerA), Saint-Léger-de-Montbrillais (PriT) et Vouillé (VenJ).

Autour des palombes *Accipiter gentilis*
S (32-21-29)

Ce rapace est très peu contacté, mais de façon régulière tout au long de l'année. Deux indices de nidification probable : le 24/03/12, un couple est noté en parade à Chauvigny (DubT), et le 3/04/12, un couple est vu en train de cercler à Saulgé (BasL). En chasse, un oiseau tente une attaque sur un Vanneau huppé le 11/01/12 à Nieuil-l'Espoir (PréO). À noter ce mâle pris dans une cage à corvidés avec un Épervier d'Europe le 27/08/11 à Dangé-Saint-Romain (DubG).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus*
S (306-110-236)

À noter cet ind. pris dans une cage à corvidés avec un Autour des palombes le 27/08/11 à Dangé-Saint-Romain (DubG).

Buse variable *Buteo buteo* **S (1197-190-816)**

Aigle botté *Aquila pennata* **M, E (6-2-3)**

Les six données concernent vraisemblablement un même individu. En effet, toutes les remarques mentionnent 1 ind. de phase claire observé autour de l'aéroport de Poitiers-Biard entre le 17/05/12 (VanB) et le 15/06/12 (JomL).

PANDIONIDÉS

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*
M (31-14-16)

Rapace uniquement contacté lors des migrations. La migration postnuptiale est observée à partir du 28/08/11 à Bonnes (MerB) et jusqu'au 3/10/11 à Pressac (SmiM). Les premiers migrateurs pré-nuptiaux sont vus le 10/03/12 à Pressac (SmiM) et au Vigeant (BusR, FaiC, PoiC). Le dernier ind. est noté à Pressac le 5/05/12 (SmiM). À signaler, deux ind. vus simultanément en pêche au-dessus de la Vienne le 3/04/12 à Chauvigny (TroS).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*
S (1055-188-709)



Faucon kobez *Falco vespertinus* **A (2-2-2)**

Deux données pour cet oiseau migrateur très rare dans le département. La première concerne une femelle vue en migration le 14/05/12 à Château-Larcher (JomL). Le second oiseau a été contacté le 27/05/12 à Mazeuil. Il s'agissait d'un mâle qui a traversé la route à 50 m de l'observateur (TiJ).

Faucon émerillon *Falco columbarius*
H (48-34-42)

L'espèce est observée régulièrement en migration et en hivernage du 27/09/11 (BasL) au 1/05/12 (LerA). Les observations décrivent des oiseaux posés ou en action de chasse. Le 9/10/11, c'est une chasse sur pipits qui est notée (JomL). Le 4/11/11, une alouette est capturée à Montamisé (VenJ). D'autres attaques sur des alouettes ont été observées le 11/02/12 à Leignes-sur-Fontaine (RenJ) et le 21/04/12 à Maillé (TiJ).

Faucon hobereau *Falco subbuteo***E (131-58-114)**

Rapace migrateur présent uniquement durant la période de reproduction. Deux preuves de reproduction sont constatées durant l'année 2011. Il s'agit d'une observation d'un couple et de deux jeunes quémendant au pied d'un pylône sur la commune de Jaunay-Clan le 25/08/11 (TilJ). La deuxième observation, faite à Cherves le 1/10/11, concerne deux jeunes sollicitant de la nourriture à un adulte, un passage de proie étant également observé (DubT). Le dernier oiseau est vu le 8/10/11 à Château-Larcher (JomL). Le premier oiseau est observé à son retour d'Afrique le 7/04/12 à Frozes (LiéB). Sept données mentionnent des nidifications probables comme le 27/06/12 à Vouillé (CouBM).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus***H, S (46-23-29)**

Observé tout au long de l'année, l'espèce est plusieurs fois notée avec une proie dans les serres : un oiseau non identifié le 28/08/11 à Champigny-le-Sec (TilJ) et le 19/04/12 à Poitiers (VanB), un pigeon ramier le 29/09/11 à Quincay (LerA). Beaucoup d'observations de chasses ont également été faites : sur des pigeons le 13/11/11 à Pressac (SmiM), des canards souchets le 6/12/11 à Saint-Cyr (TilJ), des vanneaux, pluviers et étourneaux le 20/12/11 à Pressac (RoyD), des pigeons le 30/04/11 à Beuxes (GriB), des étourneaux sansonnets le 7/08/12 à la Puye (OuvR) et enfin sur des hirondelles le 10/08/12 à Saint-Benoît (BouAC). Quatre couples ont niché en milieu naturel. Échec de la reproduction pour un couple, les trois autres ont produit respectivement 1, 2 et 3 jeunes (JeaE).

RALLIDÉS**Râle d'eau *Rallus aquaticus* S (47-17-20)**


Oiseau observé ou plutôt entendu toute l'année. Il s'agit le plus souvent d'oiseaux isolés mais quelques données rapportent des contacts simultanés. Deux données mentionnent des comportements territoriaux suggérant une probable reproduction à Champagné-Saint-Hilaire le 11/04/12 (BusR et FaiC) ainsi qu'à Saulgé le 15/05/12 (BasL). De possibles nidifications sont également notées sur Châtellerault (BoiA), Nouaillé-Maupertuis (BraJ) et Montreuil-Bonnin (BraM). À noter un oiseau retrouvé mort sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr le 14/02/12 suite à la vague de froid qu'à subi la Vienne (TilJ).

Râle des genêts *Crex crex* M (1-1-1)

Une seule donnée en migration pour cet oiseau vraisemblablement disparu de la Vienne comme nicheur. Cette donnée concerne un ind. contacté le 4/09/12 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr. L'oiseau a été vu puis entendu à la nuit tombée (FaiC).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus***S (546-101-233)****Foulque macroule *Fulica atra*****S, M (520-54-119)**

Oiseau contacté toute l'année dans le département, qui peut constituer de grands groupes durant la période hivernale. Un maximum de 250 ind. a été noté le 21/12/11 sur le plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC). À noter cet ind. présentant un plumage leucique au niveau des parotiques et de l'arrière du cou, et légèrement sur le dos, à l'étang de Beaufour le 4/03/12 (BusR), le 22/05/12 (VenJ) et le 7/06/12 (BasL). Il est observé en compagnie d'un deuxième ind. leucique le 21/04/12 (BouAC).

**GRUIDÉS****Grue cendrée *Grus grus* M (351-79-202)**

Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés le 29/09/11 avec 30 ind. à Thollet (WelB) et le 9/10/11 avec 25 ind. à Champagné-le-Sec (AnoN). Les observations rapportées sont quotidiennes du 30/10/11 au 24/11/11 avec un maximum de 1 365 ind. comptés de 9h30 à 16h15 le 6/11/11 à l'étang de Beaufour (PoiC et TheP). Les vols notés jusqu'à fin décembre sont tous en direction du sud et du sud-ouest.

Les vols pré-nuptiaux vers le nord commencent à partir du 29/01/12 avec 70 ind. à Coussay-les-Bois (DauD). Ils sont quasi-quotidiens du 18/02/12 au 16/03/12 avec un effectif maximal de 2 800 ind. le 29/02/12 à Sillars (PlaP). Les derniers groupes sont observés le 23/03/12 avec 100 ind. à Ayron (LerA), et plus de 60 ind. à Valdivienne et à Tercé (BoiP). À noter 1 ind. le 5/05/12 à la Chapelle-Viviers (GuiP). Aucune donnée dans le nord du département au dessus d'une ligne Mirebeau Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Une majorité des observations proviennent du sud-est de la Vienne.

OTIDIDÉS

Outarde canepetière *Tetrax tetrax*

E (772-43-232)

Comme souvent, les effectifs maximum dénombrés en simultané dans notre département ont été obtenus le 1/10/11 lors du second comptage collectif de la LPO Vienne avec 105 ind. : 4 à Saint-Sauvant (RenG), 1 à Saint-Léger-de-Montbrillais (GuiE) et 100 dans les plaines du Neuvilleois-Mirebalais (32 à Maisonneuve (FaiC), 23 à Ayron (DubT) et 45 à Angliers (BusR)). Si l'on excepte le groupe de 108 à 120 ind. observé à 5 reprises entre le 3/09/11 (TilJ) et le 11/10/11 (ONCFS) qui est situé en Deux-Sèvres sur la commune d'Assais à quelques centaines de mètres de la Vienne, le plus gros rassemblement était cette année celui d'Angliers avec un maximum de 54 ind. noté le 11/10/11 (ONCFS). Le dernier ind. a été observé le 13/10/11 aux Trois-Moutiers (PotD).

Un premier mâle de retour de migration a été observé précocement le 12/03/12 à Saint-Sauvant (JomL). Plusieurs rassemblements pré-nuptiaux ont ensuite été observés : 9 ind. le 16/03/12 à Saint-Sauvant (HaiM et LiéB), puis 15 ind. sur le même site le 20/03/12 (HaiM), 14 ind. le 21/04/12 à Massognes (FaiC et TilJ) et 14 ind. en limite Deux-Sèvres à la Grimaudière (PoiC). Les données de reproduction certaine restent rares compte tenu de la grande discrétion des femelles et des jeunes. À noter 1 femelle avec 2 très jeunes poussins signalés par un agriculteur au moment de broyer sa jachère le 8/07/12 à Cherves, 1 femelle et 1 jeune le 24/07/11 à Craon (GuiE), 1 femelle et 1 jeune le 31/07/11 à Vouzailles (TilJ), 1 femelle et 4 jeunes le 5/08/12 à Saint-Clair (GuiP) et un groupe de 15 ind. dont 2 femelles accompagnées de 2 et 3 jeunes le 13/08/12 à Cherves (CouD).

RÉCURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche *Himantopus himantopus*

M (4-3-3)

Espèce notée uniquement en migration pré-nuptiale avec 1 ind. le 21/04/12 à Vendevre-du-Poitou (FaiC et TilJ), un maximum de 5 ind. le 27/04/12 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (MugX et TilJ), 2 derniers ind. notés le 3/05/12 à Saulgé (BasL et PréO).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

M (13-5-7)

Espèce observée principalement en période hivernale du 8/10/11 avec 1 ind. à Pressac (SmiM) au 9/01/12 avec 12 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr (CouD et PicY). Les groupes les plus importants sont signalés avec 31 ind. le 6/11/11 à Sillars (TheP et PoiC) et 40 ind. le 17/12/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (ForP). Un

ind. a stationné à la réserve ornithologique du 11/06/12 au 16/06/12 (BouAC et al).

BURHINIDÉS

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus*

E, S (718-110-464)

Les premiers rassemblements postnuptiaux se forment dès le mois d'août, puis deviennent progressivement plus importants jusqu'en octobre comme à Vouzailles : 26 ind. le 15/08 (BusR), 57 le 20/08 (BusR et BouV), 84 le 22/08 (BusR), 102 le 3/09 (LecF) et un maximum de 181 le 2/10 (PoiC). Les 4 comptages réalisés par la LPO Vienne et l'ONCFS de la Vienne ont permis de comptabiliser sur l'ensemble du département : 1 038 ind. le 3/09/11, 1 501 le 20/09/11, 2 006 le 1/10/11 et 1 702 le 11/10/11. Avec plus de 1 000 ind. dès le premier comptage, les rassemblements ont été particulièrement précoces cette année. Les effectifs des 4 recensements sont assez nettement supérieurs à ceux des années précédentes et témoignent vraisemblablement d'une bonne saison de reproduction pour l'espèce, même si une partie de l'augmentation est à attribuer à la découverte de nouveaux sites. 7 groupes ont dépassé la centaine d'individus et le maximum pour un groupe a été atteint le 11/10/11 avec 250 ind. à Moncontour (ONCFS). Certains rassemblements ont séjourné tardivement dans notre département : encore 92 ind. le 2/12/11 à Moncontour (ArmA), 42 le 18/12/11 à Vendevre-du-Poitou (BusR, TilJ) ; certains ayant même tenté d'hiverner comme à Angliers : 14 ind. le 20/01/12 (ArmA) et à Sillars : 25 ind. le 31/01/12 (ThiJ) dans une pelouse rase recouverte de 5 cm de neige !

Les premiers individus de retour de migration ont été observés début mars avec 1 ind. le 6/03/12 à Archigny (OuvR), 2 ind. à Moncontour (ArmA) et 1 ind. à Vouillé (RicJ) le 7/03/12. Plusieurs indices de reproduction certaine ont été notés : 1 ind. en position de couvrir le 13/05/12 aux Trois-Moutiers (PriT), 2 adultes et 1 poussin le 25/05/12 à Loudun (MarL), 2 poussins le 5/06/12 à Sillars (BasL), 1 ind. couvant le 6/06/12 à Saulgé (BasL), 1 ind. couvant à Saint-Cyr observé à 3 reprises entre le 15/07/12 (OuvR) et le 25/07/12 (BouAC).



CHARADRIIDÉS**Petit gravelot *Charadrius dubius*****M, E (74-16-20)**

Premier ind. observé le 11/03/12 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC) et les derniers oiseaux pour la saison de reproduction sont notés avec 2 ind. le 28/06/12 à Naintré (BoirA).

Grand gravelot *Charadrius hiaticula* M (1-1-1)

Une seule donnée rapportant un groupe de 40 ind. s'alimentant dans un labour le 20/05/12 à Craon (FaiC).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus***M (7-3-4)**

Début de la migration postnuptiale noté avec 4 ind. le 19/08/11 à Vouzailles (BouV, BusR et TilJ) et se terminant le 29/08/11 avec 5 ind. à Maillé (BusR et TilJ). Maximum atteint avec 16 ind. le 22/08/11 à Vouzailles (BusR).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria***M, H (171-71-140)**

1 ind. précoce signalé le 22/08/11 à Vouzailles (BusR). Les premiers groupes hivernaux sont notés le 12/11/11 avec 90 ind. à Usson-du-Poitou (BusR) et 29 ind. à Cherves (GilV). Un groupe de près de 3 000 ind. est observé le 20/12/11 à Thurageau (RoyD). Derniers oiseaux présents avec 2 ind. le 31/03/12 à Usson-du-Poitou (FaiC). Une donnée atypique hors période d'hivernage avec 1 ind. contacté en vol le 24/06/12 à Château-Larcher (JomL).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus***H, S (723-161-474)**

Plus important rassemblement d'hivernants rapporté avec près de 3 000 ind. le 16/12/11 à Thurageau (RoyD). Trois données de reproduction certaine détectées le 25/05/12 à Mauprévoir (BusR), le 23/06/12 à Archigny (FraJ) et le 24/06/12 à Bonneuil-Matours (NioD).

SCOLOPACIDÉS**Bécasseau variable *Calidris alpina* M (12-8-9)**

Données postnuptiales à partir du 13/09/11 avec 1 ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP) et jusqu'au 17/12/11 avec 1 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ). Un maximum de 4 ind. le 27/11/11 à l'étang de la Pétolée (BusR). Reprise des observations avec 2 ind. le 4/03/12 à l'étang du Léché (BusR).

Combattant varié *Philomachus pugnax***M (8-4-4)**

Une donnée pour le passage postnuptial avec probablement le même individu observé le 4/09/11 et le

11/09/11 au Grand Étang de la Puye (OuvR). Les autres observations concernent des oiseaux en passage pré-nuptial en mars et mai avec un maximum de 5 ind. observés à la réserve ornithologique de Saint-Cyr le 25/03/12 (FaiC et PoiC).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus***M (4-3-3)**

Première observation de cette espèce à la réserve ornithologique de Saint-Cyr avec 3 ind. le 8/12/11 (TilJ). Deux autres sites avec 1 ind. le 12/03/12 à l'étang de Beauregard (JomL) et 1 ind. à l'étang Delage (ZunF).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago***H, M (146-30-52)**

Premiers oiseaux observés avec 2 ind. le 22/08/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) et les derniers avec 2 ind. le 22/04/12 à la Puye (OuvR). Le maximum est observé avec un groupe de 28 ind. le 14/01/12 à la Roche-Posay (LiéB).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola***S, H (45-25-43)**

Nombreuses données rapportées lors de l'hiver 2011-2012 avec des oiseaux faibles et peu farouches, comportement dû à des températures négatives prolongées et des sols gelés. L'espèce est même observée en plein centre-ville de Poitiers avec 1 ind. le 7/02/12 (AnoN) ou dans des parcs urbains comme ces 2 ind. le 12/02/12 à Saint-Benoît (ForP). 1 ind. est retrouvé mort gelé, le bec planté dans le sol, avec 2 ind. visiblement épuisés le 8/02/12 à Vouneuil-sur-Vienne (TilJ).

**Barge à queue noire *Limosa limosa* M (5-3-3)**

Deux données pour la migration postnuptiale avec 1 ind. le 3/09/11 à Ayron (DubT et DubA) et 6 ind. le 30/10/11 à l'étang de Beaufour (SalF). Les observations pré-nuptiales proviennent toutes de l'étang de la Pétolée du 7/04/12 au 1/05/12 avec 1 ind. (FaiC et al).

Courlis corlieu *Numerius phaeopus* M (3-3-3)

Trois données uniquement en avril avec 1 ind. à chaque fois, le 17/04/12 à Valdivienne (FaiC), le 19/04/12 à Moncontour (PoiC) et le 21/04/12 à Aslonnes (JomE).

Courlis cendré *Numenius arquata* S (112-24-57)

Espèce notée tout au long de l'année, seuls deux cas de reproduction probable rapportés, avec 1 ind. ayant un comportement territorial du 7/05/12 au 6/06/12 à Sillars (BasL) et 4 ind. le 17/05/12 à Saint-Sauvant (RenG).

Chevalier gambette *Tringa totanus* M (48-12-14)

Deux données postnuptiales en 2011 avec 2 ind. le 16/09 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP) et le stationnement d'un ind. du 11/10 au 29/10 à l'étang de Maupertuis (TheP et al). 40 données proviennent de la période du 16/03/12 au 3/06/12 avec des pics de 19 ind. le 27/04/12 (FaiC et TilJ) et 12 ind. le 13/05/12 (LiéB) à la réserve ornithologique de Saint-Cyr. Reprise de la migration postnuptiale avec 2 ind. le 7/08/12 à l'étang de Beauregard (VauM).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* M (37-12-17)

Le passage postnuptial s'étale du 23/08/11 avec 2 ind. au Grand Étang à la Puye (WilT) au 14/12/11 avec 1 ind. à Sillars (PlaP). Le passage pré-nuptial commence le 7/04/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR) pour s'arrêter le 20/05/12 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). C'est sur ce dernier lieu que sera noté l'effectif le plus important avec 10 ind. le 13/05/12 (CroSD).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* M, H (219-37-61)

L'espèce est observée toute l'année. Notons les maxima observés : 11 ind. à Champigny-le-Sec le 15/08/11 (BusR), 10 ind. à l'étang de Beaufour le 30/10/11 (SalF) et à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* M (6-5-5)

Espèce peu observée, uniquement 3 données en août, avec 2 ind. le 15/08/11 à Champigny-le-Sec (BusR), 1 ind. le 23/08/11 à Saint-Léomer (VenJ) et 1 ind. le 28/08/11 à l'étang de Beaufour (BusR). Également 3 données pour le printemps avec 1 ind. le 28/04/12 (FaiC et TilJ) et le 17/05/12 (FaiC) à la réserve ornithologique de Saint-Cyr, et 1 ind. le 16/05/12 à l'étang de la Pétolee (BusR).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* M, H (196-37-62)

L'espèce est notée toute l'année mais avec peu de

données hivernales : les données de décembre, janvier, février et mars représentent seulement 3 % des observations rapportées. Deux regroupements postnuptiaux : 19 ind. le 17/09/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR) et 21 ind. avec au minimum 4 immatures et 2 adultes le 7/08/12 au Grand Étang à la Puye (OuvR).

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* M (1-1-1)

Première mention de cette espèce pour le département, avec 1 ind. détecté en alimentation le 20/12/11 sur le plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC, MugX et TilJ). Présent jusqu'à la tombée de la nuit, il ne sera pas retrouvé le lendemain malgré les recherches effectuées (BusR).

LARIDÉS**Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* M, H (262-60-123)**

Suite à la fermeture de la déchetterie de Saint-Georges-Baillargeaux, le dortoir hivernal du plan d'eau de Saint-Cyr a vu ses effectifs hivernaux nettement diminués avec un maximum de 850 ind. dénombrés le 31/01/12 (TilJ). Un suivi réglementé sur la déchetterie de Saint-Sauveur a permis de contrôler plusieurs oiseaux bagués d'origine polonaise, allemande et tchèque parmi 1 300 ind. le 18/02/12 (GriB).

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* M (3-2-2)

1 ind. de première année stationne du 14/11 au 18/11/11 à l'étang de Beaufour (RanN et al) et 1 ind. est observé le 20/12/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC et TilJ).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* M (2-2-2)

1 ind. de première année le 26/08/11 à Saulgé (RanN) et 1 ind. le 18/02/12 à Saint-Sauveur (GriB).

Goéland cendré *Larus canus* H (9-7-8)

Au cours de l'hiver 2011-2012, l'espèce est présente sur 7 communes : Châtellerault, Millac, Saint-Cyr, Saint-Sauvant, Saint-Sauveur, Vaux-sur-Vienne et Vouneuil-sur-Vienne. Un maximum de 3 ind. est rapporté le 18/02/12 à Saint-Sauveur (GriB). 1 ind est photographié avec un oiseau dans le bec, un probable merle, le 8/02/12 à Vouneuil-sur-Vienne (DavS et al).

Goéland leucopée *Larus michahellis* M, H (24-9-16)

La majorité des observations concerne des oiseaux isolés. Trois groupes plus importants sont signalés avec 50 ind. en alimentation derrière un tracteur en train de labourer le 9/10/11 à Saint-Sauvant (JomL),

29 ind. le 24/11/11 à Rouillé (HaiM) et 32 ind. le 18/02/12 à Saint-Sauveur (GriB). À noter 1 ind. présent en période printanière le 30/05/12 et le 20/06/12 sur les rives de la Vienne à Châtellerault (BoiA).

Goéland argenté *Larus argentatus* H (7-7-7)

Présence hivernale avec une première observation de 2 ind. le 26/11/11 à Aslonnes (TilS) et une dernière donnée, pour cette période, de 3 ind. le 9/02/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (LiéB). La dispersion postnuptiale débute le 7/07/12 avec 6 ind. observés en vol à Montmorillon (RenJ).

Goéland brun *Larus fuscus* H (6-6-6)

Données concernant des observations ponctuelles ayant pour dates extrêmes le 27/08/11 avec 2 ind. à Vouillé (VenJ) et le 26/02/12 avec 1 ind. posé au lac de Jousseau (BusR). À noter la présence d'un ind. de type *intermedius* (origine nordique) le 29/01/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (RanN et al).

STERNIDÉS

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* A (1-1-1)

Deuxième mention départementale avec 1 ind. au repos sur un îlot le 27/04/12 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (MugX et TilJ). La dernière observation datait de 2001, déjà au plan d'eau de Saint-Cyr (LecF).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* E, M (58-8-14)

Notée sur 8 communes : Châtellerault, Coulombiers, Dangé-Saint-Romain, Ligugé, Millac, la Puye, Saint-Cyr et Smarves. Dernière donnée de 2011 avec 1 ind. le 20/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ). En 2012, les premiers oiseaux sont observés le 4/04 à l'étang de Maupertuis (HaiM) et au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ et al). Pas de donnée de reproduction certaine pour cette année.

Sterne naine *Sternula albifrons* M (2-1-2)

1 ind. en pêche avec des guifettes le 28/04/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC et TilJ). 1 ind. posé en compagnie de Sternes pierregarin sur les bouées de la réserve ornithologique de Saint-Cyr le 10/07/12 (MugX).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* M (19-6-8)

Dernière donnée postnuptiale avec 2 ind. le 17/09/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR). Retour noté avec 1 ind. le 3/04/12 à Bonnes (TilJ). Un maximum de 22 ind. le 26/04/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (MugX et TilJ).

Guifette noire *Chlidonias niger* M (21-6-7)

Dernière donnée postnuptiale avec 3 ind. le 27/09/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (TheP). Retour noté avec

1 ind. le 27/04/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (MugX et TilJ). Espèce observée sur 5 autres communes : Coulombiers, Pressac, Saulgé, Usson-du-Poitou et Vaux-sur-Vienne.

COLUMBIDÉS

Pigeon colombin *Columba oenas* H, S (83-40-56)

Espèce observée toute l'année. Les effectifs maximaux sont de 200 ind. le 8/03/12 à Coussay-les-Bois (DauD) et de 110 ind. le 26/12/11 à Messemé (DupL). Des indices de reproduction probable avec des ind. notés à proximité de loges de pic le 25/03/12 à Bignoux (PicY), le 22/04 (GraM), 5/05 et le 18/05/12 (CouBM) à Liniers.

Pigeon ramier *Columba palumbus* H, S (1395-184-806)

Pas de gros effectifs ; maxima notés : 300 ind. à Quinçay (AlexJ), ainsi qu'à Coussay-les-Bois (DavS) le 8/12/11.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* S (696-149-382)

Nicheur tardif avec 1 poussin d'une dizaine de jours le 11/11/11 à Archigny (OuvR).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* E (636-109-421)



CACATUIDÉS

Calopsitte élégante *Nymphicus hollandicus* ? (1-1-1)

1 ind. est vu le 13/10/11 à Neuville-de-Poitou dans un jardin (GéHL).

CUCULIDÉS

Coucou geai *Clamator glandarius* A (1-1-1)
Quatrième mention départementale avec 1 ind. immature posé sur un fil électrique le 21/05/12 à Saint-Cyr (TilJ).

Coucou gris *Cuculus canorus* E (623-121-421)
La présence de l'oiseau est notée du 11/03 au 10/08/12. Deux données de reproduction certaine, avec 1 juv. nourri dans un jardin par un Accenteur mouchet du 21/07 au 30/07/12 à Saint-Benoît (LacJJ et CouBM) et 1 juv. prédaté le 15/07/12 à Marigny-Brizay (OuvP et OuvR).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers *Tyto alba* S (159-83-136)
L'oiseau est commun dans le département. La forte mortalité routière représente 30 données, soit 18,9 % du nombre total d'observations. 7 jeunes ont été observés dans un nichoir le 15/07/12 à Neuville-de-Poitou (VanB).

STRIGIDÉS

Petit-duc scops *Otus scops* E, M (4-3-3)
On notera une reproduction certaine avec un jeune volant observé le 19/07/12 à Coussay-les-Bois (DesCJ). La présence de ce petit rapace nocturne est confirmée sur deux autres communes, à Neuville-de-Poitou le 24/05/12 (GéhL) et à Saint-Léomer le 21/07/12 (ChaR).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* S (221-70-131)
Deux données de Chevêche mettant en fuite des chats : le 4/06/12 à Valdivienne (BoiP), le 19/07/12 à Coussay-les-Bois (DesCJ).



Chouette hulotte *Strix aluco* S (141-60-114)
Une observation insolite d'une hulotte en repos diurne posée au sol devant une entrée de terrier de blaireau le 18/12/12 à Valdivienne (AleJ).

Hibou moyen-duc *Asio otus* S (37-20-31)
Deux dortoirs : 4 ind. le 2/12/12 à Saint-Julien-l'Ars (ZunF) et 8 ind. le 3/01/12 à Payroux (BerM).

Hibou des marais *Asio flammeus* S (24-11-18)
En période hivernale, des observations sont notées dans 9 villages, dont un dortoir de 6 ind. Une reproduction certaine avec au minimum 2 jeunes à l'envol le 26/06/12 à Moncontour (ArMA).

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* E (80-30-58)
En 2011, une donnée tardive le 8/10 avec 1 ind. à Journet (RenJ) alors que l'avant-dernière observation remonte au 28/08 avec 1 ind. à Sillars (BusR). Les deux premières données pré-nuptiales sont notées à la Puye le 16/04 et le 3/05/12 (OuvR). Plus de 10 ind. sont contactés le 18/06/12 à Payré (PréO).

APODIDÉS

Martinet noir *Apus apus* E (303-74-174)
Dernière observation en 2011 le 24/08 avec 2 ind. à Poitiers (PouO). Première mention en 2012 le 24/03 à Vouillé (KaeM).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* E, H (289-64-118)
Un couple nourrit deux jeunes le 7/08/12 sur l'île Sainte-Catherine à Châtellerault (LioA). À noter, suite à l'observation d'après une photographie, la capture d'un scorpion d'eau (*Nepa cinerea*) par 1 ind. le 1/11/11 à Pressac (SmiM).

MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* E (60-17-31)
Les premiers individus sont observés le 3/05/12 à Jouhet (LyoTh) et Sillars (LipD, BasL). Tout au long de ce mois de mai, 8 sites sont fréquentés par les oiseaux. La première installation, avec creusement des terriers, est observée le 17/05/12 à la Roche-Posay (OuvP). Le 28/05/12, perchés sur les fils électriques, les oiseaux se font des offrandes de libellules et de bourdons sur ce même site (PicY).

Au total, 62 couples ont niché dans le département en 2012, répartis sur 18 emplacements dont 14 le long des rivières. La colonie la plus importante a regroupé 22 ind. (DesJ). Le 4/08/12, 40 oiseaux fréquentaient la Roche-Posay (BouAC). Les derniers spécimens, au nombre de 10, ont été notés à la Bussière le 13/08/12 (PouO).

UPUPIDÉS


Huppe fasciée *Upupa epops* E (446-122-348)

Le dernier ind. de 2011 a été observé le 24/09 à Lavausseau (BertD) et le premier ind. de 2012 le 27/02 à Château-Larcher (LipD).

PICIDÉS

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* M, E (25-16-20)

Peu d'observations ont été faites pour cette espèce qui est discrète, en raison du mimétisme de son plumage, et dont la période de chants nuptiaux est courte. Les premières arrivées sont notées en fin mars : 1 ind. le 29/03/12 à Saint-Benoît (NouP) et 1 ind. le 31/03/12 à Poitiers (LecF). Toutes les observations se rapportent à des individus isolés à l'exception de couples vus 2 fois, le 14/04/12 à La Chapelle-Moulière (CouBM) et le 15/04/12 à Coussay-les-Bois (DesCJ). Aucun cas de nidification certaine n'est signalé.



Pic cendré *Picus canus* E (1-1-1)

Un seul oiseau est observé le 10/06/12 à Smarves (CroSD) ; ce qui confirme la rareté de cette espèce dans la Vienne.

Pic vert *Picus viridis* S (1088-165-637)

Espèce très commune, quelques comportements peu courants sont notés : un oiseau dispute sa loge avec un étourneau qui finira par le chasser le 22/04/12 à Smarves (RoyD) ; un autre se présente à une mangeoire le 21/12/11 à Poitiers (Gild).

Pic noir *Dryocopus martius* S (231-77-170)

Conformément au comportement solitaire de l'espèce,

la grande majorité des observations porte sur des individus isolés, seules 5 d'entre elles concernent 3 oiseaux et 18 en comptent 2. Le creusement d'une loge est observé le 6/03/12 à Bignoux (CouBM). C'est très nettement au mois de mars que le tambourinage est entendu le plus souvent. On relève 2 cas de nidification certaine : relève de l'ind. couvant avec le mâle qui vient remplacer la femelle le 5/05/12 à Liniers (CouBM) et 1 poussin avec 1 adulte le 22/05/12 à Ligugé (FaiC).

Pic épeiche *Dendrocopos major*

S (1006-159-609)

Pic mar *Dendrocopos medius* S (78-21-43)

Présente toute l'année, cette espèce n'est pas répartie uniformément dans la Vienne et on la trouve presque exclusivement dans les massifs forestiers importants. Les chants nuptiaux sont majoritairement entendus en mars mais les premiers résonnent dès janvier : le 17/01/12 à Montamisé (CouBM) et le 23/01/12 à Fontaine-le-Comte (BraJ). Pour la reproduction, une seule donnée de nidification certaine est notée avec un adulte vu le 23/05/12 à la Chapelle-Moulière (LecF). Le creusement d'une loge est suivi du 27/03/12 au 24/04/12 à Smarves (RoyD).



ALAUDIDÉS

Cochevis huppé *Galerida cristata*

S (149-68-122)

Cet oiseau n'a quasiment pas été observé à l'est de la rivière Vienne. Il n'y a pas d'observation au Sud du département sous la ligne reliant Saint-Sauvant à Montmorillon. Beaucoup d'observations sont liées à la ville ou aux bords de routes.

Alouette lulu *Lullula arborea* S, M (119-43-98)

Observée seule ou par petits groupes de 1 à 5 ind. Un groupe de 30 ind. est noté le 8/01/12 à Saint-Maurice-la-Clouère (TiJ). La construction d'un nid est constatée le 24/05/12 à Coussay-les-Bois (DesCJ). Présente surtout dans les secteurs de prairies, elle chante toute l'année.

Alouette des champs *Alauda arvensis***S, M, H (1122-162-619)**

Migration notée de la fin septembre à la fin novembre. Regain de passage vers le sud durant la première décennie de février suite à une vague de froid et de neige. Chant dès le début mars. À signaler la poursuite d'un Coucou gris par un ind. le 25/05/12 à Usson-du-Poitou (BusR).

HIRUNDINIDÉS**Hirondelle de rivage *Riparia riparia*****E (126-32-55)**

Dernière observation en 2011 le 8/10 avec 1 ind. à Saint-Cyr (FaiC). Notons deux mentions très précoces en 2012 le 11/02 avec 10 ind. à Nieuil-l'Espoir et 4 ind. à Cissé (LheS).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica***E (853-152-546)**

Dernière observation en 2011 le 12/11 à Biard (BouV). Première mention en 2012 le 5/03 à Château-Larcher (AnoN).

**Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* A (1-1-1)**

Première mention de l'espèce en Vienne, 1 mâle adulte le 20/05/12 à Bellefonds (OuvP et OuvR). Voir la note parue dans L'Outarde n° 49.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum***E (378-103-238)**

Dernière observation en 2011 le 28/10 avec 3 ind. à Poitiers (BusR). Première mention en 2012 le 13/03 à Coussay-les-Bois (DesCJ). À noter des nidifications tardives avec nourrissage au nid le 11/09/11 à Pressac (BusR).

MOTACILLIDÉS**Pipit rousseline *Anthus campestris*****E, M (13-8-9)**

Le premier oiseau est vu à son retour de migration le 29/04/12 à Pressac (SmiM). Le premier chanteur est entendu le 17/05/12 à Aslonnes (JomL). Un maximum de deux ind. est contacté le 25/05/12 à Usson-du-Poitou (BusR).

Pipit des arbres *Anthus trivialis***E, M (329-72-225)**

Le dernier oiseau est observé en 2011 le 19/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Le premier en 2012 le 19/03 à Mignaloux-Beauvoir (BusR).

Pipit farlouse *Anthus pratensis***H, S (289-110-206)****Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*****M, H (60-13-19)**

Espèce notée uniquement en automne et en hiver, 7 ind. sont observés le 16/10/11 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Des groupes de 5 ind. ont également été vus le 28/10/11 à l'étang de Beaufour (RanN) et le 12/12/11 à Saint-Léomer (VenJ).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava***E, M (440-95-338)**

Dernier oiseau observé en 2011 le 23/10 à Château-Larcher (JomL). Premier en 2012 le 14/03 à Sillars (AnoN). À noter un groupe d'environ 60 ind. le 11/09/11 à l'étang de la Pétolée (BusR).

Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flava flavissima***M (9-8-9)**

La première observation de cette sous-espèce intervient le 7/04/12 avec 1 ind. à Saint-Cyr (BusR), et la dernière le 17/05/12 avec 1 ind. à Craon (FaiC). Des oiseaux sont observés également sur les communes de Jazeneuil (TheP), Usson-du-Poitou (BusR), Chaunay (LegA), Civaux, Saulgé (FaiC) et Valdivienne (WIT). La donnée de Saulgé le 29/04/12 (FaiC) est remarquable avec au minimum 3 mâles et 2 femelles.

Bergeronnette printanière d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla***M (1-1-1)**

Une seule observation de cette sous-espèce le 29/04/12 à Saulgé (FaiC).

Bergeronnette printanière scandinave *Motacilla flava thunbergi***M (4-3-3)**

6 ind. ont été vus en 2012 : un mâle les 27 et 28/04 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (MugX, TiJ et FaiC), 4 ind. le 29/04 à Saulgé (FaiC) et 1 ind. à l'étang de la Pétolée le 1/05 (TiJ et FaiC).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava x iberiae* M (2-2-2)

Trois hybrides ont été vus en Vienne : 1 ind. le 28/04/12 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC) et 2 ind. le 29/04/12 à Saulgé (FaiC).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* S (255-70-132)**Bergeronnette grise *Motacilla alba* S, H (808-147-422)**

À noter des effectifs remarquables : plus de 186 ind. à Raslay le 29/09/11 (BasL), 200 ind. à Lusignan le 12/10/11 (BouV), 300 ind. à Poitiers le 13/12/11 (DubT) ou encore 200 ind. à Châtelleraut le 25/01/12 (BoiA).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* M, H (10-8-9)

Sous-espèce observée durant les migrations et en hiver parmi les Bergeronnettes grises, souvent à l'unité. Les observations s'étalent du 11/01/12 avec 1 ind. à Rouillé (BouV) au 4/04/12 avec un couple à Archigny (DubT).

CINCLIDÉS**Cincla plongeur *Cinclus cinclus* S (1-1-1)**

Un ind. est observé en vol sur la Gartempe, près des Portes d'Enfer le 26/02/12 à Lathus-Saint-Rémy (VanD). Un couple a niché dans le même secteur à la limite du département mais coté Haute-Vienne (CouJ). Cette donnée n'a pas été retenue dans le total ci-dessus.

TROGLODYTIDÉS**Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* S (737-145-447)****PRUNELLIDÉS****Accenteur mouchet *Prunella modularis* S (625-121-327)**

Nourrissage d'un jeune coucou par un Accenteur mouchet du 21/07 au 30/07/12 à Saint-Benoît (LacJJ et CouBM).

Accenteur alpin *Prunella collaris* A (66-7-11)

L'hiver 2011-2012 restera dans les annales pour cette première observation de l'oiseau dans le département et pour l'ampleur de l'afflux. Les 2 premiers ind. sont vus le 8/11/11 sur l'église Sainte-Radegonde à Poitiers (HoIE). La dernière observation a lieu à Château-Larcher le 30/03/12 avec également 2 ind. (BusR). Entre ces deux dates, l'espèce

sera vue sur 7 communes : Angles-sur-l'Anglin, Château-Larcher, Chauvigny, Loudun, Poitiers, Saint-Genest-d'Ambière et Saint-Pierre-de-Maillé. Au maximum, 6 oiseaux ont été observés simultanément sur l'église Sainte-Radegonde à Poitiers le 17/12/11 (BusR). Lire la note consacrée à cette espèce dans le présent numéro de L'Outarde.

TURDIDÉS**Rougegorge familier *Erithacus rubecula* S, H (1007-168-586)****Rosignol philomèle *Luscinia megarhynchos* E (620-110-348)****Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* M (42-5-8)**

Les dernières données de 2011 concernent 1 femelle immature le 28/08 à l'étang de Beaufour (BusR) et 1 ind. de type femelle le 16/09 à Pressac (SmiM). Le retour printanier est noté le 15/03/12 avec 1 mâle à Pressac, le 18/03/12 avec 1 femelle toujours à Pressac (SmiM) et le 8/04/12 avec 1 mâle à Rouillé (RenG). Au moins 3 mâles et 1 femelle sont vus le 14/04/12 à Cherves (WilT et al). L'espèce a été observée sur cinq communes : Cherves, Pressac, Saint-Sauvant, Saulgé et Rouillé. La nidification est probable à Rouillé et possible à Cherves et Saint-Sauvant.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* E, S (695-137-338)

Durant l'hiver, l'espèce est observée dans tout le département. Les données de décembre, janvier et février représentent 13% du total.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* E, M (234-57-134)

Dernière observation en 2011 le 8/10 avec 1 mâle à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Première observation en 2012 avec 1 mâle le 26/03 à Poitiers (BusR).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* M (49-29-38)

Les derniers passages postnuptiaux sont notés le 26/09/11 avec 5 ind. à Pressac (SmiM) et le 1/10/11 avec 1 ind. aux Ormes (BoiA). À noter cet ind. hivernant à Vicq-sur-Gartempe le 28/12/11 (OuvR). Le passage pré-nuptial s'étale du 26/04/12 avec 1 ind. à Vendevre-du-Poitou (LerA) au 28/05/12 avec 1 ind. à Pressac (SmiM).

Tarier pâtre *Saxicola torquatus* S (681-124-402)

L'espèce est notée très régulièrement toute l'année. Cependant, elle a fui, dans le meilleur des cas, le

département en février 2012 lors de la vague de froid qui a touché la France du 2/02 au 13/02. Voici les observations de février : 2 ind. le 1/02 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (MugX), 1 ind. le 2/02 à Coussay-les-Bois (DesCJ) et 1 ind. le 3/02 à Rouillé (VasM). La première donnée, après cet épisode de froid, est notée le 2/03 à Ingrandes avec 2 ind. (BoiA), et les observations sont de nouveau régulières à partir de cette date.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* E, M (184-64-150)

Les données postnuptiales s'étalent jusqu'au 8/10/11 avec 2 ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Les effectifs sont parfois importants avec, par exemple, plus de 16 ind. à Saint-Clair le 1/10/11 (BusR). Au printemps, les premiers oiseaux sont observés à partir du 10/03/12 à Château-Larcher avec 1 mâle (JomL). Le passage migratoire pré-nuptial, où les données sont les plus nombreuses, couvre le mois d'avril et la première décennie de mai.

Merle à plastron *Turdus torquatus* M (9-6-9)

Une donnée postnuptiale avec 1 ind. le 23/10/11 à Château-Larcher (JomL). Toutes les autres observations ont lieu durant la première quinzaine d'avril 2012.

Merle noir *Turdus merula* S (1435-180-785)

Grive litorne *Turdus pilaris* M, H (99-59-90)

Grive musicienne *Turdus philomelos* S (451-117-318)

Grive mauvis *Turdus iliacus* M, H (140-60-117)

Grive draine *Turdus viscivorus* S, H (450-121-333)

SYLVIIDÉS

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* S (55-19-28)

Notée tous les mois de l'année ; la majorité des contacts sont uniquement auditifs. Le cas de deux oiseaux chantant simultanément est signalé plusieurs fois. Les milieux touffus qu'elle occupe et sa vie cachée n'ont permis d'obtenir que des indices de nidification probable, à savoir le repérage de territoires occupés, à Moncontour (ArmA), Montreuil-Bonnin (BerJ), Poitiers (BerJ) et Vouneuil-sous-Biard (CouBM). L'espèce a été contactée dans 19 communes.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* S (2-2-2)

Seulement 2 observations de cette espèce : 2 ind. le 3/09/11 à Saint-Jean-de-Sauves (PoiC) et 1 ind. le 17/09/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR).

Locustelle tachetée *Locustella naevia* E (44-13-25)

La majorité des contacts est faite en avril et mai. Le premier oiseau est repéré le 3/04/12 à Saulgé (AnoN). L'espèce a été notée dans 13 communes, au plus 3 ind. ont été repérés simultanément. La donnée la plus tardive est celle de 2 ind. le 26/07/12 à Saint-Cyr (PoiC). Aucune preuve de nidification n'a été relevée en 2012.

Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides* M (1-1-1)

C'est le chant qui a permis de repérer, en début de soirée, 1 ind. le 13/10/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* M, E (27-4-7)

Le dernier contact en migration postnuptiale est 1 ind. de première année le 17/09/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR). Il faut attendre mars pour revoir l'espèce, avec 1 ind. chanteur le 18/03/12 toujours à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR), mais la plupart des contacts sont en avril et mai. Quelques petits groupes sont vus, dont une concentration remarquable de 10 ind. le 3/05/12 à l'étang de Beaufour (AnoN).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* M, E (96-24-33)

Le dernier oiseau à ne pas encore être parti vers ses quartiers d'hiver est vu le 30/09/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP). Les premiers sont de retour très tôt, le 3/04/12, à l'étang du Léché (AnoN). L'espèce a été contactée dans 24 communes. Les effectifs les plus importants sont de 15 ind. le 13/05/12 au Grand Étang de la Puye (OuvR) et de 36 ind. le 14/06/12 à l'étang de Beaufour (BasL). La nidification est certaine sur 3 sites : au Grand Étang de la Puye où un oiseau transporte de la nourriture le 18/05/12 (OuvR), à l'étang de Beaufour où des jeunes sont observés le 14/06/12 (BasL) et à la Roseraie de Poitiers le 8/07/12, là aussi un transport de nourriture (LecF).

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* E (312-87-228)

Fauvette pitchou *Sylvia undata* S (25-7-13)

Peu de mentions en dehors de la période de reproduction. L'espèce a été notée dans 7 communes. Des critères de nidification probable sont relevés le 7/04/12 (GilD) et le 7/05/12 (CouBM) sur la réserve naturelle du Pinail, le 17/05/12 à La Chapelle-Moulière (AugA) et le 19/06/12 à Saint-Léomer (VenJ).

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* M (1-1-1)

1 ind. est observé le 10/09/11 à Château-Larcher en compagnie d'une Fauvette des jardins (JomL).

Fauvette grisette *Sylvia communis*
E (589-100-368)

Fauvette des jardins *Sylvia borin*
E (123-43-100)

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*
S (1192-145-596)

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*
M (5-1-1)

1 ind est présent du 8/02/12 au 12/02/12 à Poitiers (WilT et al). Repéré à ses cris, l'oiseau a été observé la plupart du temps dans un épicéa, parfois en compagnie d'un Roitelet à triple bandeau.

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*
E (146-32-99)

Le dernier oiseau automnal est entendu chanter le 1/10/11 à Bonnes (OuvR), une date vraiment tardive. L'espèce est de retour en début de printemps : premier chanteur le 26/03/12 à Quinçay (TraB). Jusqu'à 6 ind. sont entendus chanter le 14/04/12 à Liniers (CouBM). Une construction de nid est notée le 4/05/12 à Vouillé (DupJ) ainsi que le 5/05/12 à La Chapelle-Moulière (CouBM) où un ind. utilise des débris de feuilles mortes pour la construction au sol. La reproduction est certaine le 27/06/12 à Béruges (VenJ) avec l'observation d'une famille, le 11/07/12 à Saulgé (BasL) et le 3/08/12 à Saint-Benoît (BouAC), avec dans ces deux cas un transport de nourriture.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*
E (39-14-29)

Le premier oiseau de l'année 2012 est repéré grâce à ses cris le 22/04/12 à Smarves (RoyD), et les premiers chants sont entendus le 26/04/12 à Vouillé (CouBM). L'espèce est notée dans quatorze communes et la nidification a été jugée probable dans deux d'entre elles : le 22/05/12 à Ligugé sur deux sites distincts (WilT) et le 27/06/12 à Quinçay (CouBM).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*
S (917-127-498)

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*
M (75-36-62)

Les oiseaux sont contactés de façon continue en août et septembre, au passage de migration postnuptiale. Le dernier est noté le 9/10/11 à Château-Larcher (JomL). L'espèce est de retour avec le printemps ; les premiers chants sont entendus le 23/03/12 à Fleuré (FleB). Le passage migratoire est à son maximum en avril, mois qui a fourni le plus de mentions. Jusqu'à 8 ind. chanteurs sont entendus le 7/04/12 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR). L'espèce est moins

souvent notée à partir de juin. Aucun indice de nidification n'a été relevé.

Roitelet huppé *Regulus regulus* S (42-29-37)

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla*
S (335-92-239)

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris *Muscicapa striata*
E (67-34-53)

Les données postnuptiales sont régulières pour s'interrompre brutalement le 30/09/11 avec 1 ind. à Poitiers (LecF). Les premiers oiseaux pré-nuptiaux sont observés à partir du 16/04/12 avec 1 ind. à Ligugé (GodG). Deux cas de nidification certaine avec nourrissage de jeunes ont été notés le 27/07/12 à Vouillé et le 12/08/12 à Bonneuil-Matours (VenJ).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*
M (46-16-30)

En 2011, nombreuses observations lors du passage postnuptial jusqu'au 28/09 avec 2 ind. à Poitiers (LecF). Deux observations pour le passage pré-nuptial avec 1 femelle le 8/04/12 à Château-Larcher (JomL) et 1 mâle le 3/05/12 à Saulgé (AnoN). Les passages postnuptiaux débutent le 7/08/12 avec 1 ind. à Saint-Benoît (JomL), ou encore 2 ind. à Châtelerault (BoiA) et 1 femelle à Saint-Benoît (BouAC) le 13/08/12.

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*
S (519-117-341)

Un maximum de 55 ind. observé le 9/06/12 à Montamisé (GueT), 9 autres observations avec 20 ind. ou plus.

PARIDÉS

Mésange nonnette *Poecile palustris*
S (255-63-148)

Observations de 10 oiseaux simultanément le 23/03/12 à Lhonnaizé (MetG) et le 12/05/12 à Vouillé (CodG).

Mésange huppée *Lophophanes cristatus*
S (71-29-52)

L'espèce est notée toute l'année. Les effectifs les plus importants sont de 7 ind. le 29/09/11 à Morton, le 30/09/11 aux Trois-Moutiers (BasL) et de 8 ind. le 4/12/11 à Celle-Lévescault (JomL). Pas de preuve de

nidification certaine. À noter une offrande de nourriture entre partenaires le 14/04/12 à Vouneuil-sur-Vienne (TiJ).

Mésange noire *Periparus ater* H, S (9-7-7)
Seules des observations hivernales sont notées : 9 données s'étalant du 21/11/11 avec 2 ind. à Jazeneuil (TheP) au 10/02/12 avec 1 ind. à Marnay.

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* S (1293-174-676)

Mésange charbonnière *Parus major* S (1396-178-731)

Observation d'une mésange au plumage atypique : flancs blancs le 12/02/12 à Archigny (OuvR). Une mésange attaque des cocons de chenilles processionnaires du pin le 27/12/11 à Fontaine-le-Comte (FilB).

SITTIDÉS

Sittelle torchepot *Sitta europaea* S (523-115-321)

TICHODROMIDÉS

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* H (36-1-2)

Présent sur son site d'hivernage habituel sur la cathédrale Saint-Pierre et l'église Sainte-Radegonde à Poitiers, l'oiseau est repéré le 9/11/11 (BusR) et restera jusqu'au 25/02/12 (BouAC). L'évolution de son plumage permettra d'identifier un mâle. D'autres sites où l'espèce avait été déjà observée en hivernage ont fait l'objet de visites sans succès.

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* S (526-109-331)

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* M (11-4-4)
Espèce rare observée en migration. Première observation de 4 oiseaux le 5/10/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (ThéP et TiJ), puis la migration post-nuptiale se termine avec 1 ind. le 6/12/11 au même endroit (TiJ). Au printemps, la première observation est notée le 18/03/12 à Châtellerault avec 2 ind. (TiJ), et la dernière concerne un ind. le 7/04/12 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR). La plupart des oiseaux sont vus se nourrissant dans des massettes.

ORIIDÉS

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* E (460-122-354)

La dernière donnée pour la saison de reproduction 2011 est rapportée avec 1 ind. le 24/08/11 à Nouaillé-Maupertuis (DeLL). Le premier migrateur est noté le 7/04/12 à Jazeneuil (PréO). Un jeune non volant s'aventure imprudemment sur une route le 16/06/12 à Moussac (GiLD).

LANIIDÉS

Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* A (2-1-1)

Découverte d'une femelle le 24/07/12 près de l'étang de Beaufour à Saulgé (BouAC). Elle sera identifiée grâce aux photographies le 16/08 (TiJ). Première mention en Vienne et 16e mention en France, elle a attiré de nombreux ornithologues jusqu'au 10/09/12, date de la dernière observation. Lire la note consacrée à cette espèce dans le présent numéro de L'Outarde.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* E (336-70-210)

Dernière observation en 2011 le 11/09 avec 1 immature à Pressac (SmiM). En 2012, les premiers oiseaux sont notés le 1/05 avec 1 femelle à Saulgé (FaiC et TiJ) et 2 mâles à Adriers (GiLD). Nidification certaine sur 12 communes : Béruges (MetA), Béthines (CouBM), Bourg-Archambault (MorN), Coussay (PoiC), Iteuil (FaiC), Marçay (WiIT), Millac (NedS), Montmorillon (VenJ et MorN), Moulismes (BasL), Saint-Julien-l'Ars (CouBM), Sillars (PoiC), Valdivienne (BoiA).



Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* E (23-13-20)

En 2011, pas de données à signaler sur la période étudiée. En 2012, l'espèce est notée à partir du 1/05 avec 1 femelle à Saulgé et 1 mâle à Saint-Maurice-la-

Clouère (FaiC et TilJ) jusqu'au 8/08 avec 2 ind. à Lathus-Saint-Rémy (MorN). Les observations proviennent toutes de la moitié sud du département, et majoritairement du sud-est. La nidification est certaine sur Bourg-Archambault et Lathus-Saint-Rémy (MorN).

CORVIDÉS

Geai des chênes *Garrulus glandarius* S (704-146-515)

Un ind. attaqué par un Épervier d'Europe le 12/01/12 à Savigné (DucA).

Pie bavarde *Pica pica* S (909-158-524)

Rassemblement ou dortoir sur le campus universitaire de Poitiers avec plus de 105 ind. le 4/01/12 (OuvR).

Choucas des tours *Corvus monedula* S (303-90-164)

Trois couples nichent en falaise naturelle le 31/03/12 à Quincay (AleJ).

Corbeau freux *Corvus frugilegus* S (334-103-250)

Corneille noire *Corvus corone* S (1125-179-720)

Couple pourchassant un écureuil qui rôdait un peu trop près de leur nid le 28/05/12 à Coussay-les-Bois (DesCJ).

Grand corbeau *Corvus corax* E (1-1-1)

Après la présence d'un couple pendant la période 2010/2011, une seule observation a été faite en 2011/2012, le 24/12/11 à Saint-Martin-l'Ars (BusR).

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* H, S (995-174-606)

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique *Passer domesticus* S (888-167-493)

Moineau friquet *Passer montanus* S (72-25-40)
Seulement 6 indices de reproduction relevés, dont 2 preuves certaines sur la commune d'Avanton : 5 ad. avec 2 juv. le 16/06/12 (FaiC) et 1 ad. nourrissant 1 juv. le 10/08/12 (BusR). Le territoire de Grand Poitiers fournit la moitié des données.

Moineau soulcie *Petronia petronia* S (1-1-1) 1 ind. chanteur le 6/05/12 à Loudun (AnoN).

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* S (1783-192-909)

Maxima observés : 390 ind. en migration le 23/10/11 à Château-Larcher (JomL) et 600 ind. hivernant le 31/12/11 à Iteuil (JomL).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* H (43-17-26)

Premier migrateur noté le 9/10/12 à Château-Larcher (JomL) et dernier le 9/03/12 à Saint-Benoît (BouAC). Plus de la moitié des données sont issues d'observations à la mangeoire. Pas de grand groupe d'hivernants noté : maxima de 10 ind. le 31/12/11 à Iteuil (JomL) et 10 ind. le 28/01/12 à Saint-Benoît (BouAC).

Serin cini *Serinus serinus* E, H (196-58-127)

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* S (777-139-413)

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* S (826-160-449)

Maximum de 250 ind. le 18/03/12 à Vouneuil-sur-Vienne dans un champ de tournesol non récolté (TilJ).

Tarins des aulnes *Carduelis spinus* M, H (79-36-54)

Premiers migrants notés le 8/10/11 à Château-Larcher (JomL) et derniers le 20/03/12 à Lussac-les-Châteaux (VenJ) et à Vouillé (KaeM). Maxima observés : 50 ind. le 5/02/12 à Saint-Benoît (FaiC) et 50 ind. le 14/02/12 à Châtelleraut (MinN).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* S (653-135-454)

Maxima observés : 200 ind. notés le 8/01/12 à Craon (PoiC) et 200 ind. le 11/01/12 à Rouillé (BouV).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* H (2-2-2)


Deux ind. le 4/08/12 en forêt de Moulière à Bonneuil-Matours (PlaP). Au moins 1 ind. le 7/08/12 à Poitiers (JomL).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* S (48-29-35)

Noté comme nicheur possible sur les communes d'Antran, Ayron, Béruges, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Quincay, Rouillé, Saint-Léomer, Usseau, Vellèches et Vouillé.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* S (232-72-143)

Majorité des données fournies en période hivernale et début de printemps. Deux preuves de reproduction certaine : un couple construisant un nid le 18/03/12 à Saulgé (PlaP) et 1 ad. avec 5 juv. le 27/07/12 toujours à Saulgé (BasL)



EMBÉRIZIDÉS

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

S (422-96-250)

Maxima observés : 30 ind. le 1/12/11 à Pressac (SmiM), 40 ind. le 26/12/11 à Moncontour (VenJ) et au moins 30 ind. le 12/02/12 à Bonnes (OuvR).

Bruant zizi *Emberiza cirrus* S (552-137-359)

Maxima observés : 60 ind. le 1/12/11 à Vendevre-du-Poitou (AleJ) et 50 ind. les 7/02/12 et 22/02/12 à Pressac (SmiM).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

M, E (88-29-73)

Dernier migrateur le 10/09/11 à Château-Larcher (JomL) et premiers retours notés le 3/05/12 avec 2 ind. à Cissé (BouL), 1 chanteur à La Grimaudière (JolP) et 2 chanteurs à Maillé (PoiC). Indices de reproduc-

	Possible	Probable	Certaine
Aigle botté	x		
Aigrette garzette			x
Autour des palombes		x	
Bécasse des bois	x		
Bihoreau gris	x		
Bondrée apivore			x
Busard cendré			x
Busard des roseaux			x
Busard Saint-Martin			x
Buse variable			x
Caille des blés		x	
Canard chipeau			x
Canard colvert			x
Canard siffleur	x		
Canard souchet	x		
Chevalier guignette	x		
Chevêche d'Athéna			x
Chouette hulotte			x
Cigogne noire	x		
Circaète Jean-le-blanc			x
Coucou gris			x
Courlis cendré		x	
Cygne tuberculé			x
Effraie des clochers			x
Engoulevent d'Europe		x	
Epervier d'Europe			x
Faisan de Colchide			x
Faisan vénéré		x	
Faucon crécerelle			x
Faucon hobereau			x
Faucon pèlerin			x
Foulque macroule			x
Fuligule milouin			x
Fuligule morillon			x
Gallinule poule-d'eau			x
Grand Cormoran	x		

	Possible	Probable	Certaine
Grèbe castagneux			x
Grèbe huppé			x
Guêpier d'Europe			x
Héron cendré			x
Héron pourpré			x
Hibou des marais			x
Hibou moyen-duc			x
Huppe fasciée			x
Martinet noir			x
Martin-pêcheur d'Europe			x
Milan noir			x
Mouette rieuse	x		
Nette rousse		x	
Œdicnème criard			x
Ouette d'Egypte			x
Outarde canepetière			x
Perdrix grise			x
Perdrix rouge			x
Petit Gravelot			x
Petit-duc scops			x
Pic cendré	x		
Pic épeiche			x
Pic épeichette			x
Pic mar			x
Pic noir			x
Pic vert			x
Pigeon colombin		x	
Pigeon ramier			x
Râle d'eau		x	
Sarcelle d'été		x	
Sarcelle d'hiver		x	
Sterne pierregarin		x	
Torcol fourmilier		x	
Tourterelle des bois			x
Tourterelle turque			x
Vanneau huppé			x

Tableau 1 : Nidification des non-passereaux notée sur la période 15/08/11-14/08/12

tion possible ou probable collectés sur 26 communes du Neuvilleois, Mirebalais et Loudunais et à Saint-Sauvant. Aucune preuve de reproduction certaine.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*
S, H (189-69-112)

Premier migrateur noté le 1/10/11 à Cherves (DubT). Maximum de 250 ind. le 12/02/12 à Bonnes (OuvR). Deux données de reproduction possible : 1 ind. le 3/05/12 à l'étang de Beaufour (DemE) et 3 ind. le 29/06/12 sur l'étang de Beaugard (GodG et VauM). Les autres observations en période " théorique " de reproduction et sans suite concernent des hivernants attardés.

Bruant proyer *Emberiza calandra*
S (517-75-265)

Maxima observés : 150 ind. le 31/08/11 à Champigny-le-Sec (BusR et GraC) et 130 ind. le 3/09/11 à Saint-Jean-de-Sauves (BusR et TilJ).



	Possible	Probable	Certaine
Accenteur mouchet			x
Alouette des champs			x
Alouette lulu		x	
Bergeronnette ruisseaux			x
Bergeronnette grise			x
Bergeronnette printanière			x
Bouscarle de Cetti		x	
Bouvreuil pivoine		x	
Bruant des roseaux	x		
Bruant jaune			x
Bruant ortolan		x	
Bruant proyer			x
Bruant zizi			x
Chardonneret élégant			x
Choucas des tours			x
Cincle plongeur	x		
Cochevis huppé			x
Corbeau freux			x
Corneille noire			x
Étourneau sansonnet			x
Fauvette à tête noire			x
Fauvette des jardins			x
Fauvette grisette			x
Fauvette pitchou		x	
Geai des chênes			x
Gobemouche gris			x
Gorgebleue à miroir		x	
Grimpereau des jardins			x
Grive draine			x
Grive musicienne			x
Grosbec casse-noyaux			x
Hirondelle de fenêtre			x
Hirondelle de rivage			x
Hirondelle rustique			x
Hypolaïs polyglotte			x
Linotte mélodieuse			x

	Possible	Probable	Certaine
Locustelle tachetée		x	
Loriot d'Europe			x
Merle noir			x
Mésange à longue queue			x
Mésange bleue			x
Mésange charbonnière			x
Mésange huppée		x	
Mésange nonnette			x
Moineau domestique			x
Moineau friquet			x
Moineau soulcie	x		
Phragmite des joncs		x	
Pie bavarde			x
Pie-grièche à tête rousse			x
Pie-grièche écorcheur			x
Pinson des arbres			x
Pipit des arbres			x
Pipit farlouse		x	
Pipit rousseline		x	
Pouillot de Bonelli			x
Pouillot fitis	x		
Pouillot siffleur		x	
Pouillot véloce			x
Roitelet à triple bandeau			x
Roitelet huppé		x	
Rosignol philomèle			x
Rougegorge familier			x
Rougequeue à front blanc			x
Rougequeue noir			x
Rousserolle effarvate			x
Serin cini			x
Sittelle torchepot			x
Tarier pâte			x
Traquet motteux			x
Troglodyte mignon			x
Verdier d'Europe			x

Tableau 2 : Nidification des passereaux notée sur la période 15/08/11-14/08/12

	Août		Sept.			Octobre			Nov.			Déc.			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Balbusard pêcheur																																					
Bécassine des marais																																					
Bihoreau gris																																					
Bondrée apivore																																					
Busard cendré																																					
Caille des blés																																					
Canard pilet																																					
Canard siffleur																																					
Chevalier aboyeur																																					
Chevalier gambette																																					
Chevalier guignette																																					
Cigogne blanche																																					
Cigogne noire																																					
Circaète Jean-le-blanc																																					
Coucou gris																																					
Engoulevent d'Europe																																					
Faucon émerillon																																					
Faucon hobereau																																					

Tableau 3 : Présence des non-passereaux migrants ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction
Période 15/08/11-14/08/12

	Août		Sept.			Octobre			Nov.			Déc.			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août		
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Grue cendrée																																						
Guépier d'Europe																																						
Guifette moustac																																						
Guifette noire																																						
Héron pourpré																																						
Huppe fasciée																																						
Martinot noir																																						
Milan noir																																						
Milan royal																																						
Édicnème criard																																						
Oie cendrée																																						
Outarde canepetière																																						
Petit Gravelot																																						
Pluvier doré																																						
Sarcelle d'été																																						
Sterne pierregarin																																						
Torcol fourmilier																																						
Tourterelle des bois																																						

Tableau 4 : Présence des non-passereaux migrants ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction
(suite) - Période 15/08/11-14/08/12

	Août		Septembre				Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Bergeronnette printanière																																						
Bruant ortolan																																						
Fauvette des jardins																																						
Fauvette grisette																																						
Gobemouche gris																																						
Gobemouche noir																																						
Gorgebleue à miroir																																						
Grive litorne																																						
Grive mauvis																																						
Hirondelle de fenêtre																																						
Hirondelle de rivage																																						
Hirondelle rustique																																						
Hypolaïs polyglotte																																						
Locustelle tachetée																																						
Loriot d'Europe																																						
Merle à plastron																																						
Phragmite des joncs																																						

Tableau 5 : Présence des passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction Période 15/08/11-14/08/12

	Août		Septembre				Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Pic-grièche à tête rousse																																						
Pic-grièche écorcheur																																						
Pinson du Nord																																						
Pipit des arbres																																						
Pipit rousseline																																						
Pipit spioncelle																																						
Pouillot de Bonelli																																						
Pouillot fitis																																						
Pouillot siffleur																																						
Rémiz penduline																																						
Rossignol philomèle																																						
Rougequeue à front blanc																																						
Rousserolle effarvate																																						
Tarier des prés																																						
Tarin des aulnes																																						
Tichodrome échelette																																						
Traquet motteux																																						

Tableau 6 : Présence des passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction (suite) - Période 15/08/11-14/08/12