


On recherche Loir, Lérot et Muscardin : point d'étape....

Afin de faire un état des lieux des connaissances concernant ces trois petits rongeurs sur notre département, un appel à contribution a été lancé à l'automne 2011. Il s'agissait de récolter et centraliser les observations récentes de ces espèces mal connues de la faune angevine, avant de se lancer dans la recherche plus fine sur notre département. Les premiers résultats de cette remontée de donnée via la base de données en ligne « Faune Anjou » <http://www.faune-anjou.org/> et différents contributeurs sont particulièrement encourageants. En effet, les trois espèces sont désormais formellement identifiées localement, et la répartition du Lérot, la plus commune de toutes, est bien mieux connue. Le réveil printanier ainsi que l'activité estivale et automnale de ces gliridés seront l'occasion de nouveaux retours d'observation ou de recherches ciblées attentives. Premiers résultats.


LEROT *Eliomys quercinus*




La répartition angevine du Lérot est désormais mieux connue grâce aux différents témoignages issu d'observations antérieures récoltés en 4 mois (extrait de www.faune-anjou.org, données 2003 au 01/04/2012).

← LEROT – Novembre 2011

→ LEROT – 1^{er} Avril 2012



Résultats : Au total, ce sont 85 données qui ont pu être récoltées, à comparer aux 19 initialement agglomérées. La plupart des citations (57) sont issues de la dernière décennie. Sur ce pas de temps, 32 mailles sont donc couvertes, soit le tiers du département et environ le triple des mailles déjà répertoriées auparavant. Aucune phénologie saisonnière ne semble réellement se dégager (voir histogramme ci-contre), même si l'activité de la belle saison est certainement un facteur déterminant dans sa détectabilité.



Perspectives : Les témoignages restent la meilleure source de données : observations visuelles, productions sonores, cadavres ou nuisances diverses.... Le Lérot est assez bien connu, même s'il est souvent appelé à tort « Loir ». Le recueil de toutes ces informations permettra de compléter la carte. En parallèle, le questionnement des dératiseurs serait certainement une source d'information précieuse. Enfin, les analyses de pelotes de rejection à une échelle suffisante donneront des informations complémentaires sur leur répartition.

LOIR *Glis glis*


Résultats : Deux données ont été récoltées. Ces deux citations datent un peu (années 90), l'une concernant le massif forestier de Chandelais (Nord-Est du département), l'autre étant en cours de précision.

Perspectives : La pose de gîte artificiel sur les sites où l'espèce était répertoriée (Chandelais notamment) permettraient de préciser son maintien actuel. De même, une recherche en zone boisée ou par témoignage (habitants, dératiseurs...) à proximité des données limitrophes de Mayenne semble judicieuse.

MUSCARDIN *Muscardinus avellaniarius*

Résultats : L'espèce a été découverte à l'automne 2011 dans le prolongement des stations connues de Loire-Atlantique. Cette donnée est la seule fiable contemporaine, basée sur la découverte de deux noisettes rongées de façon typique en lisière de forêt.

Perspectives : Là aussi, l'installation de nichoirs artificiels en lisières forestières apporterait certainement des précisions quant au statut de cette espèce. De même, la recherche de noisettes en fin d'été/automne est à promouvoir. Tous les secteurs angevins sont à prospecter, même si le segréen, et secondairement le baugeois, sont prioritaires.



Benjamin Mème-Lafond benjicristatus@yahoo.fr

MUSCARDIN – 1^{er} Avril 2012
(extrait de www.faune-anjou.org, données 2003 au 01/04/2012).

TC