



Poussin de Râle des genêts - É. Beslot

Synthèse trimestrielle

www.faune-anjou.org

Sélection des faits marquants ornithologiques
en Maine-et-Loire durant le 3^e trimestre 2011
- Juillet-Août-Septembre -

É. Beslot, S. Courant, A. Fossé, M. Bellion, B. Marchadour,
avec la collaboration de J.-Cl. Beaudoin.

Préambule

Durant la période considérée, 175 personnes nous ont fait part de leurs observations, permettant ainsi la collecte de 20 160 données (saisies dans Faune-Anjou) portant sur 204 espèces.

On note quelques espèces peu fréquentes en Maine-et-Loire : l'Élanion blanc fait sa troisième apparition en Anjou ; deux mentions sont répertoriées pour le Chevalier stagnatile, il s'agit des troisième et quatrième données postnuptiales depuis 1968. Les Sternidés rares ne sont pas en reste : au moins 9 Sternes caspiennes sont notées entre fin août et mi-septembre ; une Sterne arctique et une Guifette leucoptère ont également été observées. Chez les fauvelles paludicoles, les opérations de baguage réalisées dans la roselière de la LPO à Soulaire-et-Bourg, ont une nouvelle fois apporté leur lot de raretés : 2 Locustelles luscinioides, 1 Rousserolle verderolle et **24 Phragmites aquatiques** ont été bagués !

L'année 2011 faisait l'objet d'une seconde enquête sur les espèces allochtones - la première ayant eu lieu en 2006 (Fossé 2006, Dubois 2007) - les espèces à surveiller dans ce cadre figurent en violet par la suite. Le bilan à l'échelle nationale est paru dans le numéro 19 (4) de la revue *Ornithos* (Dubois 2012).

Abréviations & sigles utilisés

BVA : Basses Vallées Angevines.

C. : couple.

CET : Centre d'Enfouissement Technique

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.

Env. : environ.

Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale, (CHD49, http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20047).

Espèce** : espèce soumise à homologation nationale, (CHN, <http://www.chn-france.org/>).

Ind. : individu.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

Âges

Ad. : adulte.

Juv. : juvénile.

1 A, 2A... : première année civile...

N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.

Conditions météorologiques de la période

Juillet : le début de l'été est marqué par une série de perturbations de sud-ouest apportant des précipitations abondantes et réparties sur tout le mois, et provoquant une rapide montée des eaux de la Loire entre le 16 et le 22. Le voile nuageux accompagnant ces épisodes dépressionnaires successifs est à l'origine de températures moyennes sensiblement inférieures aux normales, et de quelques jours de vents forts (66 km/h à Martigné-Briand le 17). Seule la première semaine, sous l'influence d'un régime de nord-est, se révèle ensoleillée et chaude (jusqu'à 31,3 °C à Saumur le 4).

Août : les conditions météorologiques de juillet se poursuivent au cours du mois. Plusieurs perturbations océaniques poussées par des vents de sud-ouest modérés apportent des pluies orageuses en quantité, notamment sur la façade ouest du département. Les températures

maximales peu élevées pour la saison dépassent péniblement les 30 °C le 21, avant de chuter à nouveau en fin de mois.

Septembre : malgré des vents orientés au sud-ouest comme les mois précédents, cette fin d'été s'avère très sèche et surtout exceptionnellement chaude. Des pics de chaleur sont notamment enregistrés en fin de mois (31,6 °C le 29 à Beaulieu-sur-Layon) avec des températures maximales records dans la dernière décade. Les précipitations, concentrées essentiellement en milieu de mois, apparaissent inférieures de moitié aux normales saisonnières. Seules quelques rafales les 4 et 6 sont à signaler (jusqu'à 68 km/h à Cholet le 4).

Sources : Météo France, Banque Hydro

Faits marquants ornithologiques de la période

Anatidés

Cygne noir *Cygnus atratus* : toujours 1 ad. au lac de Maine (v. chronique précédente) ; noté à cinq reprises durant la période.

Oie cendrée *Anser anser* : 2 données au cours du mois d'août (4 ind. en vol le 18 à Cholet et 1 ind. le 25 aux Youis).

Bernache nonnette *Branta leucopsis** : toujours 1 ind. au Verdon (mentionné à 25 reprises).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* : 1 ind. en vol le 31.7 en Loire aval (Chalonnnes-sur-Loire).

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* : 5 à 6 ind. à Bré entre les 16 et 22.8.



Tadornes casarcas, Seiches-sur-le-Loir, 17.8.2011 – F. Rayet

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : quelques données durant la période se rapportant majoritairement aux nicheurs locaux. 13 ind. (1 ad. et 12 juv.) sont notés le 13.7 à La Bohalle : il

s'agit probablement d'une crèche (trois jours plus tôt 1 couple était observé avec 6 jeunes au même endroit).

Canard mandarin *Aix galericulata* : 1 probable femelle (confusion avec un Carolin ?) le 11.7 sur la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne.

Canard carolin *Aix sponsa* : 1 femelle notée les 1.7 et 6.8 sur la Sarthe à Écouflant ; 1 mâle le 13.9 aux Youis (v. chronique précédente).

Canard siffleur *Anas penelope* : retour des premiers dès le 31.8 avec 2 ind. au Verdon, 1 seul est revu les 1,2 et 4.9.

Canard chipeau *Anas strepera* : le passage postnuptial semble s'amorcer dès la fin de la première décade de juillet (5 ind. le 10.7 aux Bretonnières puis 12 le 13.7). 37 mentions sur 10 sites pour la période.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : 2 ind. sont présents dès le 8.7 à Bré, et 4 aux Bretonnières le 10.7, il faut ensuite attendre début août pour observer l'espèce sur d'autres sites (marais de Juigné, étang de Chartrené...).

Canard pilet *Anas acuta* : 3 ind. notés dès le 14.9 au Verdon (pas d'autre mention pour la période).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : derniers oiseaux signalés le 30.8 avec 2 ind. aux Monteaux et 1 à Bré.

Canard souchet *Anas clypeata* : contrairement à ce que nous annonçons dans la chronique précédente, les jeunes nés au lac de Maine (1 femelle avec 13 pulli le 16.5) sont revus le 4.7 sur le site (1 cane accompagnée de 5 jeunes de taille quasiment adulte). L'effectif le plus important au cours de la période est noté le 30.8 au Verdon avec 35 ind.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : outre les sites de reproduction cités dans la chronique précédente, des familles sont observées au Fourneau (1 femelle avec 3 pulli le 5.7 et une autre avec 9 pulli le 6.7). Deux lectures de selles nasales au cours de la période concernent des oiseaux marqués en France.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : la nichée de Bré compte toujours 4 poussins le 13.7 (5 poussins le 19.6 puis 4 le 24.6). Le site accueille pour la seconde année consécutive la reproduction de l'espèce.

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* : toujours des oiseaux au Fourneau (2 mâles et 1 femelle les 5 et 6.7) et retour d'oiseaux sur Chevigné (1-2 ind. entre le 19.8 et le 30.9).

Podicipédidés

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : 4 ind. (3 ad. et 1 poussin) le 6.7 au Fourneau (ce site n'avait encore jamais accueilli la reproduction de l'espèce contrairement à ce qui est mentionné dans la chronique précédente) ; encore 5 nids avec des oiseaux couvant (« pontes de remplacement suivant échec de 2^e ponte », F. Rayer) le 9.7 aux Bretonnières.

Phalacrocoracidés

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* : 50-60 couples reproducteurs sont envisagés au lac de Maine et une quinzaine au Fourneau. L'effectif départemental augmente de près de 56 %. Contrôles d'oiseaux bagués : 18 Français, 2 Belges, 2 Hollandais et un possible Suédois.

Ardéidés

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 5-6 c. au lac de Maine et **10-11 c.** sur la colonie découverte en 2011 aux Ponts-de-Cé (Beaudoin & Beslot, 2011). Des indices de reproduction intéressants sont notés sur la Dive : 1 ad. le 7.7 emportant un poisson après en avoir mangé un sur place, puis 2 ind. 1A le 1.8 sont observés sur le même site.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : deux sites accueillent la reproduction de l'espèce, on dénombre ainsi au moins **77 couples au lac de Maine** et 3 couples (installation tardive : envols à partir de fin juillet et encore un couveur – qui échouera – le 24.8) aux Ponts-de-Cé.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : cinq sites accueillent la reproduction de l'espèce. La colonie du lac de Maine qui comptait en 2010, 22-24 couples, voit ses effectifs diminuer à **18-19 couples**. Parallèlement, la colonie découverte en 2011 sur la commune des Ponts-de-Cé accueille **14-15 couples**.

Grande Aigrette *Casmerodius albus* : maximum de 30 ind. à Bré le 10.9. Les lectures de bagues concernent 22 oiseaux d'origine française.



Grandes Aigrettes, Seiches-sur-le-Loir, 10.9.2011 – J.-L. Ronné

Héron cendré *Ardea cinerea* : l'effectif recensé au lac de Maine ne cesse de diminuer depuis 2008 (faut-il y voir une relation avec l'installation des Grands Cormorans ?), **44 couples** sont notés en 2011 contre 55-60 en 2010.

Héron pourpré *Ardea purpurea* : seul un site (étang du NO Baugeois) apporte des preuves certaines de reproduction, au moins **4 nids occupés**.

Ciconiidés

Cigogne noire *Ciconia nigra* : passage postnuptial bien marqué, 36 mentions entre le 1.8 et 25.9.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : maximum de **36 ind.** le 14.9 à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Un individu bagué en Hollande les 3-4.8 à Fontevraud-l'Abbaye.

Threskiornithidés

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : l'espèce est principalement notée sur la Loire (9 mentions en Loire aval contre 1 seule en Loire amont). En dehors des sites ligériens on note : 2 ind. le 6.8 en vol à Soulaire-et-Bourg (BVA), 1 au Verdon le 23.8 et 1 les 25 et 29.8 dans la saulaie du lac de Maine.

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : les effectifs les plus importants concernent **21 ind.** se nourrissant sur la Loire à Saint-Georges-sur-Loire le 11.9 et **min. 24** en vol le 17.9 à Saint-Germain-sur-Moine.

Accipitridés

Bondrée apivore *Pernis apivorus* : deux cas de reproduction révélés par des transports de nourriture les 9.8 au Fület et le 10.8 à Vivy. Dernier oiseau contacté le 10.9.

Élanion blanc *Elanus caeruleus** : volant d'ouest en est le 16.8 à Soulaire-et-Bourg (CHD+). Il s'agit de la 3^e donnée homologuée pour le département après celles de l'épisode du 7.11.1999 au 27.5.2000 dans les Mauges (Halligon, 2003) et l'observation d'un individu le 28.12.2009 à Saint-Germain-sur-Moine (Beslot *et al.*, 2010).

Milan noir *Milvus migrans* : le 18.7 dernier signalement de l'envol d'un jeune d'une aire à Saint-Michel-et-Chanveaux. Après le 25.8 à Angers, l'espèce n'est plus revue.

Milan royal *Milvus milvus* : une mention le 25.9 au-dessus de l'île de Montsoreau.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : le suivi de la nidification, portant sur 4 couples, donne 3 c. produisant 1 jeune à l'envol. Parmi ces couples, il faut signaler la première reproduction réussie de celui ayant réoccupé depuis au moins 2005 un ancien site de nidification, connu dans les années 1960-1970.

Une trentaine de contacts sont rapportés pour la période. Une observation atypique par le comportement, avec un oiseau posté sur une botte de paille, et par la localisation géographique, au Pin-en-Mauges, est rapportée le 18.8. **Deux observateurs signalent l'espèce après la mi-septembre (CHD+) : les 17.9 à Longué et 25.9 à Beaulieu-sur-layon.**

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : trois jeunes nourris par une femelle le 3.8 à Épieds, les oiseaux sont rejoints par un jeune d'une autre nichée (provenance ?). Le repérage plus tôt en saison du couple d'Épieds a permis le marquage des poussins (bagueur : Thierry Printemps).

Busard cendré *Circus pygargus* : au moins trois individus mélaniques adultes observés au cours de la période. Dernier contact de l'espèce le 5.9 à Épieds.

Autour des palombes *Accipiter gentilis* : une aire est rechargée dans une forêt du sud du département le 12.7.

Aigle botté *Aquila pennata** : une mention de 2 individus de forme pâle posés sur des arbres morts à Cléré-sur-Layon le 29.8 (CHD ?).

Pandionidés

Balibuzard pêcheur *Pandion haliaetus* : « Béatrice », oiseau bagué en 2000 à **Strathdon (UK)** et équipé d'un émetteur en 2008, survole à nouveau l'Anjou le 19.8. Toute son histoire au lien suivant : <http://www.roydennis.org/animals/raptors/osprey/satellite-tracking/beatrice/>

Falconidés

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : trois observations d'oiseaux seuls en septembre, à savoir, le 8.9 à Drain, le 25.9 à Turquant cerclant avec deux Balibuzards pêcheurs, et le 26.9 au lac du Verdon.

Rallidés

Rôle des genêts *Crex crex* : les effectifs angevins semblent stables par rapport à ceux des deux dernières années, **235-250 mâles chanteurs** ont été recensés (230-246 en 2009 et 228-245 en 2010). La population angevine et plus particulièrement celle des BVA constitue le dernier bastion de l'espèce en France : en 2011, elle représente **env. 75 % de l'effectif national** (Beslot & Deceuninck, 2012). Dernière mention de l'espèce le 10.8 avec 1 ad. et un jeune de l'année capturés et bagués à Soulaire-et-Bourg : le jeune montre des rémiges primaires en fin de croissance et des fourreaux bien présents permettant d'envisager une éclosion sans doute dans la première décade de juillet.



*Jeunes Râles des genêts sauvés lors des fauche dans les BVA, juillet 2011 – É. Beslot
(à g. poussins de 15 jours ; à d. jeune âgé de 30-35 jours)*

Otididés

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : rassemblement postnuptial de 27 ind. à Montreuil-Bellay le 31.8 ; derniers individus observés (2 mâles) le 9.9 à Louresse-Rochemenier.

Haematopodidés

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* : 1 le 20.7 à Chalonnes-sur-Loire et 1 le 8.8 à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Recurvirostridés

Échasse blanche *Himantopus himantopus* : 2 du 9 au 20.7 à Lézigné, 2 le 6.8 à Chalonnes-sur-Loire, belle troupe de 9 en vol vers le sud le 24.8 à la Baumette.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : signalée du 11.7 au 20.9 (**maxi. de 76** le 15.8 au marais de Juigné et de 19 le 15.9 au lac du Verdon).

Burhinidés

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* : derniers poussins signalés le 30.8 (Mouliherne). Premier rassemblement dès le 26.7 avec 70 oiseaux à Montreuil-Bellay mais il faut attendre le 19.8 pour voir signalés des rassemblements réguliers (maxi à 120 le 11.9 et 100 le 20.9 à Épièdes, 110 le 14.9 près du lac du Verdon).

Charadriidés

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : derniers poussins signalés le 16.8 (Bré).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : passage habituel noté à partir du 23.7.

Scolopacidés

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 1 du 20 au 23.8 au lac du Verdon, 1 le 26.8 à Saint-Martin-de-la-Place.

Bécasseau sanderling *Calidris alba* : 1 du 25 au 27.8 à Lézigné et 1 du 3 au 9.9 au lac du Verdon.

Bécasseau minute *Calidris minuta* : noté à partir du 28.8 (maxi. de 4 le 6.9 aux Youis).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii** : 2 le 31.8 au lac du Verdon (CHD+).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : noté à partir du 12.7 (maxi. de 8 le 4.9 aux Youis).

Bécasseau variable *Calidris alpina* : noté à partir du 13.7 (maxi. de 15 le 28.9 à Turquant).

Combattant varié *Philomachus pugnax* : noté à partir du 5.7 (maxi. de 5 le 18.9 à Freigné et le 24.9 à Varennes-sur-Loire).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : réapparition le 28.7.

Barge à queue noire *Limosa limosa* : notée du 12.7 au 24.9.

Barge rousse *Limosa lapponica* : notée, par une ou deux, du 26.8 au 10.9.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* : probable **groupe de 60** en vol vers le sud-ouest le 7.8 à Cholet.

Courlis cendré *Numenius arquata* : noté du 9.7 au 28.9 (maxi. de 20 le 13.8 à Chalonnes-sur-Loire).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : hormis 1 le 29.7 aux Youis, noté à partir du 12.8.

Chevalier gambette *Tringa totanus* : maxi. de 30 le 12.7 à la Pointe.

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis** : 1 les 8-9.7 à Lézigné (CHD+), date postnuptiale la plus précoce, et 1 le 8.8 à Champtocé-sur-Loire (CHD+). **Seconde année consécutive avec des observations postnuptiales de cette espèce rare (3^e et 4^e données postnuptiales depuis 1968).**

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : noté à partir du 3.7 (groupe maxi. de 12 le 27.8 à Turquant).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* : groupe maxi de 28 le 4.8 (Bré).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* : noté à partir du 7.7 (maxi. de 6 le 12.7 aux Youis).

Tournepierrière à collier *Arenaria interpres* : 1 le 17.7 à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 2 le 8.8 à Saint-Clément-des-Levées.

Laridés

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : seulement 15 données du 5.7 au 14.9 (12 derniers individus des Bretonnières - dont 10 juvéniles - le 10.7).

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* : 1 le 15.8 aux Ponts-de-Cé, 1 le 13.9 au lac du Verdon, 1 le 29.9 à Turquant.

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* : le 10.9 sur la Maine, 1 individu marqué, poussin, en Pologne le 27.6.10.

Goéland leucophée *Larus michahellis* : groupe maxi. de 259 le 22.7 à La Daguenière. 32 contrôles de 15 bagues : 9 françaises (8 méditerranéennes et 1 charentaise), 5 espagnoles (1 baléare) et 1 franco-allemande.

Goéland marin *Larus marinus* : 65 données essentiellement sur la Loire en aval de Chalonnès-sur-Loire et autour de la Pointe/Bouchemaine — Sainte-Gemmes-sur-Loire (jusqu'à 9 oiseaux ensemble le 19.8 à la Pointe).

Goéland brun *Larus fuscus* : premier dortoir important le 29.7 (500 individus au lac du Verdon, et 150 le 1.8 au centre de compostage de Saint-Rémy-en-Mauges). 101 contrôles de 71 bagues : 30 hollandaises, 13 belges, 9 françaises, 7 guernesaises, 5 danoises, 3 allemandes, 2 norvégiennes, 1 espagnole, 1 anglaise (à noter 41 bagues lues le 30.9 au CET de La Séguinière). Le norvégien (*intermedius*) noir JgMP sera observé 8 fois entre le 26.7 et le 13.10 au CET de Champteussé-sur-Baconne (connu déjà en août 2010 sur le même site).

Goéland argenté *Larus argentatus* : hormis 20 le 12.7 au Mesnil-en-Vallée, réapparition le 2.8 (Le Marillais). Premier rassemblement le 8.9 (50 à Saint-Rémy-en-Mauges).

Sternidés

Sterne naine *Sternula albifrons* : dernières de l'année signalées le 5.9 (La Ménittré).

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia** : au moins 9 individus : à la Pointe/Bouchemaine — Sainte-Gemmes-sur-Loire — Denée, 1 adulte du 28.8 au 1.9 (CHD+), 1 autre adulte le 2.9 au même endroit (CHD+), 1 ind. le 16.9 (CHD+) ; au lac du Verdon, 2 individus du 1 au 4.9 (CHD+), 1 adulte bagué du 6 au 10.9 (CHD+), 1 ind. non bagué les 14-15.9 (CHD+) ; à l'étang de la Godinière, 1 ad. et 1 imm. le 15.9 (CHD+).



Sterne caspienne, Denée, 28.8.2011 – A. Fossé

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* : 1 le 2.7 aux Noues, 1 le 8.7 à La Varenne et dernière de la saison : **1 juv. le 6.9* à la Pointe/Bouchemaine (CHD+).**

Guifette noire *Chlidonias niger* : réapparition le 19.7 (Sainte-Gemmes-sur-Loire) ; groupe maxi. de 15 le 10.9 aux Noues.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus** : 1 ad. du 12 au 14.8 à l'aval de l'île de Baure/La Ménitré-Le Thoureil (CHD+).



Guifette leucoptère, La Ménitré, le 12.8.2011 – F. Rayer

Sterne arctique *Sterna paradisaea** : 1 ind. 1A le 7.9 sur la Loire au Marillais (CHD+).

Cuculidés

Coucou gris *Cuculus canorus* : seulement 9 données pour la période dont un jeune tout juste volant le 8.9 sur la commune de La Varenne.

Caprimulgidés

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* : derniers chanteurs entendus le 31.8 à Fontevraud-l'Abbaye.

Apodidés

Martinet noir *Apus apus* : dernier individu observé le 7.9 à Saint-Florent-le-Vieil. À noter, un passage important observé à Cholet le 29.7 avec au **minimum 538 individus** comptabilisés entre 15 h 30 et 18 h 00.

Upupidés

Huppe fasciée *Upupa epops* : ultime observation pour l'année le 22.9 avec un individu sur la commune de Montreuil-Bellay.

Picidés

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : 16 données sur la période dont 7 individus bagués dans la roselière de Noyant.

Motacillidés

Pipit des arbres *Anthus trivialis* : encore une dizaine d'observations au cours du mois de septembre dont un dernier individu en migration à Saint-Rémy-en-Mauges le 29.9.

Pipit farlouse *Anthus pratensis* : premier groupe de 10 individus observé le 15.9 à la Varenne ; par la suite, les observations se multiplient.


Bergeronnette grise *Motacilla alba* : déjà 2 individus de la sous-espèce *yarrellii* observés sur une grève de Loire au Mesnil-en-Vallée le 21.9.

Turdidés

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica** : 1^{re} capture dès le 2.8 dans la roselière de Noyant, régulier ensuite jusqu'au 28.8 avec un total de 10 oiseaux capturés lors du camp de baguage (contrôle d'un oiseau bagué en Belgique le 18.8).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : 1^{er} migrateur capturé le 11.8 dans la roselière de Noyant, puis l'espèce est notée quasi quotidiennement du 19.8 au 23.9. Dernier individu le 26.9 à Méron.

Traquet motteux du Groenland *Oenanthe oenanthe leucorhoa** : capture d'un individu 1A le 28.8 en bordure de la roselière de Noyant (CHD+, 2^e mention départementale documentée).



Traquet motteux du Groenland, Soulaire-et-Bourg, 28.8.2011 – S. Desgranges (à g.), É. Beslot (à d.)

Sylviidés

Locustelle tachetée *Locustella naevia* : toutes les données d'août et septembre proviennent du camp de baguage de Noyant, où 76 captures sont réalisées en halte migratoire (nouveau record pour le site).

Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides** : 1 ind. de 1^{re} année du 1 au 10.8 dans la roselière de Noyant (CHD+), puis un autre sur ce site le 16.8 (CHD+).




Locustelle lusciniöide, Soulaire-et-Bourg, 1.8.2011 – E. Séchet
Notez la longueur des sous-caudales et l'absence de taches.

Bilan de captures réalisées lors du camp de baguage de Noyant/Soulaire-et-Bourg durant l'été 2011

(Bagueurs référents : Gilles Mourgaud & Emmanuel Séchet)

Espèces	Bagués	Contrôlés	Total	Remarques	Captures 2010	Captures 2009
Phragmite des joncs	557	77	634		706	317
Rousserolle effarvatte	425	58	483		594	712
Tarier des prés	149	20	169		279	11
Pouillots fitis	127	0	127		64	38
Fauvette à tête noire	96	6	102		25	70
Fauvette grisette	90	8	98		59	32
Fauvette des jardins	69		69		49	29
Locustelle tachetée	60	16	76		56	24
Bruant des roseaux	58	32	90		202	133
Hypolaïs polyglotte	41	6	47			
Phragmite aquatique	24	2	26		17	2
Gorgebleue à miroir	9	1	10	contrôle belge	7	15
Torcol fourmilier	6	1	7		2	5
Rossignol	5		5		6	3
Bruant jaune	4		4			
Bruant zizi	4		4			
Râle des genêts	3		3			
Cisticole des joncs	3		3			
Locustelle lusciniöide	2	5	7	5 fois la même	1	0
Bergeronnette printanière	2		2			
Traquet motteux	2		2	dont 1 Groenlandais		
Rougequeue à front blanc	2		2		3	4
Rousserolle verderolle	1		1			
Bruant proyer	1		1			
Total	1 470	232	1 972			
+ « banalités »	1 780	233	2 014		2 070	1 472



Bergeronnette printanière de 1^{re} année



Fauvette des jardins

Soulaire-et-Bourg, août 2011 – É. Beslot

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola** : nouveau record de captures pour la 3^e année d'application du protocole de baguage ACROLA dans la roselière de Noyant. Entre le 3.8 et le 28.8, **24 oiseaux** ont été bagués et 2 contrôlés.

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris** : un ind. de 1^{re} année le 3.8 dans la roselière de Noyant (CHD+).

Muscicapidés

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : le graphique de distribution des observations postnuptiales, qui se répartissent entre le 15.7 et le 29.9, montre un net pic de passage dans la dernière décade d'août, qui concentre à elle seule près de 43 % des observations.

Oriolidés

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* : dernière mention de l'espèce pour 2011, le 31.8 à l'étang de Chartrené.

Laniidés

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : encore un juv. le 26.8 à Vivy.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator** : 1 ind. le 3.7 à Longué-Jumelles (CHD+), l'oiseau n'est pas revu deux jours plus tard.

Fringillidés

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* : 1^{er} groupe de migrateurs en vol le 24.9* à La-Chapelle-Saint-Florent (CHD+), les données de fin septembre deviennent de plus en plus régulières.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : seules deux données estivales provenant de la Cité administrative d'Angers, datées des 13 et 30.9 sont notées.

Liste des observateurs ayant contribué au cours de la période

Christophe Alexandre, Christophe Allard, Samuel Angebault, William Arial, Mathurin Aubry, Philippe Audouin, Gérard Balesme, Gaétan Barguil, Kevin Barré, Romain Batard, Jean-Claude Beaudoin, Jacqueline Beaupérin, Bernadette et Patrice Beaupérin-Delaunay, Loïc Bellion, Marc Bellion, Pascal Bellion, Hugues Berjon, Alain Bertaudeau, Florian Bertin, Sébastien Bertru, Édouard Beslot, Aurélien Besnard, Denis Biotteau, Didier Bizien, Patrice Bizien, Alain Blet, Alain Blin, Jean-luc Blouin, Jean-Pierre Boisdrion, Rémi Bontemps, Jean-Marie Bottereau, Guillaume Bouget, Alain Boulet, Christophe Brechet, Jean-Paul Bresteau, Claude Bretaudeau-Ménard, Damien Brochard, Didier Brossard, Maison de la Nature Cae, Alain Campo-Paysaa, Michel Charrier, Thierry Charrier, Baptiste Chassaing, P.-E. Chauveau, Yann Chrétien, Sylvain Codarini, Pierre-Yves Coffin, Philippe Colas, Michèle Colasson, Jean-Pierre Cordier, Sylvain Courant, Groupe local de Chalonnes, Jean-Baptiste de la Bretèque, Romain Delanoue, Patrick Derrien, Sylvie Desgranges, Sylvain Deveau, Xavier Doineau, André Doucet, Grégoire Duffez, Thérèse Dupas, Jean-Louis Énot, Charles Ettel, Denis Farges, Matthieu Faveyrial, Didier Ferrand, Alain Fossé, François Gabillard, Arnaud Gachet, Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, Bernard Gautier, François Gautier, Arnaud Gémeux, Katia Georget, Alain Gérard, Wilfried Gilbert, Emmanuel Glémin, David Grandière, Dorian Gravier, Benjamin Griard, Émeline Gruau,

Yvon Guenescheau, Mathilde Guet, Michel Gys, François Halligon, Gabriel Hardy, Laurent Hauchecorne, Sylvain Hénaff, Tiphaine Heugas, Michel Honoré, Bernard Hubert, Charles-Alexandre Hue, Thomas Jolly, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau, Benoît Lacorre, Jacques Laîné, Frédéric Lalande, Bernard Lalos, Cyrille Landreau, Régis Le Bihan, Jean-Paul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, Pierre Leconte, Bruno Legendre, Jacques Lemoire, Michaël Leroy, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir, Luc Lortie, David Madiot, Benoît Marchadour, Richard Maréchal, Dominique Martineau, Frédéric Masson, Yann Maudet, Benjamin Même-Lafond, Jean-François Michel, Sylvaine Montet, Bernard Moreau, Jean-Pierre Moron, Gilles Mourgau, Philippe Nourry, Jonathan Ollivier, Régis Ouvrard, Patrice Pailley, Olivier Palussière, Yann Paulet, Jean Pelé, Marc Pihet, Martine et Pascal Pion, Daniel Potaux, Joseph Preau, Thierry Printemps, Romain Provost, Patrick Raboin, Jérémy Rault, Fabrice Rayer, Francky Recoquillon, Christian Rémy, Guillaume Réthoré, Jean-Philippe Richou, Julien Robak, André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, André Roland, Hélène Roland, Jean-Luc Ronné, Alain Ruchaud, Pierre Samson, Emmanuel Séchet, Benoît Sénéchal, Philippe Siritot, Alexandre Solaro, Sylvie Souffaché, Carole Stévenin, Kevin Suaudeau, Christian Taillandier, Vincent Tanqueray, Laurent Terrien, Charles Tessier, Ludovic Thomas, Romuald Thoraval, Hugo Touzé, Joël Tudoux, Émilie Vallez, Éric Van Kalmthout, Olivier Vannucci, Dominique Véron, Jean-Do. Vrignault, Bernadette Wälchli, Florine Wedlarski, Thomas Williamson.

Liste des sites et des communes associées

Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Chartrené (étang de)/Cuon
Cheigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Fourneau (étang du)/La Prévière
Godinière (étang de la)/Cholet
Juigné (marais de)/Montreuil-Juigné
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Monteaux (carrière des)/Vivy
Noyant (roselière de)/Soulaire-et-Bourg
Montsoreau (île de)/Montsoreau
Ouvrardièrre (gravière de l’)/Lézigné
Pointe (la)/ Bouchemaine
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

Bibliographie

Beaudoin J.-Cl. & Beslot É., 2011. Suivi Ardéidés : bilan de la nidification 2011 pour deux héronnières de la région angevine et bilan de la répartition des Ardéidés nicheurs en Maine-et-Loire dans le cadre de l’Atlas 2009-2012. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 6 p.

Beslot É., Courant S., Fossé A., Hauchecorne L., Marchadour B., Provost R., 2010. *Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 4^e trimestre 2009*. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 15 pages. [\[En ligne\]](#)

Beslot É., Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., Provost R., 2012. *Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 2^e trimestre 2011*. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, xx pages. [\[En ligne\]](#)

Beslot É. & Deceuninck B., 2012. Rôle des genêts. In Dupuis V. & les coordinateurs-espèce. Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2011. *Ornithos*, 19 (5) : 289-325.

Dubois P. J., 2007. Les oiseaux allochtones en France : statut et interactions avec les espèces indigènes. *Ornithos* 14 (6) : 329-364.

Dubois P. J., 2012. Les populations d'oiseaux allochtones en France en 2011 (2^e enquête nationale). *Ornithos* 19 (4) : 225-250.

Fossé A., 2006. Statut en Maine-et-Loire des espèces allochtones acclimatées ou en cours d'acclimatation en France. *Crex*, 9 : 79-81. [\[En ligne\]](#)

Halligon F., 2003. Première observation angevine de l'Élanion blanc *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789). *Crex*, 7 : 75-76. [\[En ligne\]](#)

Données de baguage : <http://bague.lpo-anjou.org/>

* * *

Rappels sur le fonctionnement du comité d'homologation département

De nombreuses données soumises à homologation ne font pas l'objet d'une fiche pour le comité d'homologation départemental (CHD). Ces homologations ne sont pas une sanction, elles sont juste destinées à assurer une certaine rigueur dans la collecte des données. Nous rappelons que les données non homologuées restent sur *Faune-Anjou* mais ne sont pas prises en compte dans les études locales ou nationales, c'est dommage !

Il serait bon que vous vérifiiez vos données afin de rattraper votre éventuel retard : vos données à homologuer/en cours d'homologation sont ici (en pratique faire une recherche multicritères en cochant « toute la période... » dans l'onglet « période », en cochant « Seulement mes données » et en entrant « CHD » dans « Rechercher le texte suivant dans les remarques » de l'onglet « Autres restrictions » ; en principe il est indiqué dans les remarques si une fiche a ou non été transmise). Seules les données avec la mention « (ndlr : aucune fiche reçue par le CHD) » requièrent une fiche.

En résumé 3 situations :

- # dans les remarques est écrit "(ndlr : aucune fiche reçue par le CHD)" = envoyer une fiche ;
- # dans les remarques est écrit "(ndlr : fiche reçue par le CHD le tant)" et point d'interrogation blanc sur bleu à gauche du triangle = fiche en cours d'examen par le CHD ;

dans les remarques est écrit "(ndlr : fiche reçue par le CHD le tant)" et coche verte à droite du triangle = donnée homologuée (en principe l'auteur de la fiche a été prévenu de l'homologation).

Pour info. : au 20 novembre 2012, si 105 données avaient bien fait l'objet d'une fiche pour 2012, un peu plus de 70 données de 2012 étaient toujours en attente d'une fiche (sans parler des années précédentes...).

En principe c'est le découvreur qui rédige la fiche mais il peut bien sûr se faire aider par les autres observateurs (vous pouvez aussi envoyer votre propre fiche si le découvreur ne l'a pas faite, mieux vaut plusieurs fiches que pas du tout).

Il est important de rapporter dans ces fiches tous les éléments de description que vous avez pu noter sur le terrain (et non pas ce qui est écrit dans les guides ornithologiques) : le lecteur de la fiche doit pouvoir se représenter ce que vous avez vu et donc avoir suffisamment de détails pour éliminer la possibilité d'une autre espèce. Photos, enregistrements, vidéos, dessins sont bien sûr d'une grande aide pour les membres du CHD.

En pratique, prenez l'habitude de prendre un maximum de notes, de dessins, de photos... sur le terrain dès que vous êtes en présence d'une observation inhabituelle pour vous (que ce soit l'espèce ou la date qui soit inhabituelle*). Si, lors de votre saisie dans Faune-Anjou, vous voyez alors apparaître le triangle fatidique, vous serez alors prêt à remplir une fiche de qualité (fiche CHD vierge ci-jointe, fiche pour le comité d'homologation national (CHN) [ici](#), vous pouvez aussi télécharger la fiche en cliquant sur le triangle d'homologation dans Faune-Anjou).

Nous vous invitons à relire la [page de présentation du CHD](#) (vous y trouverez des exemples de fiches). La synthèse des homologations est publiée dans le [Crex](#), celles qui sont en attente de publication sont présentées sur [cette page](#).

** attention, le CHD49 demande l'homologation de certaines données anachroniques (homologation phénologique) : p. ex. un Petit Gravelot au mois de janvier ou un Pinson du Nord en juillet doivent être justifiés (v. [listes principale et phénologique](#)).*

Rédaction : Marc Bellion, Édouard Beslot, Sylvain Courant, Alain Fossé, Benoît Marchadour.

Relecture : Jean-Claude Beaudoin, Édouard Beslot, Sylvain Courant, Alain Fossé.

Mise en page : Édouard Beslot.

Citation recommandée :

Beslot É., Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., 2013. Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 3^e trimestre 2011. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 15 p.