



Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 1^{er} trimestre 2010

-Janvier-Février-Mars -

É. BESLOT, S. COURANT, A. FOSSÉ, L. HAUCHECORNE
B. MARCHADOUR, R. PROVOST

avec la collaboration de J.-Cl. BEAUDOIN.

ABRÉVIATIONS & SIGLES

Ad. : adulte.

BVA : Basses Vallées Angevines.

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.

Env. : environ.

Étg. : étang.

Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale.

(CHD49, <http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm>)

Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).

(CHN, <http://www.lpo.fr/homologation/>)

Ind. : individu.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Janvier : dans l'ensemble très froid, avec des températures moyennes 2 à 3° C en dessous des normales. Le mois débute par une vague de froid prolongée qui se traduit par 13 jours de gel consécutifs, avec des températures minimales de - 8° C en divers points du département le 5, en dépit d'un ensoleillement mensuel globalement généreux. Quelques chutes de neige sont à signaler, essentiellement entre le 6 et le 10.

Février : le froid persiste, essentiellement en milieu de mois, puis le redoux se fait sentir à partir du 22, avec l'arrivée de la tempête Xynthia sur les côtes vendéennes. Les vents violents de secteur sud-ouest ont donc surtout concerné les régions plus au sud, mais des rafales atteignant tout de même les 120 km/h

www.lpo.fr



ont été enregistrées dans le sud du département en fin de mois. De forts épisodes pluvieux accompagnaient également le passage de cette dépression.

Mars : s'avère contrasté. Le mois est bien pluvieux, mais paradoxalement assez ensoleillé grâce à la présence d'un anticyclone venu du nord-est dans la première décennie, accompagné de vents froids. Par la suite, un changement de régime intervient à partir du 16, et les vents de sud amènent des températures anormalement douces et printanières (près de 20 °C) en Anjou les 17 et 24.

Sources : Météo France, Banque Hydro

FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Anatidés

Cygne chanteur *Cygnus cygnus** : apparition d'1 ind. adulte sur les prairies de la Baumette à partir du 3.1. Cet oiseau sera revu jusqu'au 29.3 sur le site (CHD+), soit un stationnement de 2 mois et 26 jours. S'agit-il du même ind. ayant séjourné l'année dernière durant 1 mois et 2 jours, du 5.3 au 7.4, sur le même site ? À suivre l'hiver prochain...



© C. ETTTEL

Oie cendrée *Anser anser* : des oiseaux sont notés dès le début du mois mais les passages pré-nuptiaux débutent réellement à partir du 2.2 pour s'étaler jusqu'au 18.2. Un beau stationnement d'au moins 598 ind. est noté le 14.2 sur l'île Saint-Aubin.

Bernache du Canada *Branta canadensis* : excepté deux données l'ensemble des observations est réalisé dans les BVA, l'espèce est vue régulièrement sur les diverses prairies inondées du 3.2 au 18.3 ; l'effectif maximum noté est de 16 le 8.2 avec 14 ind. au marais de Beaurepaire/Cantenay-Épinard ainsi que 2 à la Baumette/Sainte-Gemmes-sur-Loire. Concernant les sites hors BVA, 1 ind. le 3.3 à Saint-Germain-des-Prés et 2 le 28.3 aux Bretonnières.

Bernache nonnette *Branta leucopsis** : nombreuses observations faisant état de troupes aux effectifs élevés, à mettre en relation avec la vague de froid ayant sévi dans le Nord de l'Europe. On note ainsi 1 ind. le 6.1 sur la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (CHD+) ; 7 ind. le 4.1, 8 le 5.1 puis 9 le 6.1 sur l'île Saint-Aubin (CHD+) ; 14 ind. en vol le 10.1 à Montsoreau (CHD?) ; 18 les 17 et



www.lpo.fr



21.1 sur l'étang de la Thibaudière, plus que 8 le 11.2 puis 5 le 20.2 (CHD+); le plus gros groupe est noté à Ingrandes le 14.2 avec 32 en vol (CHD?).

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* : jusqu'à 3 ind. ensemble dans les BVA du 5 au 24.3.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : l'espèce donne lieu à de très nombreuses observations durant la période, essentiellement dans les BVA, en Loire aval et dans la vallée de la Tau. Les plus gros effectifs notés sont de 17 ind. le 25.2 au Mesnil-en-Vallée, le 29.3 à Saint-Germain-des-Prés, et également 13 le 11.3 sur le communal de Soulaire-et-Bourg. À noter, 1 ind. tué à la chasse le 22.1 à Gesté, bagué 39 jours plus tôt (14.12.09) à Margrethekog, Højer (Danemark, env. 1 100 km) (source : CRBPO*)

Canard mandarin *Aix galericulata* : 1 mâle le 17.1 sur l'étang des Hautes-Belles et 1 mâle le 5.1 à l'étang de Péronne.

Canard siffleur *Anas penelope* : effectif en hivernage nettement supérieur aux années précédentes (v. tableau du comptage Wetlands), le lac de Maine et le lac du Verdon ayant accueilli les groupes les plus importants pendant la vague de froid (respectivement 401 et 207 ind. le 16.1). Stationnements importants par la suite sur l'île Saint-Aubin avec régulièrement un millier d'oiseaux au début du mois de février (maximum d'environ 1 800 le 7).

Canard chipeau *Anas strepera* : le lac de Maine reste le site le plus fréquenté avec régulièrement plus d'une centaine d'individus pendant la période, avec un effectif maximal de 312 oiseaux le 17.1, les groupes ne dépassant généralement pas la dizaine d'individus sur les autres sites.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : effectif hivernal le plus important de ces dernières années (v. tableau du comptage Wetland) avec régulièrement plus de 500 ind. rassemblés sur l'île Saint-Aubin (maxi. de 700 le 15.1) également quelques centaines d'oiseaux au lac du Verdon (maxi. de 300 le 10.1).

Canard pilet *Anas acuta* : stationnements classiques dans les BVA, seul secteur à accueillir régulièrement l'espèce en nombre avec entre 500 et 1 000 individus sur l'île Saint Aubin début février (maxi. de 1 200 entre les 7 et 14.2) et 700 le 1.3 à Tiercé.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : première, 1 mâle, le 28.2 à Saint-Germain-des-Prés. Passage pré-nuptial peu fourni et localisé aux prairies inondées des BVA et de Loire aval (à l'exception d'un mâle le 24.3 à Beaurepaire et d'un mâle le 18.3 à Chevigné), maxi. de 11 le 12.3 à Champtocé-sur-Loire et de 11 le 14.3 à Saint-Germain-des-Prés.

Canard souchet *Anas clypeata* : effectifs semblables à ceux d'autres hivers rigoureux, moins de 100 ind. sur l'île Saint-Aubin et guère plus de quelques dizaines

* Centre de Recherches par le Baguage des Populations d'Oiseaux





ailleurs, 40 le 31.1 aux Bretonnières. Le passage pré-nuptial n'apporte pas de stationnements importants, maximum de 56 le 7.3 en vallée de la Tau.

Nette rousse *Netta rufina** : 1 couple le 20.2 sur l'île Ponneau/Saumur (CHD?).

Fuligule milouin *Aythya ferina* : importants regroupements sur quelques plans d'eaux avec notamment un maximum de 332 le 16.1 au lac du Verdon, 348 le 23.1 sur le Pré de l'Abbesse, 368 le 16.2 aux Monteaux et 428 le 17.2 au lac de Maine. Les effectifs chutent ensuite brutalement dès la première décade de mars. On note 17 contrôles d'oiseaux marqués en France.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : signalé sur de nombreux plans d'eaux et sur la Loire mais moins d'une dizaine de sites ont accueilli des groupes supérieurs à 30 ind. avec un maxi. de 70 le 31.1 à Seiches-sur-le-Loir. On note 3 contrôles d'oiseaux marqués en France.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca** : l'espèce semble avoir déserté l'Anjou avant l'arrivée de la vague de froid malgré la présence de quelques individus en décembre...

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : passage assez important avec plus d'une trentaine d'individus signalés, 1 le 3.1 sur la Baumette ; au lac de Maine 3 entre les 10 et 31.1 puis 5 le 15.2 et 9 le 17.2 ; 3 le 11 et 1 le 14.1 sur la Loire aux Rosiers-sur-Loire ; 2 le 19.1 et 1 du 24.1 au 6.2 aux Youis ; 1 le 20.1 et 1 les 4 et 22.3 à l'île Ponneau ; 1 du 30.1 au 3.2 aux Bretonnières ; 3 le 1.2 au Sol de Loire, 9 le 19.2 à Saint-Rémy-la-Varenne et 9 du 20.2 au 6.3 aux Hayes.

Macreuse brune *Melanitta fusca** : 9 individus du 9 au 13.1 puis plus que 4 le 17.1 et 3 le 19.1 au lac de Maine (CHD+).

Harle piette *Mergellus albellus** : 1 femelle ou immature les 9 et 10.1 sur le plan d'eau de l'île Ponneau (CHD+) puis 2 du 13 au 16.1 et toujours 1 le 20.1 (CHD+), 2 ind. type femelle le 17.1 au Sol de Loire (CHD+) puis 2 (les mêmes ?) du 30.1 au 4.2 à Chevigné (CHD+), encore 1 sur ce même site le 7.2 tandis que le deuxième oiseau a probablement rejoint le lac de Maine (CHD+), 1 ind. sera également vu le 13.2 à la Baumette (CHD+). Dernière observation le 15.2 au lac de Maine (CHD?). Ce sont donc au minimum 4 individus, tous en plumage de type femelle, qui ont fréquenté le département cet hiver.

Harle bièvre *Mergus merganser** : le mâle du lac du Verdon (v. chronique précédente) poursuit son hivernage jusqu'au 10.1 au moins (CHD+) puis 1 mâle et 1 femelle fréquentent ce même site entre les 20 et 31.1 (CHD+); 2 mâles passent en vol le 2.1 aux Monteaux (CHD+); 2 mâles stationnent près d'une grève les 5 et 6.1 aux Rosiers-sur-Loire (CHD+); 1 mâle avec 2 femelles sur la Loire le 10.1 à Saumur (CHD+), 1 femelle le 17.1 à l'étang Neuf/Saint-Michel-et-Chanveaux (CHD+) et enfin 1 femelle le 24.1 au lac de Maine (CHD ?). Ce sont donc entre 9 et 12 individus qui ont transité par le département au cours du mois de janvier.



www.lpo.fr



Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*: 1 mâle et 1 femelle les 4 et 5.2 à Chevigné et 1 mâle le 26.2 sur ce même étang.

*Décompte hivernal des Anatidés
en Maine-et-Loire des 16 et 17 janvier 2010
(Wetlands International)*

En 2010, 56 sites ont été recensés par 48 observateurs ; pour plus de détails sur les différents sites prospectés voir le tableau de synthèse de 2009 (BESLOT *et al.*, 2009 - chronique 1^{er} trimestre 2009).

Le tableau ci-dessous fait état des effectifs dénombrés sur les principaux sites (sites nationaux), ces derniers sont quasiment les seuls à avoir accueilli des oiseaux compte tenu du gel des petits plans d'eau durant la période.

Sites	Canard siffleur	Canard chipeau	Sarcelle d'hiver	Canard colvert	Canard pilet	Canard souchet	Fuligule milouin	Fuligule morillon
Baugeois								
Ensemble sites	-	5	30	176	-	-	-	-
Mauges								
<u>Lacs du Verdon et du Ribou</u>	207	11	128	1 081	1	-	332	20
Autres sites	10	2	1	542	-	-	-	7
Saumurois								
Ensemble des sites	-	-	12	72	-	-	-	-
Segréen								
<u>Étg de Chevigné</u>	5	-	-	22	-	-	19	-
<u>Étg de Maubusson</u>	-	-	-	26	-	-	1	1
Autres sites	13	1	47	588	-	2	70	28
Val de Loire et BVA								
<u>La Loire : Gennes à Montsoreau</u>	11	3	-	789	1	1	-	21
<u>La Loire : St-Mathurin à Gennes</u>	-	-	-	1 400	-	-	-	-
<u>Lac de Maine et la Baumette</u>	401	312	82	783	370	11	114	19
<u>Île Saint-Aubin</u>	40	3	402	14	17	25	2	7
Autres sites (dont BVA)	89	38	35	1 511	1	67	464	97
Totaux 2010	776	375	737	7 004	390	106	1 002	200

Remarque : les sites soulignés font partie des sites nationaux de recensements hivernaux des oiseaux d'eau.

Pour toutes informations complémentaires ou participer l'hiver prochain, contactez le coordinateur départemental :

Bruno GAUDEMER, b.gaudemer@laposte.net



www.lpo.fr



Podicipédidés

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : premier signalé le 1.2 à Seiches-sur-le-Loir. Au moins 30 mentions sur 4 sites durant la période, avec en particulier 3 ind. en plumage nuptial au lac de Maine le 13.3, 8 à Cheigné le 21.3 et 3 ind. débutant leur reproduction (accouplement sur ébauche de nid) le 22.3 aux Bretonnières. Ce dernier site est le théâtre d'une reproduction remarquable pour l'espèce dans notre département en 2010 (v. chronique 2^e trimestre 2010, à paraître).

Phalacrocoracidés

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* : premiers indices de cantonnement dans la colonie du lac de Maine dès le 6.2 (accouplement et arrangement de branchettes sur le nid) ; le 26.3, 12 oiseaux sont déjà en position de couveur...

Ardéidés

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : 6 mentions au cours de la période, toutes faisant état d'un seul individu, le 17.1 à l'étang du Fourneau ; les 31.1, 4-5-9.2 à Cheigné et le 19.2 à l'étang de Joreau.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 1 ind. le 15.3, en vol au-dessus du Thouet à Saumur.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : l'espèce est vue en petit nombre durant toute la période (> 10 ind.), aucun dortoir n'est signalé. Il faut attendre la mi-mars pour revoir des groupes plus importants, env. 50 le 26.3 à proximité de la héronnière du lac de Maine. Ce même jour, au sein de cette dernière, les premiers comportements de parade sont observés.



www.lpo.fr



Grande Aigrette *Casmerodius albus* : espèce bien présente durant toute la période, notée toutefois quasiment toujours par groupe inférieur à 10 ind., excepté le 7.1 à Briollay où min. 30 ind. se nourrissaient en bordure d'une nappe d'inondation dans les BVA.



Ciconiidés

Cigogne noire *Ciconia nigra* : première mention cette année sur le site de reproduction connu, le 11.3 ; 1 ad. est toujours présent sur le site le 24.3... Par ailleurs, il est fait état d'une observation assez surprenante, d'un ind. en vol du côté de Souzay-Champigny le 13.2.2010 (CHD? ; date record 3.3.1990, v. BEAUDOIN *et al.*, 1993) !

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (photo) : première migratrice notée à partir du 13.1 à Daumeray ; passage pré-nuptial bien marqué entre le 17.2 et le 16.3. Beau rassemblement de 17 ind. le 4.3 boire de la Cartraie/Cantenay-Épinard.



Threskiornithidés

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : 5 mentions durant la période avec 1 ind. les 1-2.1 et 12.2 à Chevigné, 1 ind. le 7.2 à proximité de ce dernier site, et également 1 ind. le 10.1 au lac de Maine.

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : 1 ind. de 2^e année le 2.3 à Montjean-sur-Loire (photos ci-dessous), 7 le 13.3 à l'embouchure du Layon à Chalennes-sur-Loire et également 1 ind. le 29.3 dans les BVA à Soulaire-et-Bourg.



Accipitridés

Milan noir *Milvus migrans* : première observation le 26.2 à Cantenay-Épinard, puis l'espèce est revue les 4 et 8.3, les observations deviennent quotidiennes à partir du 13.3.



www.lpo.fr



Milan royal *Milvus milvus* : 7 données entre le 6.1 à Chalonnes et le 5.3 au CET de Champteussé où deux individus étaient présents le 26.2. Observé par ailleurs à Saint-Mathurin-sur-Loire et Somloire.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : première observation le 20.3 puis observé sur 5 sites les 20, 21 et 29 mars.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : 7 données entre le 4.2 et le 23.3 ; 2 ind. paradent au dessus d'un site de nidification déjà utilisé les années précédentes à Fontevraud.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* : 5 individus le 9.3 au dortoir en forêt de Leppo.

Pandionidés

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : première observation le 26.1* à La Varenne-sur-Loire (CHD+) ce qui constitue la première mention hivernale pour le département, 1 le 17.2* à La Ménittré (CHD? ; le record date du 10.3.2002), puis observé quotidiennement sur le cours de la Loire à partir du 18.3.

Falconidés

Faucon émerillon *Falco columbarius* : après 3 données en janvier, l'espèce est notée les 2 et 4.3 (1 mâle) à Denzé-sous-Doué, le 4.3 (1 femelle) à Saint-Georges-sur-Loire, enfin le 30.3 (1 mâle adulte) à Saint-Clément-des-Levées.

Faucon hobereau : 1 ind. le 25.3* à Contigné (CHD+). Rappel : la date record est le 22.3.1991 et la date moyenne de première observation est du 14.4.

Gruidés

Grue cendrée *Grus grus* : quelques passages notés, plusieurs groupes en vol non dénombrés les 27.2 et 4.3, également 4 ind. le 13.3 survolant Cantenay-Épinard ; 1 ad. stationnant du 12 au 14.3 dans les BVA entre Soulaire-et-Bourg et Cantenay-Épinard.



13.3.2010 -Soulaire- et-Bourg

© A. FOSSÉ

Otididés

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : premier individu (femelle) noté le 26.3 à Méron.



www.lpo.fr



Haematopodidés

Huïtrier pie *Haematopus ostralegus* : 1 le 28.3 à Montsoreau.

Récurvirostridés

Échasse blanche *Himantopus himantopus* : 3 avant-coureurs du classique passage d'avril-mai : 1 le 17.3 au lac du Verdon, 1 à l'hippodrome du Breil/Saumur et 1 à la Pointe le 29.3.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : 5 à Saumur le 10.1 et 1 à Saint-Mathurin-sur-Loire le 11.1 puis tir groupé le 28.2 qui signe le début du passage pré-nuptial avec 17 oiseaux sur 5 sites (2 à l'étang du Pavillon, 2 à Saint-Georges-sur-Loire, 3 au lac de Maine, 1 au lac du Verdon et 9 à Champtocé) mais il faudra attendre un mois pour revoir l'espèce avec 22 le 23.3 et 1 le 24.3 à Cheigné.

Burhinidés

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* : après la vague de froid, réapparition à la fin de janvier avec 1 le 21.1 à Brain-sur-l'Authion et 1 le 7.2 à Saint-Georges-sur-Loire (hivernants résistants, migrateurs précoces ?). Le retour s'amorce ensuite à partir de la mi-février (5 à Beaulieu-sur-Layon le 13.2) puis l'espèce devient régulièrement signalée à partir du 23.2. À noter des groupes de 18 le 28.2 et de 15 le 13.3 au lac du Verdon.

Charadriidés

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : premiers précoces signalés le 3.3 (1 aux Monteaux, CHD?), le 5.3 (1 à Montjean-sur-Loire, CHD+), le 9.3 (1 aux Bretonnières, CHD?). Rappel : la date record est du 1.3.97, la date moyenne de première observation est du 22.3 (sur 48 années).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : seulement deux données pour le passage habituel de mars : 2 le 16.3 et 5 le 30.3 à La Bohalle.

Scolopacidés

Bécasseau variable *Calidris alpina* : noté sur toute la période. Belle troupe de 45 le 24.1 à La Daguinière.

Combattant varié *Philomachus pugnax* : effectifs faibles répartis sur toute la période, groupe maxi. de 21 le 13.3 à Saint-Germain-des-Prés.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : 1 les 14-15.2 à Chalennes-sur-Loire, 1 à Bré le 17.3, 1 à 3 sur un étang de Gennes du 17 au 31.3 au moins.

Bécassine des marais *Gallinago Gallinago* : concentrations notées à la mi-février avec 96 à Saint-Germain-des-Prés le 13.2 et >100 à l'embouchure du Layon/Chalennes-sur-Loire les 15-16.2.



www.lpo.fr



Barge à queue noire *Limosa limosa* : premières le 16.1 (2 au Verdon) puis le 3.2 sur les BVA (5 sur l'île Saint-Aubin). Passage marqué dans la première quinzaine de mars. Pic à **3 743** le 12.3.

Courlis cendré *Numenius arquata* : premier groupe important le 19.1 avec 109 à La Daguenière. Passage principal en février avec de belles troupes sur les BVA : 27 données de troupes de plus de 100 oiseaux, troupes maxi. de > 350 le 4.2 et 340 le 19.2, jusqu'à 535 oiseaux cumulés le 14.2.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : première donnée pré-nuptiale le 29.3 avec 1 ind. à Soucelles.

Chevalier gambette *Tringa totanus* : 1 le 17.1 à Saint-Germain-des-Prés, puis passage à partir du 19.2 (troupes maxi. de 20 le 9.3 et 22 le 12.3 sur l'île Saint-Aubin).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : 1 oiseau anachronique circule sur les BVA du 4.1 au 14.2* (CHD +), puis 1 (le même ?) est noté le 18.3* sur l'île Saint-Aubin (CHD+).

Laridés

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : au dortoir du lac de Maine, 1 à 3 ind. sont régulièrement notés du 2.1 au 20.2, puis 5 le 26.2 et 9 le 28.2 (et au moins 7 ind. notés au dortoir du lac du Verdon ce même soir). Les nombreuses autres données au cours des mois de janvier et février concernent essentiellement des individus isolés observés dans les BVA et sur les décharges du département. Sur les sites de nidification, les arrivées s'effectuent courant mars, le 4 aux Bretonnières, le 17 sur l'île de Montsoreau et le 21.3 au Sol de Loire.

On note sur le site des Bretonnières, 40 contrôles pour 10 oiseaux, dont 8 Belges, 1 Français et 1 Danois.

Mouette pygmée *Larus minutus* : seulement 3 données pour la période considérée, avec 1 ind. le 7.1 à Drain, puis 1 le 26.2 au lac de Maine et le 28.2 au Pont de l'Alleud.

Goéland cendré *Larus canus* : au lac de Maine, l'espèce est notée au dortoir de Laridés jusqu'au 5.3, avec un maximum de 9 ind. le 15.1. Des observations sont également réalisées sur d'autres dortoirs (lac du Verdon, BVA, étang des Noues) et aux Rosiers-sur-Loire. Derniers le 22.3 à Soucelles.

Goéland marin *Larus marinus* : dans la continuité des mois derniers, l'espèce est notée régulièrement au cours de cet hiver. 4 observations proviennent du lac de Maine, 1 subad. est noté à Soulaire-et-Bourg le 14.1 et 1 immature (H1 ou H2) le 8.3, puis 1 le 25.3 à Drain. Un couple stationne du 13 au 24.3 sur les prairies de la Baumette, où des parades sont mêmes observées.



www.lpo.fr



Goéland brun *Larus fuscus graellsii/intermedius* : 72 contrôles de 61 oiseaux dont 29 bagués aux Pays-Bas, 13 en Grande-Bretagne, 7 en Belgique, 4 en Allemagne, 3 en Norvège, 3 en France et 2 au Danemark.

Goéland pontique *Larus cachinnans** : 1 (voire 2 ?) immature à Soulaire-et-Bourg le 14.1 (CHD±), puis une série d'observations d'immatures du 26.2 au 25.3 au CET de Champteussé (CHD±) pouvant se rapporter à 2 individus.

Sternidés

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : premières le 22.3 (tardives) au lac de Maine, et jusqu'à 145 ind. présents simultanément sur ce site le 5.4.

Columbidés

Pigeon colombin *Colomba oenas* : une centaine d'individus le 18.2 à l'hippodrome du Breil/Saumur.

Tourterelle turque *Sterptopelia decaocto* : une nichée avec deux poussins de deux jours tombés du nid à la gare de Chalonnes-sur-Loire le 12.1.

Cuculidés

Coucou gris *Cuculus canorus* : premier individu entendu le 17.3 à Brossay puis quotidiennement par la suite.

Strigidés

Hibou des marais *Asio flammeus* : 7 données entre le 2.2 et le 20.2 à Montreuil-Bellay, jusqu'à 4 ind. observés ensemble (par deux fois). Le dernier individu est observé 13.3 sur le même secteur.

Upupidés

Huppe fasciée *Upupa epops* : les premiers individus sont observés le 21.3, avec 1 ind. à Saint-Germain-des-Prés, 2 à Rou-Marson et 1 à Seiches-sur-le-Loir. Les observations deviennent par la suite quasiment quotidiennes.

Picidés

Pic cendré *Picus canus** : 1 ind. contacté au chant en forêt de Chandélais le 4.3 (CHD±). Un autre individu est noté dans le bois de Buton à Vernantes le 29.3 (CHD?).

Hirundinidés

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : les premiers individus (4) sont notés le 28.2 au lac de Maine (CHD+), donnée relativement précoce pour l'espèce (20 jours d'avance sur la moyenne). Il faut attendre quelques jours avant de nouvelles observations : 2 à Tiercé le 4.3 puis 3 le 6.3 à Vivy...

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : la première observation a lieu à l'étang de Chevigné, 1 ind. est observé le 28.2 (CHD+). Les observations se font régulières



www.lpo.fr



par la suite malgré la précocité de l'espèce cette année, 15 jours d'avance par rapport à la date moyenne d'arrivée.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* : 1 individu le 22.3 à la Pointe. Un autre individu observé à Cholet quatre jours plus tard le 26.3.

Motacillidés

Pipit des arbres *Anthus trivialis* : premier individu le 24.3 à Étriché puis deux autres le lendemain ; le 25.3, 1 à Seiches-sur-le-Loir et un autre à Contigné.

Pipit farlouse *Anthus pratensis* : un minimum de 110 ind. observés le 29.3 dans la carrière des Youis.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : 2 ind. probables observés le 5.3 sur les prairies de la Baumette ce qui constitue une date des plus précoces pour l'espèce (CHD±). Les autres observations correspondent aux dates classiques d'arrivée pour l'espèce : 2 individus le 25.3 à Saint-André-de-la-Marche et 1 individu le 29.3 à la mare des Marottières/Soulaire-et-Bourg.

Turdidés

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* : premiers chanteurs précoces signalés le 28.3* à Tiercé (CHD?), le 30.3* à Brion (CHD±), et le 31.3* à Andard et au Fief-Sauvin (CHD±).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : 1 femelle le 25.3 à Bouchemaine, et 1 mâle le 31.3 à Tiercé.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : les premiers migrants sont notés le 17.3 à Daumeray et à Cholet, soit 15 jours plus tard que l'année dernière.

Grive litorne *Turdus pilaris* : dernière signalée le 31.3 au Thoureil.

Grive mauvis *Turdus iliacus* : derniers migrants notés le 29.3 à Montreuil-sur-Loir et au Thoureil.

Sylviidés

Locustelle tachetée *Locustella naevia* : 1 chanteur dès le 29.3 à La Ménittré, puis un autre le 31.3 à Tiercé.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : 1^{er} chanteur le 19.3 à Briollay, puis observé quotidiennement par la suite, avec un maximum de 39 ind. signalé dans la journée du 26.3.

Paridés

Mésange noire *Periparus ater* : très peu de données cette année, concernant essentiellement de petits groupes erratiques : 5 à Saumur le 1.1, 4 à Angers le 19.1, 4 à Fontevault le 4.2, 2 à Drain le 8.2, 5 à Fontaine-Guérin le 14.2, 3 à Blou le 29.3 et enfin 1 à Andard le 31.3.



www.lpo.fr



Fringillidés

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* : en relation avec des conditions climatiques plus défavorables (froid), les données sont plus fréquentes en janvier (10 observations pour un total d'au moins 20 ind.).

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* : noté quotidiennement jusqu'au 24.3, la dernière observation de la saison est réalisée le 29.3 à Saint-Germain-des-Prés. Maximums de 80 le 14.1 à Longué-Jumelles et le 25.1 à Seiches-sur-le-Loir, 60 le 7.2 à La Possonnière.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : seulement 2 données pour la période : 3 le 14.2 à Fontaine-Guérin, et 1 entendu le 18.3 dans le bois de Joreau à Genes.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : 22 données de janvier à mars, concernant uniquement des oiseaux isolés ou de petites troupes de 3-4 ind. À noter un échange de nourriture entre adultes à Saint-Rémy-la-Varenne le 31.3, laissant présager une éventuelle reproduction sur place...

Embérizidés

Bruant proyer *Emberiza calandra* : une troupe hivernale de 16 ind. est signalée le 17.1 dans la campagne de Méron.

LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE

S. Angebault, F. Auneau, K. Barré, G. Barguil, K. Barré, J.-Cl. Beaudoin, L. & P. Bellion, É. Beslot, A. Besnard, D & P. Bizien, A. Blin, J.-P. Boisdrion, N. Bonnet, J.-M. Bottereau, A. Boulouin, F. Bourlot, F. Breau, Cl. Bretaudeau, F. Cauet, S. Codarini, S. Courant, X. Doineau, C. Ettl, A. Fossé, B. Gaudemer, F. Gautier, M. et Mme Gourhant, Groupe de Chalennes, Y. Guenescheau, E. Guillou, M. Gys, F. Halligon, S. Havet, C.-A. Hue, B. Hubert, M. Jumeau, L. Lahaye, R. Ledunois, B. Legendre, J.-P. Le Mao, J. Lemore, J.-M. Logeais, O. Loir, L. Lortie, B. Marchadour, F. Masson, B. Môme-Lafond, B. Moreau, G. Mourgaud, P. Pailley, B. Poincet, T. Printemps, R. Provost, P. Raboin, F. Rayer, G. Réthoré, J.-P. Richou, J.-L. Ronné, E. Séchet, C. Tessier, Mme Thibault, E. Van Kalmthout, J.-D. Vrignault... veuillez nous excuser pour les éventuels oublis et merci à tous ceux qui transmettent régulièrement leurs observations.

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES

Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Buton (bois de)/Vernantes



www.lpo.fr



Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Fourneau (étang du)/La Prévière
Hautes-Belles (étang des)/la Breille
Joreau (bois de)/ Chênehutte-Trèves-Cunault ; Gennes
Joreau ou Cunault (étang de)/Chênehutte-Trèves-Cunault
Leppo (forêt de)/
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Marottières (mare des)/Soulaire-et-Bourg
Méron (champagne de)/Montreuil-Bellay
Monteaux (carrière des)/Vivy
Neuf (étang)/Saint-Michel-et- Chanveaux
Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg
Pavillon (étang du)/
Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois.
Pointe (la)/ Bouchemaine
Ponneau (île)/Saumur
Pont de l'Alleud/La Possonnière
Saint-Aubin (île)/Angers
Sol de Loire/Montjean-sur-Loire
Thibaudière (étang de la)/La Plaine
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubroignes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

BIBLIOGRAPHIE

BEAUDOIN J.-Cl., FOSSÉ A., GENTRIC A., JACQUEMIN J.-L., LE MAO J.-P., LERAY V., MOURGAUD G., 1993. Compte-rendu ornithologique de la saison postnuptiale 1989 à la nidification 1990 en Maine-et-Loire. *Bull. G.A.E.O.*, 44 (21) : 3-41.

BESLOT É., COURANT S., FOSSÉ A., MARCHADOUR B., MOURGAUD G., PROVOST R., 2009. *Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 1^{er} trimestre 2009*. LPO Anjou, 18 p.

BESLOT É., COURANT S., FOSSÉ A., MARCHADOUR B., PROVOST R., 2010. *Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 4^e trimestre 2009*. LPO Anjou, 15 p.



www.lpo.fr