



Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 3^e trimestre 2010

- Juillet-Août-Septembre -

É. BESLOT, S. COURANT, A. FOSSÉ, L. BELLION, L. HAUCHECORNE
B. MARCHADOUR, R. PROVOST

avec la collaboration de G. MOURGAUD

PRÉAMBULE

Durant la période considérée, 163 personnes nous ont fait part de leurs observations, permettant ainsi la récolte de 13 159 données concernant l'avifaune du département.

Dans les faits ornithologiques remarquables il faut noter l'observation d'une espèce pélagique occasionnelle à l'intérieur des terres (DUBOIS *et al.*, 2008) : le Fou de Bassan.

ABRÉVIATIONS & SIGLES

Ad. : adulte.

BVA : Basses Vallées Angevines.

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.

Env. : environ.

Étg : étang.

Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale.

(CHD49, http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20047)

Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).

(CHN, <http://www.chn-france.org>)

Ind. : individu.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Juillet : en ce début d'été, la sécheresse s'accroît sur l'ensemble du département, malgré des vents d'ouest dominants (localement forts du 13 au 16),



www.lpo.fr



les pluies restent rares. Juillet est bien ensoleillé et les conditions anticycloniques qui dominent une majeure partie du mois se traduisent par un temps doux et chaud, surtout durant la première décade avec des températures maximales avoisinant les 35 °C à Beaulieu-sur-Layon, Montreuil-Bellay et Pouancé le 8.

Août : les conditions de sécheresse persistent, malgré un temps instable et globalement peu ensoleillé durant tout le mois. Les précipitations demeurent très insuffisantes, et les cours d'eau du département atteignent des valeurs très en deçà des cotes habituelles. Les températures quant à elles restent de saison, avec des périodes de chaleur durant la seconde décade, et le retour de la fraîcheur en fin de mois. Le vent est modéré et de secteur ouest à nord-ouest.

Septembre : les conditions météorologiques du mois s'avèrent très contrastées, avec une alternance de périodes chaude et froide, et une pluviométrie capricieuse (précipitations, essentiellement orageuses, proches des normales dans le nord-ouest du département et très déficitaires ailleurs). Aucun épisode venteux n'est à signaler.

Sources : Météo France, Banque Hydro

FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Anatidés

Oie cendrée *Anser anser* : 1 le 4.7 au lac de Maine, ind. déjà observé sur le site les 3 et 23.6 (v. chronique précédente). Aux Bretonnières, 2 ind. sont observés les 5 et 22.8, ainsi que le 25.9, certainement les mêmes que celles notées au cours de la période précédente : oiseaux certainement d'origine captive.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* : 3 ind. le 5.9 en Loire amont à La Bohalle.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : quelques données essentiellement en Loire amont, se rapportant aux nicheurs locaux (p. ex. 1 couple avec 7 jeunes le 14.7 à Saint-Mathurin-sur-Loire). Dernière donnée pour la période le 4.8 aux Monteaux.

Canard siffleur *Anas penelope* : les deux premiers le 4.9 à l'étag. des Hayes, 3 les 10 et 11.9 sur ce même site.

Canard chipeau *Anas strepera* : 3 ind. le 10.7 au Verdon mais le passage postnuptial ne débute vraiment qu'à la mi-août avec 1 ind. le 18.8 aux Youis, maximum de 6 le 26.9 à Chevigné.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : premières, avec 5 ind., le 11.7 sur un étang du Baugeois, date assez similaire à 2009 (le 13.7 à la Charpenterie) à moins qu'il ne s'agisse d'une reproduction locale... Stationnement relativement important pour la période à Seiches-sur-le-Loir avec un maximum de 82 le 24.9.



www.lpo.fr



Canard pilet *Anas acuta* : premiers le 6.9 avec un oiseau au Verdon et un autre à Seiches-sur-le-Loir, 2 le 28.9 en Loire amont aux Rosiers-sur-Loire. On note également 1 ind. les 5 et 10.9 aux Monteaux ainsi que 2 le 10.9 à l'étg des Hayes, tous visiblement échappés de captivité (volontairement introduits ?) car porteurs de bagues plastiques vert pistache...

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : 1 femelle le 7.7 sur l'île Saint-Aubin, enfin une preuve certaine de reproduction avec **un couple ayant niché** à Beaurepaire présent jusqu'à début juillet au moins. Seulement 4 données pour la migration postnuptiale : 5 le 25.7 aux Bretonnières, 2 du 15 au 20.8 au marais de Montreuil-Juigné, 2 le 16.8 à l'étg des Hayes et enfin 2 le 8.9 dans une boire à La Varenne.

Canard souchet *Anas clypeata* : maximum de 35 ind. le 20.9 à Chevigné.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : **3 familles** le 8.7 à l'étg du Fourneau, **1 famille** le 14.7 à l'étg des Hautes Belles. Rassemblement maximal d'env. 100 ind. le 8.8 à Chevigné. On note un contrôle d'un oiseau marqué en Loire-Atlantique.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : 1 femelle avec **1 seul poussin** le 5.7 à Seiches-sur-le-Loir, unique preuve de nidification rapportée cette année et premier cas en dehors des sites connus du Segréen... Individus isolés ou petits groupes observés sur les étangs des Hayes et des Hautes Belles, ainsi qu'à Boudré et sur les étangs du Segréen, maximum de 13 le 8.7 à la Primaudière et de 18 le 21.9 à Seiches-sur-le-Loir.

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* : 1 couple niche avec succès à Chevigné (observation de comportement de parade le 11.7, **4 poussins** visibles à partir du 22.7) rejoint le 4.8 par un autre couple (8 ind. ce jour-là), également un couple le 14.9 au Fourneau possiblement nicheur sur le site (mâle observé au printemps, couple paradant en 2009).

Phasianidés

Caille des blés *Coturnix coturnix* : à noter la capture d'un ind. dans la roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg le 16.8. Les mensurations semblent en faveur de la Caille du Japon (*C. japonica*)... espèce faisant l'objet de lâchés à des fins cynégétiques et venant visiblement polluer génétiquement l'espèce indigène.



© Sylvain Courant



www.lpo.fr



Podicipédidés

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : les dernières éclosions aux Bretonnières sont notées le 24.7 avec 2 couples avec poussins (minimum 2 et 1) récemment éclos portés sur le dos.

Sulidés

Fou de Bassan *Morus bassanus** : 1 ind. de 1^{re} année le 25.9 au lac de Maine (CHD+), il s'agit de la 4^e donnée angevine. Donnée surprenant en l'absence de conditions météorologiques particulières (aucun épisode de fort vent d'ouest).

Les mentions précédentes concernent : 1 ad. partiellement mazouté récupéré à Somloire le 18.2.1977 (Bull. Gr. Angevin Ét. Orn., 1978, 8 (23) : 42) ; 1 ad. trouvé à Saint-Georges-sur-Loire le 7.1.1998 puis 1 ad. retrouvé mazouté sur le toit d'une entreprise à Angers le 7.2.2008.

Phalacrocoracidés

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* : de gros rassemblements notés à partir du début du mois de septembre sur la Loire. Au moins 800 ind. le 5.9 puis 930 le 17.9 et encore 900 le 30.9 à La Bohalle ; min. 1 000 ind. sont notés le 19.9 à Villebernier.

Ardéidés

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : 1 le 19.7 à la Roussière/Saint-Germain-sur-Moine (CHD+).

Blongios nain *Ixobrychus minutus** : sur le site suivi dans le Saumurois, le mâle est observé le 20.8 puis le couple le lendemain (CHD+). Aucun jeune n'est encore noté cette année...

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : dernière donnée pour la saison le 19.9 avec 1 ind. de 1^{re} année dans la saulaie du lac de Maine.

Héron pourpre *Ardea purpurea* : dernière donnée pour la saison le 13.9 avec 1 ind. de 1^{re} année sur une gravière à Lézigné.

Ciconiidés

Cigogne noire *Ciconia nigra* : à défaut de donnée en période de reproduction (seulement 2 données récoltées au cours de la période précédente), le passage postnuptial est particulièrement bien marqué. Ainsi, 42 mentions sont récoltées entre le 10.7 et le 22.9, avec entre autres 1 troupe de 11 ind. le 27.8 en vol au-dessus de la Baillie/Soulaire-et-Bourg (certaines se posent d'autres filent vers Cantenay-Épinard).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : 8 mentions durant la période. Lors du passage postnuptial quelques belles troupes sont observées : 25 ind. le 9.8 à Brain-sur-Longuenée et 24 le 19.8 à Beaufort-en-Vallée. Une lecture de bague réalisée le



www.lpo.fr



30.9 sur la Grande Baillie/Cantenay-Épinard : ind. baguée le 26.5.09 à Couëron (44, FR).

Threskiornithidés

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : 12 mentions durant la période essentiellement en Loire aval, dont un groupe de 12 ind. le 2.8 à La Varenne.



Ibis sacré - Drain, 30.9.10

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : contrairement à la période précédente où l'espèce était seulement mentionnée à 3 reprises, cette fois-ci c'est 33 données qui sont récoltées. Au maximum 7 ind. sont observés ensemble : les 7.8 en vallée de la Tau, 18.8 à Saint-Germain-des-Prés, 21.8 à la Soulouse/Chalonnnes-sur-Loire et enfin le 12.9 à Chevigné.

Accipitridés

Bondrée apivore *Pernis apivorus* : dernière observation le 26.9 à Grézillé ; à noter 7 ind. vus dans une ascendance le 8.9 à Mouliherne et 7 s'élevant de divers points du massif de Brignon et semblant se diriger au sud-ouest entre 10 h 20 et 10 h 40 le 24.8.

Élanion blanc *Elanus caeruleus** : 1 ind. le 6.7 à Coutures (CHD?). Posé sur un poteau électrique puis vu en vol, se repose sur un grand peuplier dominant la plaine, proche d'une luzernière fauchée. Le plumage n'a pas été détaillé mais il s'agissait *a priori* d'un adulte.

Milan noir *Milvus migrans* : dernière observation d'un adulte le 24.8 au CET de Champteusé-sur-Baconne.

Milan royal *Milvus milvus* : 1 ind. le 29.9 à Chemillé.



www.lpo.fr



Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : cette année 5 couples ont été observés. Un nouveau couple est noté dans le Baugeois : découvert le 4.4, revu les 9 et 21.4 puis le 20.5. Trois des couples (les plus anciens) ont produit 3 jeunes à l'envol. Des jeunes de l'année sont observés encore les 23 et 25.9 à proximité de sites de nidification.

Pour plus de précisions sur la reproduction 2010 de l'espèce en Maine-et-Loire, voir l'article de Patrick Raboin dans le *LPO Info Anjou* n° 82.



*Circaète Jean-le-Blanc - 5.9.10
(photos : Alain Fossé) :
Jeune volant depuis 3 semaines.*

Busard cendré *Circus pygargus* : dernières observations de 4 juv. différents le 4.9 sur trois sites de nidification.

Autour des palombes *Accipiter gentilis* : un jeune piégé dans une cage le 16.8, une femelle adulte tourne autour. L'oiseau est libéré le lendemain par les agents de l'ONCFS.

Pandionidés

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : noté sur le cours de la Loire à partir du 11.7 puis un passage qui s'affirme à partir du 6.8 avec 5 oiseaux différents vus les 11, 14, 15 et 16.8, jusqu'à 6 le 23.8, 8 le 28.8. Le nombre d'observations culmine en septembre avec 12 oiseaux différents le 3 dont 4 ensemble à La Bohalle, 13 le 4.9, 12 le 5, 15 le 10.9 dont 4 posés à Saint-Rémy-la-Varenne, 11 oiseaux le 11.9 et encore 5 le 25.9. Hors du cours de la Loire, 2 oiseaux sont notés le 11.9 au Verdon.



www.lpo.fr



Falconidés

Faucon kobez *Falco vespertinus** : une femelle de 2^e année observée dans les BVA (prairies de Soulaire-et-Bourg, Cantenay-Épinard) du 12.7 au 8.8 (CHD+).



www.lpo.fr



LPO Anjou, 2010



Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : 6 observations d'oiseaux isolés entre le 13.8 et le 12.9.

Otididés

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : l'effectif maximal enregistré lors des rassemblements postnuptiaux concerne 25 ind. le 18.9, en 3 groupes sur les communes d'Épieds et Montreuil-Bellay.

Haematopodidés

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* : 1 précoce le 14.7 à Saint-Mathurin-sur-Loire et 1 (le même ?) le 21.7 sur Saint-Rémy-la-Varenne, 1 au Sol de Loire le 14.8 et 1 du 15 au 19.8 entre Le Thoureil et La Ménittré.

Récurvirostridés

Échasse blanche *Himantopus himantopus* : 2 tardives/précoces en juillet, 1 le 2 aux Monteaux et 1 le 9 à Noyant/Soulaire-et-Bourg.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : signalée du 15.8 au 27.9 (maxi. de 30 le 13.9 à La Possonnière).

Burhinidés

Œdicnème criard *Burhinus oedicanus* : derniers poussins signalés le 3.9 (Louresse-Rochemenier) ; premiers rassemblements à la fin d'août (13 le 22.8 à Cléré-sur-Layon, 33 le 30.8 à Douvy et maxi. de 126 le 24.9 à Épieds).

Charadriidés

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : derniers poussins signalés le 18.8 (les Monteaux).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : passage habituel noté à partir du 13.7.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus** : 1 possible le 16.7 à Chalonnes-sur-Loire (CHD?).

Scolopacidés

Bécasseau sanderling *Calidris alba* : seulement 4 données du 5.8 au 13.9 sur la Loire.

Bécasseau minute *Calidris minuta* : noté du 18.8 au 19.9 (maxi. de 6 le 7.9 à Turquant).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii** : 1 le 4.9 à Turquant (CHD?) et 1 les 7-8.9 à Sainte-Gemmes-sur-Loire (CHD+).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : noté du 15.7 au 10.9 (maxi. de 10 le 27.8 à Saint-Mathurin-sur-Loire).



www.lpo.fr



- Bécasseau variable *Calidris alpina*** : noté à partir du 17.7 (maxi. de 12 le 26.8 à Turquant).
- Combattant varié *Philomachus pugnax*** : noté à partir du 12.7 (maxi. de 22 le 27.8 à Saint-Mathurin-sur-Loire).
- Bécassine des marais *Gallinago gallinago*** : réapparition le 20.7.
- Barge à queue noire *Limosa limosa*** : notée du 12.7 au 12.9.
- Barge rousse *Limosa lapponica*** : notée du 14.7 (belle troupe de 23 oiseaux aux Rosiers-sur-Loire) au 27.9.
- Courlis corlieu *Numenius phaeopus*** : 1 seul noté le 20.8 à Saint-Georges-sur-Loire.
- Courlis cendré *Numenius arquata*** : noté du 10.7 au 25.9 (maxi. de 11 les 21-22.9 au Verdon).
- Chevalier arlequin *Tringa erythropus*** : hormis 3 le 25.7 à La Possonnière, noté à partir du 20.8.
- Chevalier gambette *Tringa totanus*** : réapparition le 3.7 (maxi. de 34 le 12.7 à Saint-Maur).
- Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis**** : 1 du 12 au 14.7 à Saint-Maur (CHD+), sans doute revu le 17.7 (CHD+). La dernière donnée homologuée remonte au 22-23.4.03 (Saint-Mathurin-sur-Loire), une donnée du 21.9.04 à Parnay n'ayant pas été soumise à homologation.
- Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*** : noté à partir du 2.7 (maxi. de 26 le 26.8 à Turquant et 24 le 5.9 à La Daguenière).
- Chevalier sylvain *Tringa glareola*** : hormis 1 à Montjean-sur-Loire et 1 à Saint-Maur le 12.7, noté du 30.7 au 12.9 (maxi. de 5 le 19.8 à Montreuil-Juigné et 6 le 20.8 à Parnay).
- Tournepierrre à collier *Arenaria interpres*** : 1 du 16 au 18.8 à Saint-Maur, 1 le 25.8 à Parnay, 1 le 27.9 au Verdon.
- Laridés**
- Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*** : 23 données durant la période dont 45 jeunes et 25 adultes aux Bretonnières le 7.7.
- Mouette pygmée *Larus minutus*** : seulement 2 observations pour 3 oiseaux, 1 ind. de 1^{re} année le 7.7 à Saint-Germain-des-Prés et également 2 le 4.9 à Cheigné.
- Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibudus*** : 4 contrôles de 3 individus bagués, 3 belges et 1 polonaise.
- Goéland cendré *Larus canus*** : une seule donnée d'un individu de 1^{re} année le 18.9 en Loire aval à Liré.



www.lpo.fr



Goéland leucophée *Larus michahellis* : observations de 9 individus bagués en France (4) et en Espagne (5 dont 2 individus des Baléares).

Goéland marin *Larus marinus* : 29 données sur la période considérée essentiellement en Loire aval. Nombre de contacts plus important à partir de la mi-août. En dehors de la Loire, 1 ind. de 2^e année est observé le 27.9 au Verdon et l'espèce est observée assez régulièrement au lac de Maine.

Goéland brun *Larus fuscus graellsii/intermedius* : au total 73 contrôles de 61 ind. bagués dont 5 de la sous-espèce nordique *intermedius*. Provenance : Hollande (26), Belgique (12), France (6), Angleterre (4), Allemagne (3), Espagne (3). À noter, 32 goélands bagués le 29.9 au CET de la Séguinière.

Goéland argenté *Larus argentatus* : premier rassemblement significatif d'une cinquantaine d'individus observé dans l'ouest du département le 16.9 au centre de compostage de Saint-Rémy-en-Mauges.

Sternidés

Sterne naine *Sternula albifrons* : faible production de poussins liée notamment au dérangement sur les sites de reproduction. On notera cependant l'aboutissement de plusieurs pontes : au moins 6 poussins à Montjean-sur-Loire, 3 poussins à La Bohalle et 2 poussins au Marillais (ce dernier site de reproduction est à rajouter au bilan publié dans la chronique précédente).

Sterne arctique *Sterna paradisaea** : 1 le 30.8 à la Pointe/Bouchemaine (CHD?).

Sterne caugek *Thalasseus sandvicensis* : au moins 2 ind. pour 3 observations. Un adulte le 12.7 à Saint-Clément-des-Levées et un autre le même jour à La Bohalle (même individu ?) et 1 le 14.8 au Sol de Loire.

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia** : au moins 6 ind. observés durant la période. Une à Montjean-sur-Loire le 28.8 (CHD?), 2 le 31.8 au niveau de la confluence Loire et Maine dont 1 ind. présent jusqu'au 5.9 (CHD+), 2 au Verdon du 6 au 9.9 (CHD+) et 1 le 23.9 à Chalonnes-sur-Loire (CHD?).



© Alain Fossé



www.lpo.fr



Guifette moustac *Chlidonias hybrida* : 1 observation d'un individu le 7.7 sur la Loire à Bouchemaine (CHD?).

Guifette noire *Chlidonias niger* : première observation d'un groupe le 13.8 sur la Loire à La Ménittré puis observations régulières jusqu'à fin septembre. Groupe de 16 ind. sur la Loire au Thoureil le 11.9.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus** : 1 ou 2 individus de 1^{re} année observés du 25.9 au 4.10 sur la Loire à La Bohalle (CHD+) constituant ainsi la 14^e donnée angevine.



Individus de 1^{re} année : à g. Guifette leucoptère, à d. Guifette noire.

Columbidés

Tourterelle des bois *Sterptopelia turtur* : comme habituellement, l'espèce est régulièrement observée au cours du mois de septembre, avec des observations de plus en plus rares vers la fin du mois. La dernière donnée date du 24.9 dans les Mauges (Saint-Crespin-sur-Moine).

Cuculidés

Coucou gris *Cuculus canorus* : seulement 8 données pour la période dont la moitié au mois d'août. Le dernier individu est observé le 3.9 sur la commune de Saint-Georges-sur-Loire.

Caprimulgidés

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* : derniers chanteurs entendus le 3.9 dans le bois des Loges sur la commune du Louroux-Béconnais.

Apodidés

Martinet noir *Apus apus* : les données s'égrainent à partir de la fin août. La dernière donnée correspond à un individu blessé à Saumur et emmené au centre relais de soins le 27.9.

Méropidés

Guêpier d'Europe *Merops apiaster** : pas d'observation sur la période notamment sur les sites où l'espèce a niché l'année passée.



www.lpo.fr



Upupidés

Huppe fasciée *Upupa epops* : encore 3 données au mois de septembre dont une tardive le 27.9 à Angers.

Picidés

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : douze données sur la période, sans doute des migrants. Seulement 3 ind. capturés à la roselière de Noyant contre 5 l'année passée.

Pic cendré *Picus canus** : aucune observation malgré les contacts établis le mois précédent sur deux sites différents de l'est du département.

Motacillidés

Pipit farlouse *Anthus pratensis* : très peu de données estivales. Un chanteur cantonné sur la commune de Trémentines le 7.7 et encore 1 ind. sur le site de reproduction connu à Avrillé (ancien aérodrome). Comme l'année passée, les migrants affluent à partir de la deuxième décennie de septembre, les observations de petits groupes devenant quasiment quotidiennes.

Pipit rousseline *Anthus campestris** : 2 migrants entendus le 22.8 à Chavagnes-les-Eaux (CHD?).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* : encore des observations au cours du mois de septembre avec 1 ind. en migration le 16.9 à Chevigné, 1 le 18.9 au Marillais et 2 le 24 à Saint-Georges-du-Bois.

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* : 1 femelle précoce le 30.7* au CET Champteussé-sur-Baconne (CHD+).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : 5 données au cours du mois de septembre avec 3 à Bré le 2.9, env. 30 ind. à Valanjou le 4.9 dont un mâle de la sous-espèce *flavissima*, 1 ind. à Cossé-d'Anjou et un autre à Chalennes-sur-Loire le 12.9 et enfin 1 ind. le 17 à Saint-Georges-sur-Loire.

Turdidés

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica** : 12 ind. capturés dans la roselière de Noyant du 7.8 au 12.9 (15 captures en 2009), dont 1 ind. *namnetum* (sous-espèce endémique des marais atlantiques français) les 7 et 8.8. En dehors des activités de baguage, 1 ind. observé à plusieurs reprises en bord de Loire à La Pointe le 20.9 (CHD+). L'espèce est à rechercher en août dans les jeunes saulaies et les marais de bord de Loire.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : 1^{er} migrant noté le 3.8 au Lion-d'Angers. À partir du 6.8 (1 mâle capturé à Noyant), l'espèce devient régulière et des individus migrants sont notés à l'unité dans des habitats variés (friches, lisière forestière, roselière). À noter 4 ind. le 7.9 en bordure de la forêt de Beaulieu.



www.lpo.fr



Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : 1^{er} migrateur le 5.8 à Cantenay-Épinard.
Jusqu'à 13 ind. signalés dans la journée du 4.9.

Sylviidés

Locustelle tachetée *Locustella naevia* : 48 ind. capturés du 31.7 au 22.9* à Noyant (parmi lesquels une majorité de 1^{re} année).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola** : l'application d'un protocole de baguage spécifique « ACROLA » au sein de la roselière de Noyant a permis la capture de **18 oiseaux**, dont une majorité d'individus de 1^{re} année. Les captures sont quasi journalières entre le 7.8 et le 22.8, avec un maximum de **3 oiseaux** dans la matinée du 20.8.

L'espèce, sans doute l'un des passereaux les plus menacés en Europe (population estimée à moins de 13 000 couples), est connue pour longer la façade atlantique lors de sa migration postnuptiale : les captures réalisées dans les BVA (2 en 2009, 18 en 2010) montrent bien qu'une fraction des individus emprunte une voie plus continentale pour traverser la France. Il reste désormais à vérifier si ce passage est constant d'année en année en Anjou, et s'il se poursuit en septembre.



© Alain Fossé

*Phragmite aquatique - Noyant/Soulaire-et-Bourg, le 12.8.10 :
à g. 1^{re} année, à d. adulte.*



www.lpo.fr



Bilan des captures effectuées dans la roselière LPO

Espèces	2010			2009		
	Bagué	Contrôle	TOTAL	Bagué	Contrôle	TOTAL
Phragmite des joncs	765	50	815	304	13	317
Rousserolle effarvatte	555	64	619	641	71	712
Fauvette à tête noire	232	4	236	70	-	70
Tarier des prés	227	60	287	11	-	11
Bruant des roseaux	171	47	218	110	23	133
Fauvette grisette	82	2	84	32	-	32
Pouillot fitis	75	1	76	38	-	38
Fauvette des jardins	60	-	60	29	-	29
Locustelle tachetée	52	11	63	22	2	24
Mésange bleue	47	6	53	10	-	10
Hypolaïs polyglotte	25	-	25	9	-	9
Phragmite aquatique*	18	1	19	2	-	2
Rougegorge familier	13	-	13	16	-	16
Gorgebleue à miroir	11	1	12	15	-	15
Mésange charbonnière	8	-	8	13	-	13
Rossignol philomèle	6	-	6	3	-	3
Pouillot véloce	4	-	4	4	-	4
Rougequeue à front blanc	4	-	4	4	-	4
Merle noir	3	-	3	2	-	2
Torcol fourmilier	3	-	3	5	-	5
Pipit des arbres	3	-	3	2	-	2
Troglodyte mignon	2	-	2	-	-	-
Caille des blés	2	-	2	-	-	-
Cisticole des joncs	2	-	2	-	-	-
Pinson des arbres	1	-	1	5	-	5
Bouscarle de Cetti	1	-	1	7	2	9
Gobemouche gris	1	-	1	1	-	1
Rougequeue noir	1	-	1	-	-	-
Gobemouche noir	1	-	1	1	-	1
Grive musicienne	1	-	1	1	-	1
Serin cini	1	-	1	-	-	-
Pie-grièche écorcheur	1	-	1	-	-	-
Locustelle luscinioïde*	-	-	-	1	-	1
Martin-pêcheur d'Europe	-	-	-	1	-	1
Râle d'eau	-	-	-	1	-	1
Tarier pâtre	-	-	-	1	-	1
TOTAL	2371	253	2624			
					32 espèces	30 espèces



Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : 50 contrôles cet été dans la roselière de Noyant, concernant entre autres 2 ind. bagués en Belgique et 7 en Grande-Bretagne. Encore 1 ind. du 28 au 30.9* aux Ponts-de-Cé (CHD+).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaes* : 64 contrôles effectués dans la roselière de Noyant, dont 1 ind. bagué aux Pays-Bas, 2 en Grande-Bretagne et 4 en Belgique.

Fauvette des jardins *Sylvia borin* : 1 à Gesté et 1 à Broc le 19.9* (CHD+).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : la migration postnuptiale est perceptible dès août avec la dispersion des individus locaux, puis s'intensifie avec l'arrivée massive de migrants dans les 1^{res} et 2^e décades de septembre : **105 ind.** capturés en une matinée à Tiercé le 4.9, 95 à Noyant le 11.9, et 102 à Tiercé le 18.9.

Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta* : 1 tardif le 23.9* à Angers (CHD+).

www.lpo.fr



Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : 1 oiseau bagué au Royaume-Uni et contrôlé à Noyant le 11.9.

Muscicapidés

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : des migrateurs sont signalés du 3.8 au 23.9, avec jusqu'à 17 ind. observés dans la journée du 3-9.

Laniidés

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator** : 1 le 12.7 à Cuon (CHD+).

Fringillidés

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* : 1^{ers} migrateurs le 29.9* à Béhuard (CHD+).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : les quelques observations de juillet (11 données) et août (9 données) provenant des massifs forestiers du Sud et de l'Est du département se rapportent vraisemblablement à des nicheurs locaux. Un groupe de 16 oiseaux (jeunes et adultes) est signalé le 10.8 à Meigné, également un groupe familial observé à Saint-Macaire-du-Bois le 24.8. Une autre troupe composée d'une douzaine d'individus est notée en périphérie du bois de Linières le 16.9, et pourrait davantage se rapporter à des migrateurs postnuptiaux.

LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE

A. Martineau, Adeline Cailleau, Alain Blin, Alain Bajan, Alain Bertaudeau, Alain Boulet, Alain Fossé, Alain Ruchaud, André Robert, André Roland, Anthony Saudubois, Arnaud Gémeux, Audrey Letheule, Aurélie Guégnard, Aurélien Besnard, Baptiste Chassaing, Bénédicte Allard, Benjamin Même-Lafond, Benoît Marchadour, Benoît Robin, Bernadette Beaupérin-Delaunay, Bernard Hubert, Bernard Moreau, Bernard Gautier, Bruno Gaudemer, Bruno Legendre, Carole Stevenin, Catherine Lechevallier, Cécile Luciano, Cédric Lardeux, Charles Ettel, Charles Tessier, Charles-Alexandre Hue, Christian Rémy, Christophe Alexandre, Christophe Allard, Christophe Brechet, Christophe Ronné, Claude Bretaudeau-Ménard, Damien Rochier, David Grandière, David Sarrey, Denis Biotteau, Denis Farges, Didier Bizien, Didier Ferrand, Édouard Beslot, Émilie Vallez, Emmanuel Séchet, Emmanuel Smietanski, Erwan Guillou, Fabien Dortel, Fabrice Rayer, Florence Trottin, Franck Noël, François Breau, Frédéric Masson, Gaétan Barguil, Gérard Séjourné, Gérard Hamon, Gilles Mourgaud, Grégoire Duffez, Groupe local de Chalonnes, Guillaume Bouget, Hervé Jamard, Hervé Le Morvan, Hugo Touzé, Hugues Berjon, Jacqueline Brunies Landron, Jacques Fleury, Jacques Girard, Jacques Lemore, Jean Tharrault, Jean-Do. Vrignault, Jean-Baptiste de la Bretèque, Jean-Claude Beaudoin, Jean-François Cognée, Jean-Lou Jacquemin, Jean-Louis Corvest, Jean-Luc Maindron, Jean-Luc Ronné, Jean-Marie Bottereau, Jean-Michel Logeais, Jean-Paul Bresteau, Jean-Paul Le Mao, Jean-Philippe Richou,



www.lpo.fr



Jean-Pierre Lecointre, Jean-Pierre Boisdron, Joël Tudoux, Jonathan Ollivier, Julien Braud, Julien Geslin, Katia Georget, Kévin Barré, Laurent Chevallier, Laurent Hauchecorne, Laurent Todeschini, Loïc Bellion, Luc Lortie, Maëva Ronné, Marc Bellion, Marie-Thé Courné, Martine Gatineau, Martine Pion, Mathurin Aubry, Michel Fouquet, Michel Charrier, Michèle Colasson, Mickaël Jumeau, Myriam Halgand, Odile Chancerelle, Olivier Durand, Olivier Loir, Olivier Seyeux, Olivier Gabory, Pascal Bellion, Patrice Bizien, Patrice Charrier, Patrice Pailley, Patrick Taunay, Patrick Mulot, Patrick Raboin, Paul Meslet, Philippe Bienvenu, Philippe Dersoir, Philippe Siriot, Philippe Bernier, Pierre Croué, Pierre Dalaine, Pierre-Yves Coffin, Quentin Lelievre, Raphaël Chauveau, Régis Le Bihan, Romain Provost, Romuald Thoraval, Samuel Angebault, Samuel Havet, Sébastien Bertru, Séverine Schneider, Sophie André, Stéphane Guérif, Sylvain Codarini, Sylvain Courant, Sylvain Chollet, Terence O'Hara, Théophane You, Thierry Charrier, Thierry Printemps, Valérie Combaud, Vincent Tanqueray, Wilfried Gilbert, William Arial, Willy Raitière, Xavier Aigouy, Xavier Doineau, Yann Brilland, Yann Maudet, Yvon Guenescheau.

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES

Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon
Boudré (domaine de)/Seiche-sur-le-Loir
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Brignon (massif de)/Nueil-sur-Layon
Charpenterie (étang de)/Montreuil-sur-Loir
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Douvy (plaine de)/Épieds
Fourneau (étang du)/La Prévrière
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Loges (bois des)/Louroux-Béconnais
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Monteaux (carrière des)/Vivy
Montreuil (marais de)/Montreuil-Juigné
Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg
Pointe (la)/ Bouchemaine
Primaudière (étang de)/La Prévrière (49) ; Juigné-des-Moutiers (44)
Saint-Aubin (île)/Angers
Saint-Maur/Le Thoureil
Sol de Loire/Montjean-sur-Loire
Soulouse (la)/Chalonnnes-sur-Loire
Tau (vallée de la)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-du-Mottay, Le Mesnil-en-Vallée



www.lpo.fr



Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

BIBLIOGRAPHIE

DUBOIS P. J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G., YÉSOU P., 2008. *Nouvel Inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, Paris, 560 p.

Bulletins LPO :

Bull. Gr. Angevin Ét. Orn., 1978, 8 (23) : 42 [1^{re} mention d'un Fou de Bassan en Maine-et-Loire]

LPO Info Anjou, 4^e trimestre 2010, n° 82 : 12 [reproduction 2010 du Circaète Jean-le-Blanc]



www.lpo.fr