


Fiche de recherche

L'Aurore - *Anthocharis cardamines*

L'Aurore est un papillon facile à identifier, mais sa période de vol précoce ne coïncide pas toujours avec la période de sortie des naturalistes... Cette fiche va peut-être vous inciter à sortir un peu plus tôt et à rechercher cette espèce encore peu notée dans certains secteurs de l'Aquitaine.

Que rechercher ?

Les imagos sont à rechercher en priorité.
Petit papillon blanc, le mâle est bien repérable grâce à l'extrémité de ses ailes orange. La femelle reste plus discrète et le dessus ressemble à d'autres piérides blanches.
Le revers des ailes est caractéristique avec des marbrures vertes, proche des espèces du genre *Euchloe*.
Les œufs peuvent également être recherchés, sur la Cardamine des prés et d'autres brassicacées (Alliaire officinale, Moutarde, Arabette, etc.)



Mâle

(Van Halder I., 2011)

Femelle

(Bargeault L., 2015)

Revers

(Sannier M., 2011)

Où ?

L'Aurore est à rechercher partout en Aquitaine.

A rechercher dans les milieux ouverts humides où poussent la Cardamine des prés ou diverses brassicacées : prairies de fond de vallon, clairières, bords de champs et de routes, bords de fossés humides.




Bord de route à Cardamine des prés

Quand ?

Les imagos sont principalement observables de mi-mars à début mai (parfois plus tard).

Comment ?

Les imagos sont souvent visibles en vol autour des stations à cardamines lors de journées ensoleillées.
Les œufs sont visibles en observant délicatement sous les inflorescences de cardamines.
Leur forme (oblongue) et leur couleur (verte à orange-brun selon la maturation) sont caractéristiques.



Œufs sur Cardamine
des prés

Couple d'aurores paradant autour d'une
Cardamine des prés

Risques de confusion ?

Pas de confusion possible pour les mâles grâce à la couleur orange vif des ailes. Pour les femelles, l'analyse du revers des ailes permet d'éviter les confusions avec d'autres piérides (*P. navet* et de la rave) et surtout les espèces du genre *Euchloe* (*E. crameri* et *E. simplonia*) dont la présence de taches blanches dans la bande noire du dessus des ailes antérieures permet de faire la différence.

Carte de répartition connue de l'Aurore en Aquitaine

