

Pour y voir plus clair dans les âges des goélands

Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars
Juvénile				1er hiver				1er été				2ème hiver = adulte									
1 année = 1A				2ème année = 2A								3ème année = 3A									

2 Classes d'âges : mouette rieuse, goéland railleur, mouette de Bonaparte, mouette de Ross, mouette blanche, mouette de Franklin.

Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars
Juvénile				1er hiver				1er été				2ème hiver				2ème été				3ème hiver = adulte													
1 année = 1A				2ème année = 2A								3ème année = 3A								4ème année = 4A													

3 Classes d'âges : goéland cendré, à bec cerclé, mouette atricile, mélanocéphale, et tridactyle. Le goéland ichtyaète dans la plupart des cas.

Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars
Juvénile				1er hiver				1er été				2ème hiver				2ème été				3ème hiver				3ème été				4ème hiver = adulte					
1 année = 1A				2ème année = 2A								3ème année = 3A								4ème année = 4A				5ème année = 5A									

4 classes d'âges : Goéland argenté, leucophé, pontique, brun, marin, bourgmestre, à ailes blanches, de Thayer..

- période approximative de mue partielle (tête et corps seulement)
- période approximative de mue complète (tête, corps, plumes du vol)

D'après PJ Grant (1989). *Gulls, a guide to identification*. T& AD POYSER.
 D'après A Blomdahl & al. (2003). *Flight identification of european seabirds*. HELM

