

ANNALÈS ORNITHOLOGIQUES DU PARC NATIONAL DES CEVENNES

Période 1970-1983

par D. BRUGIERE et J. DUVAL

Ces annales rassemblent les observations réalisées par les membres du Parc National des Cévennes au sein du parc lui-même mais aussi dans la zone périphérique (quelques rares observations régionales faites en dehors de ces limites ont également été intégrées). De plus, des notes transmises par d'autres ornithologues locaux, de passage ou en vacances ont également servi à la rédaction de cette synthèse. La liste des participants est donnée à la fin de cette introduction avec les abréviations utilisées dans le texte.

La période concernée va de 1970 à 1983. Cette première synthèse couvre donc une période assez longue, aussi a-t-il fallu faire un tri parfois sévère et ne garder que les observations les plus intéressantes, ceci afin d'éviter un texte final long et fastidieux à lire.

Pour chaque espèce, après l'énoncé de son nom, il a été placé la lettre N pour nicheuse connue à l'intérieur du parc ou de la zone périphérique. Ceci permet de replacer les observations dans le contexte régional. Dans la mesure du possible il a été tenu compte de l'hétérogénéité de la zone couverte. Cette hétérogénéité tient, bien sûr, à l'étendue du parc (910 km², 3 190 km² avec la zone périphérique) mais aussi et surtout à son relief très accusé. Si seuls les départements de la Lozère et du Gard sont intéressés par le parc, avec la zone périphérique il faut y ajouter l'Ardèche. Mais il est important de signaler que très peu de notes ont été fournies pour la partie est et sud de cette zone périphérique. D'une façon simplifiée on peut découper la région étudiée ainsi :

— à l'ouest, la région des Causses (Sauveterre, Méjean et Noir) traversée par les gorges du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie et du Trévezel.

— au centre du nord au sud : le Mont-Lozère, la Montagne du Bougès, les massifs de l'Aigoual et du Lingas.

— à l'est et au sud les Cévennes prises au sens large.

Le nombre d'observations par région naturelle étant très inégal, certains pays comme le Causse Méjean sont fortement privilégiés.

Avec toutes ces difficultés (couverture ornithologique inégale, grande étendue et hétérogénéité de la zone, période longue pour des annales) une telle synthèse reste difficile à réaliser. D'ailleurs précisons d'emblée que l'absence d'indication pour certaines espèces ne signifie pas qu'elles n'ont pas été observées, mais plutôt qu'aucune donnée originale n'a été retenue. Cependant toutes les espèces nicheuses dans la zone étudiée ont été citées.

Dans le texte le numéro du département concerné a toujours été mentionné. D'une façon générale pour une même espèce le numéro de département indiqué se rapporte à toutes les observations inscrites avant. Mais si après une observation faite dans un département, toutes les autres ont été faites dans un autre département, le numéro n'a été placé qu'après la première observation faite dans ce nouveau département et il se rapporte également aux suivantes.

Liste des observateurs avec leurs initiales :

Membres du Parc : ALBOUY Dominique (DA), AUSSET Alain (AA), BALSAN Martine (MB), BONNET Jean (JB), BONNET Roger (RB), COMMANDRE Bernard (BC), ESPINASSE Claude (CE), FABRE Jean-Marie (JMF), FLEITH Patrick (PF), FOUBERT Dominique (DF), GREBET Pascal (PG), HUGONNET Serge (SH), JAFFUEL Roland (RJ), JOLY François (FJ), de KERMABON Jean (JK), MACCAGNO Yves (YM), MARTIN Patrice (PM), NAPPEE Christian (CN), PACINI Joseph (JP), PANTEL Simon (SP), PILLET Philippe (PP), PINNA Louis (LP), PLOMBAT Jean-Victor (JP), RICHARDIER Yves (YR), RIVAL André (AR), TRESCARTE Jean-Louis (JLT) et VERDIER Guy (GV).

Membres du Centre d'expérimentation pédagogique de FLORAC : BERTRAND Claude (CB), GUERIN Hubert (HG) et LAMY Gérard (GL).

Autres ornithologues : AUSTRUY Jean-Marc (JMA), AVESQUE Alain (AA), BAGNOLINI Constant (CBA), BERNIER Bernard (B), BINOT P. (PB), BRIEN Yves (YB), BRUGIERE Dominique (DB), DECANALE Monique (MD), DEJEAN, DEVES, GUILLOSON Jean-Yves (JYG), GYS Michel (MG), HEMERY (H), LIBOUREL Philippe (PL), MAUVAIS M. (MM), RECOMINI S. (SR), ROUYEYRAN D. (DRO), ROCHE D. et P. (DPR ou DR ou PR) et VAN ESBROECK Josette et Jacques (JJE), ROSE Michel (MR).

Abréviations utilisées : PNC : Parc National des Cévennes, CM : Causse Méjean, Jonte : Gorges de la Jonte, Tarn : gorges du Tarn, F : femelle, M : mâle, NG : nid garni, NV : nid vide, TM : transport de matériaux, TN : transport de nourriture, JU : juvénile non volant, JUV : juvénile volant, pul : pullus, 07 : Ardèche, 12 : Aveyron, 30 : Gard, 34 : Hérault, 48 : Lozère.

Les observations de 1970 à 1983

Héron bihoreau (*Nycticorax nycticorax*) : 3 au bord du Tarn à Quézac le 15/06/77 (HG) (48).

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : 4 le 13/05/71 à Laval-du-Tarn (HG) (48) et 1 le 11/04/81 à Causse Begon (30) (Austruy in COA, 1982).

Héron cendré (*Ardea cinerea*) : 1 le 25/01/76 au Monastier Pin Moriers (HG), 1 le 7/10/76 à St-Etienne Vallée Française (GL), à St-Julien-du-Gourg, 1 du 10 au 13/10/76, 1 le 20/04/77 et 2 le 10/05/79 (HG), 1 le 27/08/80 à Cocurès, 1 en vol le 17/08/81 à Meyrueis CM, 1 le 4/11/81 à Ste-Enimie (JB), 1 électrocuté en 02/83 à St-Julien-d'Arpaon (CN) et 2 le 13/03/83 à Ste-Croix Vallée Française (HG) (48).

Héron pourpré (*Ardea purpurea*) : A Meyrueis 1 blessé au bord de la Jonte fin 09/74 (LP) et 1 le 6/04/83 (JB) (48).

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : 1 le 10/04/76 à Florac (48) (CE), 1 le 28/04/76 à St-Sauveur-des-Pourcils (30) (AA, PF), 4 le 24/06/76 à St-Bauzile (48) (FJ), 2 le 30/09/77 à Hures-la-Parade CM, 4 le 2/05/78 à Florac CM, 1 le 22/04/79 à Hures-la-Parade CM, 2 le 21/09/77 à Vebron (JB), 2 le 27/03/80 aux Vignes (LP) et 1 le 31/05/80 à Florac CM (JB).

Oie sp (*Anser species*) : 1 tuée le 23/09/72 à St-Etienne-du-Valdonnez Mt Lozère (CN), 9 en vol le 9/10/79 à Meyrueis (JB) et 37 en vol le 5/04/80 à St-Pierre-des-Tripiers dans les gorges du Tarn (PNC) (48).

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) : 1 les 7 et 8/04/83 sur la Can-de-l'Hospitalet (PM) (48).

Fuligule milouin (*Aythya ferina*) : 5 le 4/11/73 sur une mare du CM à Vebron (LP) et 1M le 13/10/77 à Florac sur le Tarnon (YM) (48).

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : N? Passage habituel en mai. Dates précoces : 11 puis 8 le 7/05/78 aux Vignes CM (HG) et 1 le 14/05/83 à St-Pierre-des-Tripiers CM (JB). Les deux observations les plus tardives du passage printanier sont : 30 puis 13 passant le 23/05/79 à St-Maurice-de-Ventalon Mt Lozère (JMF) et 4 le 25/05/80 à Hures-la-P. CM (JB) (48). En post-nuptial le passage est noté fin août début septembre : 30/08/77 20 à Revens (30), 30/08/80 9 à Hures-la-P. et 8/09/80 5 à Vebron (JB) (48).

Milan noir (*Milvus migrans*) : N? Nidification à rechercher, l'espèce niche dans la vallée du Lot proche ainsi qu'au Sabot de Malepeyre à Banassac (48) (DB). Le passage pré-nuptial commence en mars, parfois dès fin février : en 1977 4 le 16/03 à Hures-la-P., en 1978 1 le 26/02 à Hures-la-P. (JB), en 1979 1 le 2/03 à St-Pierre-des-Tripiers, en 1980 12 le 18/03 à Pont-de-Montvert (BC), en 1981 1 le 5/03 à Meyrueis et en 1982 1 le 15/03 à St-Pierre-des-Tripiers (JB). Il se termine en général en avril : 17/04 en 1978, 23/04 en 1980 et 26/04 en 1982. Mais il existe des observations en mai et même en juin (d'oiseaux attardés?) : plusieurs le 12/05/76 à Fraissinet-de-Fourques (JLT, JP), 1 le 21/05/76 à Hures-la-P. Jonte, en 1980 sur le CM 1 le 10/05 à Hures-la-P. et 1 le 26/05 à Meyrueis et dans la Jonte 1 sur Hures-la-P. le 30/06 (JB), en 1981 1 en mai sur le CM à Hures-la-P. et St-Pierre-des-Tripiers et 1 le 9/06 à Florac, en 1982 1 le 5/05 à Hures-la-P. CM, 1 le 6/05 aux Vignes, 3 le 17/05 et 1 le 25/05 à St-Pierre-des-Tripiers (JB), et en 1983 1 le 12/05 à Hures-la-P. CM (DB). Le charnier destiné aux vautours semble fortement attirer ces oiseaux, ainsi : 26 le 31/03/83 (JB).

Le passage post-nuptial commence fin juillet-début août. Dates précoces : en 1977 1 le 26/07 à Meyrueis, en 1982 le 3/08 66 passent en plusieurs groupes sur le Mt Lozère (PNC). Il se termine début septembre. Date tardive : 1 le 7/09/82 à Ste-Enimie (JB). Deux observations encore plus tardives sont connues : 1 le 16/10/78 à Meyrueis (JB, LP) et 1 le 2/12/80 à St-Pierre-des-Tripiers (JB) (48).

Milan royal (*Milvus milvus*) : N? Signalé nicheur sur la carte de Florac dans l'Atlas des oiseaux nicheurs de France (YEATMAN, 1976).

La migration de printemps débute fin février : 1 le 29/02/80 à St-Pierre-des-Tripiers et 2 le 25/02/81 sur le CM à St-Pierre-des-Tripiers également. Elle se poursuit jusque vers la fin avril : 19/04/78 1 CM Hures-la-Parade, 24/04/80 2 CM Meyrueis, 13/04/81 1 CM Vebron (JB). Quelques observations plus tardives se rapportent-elles à des nicheurs locaux ou à des attardés : 27/05/78 1 CM Meyrueis (JP), 3/05/79 1 CM St-Pierre-des-Tripiers (JB), 13/06/79 1 à Florac (YR), mais en 1982 1 oiseau (toujours le même?) a été noté régulièrement du 22/03 au 22/06 au charnier à vautours sur le CM (JB).

Au passage post-nuptial des oiseaux sont notés dès le mois d'août : 15/08/75 1 CM Gatuzières (LP), 13 et 15/08/82 1 CM Hures-la-Parade (B,H) et jusqu'au début novembre : 1 le 10/11/79 à Meyrueis CM (JB), 1 le 1/11/81 à Hures-la-Parade CM (JB, AA). Une seule observation en décembre : 1 le 23/12/81 dans la Jonte à St-Pierre-des-Tripiers (JB) (48).

Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*) : N? 1 début 05/76 à Aumessas (30) (JYG); 1 le 30/06/76 à Hures-la-P. CM (48) (CE, JP, DA); 1 le 17/03/77 dans les gorges de la Dourbie (12) (JB); 1 les 8 et 22/05/80 à St-Julien-d'Arpaon (48) (CN); 1 presque ad. le 5/06/80 dans la Jonte près du charnier à vautours (JB, AA, YM, JK, JP, LP); puis 1 sans doute toujours le même sur le CM à Hures-la-Parade les 15/06 et 5/07 (JB) et au Col de Perjuret (Fraissinet-de-Fourques) le 27/06 (YM). En 1981 1 ad. le 12/04/81 (Nature Aveyron) au charnier où 1 ad. et 1 im. sont vus le 21/5; puis 1 im. le 11/06 à Hures-la-P. CM (JB) (48). En 1982 2 ad. le 14/04 dans les gorges de la Dourbie à La Roque-Ste-Marguerite (12) (JB, Austruy), 1 ad. les 22 et 26/04 et 1 im. le 17/06 au charnier à vautours sur le CM (LP, JB) (48).

Une nidification régionale est donc à espérer au vu de ces observations. L'espèce niche d'ailleurs en limite de la zone périphérique (DB). Rappelons que le Percnoptère nichait il y a 40 ans dans les gorges du Trévezel (30) (Rochon-Duvigneaud, 1921). La présence d'un charnier et d'une colonie de Vautours fauves favorisera peut-être le retour de cet oiseau.

Vautour fauve (*Gyps fulvus*) : N L'oiseau vu le 25/06/80 au Rozier (48) était vraisemblablement celui échappé en mars 80 de la volière (COCHET G. in COA, 1981).

Si la première tentative de réintroduction de l'espèce dans les Causses s'est soldée par un échec, celle de 1981 semble être une réussite. En effet après un lâcher de 10 oiseaux en 1981, un couple s'est reproduit et a amené un jeune à l'envol (PNC).

Circaète Jean le Blanc (*Circaetus gallicus*) : Arrivées générales dans la seconde quinzaine de mars. Dates précoces : 2 le 12/03/77 à Ste-Croix-Vallée-Française (DF) et 1 le 15/03/82 à St-Pierre-des-Tripiers. Date exceptionnelle : 1 le 3/03/77 à Meyrueis (JB) (48).

Les dernières observations se font en septembre : 29/09/74 à Pont-de-Montvert (RB) ou le 18/09/78 à Hures-la-P. (JB); exceptionnellement début octobre comme en 1975 : 1 le 1/10 à Meyrueis (HG) et 1 le 8/10 sur le Mt Lozère (AA).

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : Passage noté dès la fin mars (2 M et 1 F le 29/03/80 à Montbrun CM) et jusqu'au début mai (1 M le 2/05/78 et 1 F le 7/05/81 à Hures-La-P. CM). Observation exceptionnellement tardive d'une F ou im. le 24/05/80 à Hures-la-P. Au passage post-nuptial une seule donnée : 1 M le 9/09/80 à Meyrueis CM (JB). En 1983 1 F les 10 et 17/07 et 15/08 sur le Mt Lozère à St-Julien-du-Tournel (DB) (48).

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) : N Notons les observations les plus intéressantes : en 1976 1^{er} dans le Bougès le 8/02 à Pont-de-Montvert, et en 1977 le 6/03 à St-Privat-de-Vallongue (RB).

En nidification retenons : NG 4 JU le 17/06/77 à La Boulaine (AA); 2 sur le Mt Lozère le 25/05/78 (AR, JMF) (48); 1 M à Revens sur le Causse Noir le 30/06/79 (H, B) (30); 1 M à Ste-Enimie Causse Sauveterre le 7/07/83 (DB). Hiverné sur le CM et le Mt Lozère (HG).

Busard cendré (*Circus pygargus*) : N Dates de retour précoces : 20/04/81 1 F à La Malène (DB); 25/04/82 1 à Montbrun CM (JB). A noter 1 mélanique sur le CM le 15/08/82 à Hures-la-P. (B, H) et 2 TM le 12/05/75 à Ste-Croix-Vallée-Française (HG) (48).

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) : N.

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) : N.

Buse variable (*Buteo buteo*) : N.

Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) : N Retenons les observations en dehors des sites de nidification ou des coins habituels de chasse : 1 sur le Mt Lozère (est) les 29/09 et 7/10/71 (HG), 1 à Nant le 22/03/73 (G. Prudent et C. Bouchardy); 1 im. au Truc de Fortunio le 9/07/75 (AA); 1 le 2/05/79 à St-André-de-Lancize (SH); 1 le 25/02/81 à St-Andéol-de-Clergumont dans le Bougès (BC); 1 les 6 et 23/08/82 à Pont-de-Montvert (AR); 1 à Florac le 2/01/83 (HG) et 1 à St-Maurice-de-Ventalon le 9/05/83 (JMF) (48).

Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaëtus*) : Passage régulier en mars et avril. Date précoce : 1 le 24/03/82 à St-Pierre-des-Tripiers (JB, LP). Une seule observation en mai : 1 le 9/05/80 à Hures-la-P. CM (JB). Au passage post-nuptial seulement deux observations : 1 le 3/09/80 au Barrage de Villefort (Cochet in COA, 1982) et 1 le 19/10/82 dans la Jonte à St-Pierre-des-Tripiers (JB) (48).

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : N Notons un rassemblement de 24 le 4/09/75 à Meyrueis CM (48) (JB).

Faucon kobez (*Falco vespertinus*) : 3 fin 06/78 à Hures-la-P. CM (HG) (48).

Faucon émerillon (*Falco columbarius*) : Régulièrement noté entre 1977 et 1983 sur le CM essentiellement en octobre, mais aussi de novembre à mars. Toutes les observations ont été retenues : 1 les 19/11/77 et 21/01/78 à Hures-la-P. (JB) et 30/12/78 à Montbrun (JB, LP); en 1979 1 le 2/01 à Meyrueis (JB); en 1980 1 le 3/03 ratant une Grive musicienne à Florac (LP) et 1 le 20/11 à Meyrueis; en 1981 1 le 11/10 à Florac, 1 F le 13/10 et 1 M le 19/10 à Hures-la-P., 1 M le 23/10 à Fraissinet-de-Fourques et 1 M le 2/11 à Florac; en 1982 1 M et 1 F le 20/01 à Hures-la-P., 1 le 24/03 à Meyrueis et 1 M le 15/10 à Hures-la-P.; en 1983 1 le 18/03 à Hures-la-P. (48) et une observation le 4/02 sur le Causse Noir à Lanuéjols (30) (JB).

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) : N Signalé nicheur dans les gorges de la Jonte près de Meyrueis et sur le CM (JB). Dates de retour précoces : 1 le 10/04/79 à Meyrueis CM et 1 le 6/04/81 à Vebron CM (JB). Noté en général seulement dans la seconde quinzaine d'avril. Dates tardives en automne : 1 les 25/10 et 3/11/77 à Vebron CM (48) et 1 le 13/10/78 à Revens Causse Noir (30) (JB).

Quelques observations permettent de supposer la présence d'autres points de nidification : 1 les 11 et 12/05/76 à Montbrun (48) (JB, JP), 1 le 13/05/76 sur le Mt Lozère (HG), 1 le 30/06/79 à Revens (30) (anonyme), 1 le 19/08/80 à St-Chély-du-Tarn (48) (Lang et Kapps in COA, 1981), 1 le 14/08/82 au col de Finiels sur le Mt Lozère (B, H), 1 le 29/06/82 sur le CM à St-Pierre-des-T. (JB) (48), 1 le 29/08/82 à Revens Causse Noir (30) (MM) et 1 cht le 14/05/83 à Prévencières (48) (DB).

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : N Retenons 1 im. blessé et mort par la suite à St-Jean-du-Gard (30) le 28/07/76 (DF), et 1 couple dont la F couve dans une aire d'Aigle royal dans les gorges du Tarn le 5/04/78 (DB, DPR).

Tétras lyre (*Tetrao tetrix*) : N?? Une tentative d'introduction a été réalisée par le PNC. Des oiseaux ont été lâchés sur le Mt Lozère et dans le massif de l'Aigoual.

Grand tétras (*Tetrao urogallus*) : N?? Une tentative d'introduction a également été réalisée par le PNC, mais dans le Bougès.

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) : N Notée à Florac le 1/11/76; à St-Julien-d'Arpaon 3 le 3/11/76 (CB). Nicheuse sur le CM : 1 + 12 jeunes à Meyrueis le 12/08/82 (H, B); 1 famille à St-Pierre-des-Tripiers le 29/08/82 (MM).

Données trop fragmentaires pour cerner le statut de cette espèce.

Perdrix grise (*Perdix perdix*) : N Quelques observations intéressantes si elles ne proviennent pas de lâchers : NG 8 œufs le 19/06/74 à Ste-Enimie sur le Causse Sauveterre, 1 le 24/06/74 à St-Chély-du-Tarn CM (MG), 2 le 3/03/77 à Vebron CM (JP), 2 le 22/05/78 à Pont-de-Montvert sur le Mt Lozère (Devès, Déjean), 9 le 20/01/80 à Hures-la-P. CM (JB), 1 + 3 juv. le 10/08/81 sur le CM (anonyme). Statut régional à préciser comme dans tout l'intérieur du Massif Central où la régression des deux perdrix est alarmante.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) : N en particulier sur les Causses.

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*) : N?? Seulement 2 observations : 1 M le 7/05/78 à Grizac dans le Bougès (JMF) et 1 le 16/05/81 sur le CM (JB).

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : 1 les 26/01 et 4/02/73 sur le Tarnon à Florac (HG) (48).

Poule d'eau (*Gallinula chloropus*) : 1 le 20/01/73 sur le Tarnon à Florac (HG) (48).

Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*) : N Connue nicheuse qu'en 2 points sur le CM. Les premiers oiseaux sont notés vers le 20 avril : à Meyrueis 4 le 18/04/77 (JB), à Hures-la-P. 2 M le 18/04/78 (JB, JP), 1 couple le 18/04/80 (JB) et 2 M le 19/04/81 (DB). Sur ce dernier site il ne semble pas y avoir plus de 2 M en période de reproduction : ainsi 2 M chanteurs le 9/07/82 (DB). Pour le site de Meyrueis 2 couples sont signalés en 1981 (B). Les dernières observations se font en septembre. Date tardive : 6 le 10/09/78 à Meyrueis (JB) (48).

Œdicnème criard (*Burhinus oedipnemus*) : N sur les Causses. Les premiers sont notés en avril, parfois en mars. Dates précoces : 1 le 4/04/77 à St-Chély-du-Tarn CM (LP), à Hures-la-P. CM 1 les 9/04/79, 29/03/80 et 3/04/81 (JB). En automne des bandes se forment : à Hures-la-P. CM 40 le 13/09/74 et une quarantaine le 18/09/75. Les observations les plus tardives sont du 11/10/78 avec environ 40 à Meyrueis CM (JB) et 2 à St-Etienne-du-Valdonnez Causse Sauveterre (HG). Notons 1 nid en éclosion le 1/06/76 à Montbrun CM (HG) (48).

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*) : 1 le 24/04/83 à Hures-la-P. CM (JB) (48).

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*) : Toutes les observations ont été faites sur le CM. L'espèce n'est pas notée chaque année mais elle l'est parfois en nombre toujours au passage en octobre et novembre.

En 1974 11 le 22/10 à Florac, 55 le 25/10 à Vebron et 9 le 21/11 à Florac (LP). En 1975 à Meyrueis environ 100 le 18/10, 150 à 200 le 29/10, 1 le 4/11 et 3 le 7/11 (JB, LP). En 1980 2 le 25/03 à Hures-la-P. Enfin en 1982 à Vebron 6 le 2/10 et 11 le 30/11 (JB) (48).

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) : Seulement 14 observations depuis 1971, la plupart faites sur les Causses en décembre, janvier, février et mars : 1 le 7/03/71 à Florac (HG), 40 le 27/12/73 à Hures-la-P. CM (LP), 1 le 14/01/76 CM (JB), 6 à 8 le 28/12/76 à Ste-Enimie Causse Sauveterre (JP), 1 le 4/12/77 à Montbrun CM, 1 le 5/02/79 à Hures-la-P. CM (JB), 5 le 14/02/79 sur la Can-de-l'Hospitalet (HG), environ 60 en vol le 16/02/79 à St-Pierre-des-T. Jonte, 4 les 5 et 9/02/80 à Hures-la-P. CM (AA, JB), au même endroit 2 le 7/12/80 (JB) et environ 30 le 8/03/83 (HG) (48).

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : Quelques rares données : 1 le 6/09/69 sur la Can-de-l'Hospitalet, 2 le 10/01/71 à Florac, 1 le 17/09/71 à St-Etienne-du-Valdonnez Mt Lozère, 1 le 17/04/72 à Vebron CM, 1 le 23/10/73 à Pont-de-Montvert Mt Lozère et 1 le 16/11/82 sur la Can-de-l'Hospitalet (HG) (48).

Bécasse (*Scolopax rusticola*) : N Signalée aux passages de mars et novembre : dans les Cévennes 2 les 5, 7 et 19/03/76 à Molezon (DF), 1 le 16/03/77 à St-Julien-d'Arpaon (DF, CN) et 2 à Molezon le 11/11/77 (DF); dans les gorges du Tarn 1 à Florac le 24/11/76 (RB) et sur le CM 1 à Montbrun le 27/11/79 (JB, JP). Un NG 4 œufs le 1/04/74 à St-Pierre-des-T. CM (HG) et signalé présent en période de reproduction en 1983 dans le Bougès (CN) (48).



Oedicnème criard (Photo D. BRUGIERE)

Courlis cendré (*Numenius arquata*) : 2 le 21/08/73 à Meyrueis CM (LP) et 1 le 2/10/81 à Hures-la-P. CM (JB) (48).

Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : Sur le Mont Lozère 2 les 16 et 17/04/75 à Fraissinet-de-Lozère et 1 le 23/04/75 à St-Julien-du-Tournel (HG) (48).

Chevalier cul-blanc (*Tringa ochropus*) : 1 le 30/08/73 à St-Etienne-du-Valdonnez Mt Lozère (CN), 1 le 29/07/75 à Vebron CM (HG) et 1 le 5/05/82 à Hures-la-P. CM (JB) (48).

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : 2 le 8/07/82 à St-Etienne-du-V. Mt Lozère (DB) (48).

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : N seulement sur une partie du Tarn et peut-être également le long des Gardons. Ainsi : à Ispagnac 1 couple chanteur le 20/04/81 (DB), à Quézac TN le 25/05/74 (HG) et 1 avec pul. alarme le 10/07/83 (DB). Date précoce : 1 le 3/04/72 sur le Tarn (HG). Date tardive : 1 le 24/09/73 à Florac (HG) (48).

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : 5 le 31/12/70 à Mende (HG), 3 le 11/07/78 à Vebron CM, 1 le 23/02/79 à Hures-la-P. CM (JB), le 9/11/82 20 à St-Julien-du-Gourg (HG) et 1 à Hures-la-P. CM (JB), et 1 le 21/03/83 à Hures-la-P. CM (JB, CV) (48).

Goéland argenté (*Larus argentatus*) : 3 le 21/06/75 au Col de Perjuret (Fraissinet-de-F.) (JB); le 8/11/82 2 dans la Jonte et environ 100 à Hures-la-P. CM (JB) (48).

Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) : 1 juv. récupéré épuisé au sommet du Mt-Aigoual le 9/01/74 (48) (LHERITIER et PLOMBAT, 1975).

Pigeon biset (*Columba livia*) : N dans les falaises des gorges du Tarn et de la Dourbie.

Pigeon colombin (*Columba oenas*) : N Mis à part une observation d'un le 7/02/82 dans la Jonte à Meyrueis (JB), le retour est en général noté dans la dernière dizaine de février. Dates précoces : 1 les 20/02/78 et 18/02/80 dans la Jonte (LP, JB). Date tardive : 1 à la Salle-Prunet (Bougès) le 15/11/71 (HG) (48).

Pigeon ramier (*Columba palumbus*) : N Le passage prénuptial est sensible dès le début mars : 30 puis environ 100 le 6/03/78 dans la vallée du Tarn du Barrage de la Vernède (JMF, AR), 15 le 2/03/79 dans la Jonte à St-Pierre-des-T. (LP), environ 30 le 4/03/80 sur la même commune et 3 vols de 50 le 4/03/82 à St-Georges-de-Lévêjac (JB). Au passage post-nuptial : 12 le 3/11/78 à Meyrueis dans la Jonte, 50 à Montbrun CM le 20/11/80 et 100 le 10/10/82 à Hures-la-P. CM (JB) sont les observations les plus tardives. A cependant été noté en janvier entre 1953 et 1970 à Florac (DUCKERT, 1980).

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : N Dates précoces : 1 le 11/04/79 à Vebron CM (JB), 1 le 22/04/76 à Cassagnas dans les Cévennes (DF) et 1 le 26/04/80 à Hures-sur-la-P. CM (JB). Remarquons 1 le 1/06/77 sur le CM (HG) (48) et chant le 9/07/83 à Nant (DB) (12).

Coucou-geai (*Clamator glandarius*) : 1 juv. en 07/75 sur le CM (J.N. LHERITIER), 1 juv. le 26/08/78 à St-Laurent-de-Trèves (JP, LP) (48).

Coucou-gris (*Cuculus canorus*) : N Dates précoces : 1 le 12/03/79 à St-Roman-de-Tousque dans les Cévennes (PB), chts aux Vignes dans le Tarn le 6/04/77 (LP) et 1 le 9/04/82 dans la Jonte à St-Pierre-des-T. (JB). En nidification retenons 1 jeune déjà volant nourri par 1 couple de Rouge-queue noir le 26/07/78 à Fraissinet-de-F. CM (JB).

Chouette effraie (*Tyto alba*) : N.

Hibou petit-duc (*Otus scops*) : N Dates de retour précoces : 1 le 22/03/73 dans la Jonte (HG), 1 cht le 30/03/80 à Hures-la-P. CM, 1 le 3/04/78 à Vebron CM et 2-chts le 14/04/79 à Hures-la-P. CM (JB). Observations tardives : plusieurs tués les 14 et 15/09/73 sur le CM (HG) et 1 mort le 4/09/77 à Hures-la-P. CM (LP). Notons 1 le 10/04/74 aux Bondons Mt Lozère (HG) (48).



Hibou grand-duc (Photo G. PRUDENT)

Hibou grand-duc (*Bubo bubo*) : N Retenons 1 F électrocutée le 29/03/78 à Meyrueis Jonte (LP, PL) (48).

Chouette chevêche (*Athene noctua*) : N Fréquente sur les Causses. TN les 8/07/72 à Montbrun CM (HG) et 7/07/83 à St-Etienne-du-V. C. Sauveterre (DB) (48).

Chouette hulotte (*Strix aluco*) : N 2 nichées de 2 et 3 jeunes à 300 m de distance le 13/05/76 à Florac (HG) (48).

Hibou moyen-duc (*Asio otus*) : N Hivernage régulier dans les bois de pins du CM (JB), NG le 6/04/75 sur le CM et 2 nichées avec jeunes le 15/06/83 à Florac (HG) (48).

Hibou des marais (*Asio flammeus*) : 1 le 12/04/79 à Hures-la-P. CM (JB) (48).

Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) : N Signalé en période de reproduction dans le Bougès vers 1 080 m à Pont-de-Montvert en 1975 (RB), dans les gorges du Tarn, de la Jonte, les Cévennes et sur le Mt Lozère. Notons 3 observations tardives : 1 le 27/09/71 à Fraissinet-de-Lozère Mt Lozère (HG) et 1 M les 26 et 28/09/80 à Hures-la-P. CM (JB). Pas d'observation réellement précoce, la première étant du 6/05/78 avec 3 à Cocurès (AR) (48).

Martinet noir (*Apus apus*) : N Dates précoces : 1 le 20/04/81 à La Malène (DB) et 30 le 28/04/78 à Pt-de-Montvert (BC). Une colonie rupestre avec environ 50 ind. le 9/07/83 à St-Pierre-des-T. Jonte (DB) (48).

Martinet alpin (*Apus melba*) : N Curieusement aucune donnée de fin mars, les plus précoces étant : 1 le 14/04/79 à La Roque-Ste-Marguerite (JB) (12), 3 à Hures-la-P. Jonte le 21/04/81 (DB) (48), 4 le 9/04/82 à St-Pierre-des-T. Jonte (J. CITOLEUX). Notons environ 50 le 9/09/74 à St-Pierre-des-T. Jonte (YB) et 2 à La Canourgue le 6/07/83 (DB).

Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*) : N notamment au bord du Tarn.

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 2 à Dourbies le 17/08/76 (GV) (30), 2 à Montbrun CM le 11/06/77 (anonyme) et 1 à Ispagnac le 12/05/83 (DB) (48).

Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) : 1 le 14/08/75 à Vebron CM (JB, LP), 1 le 5/09/76 à Vebron CM (YM, PP) et 1 le 26/05/77 à Bassurels dans l'Aigoual (JB) (48).

Huppe fasciée (*Upupa epops*) : N Dates précoces : 1 le 17/03/77 dans la vallée du Béthuzon dans l'Aigoual, 1 le 14/03/79 à Vebron Gorges Tarnon (MB, PG), 1 le 17/03/80 à Hures-la-P. CM (AA), 1 le 12/03/81 aux Vignes (SP) et 1 le 11/03/83 à St-Pierre-des-T. CM (JB). NG avec nourrissage dans le mur d'une maison habitée le 23/06/73 à Vebron CM (HG) (48).

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : N Dates précoces : cht les 10/04/76 et 4/04/77 à Pont-de-Montvert et 12/04/78 à Badaroux (JB). Un cht tardif à Ispagnac le 10/07/83 (DB) et TN à Quézac le 29/06/72 (HG) (48).

Pic vert (*Picus viridis*) : N.

Pic noir (*Dryocopus martius*) : N Noté régulièrement dans le massif du Bougès et le nord des Cévennes dans la vallée de la Mimente (RB). Bien que signalé seulement en novembre 75 dans la vallée du Tarn sur St-Pierre-des-T. et les Vignes (HG, CB), l'espèce y est présente en période de nidification. Signalé aussi dans les forêts du Mont-Aigoual, et les vallées de la Jonte et de la Dourbie (48 et 12) (DB). Notons 2 dont 1 chanteur le 15/07/83 dans une châtaigneraie à St-Jean-Chazorne (DB) (48).

Pic épeiche (*Dendrocopos major*) : N.

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*) : N Très peu signalé : en 07/72 dans la vallée de Paillère près Villefort (48) et dans le Bois de Païolive (Les Vans) (07) (Van Esbroeck J.), 1 le 8/02/76 à Ste-Croix Vallée Française (DF) et 1 le 29/07/76 et les 11 et 13/08/82 à Cocurès (H, B). L'espèce est présente dans les ripisylves comme celles des gorges du Tarn (DB) et dans les châtaigneraies (HG) (48).

Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*) : Observation exceptionnelle d'une le 21/05/76 à Vebron CM (JLT, JP) (48).

Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) : N Signalée nicheuse sur le CM (Duckert, 1971) l'espèce y est très localisée, localement abondante (DB, DR). En 1981 elle a été trouvée sur le Causse Sauveterre où elle n'était pas connue : 3 chts et 1 en TN à Ste-Enimie le 6/07/81 ; en 1982 au même endroit 1 cht et 1 alarme le 6/07. Sur le CM en 1983 NG 4 œufs le 8/07 à Ste-Enimie (DB) (48).

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : N Aucune donnée hivernale mais l'espèce a été signalée par DUCKERT (1980) près de Florac dans la 1^{re} décade de janvier entre 1953 et 1970. Le retour est sensible dès février ; dates précoces : 1 cht à Montbrun CM le 28/01/72 (HG), 1 cht à Pont-de-Montvert Bougès le 5/02/77 (RB), nombreux chts le 8/02/77 à Gatuzières et Fraissinet-de-F. CM, 1 le 10/02/80 CM et 1 cht le 1/02/82 à St-Pierre-des-T. Jonte (JB). Notons 2 chants le 16/10/79 à Vebron CM (JB) (48).

Alouette des champs (*Alauda arvensis*) : N.

Hirondelle des rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) : N Dates précoces : en 1976 1 le 26/02 à Meyrueis Jonte (48), en 1977 2 le 9/02 à Rivière-sur-Tarn (12) (JB) puis 1 le 21/02 à Meyrueis (48) (LP, JB) et 2 le 27/02 à St-Germain-de-Calberte (YM), en 1978 5 le 27/02 à Meyrueis (48), en 1980 1 le 14/02 à Trèves (30), en 1981 2 le 5/03 à Meyrueis (48) et en 1982 2 le 3/03 à St-Pierre-des-T. (JB). Dates tardives : 16/10/75 aux Vignes (HG), nombreuses le 15/10/77 à Meyrueis (JB) et notée le 15/10/82 dans les Cévennes (HG). Une seule donnée hivernale mais dans l'Hérault : 6 le 10/01/73 à St-Guilhem-le-Désert (anonyme).

Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*) : N Signalée nicheuse en extension sur les Causses (HG). Dates précoces : 1 le 2/04/79 à Meyrueis CM (LP), 1 le 29/03/80 à Hures-la-P. CM et 1 le 2/04/82 à St-Pierre-des-T. CM (JB). Dates tardives : 19/10/76 à Ispagnac et 18/10/82 à Florac (HG) (48).

Hirondelle rousseline (*Hirundo daurica*) : 1 à 3 le 22/05/79 à Meyrueis Jonte (Lhéritier in COA, 1980).

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) : N Pas connue nicheuse sur le CM. Nombreuses colonies rupestres dans les vallées. Dates précoces : 2 aux Vignes le 6/04/77 (LP) et 5 à 10 le 8/04/78 à Meyrueis (JP). Date tardive : 1 aux Vignes le 16/10/75 (HG) (48).

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : N commun sur les Causses. Ailleurs retenons 1 cht à Prévenchères le 15/07/83 (DB) et sur le Mt Lozère où il a été observé au cours de l'été 83 (B), 1 cht les 10 et 15/07/83 à St-Etienne-du-Valdonnez à 1 400 m d'altitude (DB). Date précoce : 2 le 19/04/81 à Hures-la-P. CM (DB) (48).

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) : N Date précoce, le 15/04/82 à Florac. Migration notée du 1^{er} au 7/08/82 sur le Mt Lozère au Col de Finiels (HG).

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) : N sur le Mt Lozère. TN et NG 4 œufs à St-Julien-du-Tournel le 10/07/83 (DB). Hiverné un peu partout dans la région (HG).

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) : N sur le Mt Lozère : cht le 23/07/80 à Pont-de-Montvert (B) et le 26/07/81 au Pic de Cassini (DB) ; 2 + 1 juv. au Col de Finiels le 14/08/82 (H, B) ; à St-Etienne-du-V. 2 le 12/05/83 mais pas sur un site de nidification (DB). Noté de passage dans le Bougès le 25/03/72 (HG) (48).

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) : notée le 20/9/70 à Ste-Enimie-Sauveterre, 15 à Hures-la-P. CM le 24/4/72, plusieurs dans le Bougès les 15 et 16/5/74, notée à Ste-Enimie-Sauveterre le 29/4/76, 3 le 15/4/77 à St-Pierre des T. CM (HG), 5 à Hures-la-P. CM le 19/4/81, 1 à Ispagnac le 20/4/81, 1 à Ste-Enimie-Sauveterre le 22/4/82 (DB), notée du 1^{er} au 7/8/82 sur le Mt Lozère (PNC) et 1 le 10/7/83 à St-Etienne-du-V. Mt Lozère (DB) (48).

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) : N.

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) : N Une seule observation hivernale avec 1 le 24/1/77 au dépôt d'ordures de Ste-Enimie (HG), mais l'hivernage a été noté près de Florac entre 1953 et 1970 (DUCKERT, 1980). Retour en général fin février début mars. Dates précoces : 25/2/76 à St-Etienne Vallée Française (HG) et 1 le 6/3/79 à Fraissinet-de-Lozère (BC). Mais de 1971 à 1977 le retour à Florac et sur le Tarn a été noté entre le 20 et le 30/1 (HG). En post-nuptial passage noté jusqu'en octobre : 20 le 16/10/76 à La Malène CM (HG) et nombreuses le 10/10/82 à Hures-la-P. CM (JB). Quelques données tardives : à Florac 1 les 20/11/75, 20/12/76, 24/12/77 et 5/12/78 (HG) (48).

Cinacle plongeur (*Cinclus cinclus*) : N.


Troglodyte (*Troglodytes troglodytes*) : N.

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) : N.

Accenteur alpin (*Prunella collaris*) : Hivernant régulier dans les zones rocheuses, il est de ce fait plus abondant dans les causses, mais il a été noté sur le Mt Lozère, dans l'Aigoual et les Cévennes. Les premiers arrivants sont notés à la mi-octobre. Dates précoces : le 11/10/71 à Florac (HG), 24 le 15/10/76 à Meyrueis (48), 1 le 24/10/77 sur le versant sud de l'Aigoual (30), 1 le 21/10/78 CM (48), 7 le 21/10/79 à Meyrueis, 1 le 26/10/81 à Hures-la-P. et 10 le 17/10/82 à Florac CM (JB). Date la plus tardive : 1 le 28/3/77 à St-Georges-de-Lévêjac (48) (DB).

Rougegorge (*Erithacus rubecula*) : N.

Rosignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : N Arrivée générale vers le 20/04. Date précoce : 1 le 10/04/74 à Ispagnac (HG). Sur le CM cht régulier jusqu'à 1 000-1 050 m (RB, DB) (48) sur le Mt Lozère à Génolhac cht à plus de 1 200 m le 15/07/83 (DB) (30).



Chevalier guignette au nid (Photo D. BRUGIERE)

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : N Dates tardives : 1 le 26/10/75 sud Mt Aigoual (30) et plusieurs le 5/11/76 à Hures-la-P. CM (48) (JB). Dates de retour les plus précoces : 1 à Vebron le 11/03/76 (48), 1 à St-André-de-Valborgne (30), 1 à Hures-la-P. (48) et 1 à Gatuzières le 4/03/77, 10 aux Vignes le 10/03/78 (48), 1 M le 7/03/80 à Trèves (30) et 1 M à Vebron le 6/03/81 (48) (JB). Quelques données hivernales : à Florac 1 les 2/01/71 et 15/12/76 (HG) et à Ste-Enimie 2 le 2/12/82 (JB).

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) : N Dates précoces : 1 M le 12/04/76 à Vebron CM (JB) et 1 le 29/03/78 à Meyrueis (LP). Mais le retour s'effectue surtout fin avril début mai. Dates tardives : 1 M le 12/11/75 à Bassurels (JP) et 1 le 26/10/77 au Mt Aigoual (LP) (48).

Traquet tarier (*Saxicola rubetra*) : N Peu d'observations, aux passages retenons : 1 le 17/05/78 à Meyrueis CM (LP), 1 couple le 19/04/81 à Hures-la-P. CM (DB) et 1 à Florac CM le 15/08/82 (H et B). Date tardive : 1 le 21/09/73 sur le Mt Lozère (HG) (48).

Traquet pâtre (*Saxicola torquata*) : N Les observations d'un les 15/11/75 et 3/02/76 à Florac (HG), peuvent laisser supposer un hivernage. Autrement le retour est noté en mars ou parfois en février. Dates précoces : 1 le 22/02/77 à Meyrueis-Jonte (JB) et 1 M le 13/03/79 à Meyrueis CM (LP) (48).

Traquet motteux (*Cenanthe cenanthe*) : N Mis à part 3 données de mars toutes les observations les plus précoces ont été faites en avril. Dates précoces : 1 le 7/04/76 à Fraissinet-de-F. CM (JB), 2 le 5/04/77 à Fraissinet-de-F. CM (LP) 1 M les 20 et 21/03/79 à Meyrueis CM (Cochet et Joubert in COA, 1980 et JB), 1 les 29/03/80 et 5/04/81 à Hures-la-P. CM (JB). En automne les observations les plus tardives sont faites en octobre, exceptionnellement en novembre : 1 jeune le 12/11/77 CM et 1 le 31/10/78 à Vebron CM (JB) (48).

Traquet oreillard (*Cenanthe hispanica*) : N Sur le CM, le 12/7/79 1 M stapazin à St-Chély du Tarn, le 14/07/80 1 M stapazin et 3 ou 4 juv. à Ste-Enimie, le 30/07/80 1 M stapazin à Hures-la-P., le 14/07/81 1 famille stapazin revue sur le site de Ste-Enimie, en 1982 NG 3 pul en juillet (M stapazin) et NG 3 pul fin juillet à Hures-la-P. (M. oreillard), et en 1983 1 famille en juillet à Ste-Enimie et les 20 et 30/07 au moins 7 familles sur Hures-la-P. (B,H), le 8/07 1 couple à Ste-Enimie et 2 ou 3 M (dont 2 stapazin) dont 1 nourrit 2 jeunes voletant à Hures-la-P. (DB) (48). Ailleurs 1 M le 1/06/81 à Trèves (AUSTRUY in COA, 1982).

Merle de roche (*Monticola saxatilis*) : N Dates précoces : le 5/05/76 couples à Florac, Hures-la-P. et Vebron CM (LP), le 28/04/78 1 couple sur le Mt Lozère près de Finiels (BC), le 4/05/79 1 à Hures-la-P. CM (JB) (48), le 24/04/82 1 M au Caylar sur le Larzac (34), le 23/04/82 2 M dont 1 chante à Palhers (48) (DB) et le 24/04/82 1 M à Meyrueis CM (JB).

Nicheur sur le Mt Lozère et sur les différents causses. Il se reproduit également dans les gorges comme au col de Perjuret (Fraissinet-de-F.) où 1 couple en TN est vu le 11/07/82, et dans les hautes gorges de la Borne où 1 couple nourrit 1 juv. à Prévencières le 15/07/83 (DB). Dans les Cévennes parade nuptiale le 9/05/83 (SH) et 1 couple nourrit 1 juv. le 17/07/83 à Barres-des-Cévennes (DB). Dans le Bougès l'observation de 2 ind. le 3/08/81 et d'un M le 13/08/81 à St-Julien-d'Arpaon est-elle en rapport avec la nidification ? (anonyme). Même remarque pour celle d'un M le 15/05/83 au Barrage de Villefort (DB). Date tardive : 1 le 18/9/75 sur le CM (HG) (48).

Merle bleu (*Monticola solitarius*) : N C'est un nicheur bien répandu dans les gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie (48, 12, 30) (BRUGIERE et BONNET, 1983). Il était déjà signalé en 07/72 au Point Sublime dans les gorges du Tarn (VAN ESBROECK) (48). En dehors de ces gorges l'espèce est connue des gorges du Chassezac où un couple en nourrissage est observé en 07/72 vers les Vans (07) (VAN ESBROECK), 1 couple en TN le 9/04/82 à la Garde-Guérin (COCHET in COA, 1983) (48) et 1 M chanteur le 15/05/83 à Prévencières (DB), des gorges de la Borne avec 1 M le 15/05/83 à Montselgues (07) (DB) et des gorges de l'Allier avec 1 M le 11/04/82 au Barrage de Villefort (COCHET in COA, 1983) (48) et 1 M le 15/07/83 à Prévencières (DB).

Merle à plastron (*Turdus torquatus*) : N sur le Mt Lozère et à l'Aigoual. L'espèce est très commune lors de ses passages en mars et avril ainsi qu'en octobre et novembre. Dates précoces : 2 le 27/02/77 à Florac CM (JP), 1 le 11/03/77 à Gatuzières dans l'Aigoual (JB), plusieurs le 11/03/78 sur le Mt Lozère (JMF), 1 le 7/03/79 à Meyrueis CM (LP), 2 le 10/02/80 et 7 le 19/02/81 à Meyrueis CM et 7 le 5/02/82 à Hures-la-P. CM (JB). Le passage continue jusque dans la seconde quinzaine d'avril, exceptionnellement début

mai. Dates tardives : 1 le 29/04/80 à Gatuzières CM (JB), 1 le 22/04/82 à Ste-Enimie Causse Sauveterre (DB) et 4 M le 3/05/81 à Florac (JB). Il reprend en septembre ou plus souvent en octobre, pour se terminer en novembre : 7 le 27/09/79 à Meyrueis CM (JB), 2 le 16/11/75 à Hures-la-P. CM (JP), 1 le 14/11/76 à Meyrueis-Aigoual, 1 le 18/11/77 à Meyrueis CM et 1 le 14/11/82 à Vebron CM (JB) (48).

Merle noir (*Turdus merula*) : N.

Grive litorne (*Turdus pilaris*) : Très peu d'observations rapportées, mais hivernant régulier en altitude (HG). Les observations les plus précoces se font en septembre, octobre ou seulement novembre : 15 à 30 le 1/11/75 sur le CM, 1 le 17/09/78 à Montbrun CM (HG), 15 à Florac le 22/11/79 et plusieurs le 14/10/81 sur le CM (JB). Date tardive : 19/03/82 sur le Mt Lozère à Pont-de-Montvert (HG) (48). Hivernage en plus faible nombre depuis 1975 (HG).

Grive musicienne (*Turdus philomelos*) : N.

Grive mauvis (*Turdus iliacus*) : Très peu d'observations : 15 le 2/11/77 à St-Julien-du-T., 20 le 19/02/79 à Florac (HG), 70 le 7/03/79 à St-Pierre des T. CM (LP), 2 le 8/02/80 à Meyrueis CM (JB) et notée le 10/03/80 à Quézac (HG). Date précoce : le 22/10/71 sur le CM (HG) (48).

Grive draine (*Turdus viscivorus*) : N Des bandes erratiques d'octobre à la mi-mars (HG).

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : N Connue seulement dans la vallée du Gardon de Ste-Croix notamment à Ste-Croix-Vallée-Française (48) (DF) et dans les gorges de la Vis (30) (DB).

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) : N ? 1 cht le 17/08/75 à Fraissinet-de-F. CM (48) (DB, DPR) et 2 chts le 13/08/77 à Nant dans la vallée du Durzon (12) (DB, PR).

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) : N Dans l'Aigoual notée en 07/72 à Bassurels (M. BROSELIN); sur le Mt Lozère cht le 17/07/83 sur Pt-de-Montvert (B); à Florac cht en 1983 (CB); connue aussi dans les Cévennes. Notons l'observation curieuse vu le milieu de 2 chanteurs dans des saulaies au bord du Tarn à Ste-Enimie le 27/06/76 (JB) (48).

Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*) : En ripisylve du Tarn à Florac, 1 capturée au filet les 23/05/70, 11/05/72 et 7/06/74 (HG); 1 cht bref d'oiseau de passage le 15/05/83 à Prévencières (DB) (48).

Hypolais icterine (*Hippolais icterina*) : 1 capturé au filet à Florac le 26/04/74 (HG) (48).

Hypolais polyglotte (*Hippolais polyglotta*) : N Retenons 1 cht sur le CM à Montbrun les 25/05/73 et 2/06/77 (HG) (48).

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) : N Quelques observations la plupart automnales ou hivernales : 2 le 27/10/75 à Ruas flanc sud Mt Lozère (CN) où elle est renotée le 27/11; 1 le 13/12/75 à Cassagnas Cévennes (CN), 2 le 11/11/76 à Meyrueis-Aigoual et 2 le 2/01/77 au Col du Bès dans l'Aigoual (LP), 2 le 28/02/77 à Barre-des-Cévennes (RB), 1 le 12/07/77 à Vialas Mt Lozère (YM), 2 le 5/11/77 à Meyrueis-Aigoual (LP) et 1 le 16/03/79 à Meyrueis-Aigoual (LP). Les limites de la répartition de cet oiseau sont à rechercher, il est signalé nicheur probable près de St-Julien-d'Arpaon (PNC, 1978) et nicheur certain dans les Cévennes, dans la vallée du Trabassac (PNC, CEPMA et COA LOZERE, 1975).

Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) : N Date précoce : 1 cht le 4/04/78 dans les gorges de la Vis (30) (DB, DPR). En dehors des causses où l'espèce est commune dans les gorges, retenons 1 cht le 26/05/80 à Pied-de-Borne (COCHET in COA, 1981).

Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) : N 1 morte le 7/12/76 au Vigan (PF).

Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) : N Mis à part les observations habituelles dans la vallée du Tarn et de ses affluents, l'espèce est connue sur le CM : 1 cht le 23/06/74 à Montbrun (MG), 2 dont 1 cht le 31/05/76 à Montbrun dans une plantation de résineux vers 1 000 m (LP) et NG le 28/06/77 à Montbrun-Causse-Sauveterre. Semble absente du Mt Lozère (HG) (48). Date tardive : 1 le 28/09/77 sur le versant sud du Lingas (YM).

Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*) : N Une famille le 16/07/75 à Montbrun CM et 1 ind. le 11/07/83 à Florac CM (B) (48).

Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : N Date la plus précoce : 19/04/75 à Florac (HG) (48).

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) : N Dates extrêmes des prises au filet à Florac : 5/05/71 et 23/09/72 (HG) (48).

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : N Retenons des observations tardives ou hivernales : à Florac notée en hiver entre 1953 et 1970 (DUCKERT, 1980), à Florac également 1 le 19/12/70, plusieurs le 3/01/71, 1 M et 1 F le 29/12/73 (48), 1 F le 31/10/75 à Peyreleau-Jonte (12) et 1 le 8/12/75 à Ste-Croix-Vallée-Française (48) (HG).

Pouillot de bonelli (*Phylloscopus bonelli*) : N Dates précoces : 1 cht le 16/04/80 à Millau (12) et 1 cht le 19/04/80 à La Malène et à Ste-Enimie (48) (DB).

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) : N 1 cht le 22/04/82 en ripisylve du Tarn à Ste-Enimie (DB) (48) concerne un migrateur.

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) : N Date de retour : 1 cht le 7/03/77 à Meyrueis (LP). Date tardive : le 13/10/72 sur le Mt Lozère (HG). Hivernage signalé près de Florac par DUCKERT (1980). Autrement noté également à Florac les 1/12/71 et 14/01/73 (HG) (48).

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : Noté au passage : en 1972 5 chts le 20/04 entre Florac et St-Julien-du-Gourg, 20 sur le CM le 24/04, nombreux au Rozier le 25/04 et noté à Florac le 26/04 (HG) (48); le 22/04/73 plusieurs captures à Nant (12) (COA); le 17/08/75 cht à Fraissinet-de-F. CM (DB, DPR) (48); le 22/04/82 2 chts à Ste-Enimie et 1 cht à Blajoux (DB); et cht le 14/08/82 au col de Finiels Mt Lozère (H, B).

Roitelet huppé (*Regulus regulus*) : N.

Roitelet triple-bandeau (*Regulus ignicapillus*) : N.

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : N.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : N 1 le 26/04/78 à Pont-de-Montvert (BC) (48), 1 M le 2/05/79 à St-Sauveur-des-Pourcils (30) (YR), 1 M le 13/04/80 à Meyrueis (JB) (48), 1 le 9/09/74 à Meyrueis (YB) et 1 F le 14/08/82 au Col de Finiels Mt Lozère (B,H). Mais l'espèce est fréquente au passage fin août début septembre (HG). Dans la vallée de la Borne 5 chts le 15/05/83 à St-Jean-Chazorne (DB).

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) : N.

Mésange nonette (*Parus palustris*) : N.

Mésange huppée (*Parus cristatus*) : N.

Mésange noire (*Parus ater*) : N.

Mésange bleue (*Parus caeruleus*) : N Le 1/10/78 passage par centaines sur le CM (HG) (48).

Mésange charbonnière (*Parus major*) : N.

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) : N.

Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) : Hivernant régulier dans les zones rocheuses, il est de ce fait abondant dans la région des Causses. Dates précoces : 1 le 11/10/71 à Florac (HG), 2 à Florac le 15/10/75 (LP), 1 à St-Pierre-des-T.-Jonte le 13/10/76 (JB, LP), 1 à Meyrueis le 31/10/77 (FP), 1 à Vebron le 16/10/78 (JB, LP), 1 dans la basse Jonte le 20/10/81, 1 à St-Pierre-des-T.-Jonte le 5/10/82 (JB). Les derniers oiseaux sont notés en mars. Dates tardives : 1 le 17/03/76 et le 13/03/77 à Ste-Croix-Vallée-Française (DF, YM) (48).

Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*) : N Connu des forêts du Mt Lozère (JAFFUEL in LOVATY, 1981). Il est plus que probable qu'il se trouve également dans le Bougès et l'Aigoual.

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) : N Des chanteurs notés jusqu'en limite forestière à plus de 1 500 m au Mt Aigoual le 11/07/82 (DB) (30, 48).

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) : N Signalé dans les ripisylves de la Jonte à Peyreleau, du Tarn entre Aguessac et Millau (JP, DB), dans la vallée du Durzon où 1 cht est entendu le 9/07/83 (DB) (12), dans la vallée de la Mimente à Barre-des-Cévennes où 1 cht est entendu le 29/04/82 (RB) (48). Au passage noté à St-Martin-de-Lansuscle le 8/05/75 (DF), à Hures-la-P. CM le 10/08/75 (LP), à Vebron le 15/09/76 (JB, LP), et sur la Route Royale dans les Cévennes le 2/05/83 (DF). Une donnée très tardive de migrateur : 1 le 28/05/83 à Florac (HG).

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : N Dates précoces : 1 le 5/05/71 à Hures-la-P. CM (HG), 1 le 12/05/76 à Fraissinet-de-F. (JLT, JP) (48), 1 le 10/05/77 à Lanuéjols (JB) (30), 1 le 11/05/80 à St-Pierre-des-T. CM et 1 le 6/05/83 à Ste-Enimie CM (JB) (48). Date tardive : 1 le 16/09/72 à St-Laurent-de-Trèves (HG). Ne semble pas dépasser 1 250 m en nidification sur le Mt Lozère (HG). Nidification à prouver dans les Cévennes et l'Aigoual.

Pie-grièche à poitrine rose (*Lanius minor*) : Observation tout à fait exceptionnelle d'une à Hures-la-P. CM le 9/01/79 (JB).

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : N Signalée hivernante tant sur le CM que dans les Cévennes. Nicheuse sur les Causses, sur le CM sous la forme meridionalis alors que la forme type est observée le 8/07/82 sur le Causse-de-Montbel (DB). Niche vraisemblablement sur le Mt Lozère (HG) (48).

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : N Nicheuse régulière à Florac et sur le CM. Semble absente du Mt Lozère et des Hautes-Cévennes. Dans l'Aigoual notons 1 le 17/05/78 à Gatuzières (JP). Date précoce : 1 le 28/04/77 à Florac (MD) (48).

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) : N Un exemple de migration : 30 puis 50 passent dans les gorges du Tarn au Rozier le 28/04/78 (48) (LP).

Pie bavarde (*Pica pica*) : N

Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) : N Après le cas de nidification noté en 1977 sur le CM (Lhéritier, 1978), l'observation de 2 oiseaux sur ce même Causse à Fraissinet-de-F le 19/08/82 mérite une attention particulière (MM). Autrement 1 le 4/09/75 à Servières (AA) (48).

Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) : N Retenons quelques chiffres importants : environ 100 le 14/08/74 à Meyrueis CM (YM), environ 100 le 26/07/76 à Hures-la-P. CM (B), plus de 80 le 13/08/78 à Hures-la-P. CM (YM, MD) et une colonie avec 57 individus (tous nicheurs ?) dans la Jonte à Meyrueis (DB, DR).

Choucas des tours (*Corvus monedula*) : N

Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) : 1 à Meyrueis CM le 6/11/76 (48) (JB).

Corneille noire (*Corvus corone*) : N

Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*).

Grand corbeau (*Corvus corax*) : N Retenons le chiffre d'au moins 107 ind. harcelant les Vautours fauves le 21/04/82 dans les gorges de la Jonte (DB), d'un NG dans un aven du CM le 28/03/72 (HG) et d'une aire en 1983 sur le Mt Lozère à Villefort à plus de 1 400 m (DB) (48).

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : N Passages habituels de mars et avril en petites bandes, mais 2 000 à Florac le 2/03/74 (HG).

Moineau domestique (*Passer domesticus*) : N.

Moineau friquet (*Passer montanus*) : N.

Moineau soulcie (*Petronia petronia*) : N Bien répandu sur les Causses où il niche dans les villages, mais aussi dans les falaises ou les avens ; ainsi : le 15/08/82 2 nourrissant dans l'aven de Drigas (Meyrueis) CM (B,H).

Niverolle des Alpes (*Montifringilla nivalis*) : Quelques observations prouvent que l'hivernage de cet oiseau exceptionnel dans le nord du Massif Central est plus régulier dans sa partie sud : 15 le 11/11/76 à Florac (HG), 1 le 24/01/78 à Meyrueis CM, 6 le 28/01/78 à Montbrun CM (JB, JP), environ 20 à Florac CM le 24/01/80 (JB, JLT), 1 le 28/03/82 à St-Pierre-T. (CB) et 1 le 9/11/82 à Florac (HG). Signalée durant l'hiver 81-82 au Mt Aigoual (JP, JLT) et dès l'hiver 72-73 sur le CM et le Mt Lozère (CHEYLAN, 1973).

Pinçon des arbres (*Fringilla cœlebs*) : N.

Pinson du nord (*Fringilla montifringilla*) : Noté en général d'octobre à mars. Dates précoces : le 14/10/72 à Montbrun CM (HG), 3 F le 20/10/75 à St-Julien-d'Arpaon (CN) et le 18/10/78 plusieurs sur le Mt Lozère (JMF, AR). Date tardive : noté le 29/03/76 à Vebron CM (YM). Deux chiffres importants : 400 le 17/01/71 à Cocurès (HG) et plusieurs centaines le 21/01/80 à St-Julien-d'Arpaon (RB) (48).

Serin cini (*Serinus serinus*) : N Dates extrêmes : à Florac 1 cht le 2/03/77 et 1 ind. le 25/10/71. Noté en nidification jusqu'à 1450 m sur le Mt Lozère (HG) (48).

Venturon montagnard (*Serinus citrinella*) : N sur le Mt Lozère et l'Aigoual. Sur le Mt Lozère 10 en 07/72 en dessous du Pic de Cassini (Van Esbroeck), des chts à St-Etienne-du-V. le 19/04/75, nombreux juv. à Vialas du 14 au 18/06/76 (HG), 5-6 le 15/07/76 en Ft des Laubies (B) et cht du 1 au 7/08/82 dans le Bois du Commandeur (PNC). Dans la vallée du Béthuzon (nord Aigoual) plusieurs chts le 3/03/79 (LP).

Verdier d'Europe (*Chloris chloris*) : N Retenons 3 tués par tendelle le 16/02/76 à Hures-la-P. CM (HG). Hivernant régulier en particulier sur les Causses et can. N'a pas été prouvé nicheur ailleurs que dans la vallée du Tarn (HG) (48).

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) : N.

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*) : Hivernant régulier sauf sur les Causses. Dates extrêmes : 1 le 1/10/75 dans les Cévennes (HG), noté le 18/04/76 à Mas-d'Oricières (RJ) (48) et 1 à Trèves le 18/04/80 (DB, DR) (30).

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) : N

Sizerin flammé (*Carduelis flammea*) : 1 le 9/01/73 au Vigan (30), 2 le 16/01/73 au Col de l'Exil (Cévennes) (O. BIBER) (48), 1 capturé le 23/04/73 à Nant (12) (COA) et 2 dans les Cévennes le 31/12/77 (DF).

Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*) : N Connu dans les forêts de conifères, que ce soit sur les Causses, le Mt Lozère, l'Aigoual ou le nord des Cévennes (forêts de Molézon et de Font-Mort) (48).

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) : N.

Gros bec (*Coccothraustes coccothraustes*) : N Très peu d'observations : 1 à Ste-Enimie le 18/06/74 (MG), 5 à St-Julien-d'Arpaon le 28/10/75 (CN), 2 à Florac le 18/01/76, 1 sur le Mt Lozère le 13/03/76 (HG), 2 à Hures-la-P. CM le 9/01/79 (JB) et 6 à Florac le 23/03/79 (S. Auclair).

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) : N Des chts jusqu'à 1600 m du 14 au 18/06/76 sur le Mt Lozère (HG) (48).

Bruant zizi (*Emberiza cirius*) : N.

Bruant fou (*Emberiza cia*) : N Un rassemblement de nombreux ind. le 16/04/75 sur le Mt Lozère à Fraissinet-de-Lozère dans un biotope inhabituel laisse supposer un mouvement migratoire (HG) (48).

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) : N Notons à Montbrun plusieurs NG découverts du 1 au 26/06/77 (MG) et 1 NG 4 œufs le 15/07/79 (DB, PR), à Prévencières cht le 15/05/83 (DB) (48).

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) : Noté au passage de printemps : 1 le 25/04/72 au Rozier, nombreux M et F le 15/03/74 à Fraissinet-de-Lozère, 1 M le 16/03/74 à Florac et 1 le 8/03/83 à Hures-la-P. (HG) (48).

Bruant proyer (*Miliaria calandra*) : N sur les Causses et peut-être à Florac (HG).

Synthèse réalisée par D. BRUGIERE
avec l'aide de J. DUVAL,
reliée et complétée par H. GUERIN et Y. MACCAGNO

BIBLIOGRAPHIE

- BRUGIERE D. et BONNET J., 1983 : Le Merle bleu (*Monticola solitarius*) en Lozère. **Le Grand-duc**, 22 : 26-28.
- CHEYLAN G., 1975 : les déplacements de la Niverolle (*Montifringilla nivalis*) et son hivernage en France méridionale. **Alauda**, 41 (3) : p. 213.
- COA, 1977 : Atlas des oiseaux nicheurs du Massif Central. **Le Grand-duc**, 10 : 209 p.
- COA, 1980 : Annales du Centre Ornithologique Auvergne. Période du 15/07/78 au 14/07/79. **Le Grand-duc**, 16 : 11-40.
- COA, 1981 : Annales du Centre Ornithologique Auvergne. Période du 15/07/79 au 14/07/80. **Le Grand-duc**, 18 : 33-68.
- COA, 1982 : Annales du Centre Ornithologique Auvergne. Période du 15/07/80 au 14/07/81. **Le Grand-duc**, 20 : 26-58.
- COA, 1983 : Annales du Centre Ornithologique Auvergne. Période du 15/07/81 au 14/07/82. **Le Grand-duc**, 22 : 39-60.
- DUCKERT R., 1971 : Notes sur l'Alouette calandrelle. **Le Grand-duc**, 1.
- DUCKERT R., 1980 : Observations faites dans le sud du Massif Central. 1^{re} communication : les oiseaux hivernant de la région de Florac (1953 à 1970). **Le Grand-duc**, 17 : 53-58.
- GUERIN H., 1977 : Inventaire provisoire des oiseaux nicheurs du sud-est du Mont-Lozère et des vallées environnantes. **Le Grand-duc**, 11 : 1-28.
- LHERITIER J. N. et PLOMBAT J. V., 1975 : Capture d'une Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) en Lozère. **Le Grand-duc**, 7 : 25.
- LHERITIER J. N., 1978 : Un cas de nidification isolé du Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) dans le Massif Central. **Le Grand-duc**, 13 : 27-32.
- LOVATY F., 1981 : Le Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*) et le Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) nichent en Lozère. **Alauda**, 49 (3) : p. 229.
- PNC, CEPMA et COA LOZERE, 1975 : Inventaire provisoire des oiseaux nicheurs et migrateurs des Cévennes. **Le Grand-duc**, 8 : 3-14.
- PNC, 1978 : Les oiseaux du Parc National des Cévennes. Cévennes, 11 et 12 : 1-84.
- ROCHON-DUVIGNEAUD A. (Dr), 1921 : Les grands rapaces des gorges du Tarn. Revue française d'Ornithologie. 142-143.
- YEATMAN L., 1976 : Atlas des oiseaux nicheurs de France. Société ornithologique de France et Ministère de la Qualité de la Vie et de l'Environnement. 282 p.

Manuscrit reçu le 26 octobre 1983.