

Observations de Vautours en Auvergne.

Romain RIOLS


Jusqu'en 2000, le Vautour fauve a été, soit exceptionnel en Auvergne (Allier et Cantal), soit occasionnel (Haute-Loire et Puy-de-Dôme). Pour le Vautour moine seulement 4 données étaient connues (BOITIER, 2000). Les deux espèces ont alors été mises dans la liste des espèces à homologuer par le CHR. Depuis cette date les observations de vautours ont commencé à augmenter.

Nous suivons donc depuis 2003 les observations de vautours en Auvergne : Vautour fauve et Vautour moine. Pour ce printemps 2008, il y a eu de nombreuses observations, toutefois bien moins régulières que lors des 2 années précédentes. La croissance exponentielle des données a donc été stoppée nette en 2008, probablement avant tout à cause des conditions météorologiques, exécrables en juin, principale période d'erratismes des vautours, car la saison 2008 commençait sur les chapeaux de roues avec la donnée la plus précoce enregistrée jusqu'à présent : un individu le 6 février, au Puy de Côme-63 (P. Alexandre).

Puis à nouveau une rare observation a lieu en mars, et 6 observations en avril (2 à 3 fois plus que les années antérieures). Le mois de mai connaît aussi un record avec 16 observations totalisant 69 oiseaux (contre 53 en 2007). Mais le mois de juin ne totalise que 27 données pour 163 ind. (contre 34 données pour 247 ind. en 2007) et le mois de juillet 4 données pour 10 ind. (contre 13 données pour 47 ind. en 2007). Enfin 3 observations sont faites en août et aucune en septembre...

Très rares en octobre, deux données de Vautours fauves viennent cependant de nous être transmises pour 2008 : 1 à Aurières-63 le 14 octobre (B Gilbert) et 1 à Perrier-63 le 15 octobre (M. et T. Bernard).

Les effectifs cumulés de 2003 à 2008 et la phénologie saisonnière d'apparition sont donnés dans les graphiques ci-après.



Comme chaque année, l'ensemble des observations ont lieu avant tout sur les différents massifs montagneux de la région (Mézenc, Cantal, Sancy, Chaîne des Puys, Forez) et sur les vallées profondes et les plateaux qui relient ces massifs (Gorges de la Loire, de l'Allier, de la Sioule, Pays des Couzes et Cézallier). Quelques observations ont été faites plus à l'ouest que d'habitude (Artense, gorges de la Rhue et de la Dordogne).

Une seule observation a été faite dans l'Allier (en montagne bourbonnaise), mais elle correspond au plus gros groupe noté en 2008 avec 30 oiseaux (E. Piéchaud).

Toutes ces observations s'inscrivent dans celles compilées récemment par TERRASSE (2006) et correspondent à des mouvements naturels de prospection des vautours au nord de leur aire actuelle de nidification, la plus proche de l'Auvergne étant celle des Grands Causses.

Bibliographie

BOITIER E., 2000. Liste commentée des oiseaux d'Auvergne. *Le Grand Duc*, hors série n°1, 132 p.

TERRASSE M., 2006. Evolution des déplacements du Vautour fauve *Gyps fulvus* en France et en Europe. *Ornithos*, 13 : 273-299.

Manuscrit reçu le 17 octobre 2008

☒ Romain RIOLS
LPO Auvergne
2 bis, rue du Clos Perret
63100 Clermont-Ferrand

