



Nidification de la Nette rousse en Auvergne : point en 2009

Arnaud TROMPAT et Jean-Pierre DULPHY

Contexte

En France un point récent sur le statut de cette espèce a été réalisé : elle conserve un statut de nicheur rare à l'échelle du pays avec une population estimée à 800 - 1000 couples dans les années 2000 (DUBOIS & al., 2008). Une augmentation numérique et territoriale est notée depuis les années 1990. L'Auvergne se situe à proximité du Forez où les premières nidifications constatées remontent aux années 1890. Actuellement cette population est estimée à 50 à 70 couples. A l'ouest de l'Auvergne, l'espèce est présente en Brenne en tant que nicheuse de manière sporadique depuis 1993. Cette population, qui a augmenté après 2002, est de l'ordre d'une dizaine de couples en 2006 (DUBOIS *et al.*, 2008).

En Auvergne, en 2000, la Nette rousse (*Netta rufina*) n'est pas notée nicheuse. Elle est cependant régulièrement notée, comme migratrice ou hivernante, toujours en petit nombre, sauf dans le Cantal (BOITIER, 2000). Un point plus précis, pour la période 1993-2003, a été fait en 2004. Le statut de l'espèce a été défini comme étant d'observation annuelle avec quelques individus (0-4) vus par année (FRENOUX, 2004). La première mention pour le Cantal date de 1999 avec une femelle à Ytrac (Henri Verne). La première nidification certaine en région Auvergne date de 2006 dans l'Allier. Elle a niché ensuite en 2009 dans le Puy-de-Dôme.

✓ Nidification dans l'Allier

L'étang où la nidification a eu lieu, sur la commune d'Ainay-le-Château, fait partie d'un ensemble qui comprend les étangs du secteur de la forêt de Tronçais. Sa situation au centre d'une propriété privée assure une quiétude importante au site. L'étang est géré dans l'optique d'une pisciculture traditionnelle. La chasse est pratiquée et les populations de Ragondin *Myocastor coypus* et de Rat musqué *Ondatra zibethicus* sont régulées. L'étang, d'environ 16 hectares, est d'une qualité assez exceptionnelle pour la région. Il est pourvu d'une roselière de Roseaux communs *Phragmites australis* d'une superficie d'environ 2 hectares répartie sur la partie sud-ouest et de radeaux de Nénuphars *Nymphaea alba* d'une superficie d'environ 1,5 - 2 hectares. Cet étang abrite aussi une population nicheuse de Fuligule milouin *Aythya ferina* et de Canard colvert *Anas platyrhynchos* et la population de Foulque macroule *Fulica atra* est importante (environ 180-200 individus après reproduction en 2006, 2007, 2008 et 2009).

Observations en période de nidification entre 2006 et 2009

En 2006, une femelle accompagnée de 9 canetons est observée le 7 juillet. Aucune observation n'avait eu lieu auparavant sur ce site par manque de prospection. Les canetons ont été revus le 18 juillet puis le 26 juillet avec un mâle en plumage d'éclipse. Le 30 août, un seul jeune volant était encore présent. La découverte tardive de cette nidification n'a pas permis d'obtenir plus de détails notamment sur la localisation du nid et la phénologie de la reproduction.

En 2007, aucune reproduction n'a été constatée malgré la présence de couples cantonnés. Le 11 mars 2007, 7 couples paraient sur le site puis ce nombre a diminué. Le 28 mars, 6 couples sont visibles. Un contrôle le 24 avril permet d'espérer une reproduction car 3 couples sont toujours cantonnés. Ils sont revus le 12 juin mais pas recontactés par la suite.

En 2008, 2 couples sont à nouveau cantonnés le 21 avril, mais le 13 juin il ne reste qu'une femelle seule. La reproduction n'a pas eu lieu cette année.

En 2009, 2 couples sont présents en mai (information du propriétaire) et le 4 juin, 2 mâles et une femelle sont observés suggérant que l'autre femelle est en train de couvrir. Le 18 juillet, une femelle suivie de 3 poussins d'environ 8 jours est vue. Le 1^{er} août, cette famille n'est pas revue et il est fort possible que les jeunes aient été prédatés mais ce jour une femelle suivie d'un jeune de moins de 8 jours est présente dans un des radeaux de nénuphars. Lors du contrôle le 31 août, seul ce jeune non encore volant est observé en train de se nourrir parmi un groupe de 32 Fuligules milouins et il sera revu une dernière fois le 18 septembre.

Pour résumer, entre 2006 et 2009, entre 2 et 3 couples cantonnés ont été vus en période de reproduction (mai et juin) mais une population plus importante allant jusqu'à 7 couples a été observée en mars et avril. La reproduction a eu lieu avec succès 3 fois produisant 13 jeunes (9, 3 et 1 jeunes) soit 4,33 jeunes par nid dont 10 (9 et 1) ont atteint le stade de l'envol soit 3,33 jeunes par nid. En ce qui concerne la phénologie de reproduction, les éclosions ont eu lieu la dernière décade de juin, la première décade de juillet et la dernière décade de juillet. Les mâles semblent désertier le site de nidification en juin, laissant les femelles seules s'occuper des jeunes.

✓ Nidification dans le Puy-de-Dôme

Le site est une ancienne gravière pourvue d'une île au milieu. La surface en eau est de 10-15 ha. La gravière n'est plus utilisée, une autre ayant été ouverte un peu plus loin. Elle est donc très calme, d'autant que l'accès au site est interdit. Le plan d'eau est entouré de grands arbres (ripisylve), mais il semble assez profond et ne présente pas de végétation flottante visible. Les oiseaux peuvent facilement stationner sur les bords, mais la végétation rivulaire est plutôt de nature terrestre. Il est très probable cependant qu'il existe une végétation importante au fond de l'étang, car c'est un site de reproduction et surtout d'hivernage de la Foulque *Fulica atra* et de fuligules *Aythya sp.*

Habituellement la Nette rousse est rare dans ce département, mais elle est parfois visible au passage.

En 2009 cependant des observations plus suivies sont faites dans la région de Maringues :

- ✓ 2 mâles et 2 femelles le 19 février sur Joze, tout à côté de Maringues (J.C. Lablanquie)
- ✓ 3 couples et un mâle les 17 et 21 mars sur un plan d'eau de Maringues (J.J. Lallemand et L. Maly)
- ✓ 1 couple aux Martres d'Artière, tout près de Maringues aussi, le 30 mars (J.C. Lablanquie)
- ✓ 2 couples sur le futur site de reproduction le 22 avril (L. Tailland)
- ✓ 1 couple le 23 mai sur un étang proche (J. Kerleaux).

Il est probable que ces oiseaux allaient d'un étang à l'autre et se sont finalement fixés sur celui où a eu lieu la reproduction.

Le 18 juillet lors d'un contrôle nous observons 2 mâles en éclipse, mais mal placé, nous ne pouvons pas voir d'éventuels autres oiseaux de cette espèce cachés derrière une île située au milieu du site. Le 25 juillet nous retournons donc sur place en changeant de point d'observation. Cette fois ci nous observons 4 mâles en éclipse, 9 oiseaux de type femelle, ou gros immatures, que nous n'avons pu distinguer. Heureusement en changeant encore de point d'observation nous notons une femelle accompagnée de 3 canetons âgés de 3 semaines environ.

Le 1 août, avec D. Peynet, nous notons 21 oiseaux : 1 femelle et 8 gros poussins, 4 mâles et 8 autres individus. Le 6 août P. Nicolas note 22 oiseaux, dont 3 mâles en éclipse. Le 8 août nous notons 4 mâles, toujours la femelle et ses 8 gros poussins, et 7 autres individus. Enfin le 26 août J.F. Carrias note encore 5 mâles et 5 femelles sur le site.

Il y a donc eu en 2009 au moins 2 couvées de 3 et 8 poussins de Nette rousse à Maringues. Les autres individus, jeunes et femelles mélangées, pourraient correspondre à une ou deux autres nichées. Au final on retiendra cependant le chiffre de 4 couvées pratiquement sûres et une quinzaine de jeunes. On ne saura jamais les valeurs exactes, faute d'un suivi plus précoce. Le 16 octobre aucune Nette n'était présente sur le site.

Cette reproduction est assez atypique par le milieu choisi. Cependant une reproduction a déjà été notée sur une gravière près de Dijon en 2006 (FAIVRE et FROCHOT, 2006). L'espèce s'est installée aussi il y a quelques années en Champagne humide où la population est en pleine expansion sur les gravières (jeunes) de la plaine du Perthois.

Discussion et conclusion

La découverte de la Nette rousse nicheuse en Auvergne s'inscrit donc dans une logique d'expansion géographique soulignée par DUBOIS *et al.* (2008) et noté depuis les années 1990 avec une accentuation dans les années 2000.

Une observation antérieure à celles relatées ici peut être la première reproduction certaine en Auvergne. Le 18 Août 2001, Henri Verne a observé un couple accompagné de 4 jeunes au lac du Pêcher, commune de Chavagnac-15. Aucune mention antérieure ou postérieure à cette date n'a permis de confirmer que la reproduction avait bien eu lieu sur ce site.

Cette note complète un texte à paraître dans l'Atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne (TROMPAT, *in prep.*). La nidification de 2006 n'a donc pas été exceptionnelle. Cependant la population concernée est très réduite et son avenir n'est pas évident.

Dans l'Allier il existe des étangs favorables, par exemple en Sologne bourbonnaise, même si ce secteur n'a pas été choisi en priorité, une prospection plus poussée étant cependant nécessaire. Par contre, dans le Puy-de-Dôme il y a normalement peu de sites favorables et la nidification constatée est une surprise. Elle montre que l'espèce dispose d'une certaine adaptabilité, dans la mesure où elle trouve un lieu avec de la nourriture et du calme ! Remarquons tout de même que les gravières jeunes peuvent être relativement favorables, mais qu'ensuite le colmatage risque d'y faire disparaître la végétation aquatique. Enfin, elle pourrait aussi s'installer sur les plateaux du Cantal, où des observations ont déjà été effectuées.

Dans sa synthèse FRENOUX (2004) indiquait que 0 à 4 individus étaient vus en Auvergne chaque année, avec deux maxima, août et octobre. Les années récentes modifient largement ce constat notamment 2009, avec la découverte d'au moins 5 nichées sur 2 sites.

NDLR

Hors les données utilisées plus haut il en existe quelques unes relatives au passage ou à l'hivernage de quelques oiseaux en 2009. Nous les donnons à titre de complément, même si elles ne sont pas nombreuses :

- ✓ 1 couple le 8 février à Valigny-03 (N. Deschaume)
- ✓ 2 mâles et une femelle à Parentignat-63 (M. Bernard) le 1 mai,
- ✓ 1 mâle le 5 octobre aux Martres d'Artière-63 (J.C. Lablanquie).

Bibliographie

BOITIER E., 2000. Liste commentée des oiseaux d'Auvergne. *Le Grand-Duc*, Hors série n°1, 132 pages.

DUBOIS J.D., LE MARECHAL P., OLIOSSO G., YESOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris, 559 p.

FAIVRE B., FROCHOT B., 2006. Reproduction de la Nette rousse *Netta rufina* sur une gravière près de Dijon. *Bourgogne nature* n° 3, pp 91-92.

FRENOUX J.M., 2004. Etat des populations d'anatidés en auvergne. *Le Grand-Duc*, 65 : 1-142.

TROMPAT A., (*in prep.*). La Nette rousse. *in* LPO Auvergne, *Atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne 2000-2006*.

Manuscrit reçu le 15 octobre 2009.

✉ Arnaud TROMPAT
Le Grand Villers
03350 Le Brethon

✉ Jean-Pierre DULPHY
Les Coteaux de Varennes
4 impasse des sapins
63450 Chanonat

