# Synthèse des données 2017 de faune-auvergne.org

## Sommaire


- → Oiseaux
- → Mammifères
- → Reptiles
- → Amphibiens
- → Libellules
- → Papillons de jour
- → Orthoptères
- → Mollusques


Photos : Nacré porphyrin (S. Heinerich), Sonneur à ventre jaune (E. Mautret), Ischnure élégante (P. Peyrache), Couleuvre verte et jaune (R. Riols), Escargot des jardins (R. Riols), Hermine (Y. Martin), Criquet ensanglanté (Romain Riols), Milan royal (C. Lemarchand)

AGIR pour la BIODIVERSITÉ AUVERGNE

# Les Oiseaux en 2017

# Synthèse des données de faune-auvergne

**430 410** données ↗ 8%*

**281** espèces ↗ 20*

**1147** observateurs ↗ 151*

*Comparé aux données 2016

**Nombre d'espèces par département :**




**Nombre de données par département :**

**1 255** communes




## Les espèces qui ont marqué 2017

Parmi les données les plus remarquables, on peut retenir :

- La première mention auvergnate de **Fauvette sarde**, vue en avril dans le Cantal
- L'afflux sans précédent de **Cisticoles des joncs** : 138 individus contactés sur une 20aines sites
- Plusieurs apparitions de rapaces rares :
  2 **Gypaètes barbus**, 1 **Vautour percnoptère**, 1 **Aigle criard**, 1 **Pygargue à queue blanche**, et 1 **Busard pâle** ; mais aussi Buse pattue, Faucon kobez et Elanion blanc !

En fin d'année, on constate un afflux de **Sizerins flammés** et autres **fringilles** (Pinson du nord, Bouvreuil pivoine, Gros-bec casse-noyaux, Serin cini…)

D'autres **espèces rares** ont pu être observées : Blongios nain, Harle piette, Harle huppé, Crave à bec rouge, Plongeon catmarin, Labbe parasite…

## Autres actualités 2017

La **formation « chants d'oiseaux »** continue son chemin avec 2 modules de formation en salle et 9 sorties terrain proposés en 2017. Le succès est croissant et les habitués progressent ! Les animateurs ont même réalisé des sorties dédiées aux différentes techniques d'inventaires (quadrats, STOC, EPOC).

Cette année, le sixième **camp naturaliste de Pentecôte** a attiré 28 participants et a permis de recenser 88 espèces d'oiseaux (192 espèces tous groupes confondus). Une belle découverte de l'est de la Haute-Loire et bien sûr une bonne ambiance entre naturalistes !

R. Riols

R. Riols

# TOP 10

## Les + observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Merle noir | 19 786 |
| 2 | Pinson des arbres | 15 566 |
| 3 | Buse variable | 15 043 |
| 4 | Mésange charbonnière | 14 288 |
| 5 | Pigeon ramier | 12 452 |
| 6 | Corneille noire | 12 053 |
| 7 | Rougegorge familier | 11 381 |
| 8 | Fauvette à tête noire | 10 669 |
| 9 | Mésange bleue | 10 345 |
| 10 | Milan royal | 9 411 |

## Les − observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Blongios nain | 1 |
| 2 | Bruant des neiges | 1 |
| 3 | Bruant lapon | 1 |
| 4 | Coucou geai | 1 |
| 5 | Busard pâle | 1 |
| 6 | Chocard à bec jaune | 1 |
| 7 | Fauvette sarde | 1 |
| 8 | Labbe parasite | 1 |
| 9 | Pygargue à queue blanche | 1 |
| 10 | Vautour percnoptère | 1 |

T. Lyon

B. Megnat

# Et en 2018 ?

Plusieurs suivis et enquêtes seront reconduits en 2018, comme l'enquête rapaces nocturnes qui entre dans sa dernière année de recensement, les suivis Faucon pèlerin et Grand-Duc ou encore le programme STOC.

L'**enquête « Merle à plastron »** (2017-2018) suit son cours. Des efforts de prospection sont à prévoir dans le Cantal, le Mézenc et le Forez, car peu de données ont été saisies en 2017. Il faut également poursuivre le suivi sur le Sancy afin de confirmer les résultats de l'an passé. **A vos jumelles !**

Enfin, le **camp naturaliste de Pentecôte** aura cette année lieu dans le sud-ouest du **Cantal**, dans les châtaigneraies.

http://www.lpo-auvergne.org/
auvergne@lpo.fr

Synthèse rédigée par la LPO Auvergne et grâce à tous les observateurs amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. **Merci à tous !**

**Photos** : Page 1 : Fauvette sarde (Y. Blat) Page 2 : Blongios nain (R. Riols) – Pygargue à queue blanche (R. Riols) - Merle à plastron (T. Lyon) – Bruant des neiges (B. Megnat)

AGIR pour la BIODIVERSITÉ AUVERGNE

GMA

Groupe Mammalogique d'Auvergne

D. Pagès

# Les Mammifères en 2017

# Synthèse des données de faune-auvergne

**11 716** données ↘ 4%*

**49** espèces ↗ 5*

**495** observateurs ↗ 29*

*Comparé aux données 2016

**Nombre d'espèces par département :**




**Nombre de données par département :**

**970** communes

Commune avec des données en 2017

## Les poils à l'honneur en 2017

Concernant le **Rat des moissons** *Micromys minutus*, la recherche de nids a été moins importante cette année. Il reste des zones n'ayant encore jamais été prospectées. Toutefois, ça présence dans les 4 départements est toujours avérée même si la majorité des données proviennent du 63. Des efforts sont à maintenir dans les zones humides du 15.

Le **Chat forestier** *Felis silvestris silvestris* cumule 74 données avec néanmoins un faible nombre pour le 43, 15 et 03.

220 données de **Loutre** *Lutra lutra,* ont été référencées cette année. Elle est présente sur les 4 départements mais il y a peu de données sur le 03 (20) et seulement 35 dans le 43…
**Ouvrez l'œil** !

Une nouvelle espèce de taupe à été mise en évidence en France par l'équipe de V. Colin (MNHM) : la **Taupe d'Aquitaine**, *Talpa aquitania*. En Auvergne, nous n'aurions que cette espèce. Cette année, 607 données ont été récoltées, continuez à nous communiquer vos observations ! Si vous trouvez des individus morts, vous pouvez les transmettre au GMA qui se chargera de les envoyer pour analyse à V. Colin afin d'affiner la limite de répartition de chaque espèce.

La **Genette commune** *Genetta genetta*, comptabilise seulement 8 données en 2017. Un effort de prospection notamment sur la recherche de crottiers semble nécessaire.

C. Lemarchand

# TOP 10

## Les + observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Chevreuil européen | 1920 |
| 2 | Renard roux | 1507 |
| 3 | Ecureuil roux | 1136 |
| 4 | Lièvre d'Europe | 1045 |
| 5 | Lapin de garenne | 628 |
| 6 | Ragondin | 619 |
| 7 | Blaireau européen | 608 |
| 8 | Taupe d'Europe | 607 |
| 9 | Sanglier | 403 |
| 10 | Hérisson d'Europe | 343 |

## Les − observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Bouquetin des Alpes | 1 |
| 2 | Campagnol souterrain | 1 |
| 3 | Daim européen | 2 |
| 4 | Musaraigne pygmée | 3 |
| 5 | Crossope aquatique | 3 |
| 6 | Rat noir | 4 |
| 7 | Genette commune | 8 |
| 8 | Crocidure musette | 12 |
| 9 | Loir gris | 13 |
| 10 | Campagnol des champs | 17 |

GMA

C. Lemarchand

# Et en 2018 ?

## → Recherches de crottes de Genette

**Le GMA a été sollicité par Christian Riols afin de récolter des fèces de Genette dans la but de faire une étude du régime alimentaire !**

Alors, prospectez les zones rocheuses autour de chez vous à la recherche des **crottiers de Genette**. Si vous en trouvez, ramasser tous les éléments en laissant quelques fèces plus récentes afin de limiter le dérangement. Ensuite, faire sécher les fèces quelques jours puis les envoyer au GMA. Prenez le soin d'envoyer vos lots collectés sans les mélanger, en n'oubliant pas d'indiquer le lieu et la date de ramassage ainsi que le nom des collecteurs. **MERCI !**

http://mammiferes.org/
assogma@mammiferes.org

Synthèse rédigée par le Groupe Mammalogique d'Auvergne et grâce à tous les observateurs amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. **Merci à tous !**

**Photos** : Page 1 : Mulot sylvestre (D. Pagès) - Page 2 : Mouflon (C. Lemarchand) – Genette au piège photo (GMA) - Crottier de Genette (C. Lemarchand)

GMA
Groupe Mammalogique d'Auvergne

Observatoire des Reptiles d'Auvergne

S. Heinerich

# Les Reptiles en 2017

# Synthèse des données de faune-auvergne

**2 610** données ↗ 1%*

**14** espèces ↘ 1*

**285** observateurs ↗ 26*

*Comparé aux données 2016

**Nombre d'espèces par département :**




**Nombre de données par département :**




**558** communes



Commune avec des données en 2017

## Retour sur les données de 2017

Le nombre de données de ce groupe ainsi que le nombre d'observateurs continuent de progresser chaque année, preuve que l'intérêt pour les reptiles augmente et que la sensibilisation porte ses fruits ! Ce qui est d'autant plus encourageant qu'au niveau national, ce groupe décline….

Bien que le Puy-de-Dôme comptabilise le plus grand nombre de données, il est intéressant de constater qu'en nombre d'espèces, les quatre départements sont quasi-identiques, malgré des cortèges d'espèces sensiblement différents. Quasiment (>80%) toutes les espèces possibles sont observées sur chacun d'eux.

### Les Stars de l'année :

→ Comme l'an passé, le **Lézard des murailles** et le **Lézard à deux raies** (ex-Lézard vert, cf. « changement de taxinomie » plus bas) sont toujours en tête, sans surprise, grâce à leur facilité d'observation et leur proximité avec les milieux anthropisés. Il faut toutefois rester vigilant avec les risques de confusion possible.

→ La **Couleuvre helvétique** arrive toujours en tête pour les serpents, mais réalise pourtant un score faible en nombre de données (<10%)

### Les « Oubliées » :

Cette année, le **Lézard ocellé** n'a pas été observé, certainement par manque d'observateurs (ou défaut de prospection) dans le sud Cantal. Ce qui devrait être remédié en 2018, avec le camp de prospection de Faune Auvergne près de la vallée du Lot. Pour autant, des publications récentes sur cette espèce pourraient présager d'une répartition plus large que celle connue actuellement…

### Les « scoops » !

Même si cela n'apparait pas dans le bilan 2017 de Faune Auvergne, deux nouvelles espèces ont fait ou refait leur apparition sur le territoire :

La **Coronelle girondine**, en Haute Loire, confirmée par photo et ayant été prise pour une Coronelle lisse par son observateur. Preuve qu'il ne faut pas hésiter à prendre des photos pour éviter les risques de confusion et garder la possibilité de déterminer *a postériori.*

La **Tarente de Maurétanie** (*Tarentola mauritanica*). Petit gecko métropolitain du pourtour méditerranéen, la Tarente a été découverte cet automne dans Clermont-Ferrand. Cette présence est certainement liée à une introduction fortuite par l'homme au cours d'un voyage dans le sud.

A. Sprumont

P. Peyrache

# TOP 5

## Les + observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Lézard des murailles | 1021 |
| 2 | Lézard à deux raies | 547 |
| 3 | Lézard vivipare | 211 |
| 4 | Couleuvre helvétique | 192 |
| 5 | Orvet fragile | 188 |

## Les − observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Couleuvre d'Esculape | 18 |
| 2 | Couleuvre vipérine | 18 |
| 3 | Lézard des souches | 32 |
| 4 | Tortue de Floride | 41 |
| 5 | Cistude d'Europe | 42 |

Depuis fin 2017, la taxinomie de certaines espèces a été modifiée et validée par le MNHN et la SHF. Pour l'Auvergne :
- La **Couleuvre à collier** (*Natrix natrix* Linnaeus, 1758) « française », devient **Couleuvre helvétique** (*Natrix helvetica* Lacepède, 1789), suite à de nouveaux travaux génétiques (cf. explication sur le site de la SHF http://lashf.org/liste-taxinomique/)
- Le **Lézard vert** (*Lacerta bilinaeta*), garde son nom latin mais devient ainsi **Lézard à deux raies**.

**Attention ! Changement de taxonomie !**

R.Riols

R.Riols

## Et en 2018 ?

L'ORA finalise la synthèse des connaissances des reptiles pour l'Auvergne, ce qui permettra à chacun de mieux se rendre compte de la répartition connue par espèce, et d'orienter les prospections par espèces ou par secteurs. Cette synthèse met en évidence, dans un grand nombre de cas, le défaut de prospections.

Au vu des nouvelles découvertes « scoop », il va falloir **augmenter les prospections en Haute-Loire et Cantal** pour mieux cerner la répartition de la Coronelle girondine, afin de vérifier ces nouvelles populations ainsi que les corridors de dispersion. Et ouvrir l'œil en ville pour détecter s'il n'y aurait pas d'autres Tarentes en Auvergne !

**Objectif 2018 : 300 observateurs et 3000 données !**

Synthèse rédigée par l'ORA et grâce à tous les observateurs amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. **Merci à tous !**

Contact : reptiles.auvergne@gmail.com

**Photos** : Page 1 : Lézard à deux raies (S. Heinerich)
Page 2 : Lézard des souches (A. Sprumont) – Vipère aspic (P. Peyrache) – Ciustude d'Europe (R. Riols) – Couleuvre d'Esculape (R. Riols)

Observatoire des Reptiles d'Auvergne

# Les Amphibiens en 2017

# Synthèse des données de faune-auvergne

**2 687** données ↘ 22%*
**13** espèces =
**243** observateurs ↗ 20*

*Comparé aux données 2016

**Nombre d'espèces par département :**

**Nombre de données par département :**




**525** communes

Commune avec des données en 2017

## Cooah de neuf en 2017 ?

Le nombre d'observateurs a légèrement augmenté en 2017 mais en revanche le nombre de données récoltées est plus réduit qu'en 2016. On note aussi que les observateurs délaissent toujours les mêmes secteurs…

En 2017, après plusieurs années de travail, l'actualisation de la Liste rouge régionale des Amphibiens a été finalisé : **3 espèces** sont considérées comme menacées, soit **18,8%** des Amphibiens. Ainsi, le **Pélodyte ponctué**, et le **Triton ponctué** sont tous deux classés dans la catégorie « en danger » et le **Sonneur à ventre jaune** dans la catégorie « Vulnérable ».

Une **évaluation des priorités de conservation et de connaissances** a également été réalisée, identifiant notamment des **lacunes de connaissances sur le groupe des grenouilles vertes** dont les statuts de conservation n'ont pas pu être évaluées dans la Liste rouge.

En parallèle, l'importante collecte de données a permis de réaliser un **atlas des Amphibiens d'Auvergne** : jamais un tel travail de synthèse cartographique n'avait été réalisé à l'échelle de la région. Il a été publié en ligne et est téléchargeable gratuitement. Les informations accumulées sur les différentes espèces de batraciens de la région sont ainsi portées à connaissance de tous !

# TOP 5

## Les + observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.) | 699 |
| 2 | Grenouille rousse | 366 |
| 3 | Crapaud commun ou épineux | 287 |
| 4 | Salamandre tachetée | 285 |
| 5 | Alyte accoucheur | 213 |

## Les – observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Pélodyte ponctué | 7 |
| 2 | Triton marbré | 14 |
| 3 | Triton alpestre | 39 |
| 4 | Sonneur à ventre jaune | 59 |
| 5 | Crapaud calamite | 96 |

## Et en 2018 ?

Face aux enjeux de connaissance sur les **grenouilles vertes**, nous souhaitons cibler des recherches sur ce groupe en 2018.

D'autres part, nous espérons que la sortie de la nouvelle Liste Rouge Régionale et la publication en ligne de l'Atlas suscitera des vocations et fera naitre **une dynamique nouvelle** pour encore et toujours améliorer les connaissances et participer à la protection des espèces et de leurs milieux.

http://www.amphibiens-massif-central.org/
evea.mautret.cpie15@orange.fr

**Photos** : Page 1 : Pelophylax lessonae (E. Mautret) – Page 2 : Pélodyte ponctué (E. Mautret) – Rainette verte (E. Mautret) – Triton marbré (E. Mautret)

**Synthèse rédigée par l'Observatoire des Amphibiens d'Auvergne et grâce à tous les observateurs amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. Merci à tous !**

GOA
Groupe Odonat'Auvergne

M. Kreder

# Les Odonates en 2017

# Synthèse des données de faune-auvergne

**6086** données ↗ 16%*
**77** espèces ↗ 9*
**153** observateurs ↗ 15*

*Comparé aux données 2016

**Nombre d'espèces par département :**

**Nombre de données par département :**

**545** communes

Commune avec des données en 2017

## Les demoiselles à l'honneur :

La Haute-Loire se distingue avec :

→ Une première mention pour la **Leucorrhine à gros thorax** avec l'observation d'une femelle à Loudes le 19 juin par F. Chastagnol. Affaire à suivre…

→ Une première mention de la **Libellule fauve** à Bas-en-Basset par Alexis Bruyère le 25 mai, Reste à savoir si elle s'y reproduit…

→ De nouvelles données pour l'**Aeschne des joncs** et le **Leste verdoyant** sur les zones humides du Devès (F. Chastagnol)

→ Une observation étonnante pour la rarissime ***Aeshne isocèle*** (*Aeshna isoceles*) sur une rase à Aubière (63) le 30 mai par V. Spampani.
Se reproduit-elle dans la zone ?

→ Un imago de **Cordulegastre bidenté** à Condat (15) par A. Luguin. La recherche de larves ou exuvies dans les ruisseaux de la zone serait à réaliser.

→ Une très belle participation des observateurs à l'**enquête Caloptéryx**, avec **368 communes** prospectées, dont 141 où il n'y avait pas eu d'observation récente de nos belles demoiselles bleutées !



R. Lecomte

# TOP 10

## Les + observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | *Libellula depressa* | **449** |
| 2 | *Calopteryx virgo* | **448** |
| 3 | *Ischnura elegans* | **395** |
| 4 | *Coenagrion puella* | **363** |
| 5 | *Platycnemis pennipes* | **323** |
| 6 | *Calopteryx splendens* | **267** |
| 7 | *Anax imperator* | **255** |
| 8 | *Aeshna cyanea* | **237** |
| 9 | *Sympetrum sanguineum* | **234** |
| 10 | *Pyrrhosoma nymphula* | **233** |

## Les − observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | *Leucorrhinia pectoralis* | **1** |
| 2 | *Gomphus graslinii* | **1** |
| 3 | *Coenagrion pulchellum* | **1** |
| 4 | *Macromia splendens* | **1** |
| 5 | *Sympetrum pedemontanum* | **1** |
| 6 | *Sympetrum depressiusculum* | **2** |
| 7 | *Oxygastra curtisii* | **3** |
| 8 | *Platycnemis latipes* | **3** |
| 9 | *Cordulegaster bidentata* | **3** |
| 10 | *Gomphus simillimus* | **5** |

M. Kreder

P. Flammant

# Et en 2018 ?

Des **week-ends associatifs de prospections** dans les Combrailles avec les copains du Limousins, dans le secteur de Tronçais pour l'AG, et d'autres surprises !

Une deuxième année d'**enquête sur les Caloptéryx**, avec une présentation des résultats de la journée faune-auvergne à l'automne.

Plus d'infos …. Bientôt !

http://groupeodonatauvergne.fr/
groupeodonatauvergne@gmail.com

Synthèse rédigée par le Goupe Odonat' Auvergne et grâce à tous les odonatologues amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. **Merci à tous !**

**Photos** : Page 1 :*Aeshna isoceles* (M. Kreder) – Page 2 *: Libellula depressa* (R. Lecomte) – *Le président en pleine action* (M. Kreder) – *Coenagrion pulchellum* (P. Flammant)

# LES RHOPALOCÈRES EN 2017

# Synthèse des données de faune-auvergne

**29 838** données ↗ 43%*

**139** espèces ↘ 4*

**277** observateurs ↗ 59*

*Comparé aux données 2016

**Nombre d'espèces par département :**

**Nombre de données par département :**




**864** communes



Commune avec des données en 2017

## LES OBSERVATIONS QUI ONT MARQUÉ 2017

Cette année, on constate une très nette augmentation de l'intérêt des observateurs pour ce groupe d'insectes, avec **65 nouveaux observateurs** par rapport à l'année précédente ! Le nombre de données collectées a également augmenté, avec **près de 9 000 données de plus qu'en 2016**.

Grâce à des conditions météorologiques très favorables, les données du début et de la fin du printemps sont en hausse et le mois de juin enregistre le pic d'observation le plus élevé. Dans l'ensemble, **le nombre de données est largement supérieur à la moyenne des données des 5 années précédentes**.

En résumé, les 277 observateurs ont été très actifs et on ne peut que constater l'impact très important des conditions météos sur l'observation des papillons.

- **Puy-de-Dôme** : l'**Hespérie de l'épiaire** (2ème mention départementale, la 1ère datant de 1910). Nouvelle station et 3ème mention départementale pour la **Mélitée des Linaires**.
- **Haute-Loire** : Nouveau site pour le **Moiré automnal** et de nouvelles observations du **Thècle des nerpruns** et surtout du **Mercure** (espèce connue dans le département que depuis 2016).
- **Cantal** : Observation très importante de la **Mélitée des Linaires** (très peu d'observation historique). On note également de nouvelles observations de l'**Hespérie de la malope** (connue depuis quelques années seulement en Auvergne) ainsi que l'observation du Marbré de vert (2ème mention départementale).
- **Allier** : Observation du **Marbré de vert** et de l'**Azuré des Coronilles**, rarement observé dans ce département.

P. Peyrache

P. Peyrache

# TOP 10

## Les + observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Fadet commun | 1818 |
| 2 | Citron | 1652 |
| 3 | Paon du jour | 1545 |
| 4 | Myrtil | 1447 |
| 5 | Vulcain | 1372 |
| 6 | Demi-deuil | 1037 |
| 7 | Azuré commun | 882 |
| 8 | Aurore | 871 |
| 9 | Petite Tortue | 818 |
| 10 | Robert-le-diable | 792 |

## Les − observées :

| | | Nombre d'individus |
|---|---|---|
| 1 | Nacré de la Canneberge | 1 |
| 2 | Thècle des Nerpruns | 3 |
| 3 | Grand Sylvain | 3 |
| 4 | Thècle du Prunier | 4 |
| 5 | Marbré-de-vert | 4 |
| 6 | Hespéride de l'Epiaire | 9 |
| 7 | Thècle de l'Orme | 9 |
| 8 | Moiré Ottoman | 10 |
| 9 | Citron de Provence | 11 |
| 10 | Azuré Osiris | 12 |

P. Peyrache

P. Peyrache

# Et en 2018 ?

**Diverses sorties à thème** : "découverte", " formation à l'observation", "espèces rares", et autres...ouvertes à tout public, à retrouver sur l'agenda du GEPA !

Prospection des zones blanches (voir carte) afin d'améliorer les connaissances sur les répartitions des papillons en Auvergne et **recherche d'espèces pas ou peu notées sur Faune-Auvergne**.

Vous pouvez également retrouver plus d'infos et les synthèses mensuelles avec le « **Filet garni** » ou en contactant le GEPA à l'adresse suivante : gep.auvergne@gmail.com !

Synthèse rédigée par le GEPA et grâce à tous les observateurs amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. **Merci à tous !**

**Photos** : Page 1 : Grand Sylvain (P. Peyrache) - Thècle des nepruns (P. Peyrache)
Page 2 : Hespérie de l'épiaire (P. Peyrache) – Marbré-de-vert (P. Peyrache) – Citron de Provence (P. Peyrache) – Nacré de la Canneberge (P. Peyrache)

# Les Orthoptères en 2017

# Synthèse des données de faune-auvergne

**13 675** données ↗ 76%*
**79** espèces ↗ 1*
**115** observateurs ↗ 24*

*Comparé aux données 2016

**Nombre d'espèces par département :**




**Nombre de données par département :**




**636** communes



Commune avec des données en 2017

## Quoi de neuf en 2017 ?

L'été 2017 fût très riche en découvertes, notamment en ce qui concerne les espèces rares, ou menacées et inscrites sur la liste rouge. **Rien de moins que :**

→ La découverte l'**Oedipode stridulante** (CR) sur le Cézallier avec une toute petite population à Marcenat, mais qui laisse espérer que d'autres sites puissent être occupés dans cette région naturelle. Une station nettement plus conséquente est découverte à Saint-Urcize sur l'Aubrac.

→ Deux importantes stations (plusieurs dizaines d'individus) d'**Oedipode souffrée** (VU) sont découvertes dans le nord-ouest de la Margeride à Bonnac et Coren et constituent les premières mentions pour le département du Cantal.

→ Le **Criquet des garrigues** (EN), historiquement connu uniquement du centre du Puy-de-Dôme, a été découvert dans le département du Cantal et en bordure de la vallée de l'Alagnon, puis à Joursac lors d'un week-end de prospection du groupe orthoptère.

→ Le **Criquet des grouettes** (EN) est redécouvert en Haute-Loire en bordure des gorges de la Loire mais aussi à la frontière cantalienne à Blesle.

→ Sur le val d'Allier dans le département éponyme, un **Criquet des chaumes** est redécouvert à Varennes-sur-Allier, puis une 1ère petite population d'une quinzaine d'individus est découverte à Saint-Rémy-en-Rollat. Enfin, plus de 70 individus sont dénombrés à Châtel-de-Neuvre et à La Ferté-Hauterive. Le val d'Allier abrite donc de véritables populations de cette espèce, bien loin des populations connues en France.

→ La Haute-Loire apporte une 84ème espèce à l'Auvergne avec la découverte inattendue du **Criquet de l'Aigoual** dans le massif du Mézenc ! Cette (sous)espèce endémique du sud-est du Massif central a été trouvée sur « les Dents du Diables » à Chaudeyrolles (F. Peyrissat).

# TOP 10

## Les + observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Grillon champêtre | 1104 |
| 2 | Grillon des bois | 902 |
| 3 | Criquet mélodieux | 896 |
| 4 | Criquet des bromes | 725 |
| 5 | Oedipode turquoise | 694 |
| 6 | Criquet des pâtures | 683 |
| 7 | Criquet duettiste | 654 |
| 8 | Grande Sauterelle verte | 637 |
| 9 | Ephippigère des vignes | 443 |
| 10 | Decticelle chagrinée | 425 |

## Les − observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Dectique à front blanc | 1 |
| 2 | Barbitiste des Pyrénées | 1 |
| 3 | Arcyptère bariolée | 1 |
| 4 | Tétrix déprimé | 2 |
| 5 | Barbitiste des bois | 2 |
| 6 | Criquet blafard | 3 |
| 7 | Tétrix méridional | 3 |
| 8 | Criquet de l'Aigoual | 6 |
| 9 | Criquet des ajoncs | 6 |
| 10 | Oedipode stridulante | 6 |

# Et en 2018 ?

**Deux camps de prospection** sont prévus dans l'année : un dans les **Combrailles** avec le groupe orthoptères du Limousin et un dans les **Gorges de la Truyère**.

Pour les débutants, une **journée d'initiation** sera organisée dans l'Allier.

Synthèse rédigée par Romain Riols, Luc Belenguier et Thibault Brugerolle et grâce à tous les observateurs amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. **Merci à tous !**

**Photos** : Page 1 : Criquet des chaumes (R. Riols) – Criquet des grouettes (R. Riols)
Page 2 : Oedipode souffrée (R. Riols) – Criquet des garrigues (R. Riols) - Acryptère bariolée (R. Riols) - Oedipode stridulante (R. Riols)

VisioNature

P. Rousteau

# Les Mollusques en 2017

# Synthèse des données de faune-auvergne

**462** données
**50** espèces
**38** observateurs

**Nombre d'espèces par département :**

**Nombre de données par département :**

**129** communes

Commune avec des données en 2017

## Malacologie... on commence doucement !

2017 est l'année de lancement de ce nouveau groupe sur Faune Auvergne : les mollusques !
Elle comprend les **gastéropodes** et les **bivalves**.



Gastéropodes



Bivalves

Le bilan de cette première année reste modeste ; toutefois **50 observateurs** (8 pour les bivalves et 36 pour les gastéropodes) ont fourni au moins une donnée... Bien sûr la plupart des données sont afférentes à des espèces faciles à trouver : les classiques **Escargot de bourgogne**, et autre **Petit Gris**, **Grande Loche**. Parmi les gastéropodes aquatiques, on compte seulement une espèce : l' **Ancyle des fleuves**.
Il y a un début à tout !

Le manque d'outils d'identification mis à disposition y est sûrement pour quelques chose et il est vrai aussi que nombre d'espèces sont difficiles à identifier sans matériel optique.

En 2017, **44 espèces de gastéropodes** et **6 de bivalves** ont fourni au moins une donnée.

L'Auvergne est très riche grâce à sa diversité géologique, d'altitudes et de biotopes... Le potentiel d'espèces est bien évidemment plus important que ce qu'en témoignent à l'heure actuelle les données.

Affaire à suivre…

J-J. Lallemand

# TOP 10

R. Riols

## GASTEROPODES

### Les + observées :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Escargot de Bourgogne | **133** |
| 2 | Escargot petit-gris | **54** |
| 3 | Escargot des haies | **46** |
| 4 | Escargot des jardins | **31** |
| 5 | Grande Loche | **24** |
| 6 | Ancyle des fleuves | **16** |
| 7 | Soucoupe commune | **15** |
| 8 | Elégante striée | **14** |
| 9 | Hélicelle trompette | **12** |
| 10 | Bulime zébré | **8** |

## BIVALVES

### Ensemble des données :

| | | Nombre de données |
|---|---|---|
| 1 | Corbicule asiatique | **8** |
| 2 | Anodonte des étangs | **4** |
| 3 | Mulette perlière | **4** |
| 4 | Anodonte des rivières | **2** |
| 5 | Pisidie commune | **1** |
| 6 | Pisidie fluviale | **1** |

N. Vaille

N. Vaille

# Et en 2018 ?

En 2018, afin de renforcer la dynamique de ce groupe, de nouveaux liens ont été mis en ligne pour identifier potentiellement toutes les espèces présentes en Auvergne :
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20125

Mi-septembre, **une première journée de formation** aura lieu dans la forêt de la Comté...

A bientôt !

Synthèse rédigée par Sylvain Vrignaud et Pascal Duboc et grâce à tous les observateurs amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. **Merci à tous !**

**Photos** : Page 1 : Loche hérisson (P. Rousteau) – Page 2 : Petit moine (J-J. Lallemand) – Corbicule asiatique (R. Riols) – Escargot des haies (N. Vaille) – Soucoupe commune (N. Vaille)