

IDENTIFIER LES ROUGEQUEUES NOIRS « TYPE FEMELLE » AU PRINTEMPS

Rechercher la limite de mue

Les jeunes RQN n'effectuent qu'une mue partielle de leur plumage. Ainsi, au printemps suivant, ces oiseaux de 2^{ème} année civile ont donc conservé les rémiges primaires et secondaires, ainsi que les couvertures primaires, de leur naissance. Celles-ci sont brunes et contrastent avec les plumes muées (grises).



Cas 1 Si absence de contraste
(tout +/- gris)

Femelle +2A
FCA = femelle adulte



Cas 2 Si contraste évident
+ noir présent sur la gorge, la poitrine, la face... mais absence de miroir blanc sur les rémiges

Mâle 2A « paradoxus »
(20% des mâles 2A)
FCA = mâle 2^{ème} année civile



Le plus simple !



Mâle +2A
FCA = mâle adulte

Avec sa livrée noire et ses miroirs blancs visibles sur les ailes, le mâle adulte de Rougequeue noir est le plus facile à identifier... mais en réalité, il s'agit d'oiseaux entrés dans leur 3^{ème} année civile (au minimum) !

Cas 3 Si contraste évident
+ absence totale de noir sur la tête et la poitrine

**Impossible* de distinguer entre
Femelle 2A et mâle 2A « cairii »**

(80% des mâles 2A)
FCA = adulte, type femelle



* Certains individus ont pu muer certaines rémiges tertiaires. Dans ce cas, si présence de marques blanches = mâle 2A certain.