

Chronique naturaliste - avifaune

Cette chronique a été réalisée à partir de la sélection d'observations ornithologiques saisies en ligne sur www.faune-drome.org. La période concernée correspond essentiellement à l'été (juin à août).

Grèbe castagneux : couvaison notée le 8/6 à Albon (F. Léglise) où un poussin, certainement issu d'une deuxième couvée, est encore observé le 31/8 (V. Palomares) ; également un gros poussin le 28/7 à La Roche-de-Glun (L. David) ; il s'agit là des seuls indices certains de nidification pour cette année. Ailleurs, il est essentiellement noté en basse vallée de l'Isère




Photo : Vincent Palomares

Grand Cormoran : deux adultes nuptiaux sont observés le 21/6 puis le 4/7 dans le secteur de Montélimar et de Châteauneuf-du-Rhône (V. Palomares et V. Fort), à une période où habituellement seuls des immatures sont notés. Nidification possible dans ce secteur favorable ?... Premiers retours sensibles en première décennie d'août avec notamment 24 en migration le 9/8 à Rochefort-Samson, où un maximum de 159 migrateurs sont observés durant la matinée du 27/8 (R. Métais)

Blongios nain : un mâle adulte est observé le 26/6 dans le secteur de Montélimar (J-L. Bonis)

Bihoreau gris : des jeunes non volants ou à peine volants sont observés au nid ou à leurs abords les 26/6 à Beaumont-Monteux (V. Palomares) et 14/7 à Upie (J. Girard-Claudon) ; il s'agit des seules données certaines de reproduction saisies sur la période. Au moins 3 individus sont notés les 25 et 27/7 au lac de Bouvante (F. Arod), à 1181 mètres d'altitude, rare donnée en altitude et devant correspondre à de la dispersion postnuptiale

Crabier chevelu : 9 données concernant des individus isolés du 10/6 au 6/7, ce qui est tout à fait inhabituel : le 10/6 à Chavannes (B. Delhome) et à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret), le 18/6 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et du 11/6 au 6/7 en amont de Romans-sur-Isère (C. Arlaud et V. Palomares)

Héron garde-bœufs : un poussin est observé au nid le 14/7 à Upie (J. Girard-Claudon), seule donnée de nidification dans la Drôme cette année. La majorité des données concernent des oiseaux localisés autour des colonies d'Upie

Bonne lecture et bon automne !

Compilation et rédaction par Vincent Palomares
vincent_palomares@yahoo.fr

et Meysse-07, excepté deux individus les 18 et 25/6 dans le secteur de Serves-sur-Rhône (V. Palomares) ; d'où viennent-ils ?...

Aigrette garzette : seules deux données concernent des indices certains de reproduction, avec des adultes ravitaillant au moins 4 nids le 3/7 en basse vallée de l'Eygues (R. de Coster), et au moins 5 poussins le 14/7 à Upie (J. Girard-Claudon)

Grande Aigrette : contrairement à l'an passé, des oiseaux sont notés en juin, en basses vallées de la Drôme et du Rhône : 1 les 11 et 20/6 à Montélimar (J-L. Bonis et V. Fort), 1 le 21/6 à Livron-sur-Drôme (V. Palomares) et 1 le 27/6 à Grâne (C. Carton) ; en juillet les six observations concernent les mêmes secteurs. Peu de données en août, avec un max



Photo : Jean-Louis Bonis

de 6 le 3/8 à Bourg-lès-Valence (L. David)

Héron pourpré : en juin-juillet, uniquement noté en amont de Romans-sur-Isère (C. Arlaud) et en basse vallée du Rhône, à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), Savasse (V. Palomares) et Montélimar, où un max de 6 est noté le 29/8 (J-L. Bonis) ; aucun indice probant de reproduction cette année...

Cigogne noire : seulement 4 données ; premières le 10/8 avec 4 individus au Grand-Serre (L. Basso) et un juvénile à Grâne (J. Armand) ; un juvénile dans le secteur de Chabrillan le 12/8 (J. Armand)

Cigogne blanche : contrairement à l'an passé, des oiseaux ont été observés en juin avec 1 le 1/6 à Livron-sur-Drôme (T. Deana), 1 le 10/6 à Allex (J. Armand) et 2 le 14/6 à Malataverne (S. Moreno). En juillet, unique donnée d'un individu le 20/7 à Valence (N. Parrain). En août, 31 données saisies sur Faune Drôme totalisent plus de 1300 individus migrateurs avec plusieurs groupes dépassant ou approchant la centaine d'individus : 100 le 11/8 à Donzère (N. Laforest), 100 le 13/8 à Bellecombe-Tarendol (V. Pelbarg), 98 le 30/8 à Mercuriol (L. Cremillieux), et enfin, à Pierre-Aiguille, 92 le 26/8 et 136 (40+96) le 27/8 (R. Métais)

chronique naturaliste - avifaune

Bernache nonnette : étonnante observation d'un individu en vol le 13/6 à Montrigaud (F. Léglise) ; vu la date, il s'agit potentiellement d'un échappé de captivité

Sarcelle d'hiver : en août, les 4 premières le 9 et 14/8 à Erôme (V. Palomares) puis 2 le 11/8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. Cremillieux) et 3 le 20/8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David)



Photo : Vincent Palomares

Canard souchet : une donnée en juin avec 1 le 21/6 à Livron-sur-Drôme (V. Palomares), une en juillet avec 3 le 26/7 à Gervans (V. Palomares). Jusqu'à 4 individus stationnent du 18 au 20/8 à Châteauneuf-sur-Isère (B. Delhome et L. David)



Photo : Vincent Palomares

Sarcelle d'été : quatre premiers migrateurs postnuptiaux le 2/8 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis) puis un le 11/8 à Gervans (V. Palomares), un le 14/8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. Cremillieux), un le 19/8 à La Roche-de-Glun (B. Piot), 6 le 21/8 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Nette rousse : des nichées sont notées à Montélimar (J-L. Bonis et al.), Saulce-sur-Rhône (V. Palomares) et Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), commune sur laquelle 393 individus sont observés le 2/8 (J-L. Bonis)

Fuligule milouin : max de 70 le 21/8 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Fuligule nyroca : un mâle adulte est observé le 25/6 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Fuligule morillon : noté nicheur classiquement en basse vallée de l'Isère en juillet-août avec première nichée de 10 ca-

netons le 13/7 à Châteauneuf-sur-Isère puis 5 le 17/7 à Saint-Paul-lès-Romans (C. Arlaud)



Photo : Vincent Palomares

Bondrée apivore : passage sensible le 26/8 avec 40 migratrices à Pierre-Aiguille (R. Métais)

Elanion blanc : deux observations exceptionnelles réalisées à une semaine d'intervalle dans le sud du département, concernant potentiellement deux oiseaux différents : 1 le 27/7 à Montboucher-sur-Jabron (M & R Fonters) puis 1 le 3/8 à Bouchet (J-N. Heron ; données homologuées par le CHR)

Milan royal : quelques rares données en juin-juillet : 1 le 1/6 à Montrigaud (F. Léglise), 1 le 22/6 à Crozes-Hermitage (M. Sequier), 1 le 9/7 à Chaudebonne (B. Labet), 1 le 24/6 à Léoncel puis 1 le 2/6 et 9/7 à Châteaubleue (C. Carton) ; premier migrateur postnuptial de passage le 4/8 à Colonzelle (S. Moreno)

Vautour percnoptère : adultes régulièrement observés dans les Baronnies (C. Tessier, A. Hargreaves, J. Traversier, P. Hermand, E. Blancard, B. Gravelat, A. Calonec), le sud-ouest du Vercors (R. Mathieu, T. Deana, C. Arlaud, P-A Hutter, C. Santos, N. Renoux, N. Gasco, J. Dumoutier, B. Pascal). Entre les deux zones, de nouvelles observations d'adultes entre Saou et Dieulefit posent toujours la question de l'origine de ces oiseaux (S. Stoecklé et V. Maile)

Vautour fauve : plus de 200 données, principalement dans les zones de reliefs. Parfois de grands rassemblements à proximité des sites de nidification dans le sud Vercors et les Baronnies, de plus de 80 individus. Des oiseaux observés plus à l'ouest, dans les secteurs de plaine comme à St-Paul-Trois-Châteaux, Châteauneuf-du-Rhône, Crest, Ourches, Mours-Saint-Eusèbe... (V. Fort, S. Corre, R. Métais, P. Rotsaert...)

Vautour moine : la majorité des observations provient du secteur des Baronnies / Gorges de l'Eygues. Egalement des oiseaux en estive dans les reliefs du Vercors, dans le sud des Baronnies, le Haut-Buëch ou le pays de Bourdeaux (A. Hargreaves, E. Blancard, E. Ruchon, J. Traversier, JP Choisy, V. Chartendault, B. Gravelat, etc.). A noter : l'observation d'un individu probablement victime d'une "crise de tournis" (provoqué par une carence en vitamine D) à Bouvières (E. Ruchon)

Circaète Jean-le-Blanc : un jeune, encore au nid le 31/7 à Monfroc, n'y est plus le 5/8 (M. Montadert)

chronique naturaliste - avifaune

Busard des roseaux : aucune reproduction cette année ; en juin, le seul individu observé était en migration le 4/6 à La Baume-de-Transit (J-N. Heron) ; premier migrateur postnuptial noté le 29/8 à Tulette (J-N. Heron)

Busard cendré : rares observations ; en période de reproduction, 1 le 17/6 à Eygalayes (M. Montadert), 2 les 27 et 28/6 à Ferrassières (F. Lloret), 1 le 28/6 au Chaffal (N. Renous), 1 le 2/7 à Anneyron (F. Légglise) et 1 le 17/7 à Aucelon (E. Ruchon). Premiers juvéniles, en migration, le 14/8 à Albon (V. Palomares) et le 15/8 à Omblèze (L. Flenet)

Aigle de Bonelli : seule observation d'un juvénile observé le 8/8 à Cornillon-sur-l'Oule (J. Traversier et al.) ; d'où venait-il ?...

Balbusard pêcheur : observation inhabituelle en juillet avec un individu observé à Grâne le 6/7 (J. Armand) ; la seule observation en août concerne un individu en pêche le 23/8 à Eymeux (C. Arlaud)

Faucon crécerellette : observation assez exceptionnelle d'un mâle le 26/8 à Ferrassières, chassant parmi rolliers et crécerelles (sous réserve d'homologation régionale)

Faucon kobez : trois observations en juin, avec un mâle de 2^e année le 4/6 à Pierrelatte (J-N. Heron), 2 le 5/6 à Chantemerle-lès-Blés (B. Delhome) et 1 le 21/6 à Léoncel (C. Carton)



Photo : Vincent Palomares

Faucon hobereau : échanges de proie et ravitaillement au nid – situé dans une haie de peupliers noirs – sont observés les 2 et 14/7 à Tulette (J-N. Heron) ; il s'agit des seuls indices certains de reproduction cette année

Gélinotte des bois : seule donnée d'un individu le 17/7 à Bouvante (F. Arod)

Lagopède alpin : des crottes notées le 4/7 sur les hauteurs de Lus-la-Croix-Haute sont les seuls indices de présence notés durant la période (V. Palomares)

Tétrax lyre : 7 données en juin, une en juillet puis une en août avec une femelle accompagnée de 2 poussins le 1/8 à Romeyer (G. David), unique mention de reproduction certaine saisie cette année

Perdrix bartavelle : 5 données, en provenance de Glandage et de Lus-la-Croix-Haute, concernant pour partie des perdrix rochassières (hybrides rouge x bartavelle) (E. Blancart, V. Palomares et F. Varagnat)

Caille des blés : encore un chanteur le 5/8 à Salettes (Anonyme)

Outarde canepetière : un mâle a percuté un projecteur d'une tour du site du Tricastin le 12/6 à Saint-Paul-Trois-Châteaux : il a été transmis le lendemain au centre de soins de Boucieu-le-Roi-07 (info de M. Mure) ; également 2 à Rochegude le 28/7 (J-N. Heron)

Oedicnème criard : 7 données en juin-juillet (nicheurs potentiels), en provenance de Nyons (B. Gravelat), Ferrassières (F. Lloret) et Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendraud)

Glaréole à collier : exceptionnelle observation de 2 individus en vol vers le sud-ouest le 7/6 à Montmeyran (sous réserve d'homologation régionale)

Petit gravelot : un couple accompagné d'un jeune est observé le 22/6 à Tulette (J-N. Heron), alors qu'un adulte en train de couver est repéré le 9/7 à Grâne, où un jeune est observé le 10/8 (J. Armand) ; ce sont les seuls indices certains de reproduction saisis cette année

Pluvier guignard : 1 le 24/8 à Montélier (sous réserve d'homologation régionale)

Vanneau huppé : rares données correspondant à la dispersion des nicheurs (adultes et/ou juvéniles) : 1 le 7/6 à Saules-sur-Rhône (P. Seguin), 1 le 21/6 à Granges-lès-Beaumont (L. David), 5 le 4/7 à Beaumont-lès-Valence (J. Dumoutier), 1 le 25/7 à Tulette (J-N. Heron), 4 le 1/8 à Grâne, 1 le 12/8 à Chabrillan (J. Armand) et 6 le 27/8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David)

Bécassine des marais : aucune donnée en juin-juillet ; premier migrateur postnuptial le 2/8 à Saint-Roman (J-P. Choisy), puis un max de 4 le 10/8 à Grâne (J. Armand)

Bécasse des bois : un oiseau en croûle est noté le 3/6 à Glandage (F. Varagnat) alors qu'une nichée de 6 poussins est découverte le 16/6 à Chantemerle-lès-Blés (info de B. Delhome)

Chevalier gambette : un dernier migrateur pré-nuptial est noté les 12 et 13/6 à Romans-sur-Isère (F. Lloret)

Chevalier aboyeur : joli groupe de 8 migrateurs pré-nuptiaux tardifs le 5/6 à Eurre (J. Armand) puis encore un le 22/6 à Granges-lès-Beaumont (C. Arlaud). Premier migrateur postnuptial noté le 31/7 à Erôme (V. Palomares) ; 1 les 14 et 18/8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. Cremillieux et B. Piot)

Chevalier culblanc : 68 données (11 en juin, 11 en juillet, 46 en août) ; après seulement 2 données en mai, l'oiseau observé le 3/6 à Albon (F. Légglise) peut être un migrateur pré-nuptial tardif ou déjà un premier migrateur postnuptial... Max de 8 le 11/8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. Cremillieux)

Chevalier sylvain : 13 données, uniquement en août ; maximum de 4 le 13/8 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Chevalier guignette : aucune donnée de reproduction certaine malgré des indices possibles ou probables de reproductions le long de la Drôme en amont de Crest... Passage sensible fin-juillet / début-août avec un max de 12 les 26/7 et 2/8 à Erôme (V. Palomares), 9 le 28/7 à La Roche-de-Glun (L. David)

Mouette mélanocéphale : beau stationnement sur les barrages du secteur de Gervans et de Serves-sur-Rhône avec une quinzaine d'individus entre le 26/7 et le 19/8 : 2 ad et un juv le 26/7, puis présence régulière de juvéniles, avec un maximum de 5 les 28-29/7 puis les 5-6/8 (V. Palomares) ; ces oiseaux accompagnaient des mouettes rieuses (dispersion

chronique naturaliste - avifaune

postnuptiale vers le sud). Egalement un juvénile signalé le 25/8 à La Roche-de-Glun (B. Delhome)



Photo : Vincent Palomares

Mouettes mélanocéphales juvéniles (juillet 2012)



Photo : Vincent Palomares

Mouettes mélanocéphales adultes (juillet 2012)

Mouette rieuse : des mouvements vers le sud sont notés de mi-juin à mi-août, avec des *maxima* de 103 en une ½ heure le 18/6 et 170 en halte le 26/7 à Gervans (V. Palomares) ; des proportions croissantes de juvéniles ont pu être notées, ce qui permet de penser que ces déplacements correspondent à des oiseaux ayant fini leur reproduction plus au nord

Goéland brun : des adultes en migration sont observés en août, avec 1 le 19/8 à La Roche-de-Glun (B. Piot), 5 le 20/8 à Saint-May (J. Traversier) et 3 le 27/8 à Pierre-Aiguille (R. Métais)

Goéland leucophaée : en plus des sites déjà prospectés en mai, l'espèce est notée nicheuse certaine le 21/6 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Sterne caspienne : un migrateur pré-nuptial plutôt tardif est observé en vol nord le 4/6 à Gervans (V. Palomares, donnée homologuée par le CHR)

Sterne pierregarin : potentiel migrateur tardif remontant l'Isère le 11/6 à Chatuzange-le-Goubet (V. Palomares) ; reproduction suivie sur l'unique site drômois de Saulce-sur-Rhône : couvaisons notées le 29/5 encore d'actualité le 19/6 (V. Fort), premiers ravitaillements observés le 21/6 (V. Palomares). Egalement trois observations en juin à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort). Aucune donnée en août...

Guifette noire : une seule observation par mois : 1 le 25/6 à Granges-lès-Beaumont (C. Arlaud), 2 adultes le 6/7 (R. Métais) puis un juvénile le 19/8 à Châteauneuf-sur-Isère (B. Piot)



Photo : Jean-Noël Heron

Coucou geai : un adulte est observé le 30/6 à Tulette (J-N. Heron, donnée homologuée par le CHR) ;

Coucou gris : seule observation d'un juvénile le 26/7 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et R. Métais) ; l'individu observé le 3/8 à Léoncel (C. Carton) constitue l'unique donnée de ce mois

Effraie des clochers : unique donnée d'une nichée découverte le 20/6 à Hauterives (info L. David)

Petit-duc scops : nichées ou jeunes isolés notés le 30/6 à Cléon d'Andran (info S. Portier), le 4/7 à Suze-la-Rousse (info J-N. Heron), le 9/7 à Vercheny (E. Gonzalez), le 13/7 à Pierrelatte, le 15/7 à Tulette (J-N. Heron), le 28/7 à Rémuzat (F. Veau et C. Tessier) ...

Hibou moyen-duc : données en provenance de la basse vallée de l'Isère, où le dernier jeune est encore entendu le 6/8 à Granges-lès-Beaumont (L. David)

Chouette de Tengmalm : deux données seulement, en provenance de Saint-Agnan-en-Vercors, avec encore deux chanteurs tardifs le 9/6 (J. Girard-Claudon) puis des cris entendus le 22/8 (F. Arod)



Photo : Vincent Palomares

Sterne pierregarin

chronique naturaliste - avifaune

Engoulevent d'Europe : dernier chanteur noté le 13/8 à Vachères-en-Quint (B. Cotte)

Martinet à ventre blanc : ce printemps, uniquement noté nicheur sur sites rupestres : à Echevis et Saint-Jean-en-Royans (V. Palomares), Pommerol (M. Amy), et potentiellement à Saint-May (J. Traversier) et Mollans-sur-Ouvèze (J-M. Desprez) ; présence en zone urbaine à Tain l'Hermitage, Saint-Vallier et Saint-Rambert-d'Albon (V. Palomares)

Rollier d'Europe : en basse vallée de l'Eygues, 11 à 12 couples nicheurs ont été recensés cette année par J-N. Heron (10-11 l'an passé et maximum précédent de 8 couples en 2009 sur la même surface de 10 km² prospectée depuis 2005). Des nicheurs potentiels sont notés le 8/6 à Grâne (J. Armand), le 17/6 à Saint-Maurice-sur-Eygues (S. Moreno) et le 23/6 à Vinsobres (R. de Coster).

Des observations sont réalisées en-dehors des secteurs de reproduction connus (dispersion) à partir du 3/8 avec un à La Bégude-de-Mazenc (S. Couvent), puis le 12/8 avec 2 en vol nord à Albon (V. Palomares) et 2 à Anneyron (F. Léglière) ; à Ratières, 1 le 13/8 puis 3 les 23 et 29/8 (S. Stoëcklé), encore 1 le 31/8 (L. Cremillieux) ; 1 le 21/8 à Arnayon (J. Traversier) ; 1 le 24/8 à Crest (T. Deana) et 2 le 28/8 à Marsanne (J. Armand). Durant cette période, à noter : de beaux rassemblements, avec 10 le 14/8 à Mirabel-aux-Baronnies (A. Simon), 11 le 26/8 à Ferrassières (J. Traversier) et un groupe exceptionnel de 23 le 30/8 à Tulette (J-N. Heron)

Torcol fourmilier : becquée notée le 11/6 à Bésignan (J. Traversier) puis un jeune à peine volant est observé le 1/7 Comillac (C. Tessier) ; uniques données de reproduction certaine ce printemps

Pipit rousseline : en dehors des sites connus de reproduction, un chanteur est noté le 11/6 à Chavannes (B. Delhome) ; beau rassemblement postnuptial de plus de 10 individus le 21/8 à Aucelon (J. Traversier)

Pipit des arbres : premiers migrateurs le 17/8 à Anneyron (V. Palomares), mais peu noté ensuite



Photo: Vincent Palomares

Bergeronnette printanière : chanteurs notés dans les cultures en juin à Génissieux (F. Lloret) ainsi qu'à Lens-Lestang (V. Palomares), seules données de reproduction

potentielle, concernant des hybrides cinereocapilla x flava. Premiers migrateurs postnuptiaux le 31/8 à Albon (V. Palomares), unique donnée du mois d'août

Accenteur alpin : rares données en période de reproduction : 1 le 7/6 à Romeyer (G. David) et maximum de 5 chanteurs le 4/7 sur les hauteurs de Lus-la-Croix-Haute (V. Palomares)

Tarier des prés : des données de reproduction certaine sont obtenues du 7/6 au 4/7 à Vassieux-en-Vercors (N. Renous) et le 3/7 à Lus-la-Croix-Haute (V. Palomares) ; premiers migrateurs notés vers la mi-août avec un le 17/8 à Anneyron puis déjà plus de 20 le 21/8 à Aucelon (J. Traversier)

Traquet motteux : premiers migrateurs notés le 17/8 à Anneyron puis déjà plus de 20 le 21/8 à Aucelon (J. Traversier)

Traquet oreillard : mâle chanteur noté le 6/6 à Montbrun-lès-Bains (sous réserve d'homologation régionale)

Monticole de roche : seules données de reproduction certaine : un couple avec becquée le 23/6 à Saint-May (J. Traversier) ainsi que le 3/7 à Lus-la-Croix-Haute (V. Palomares), sur un site où un jeune est observé le 12/8 (H. Pottiau)

Monticole bleu : nourrissage noté le 19/6 à Saoû (Y. Masse) ; unique donnée certaine de reproduction ce printemps

Merle à plastron : des jeunes (encore nourris ou non) sont observés le 10/6 à Laval-d'Aix (B. Pascal), le 24/6 à Lus-la-Croix-Haute (E. Blancard) ; uniques données certaines de reproduction ce printemps

Grive litorne : 4 le 3/8 à Montclar-sur-Gervanne (F. Varagnat) ; unique donnée en période de reproduction, dispersion ou nidification potentielle ?

Locustelle tachetée : hors baguage, unique donnée d'un migrateur en halte le 12/8 à Lus-la-Croix-Haute, à plus de 1500 mètres d'altitude (H. Pottiau)

Locustelle lusciniöide : première de la saison capturée (bague) le 22/7 à Châteauneuf-sur-Isère (L. Carrier)



Photo: Vincent Palomares

Rousserolle verderolle : 15 données en juin-juillet ; à Lus-la-Croix-Haute, des becquées sont notées le 3/7, où plus de 5 territoires sont occupés (V. Palomares) ; ailleurs, notée à Saint-Agnan-en-Vercors avec 5 chanteurs sur le même site (N. Renous, F. Arod et E. Lemoigne), ainsi qu'à Saint-Martin-en-Vercors avec au moins 4 chanteurs sur trois sites (N. Renous, B. Labet)

chronique naturaliste - avifaune

Rousserolle turdoïde : présence confirmée en juin dans le Diois avec un chanteur le 1^{er} à Beaumont-en-Diois (F. Deroussen) et un autre les 3, 9 et 26/6 à Montmaur-en-Diois (J-P. Choisy)

Fauvette des jardins : dernier chanteur noté le 11/7 à Treschenu-Creyers (B. Veillet) ; à Anneyron, migratrices en halte le 11/8 (V. Palomares)

Fauvette babillarde : seulement trois données, concernant des nicheurs probables : 2 le 7/6 à Romeyer (G. David), 1 le 10/6 à Saint-Agnan-en-Vercors (J. Girard-Claudon) et 1 le 23/6 à Lus-la-Croix-Haute (E. Blancard)

Fauvette passerinette : migrateur en halte observé le 15/8 à Anneyron, au-delà de l'extrémité nord de l'aire de répartition drômoise de l'espèce, probablement un juvénile issu d'une nichée du coteau rhodanien plus au nord (V. Palomares)...

Pouillot siffleur : trois données concernant des nicheurs possibles : 1 le 15/6 à Chastel-Arnaud (G. David), 1 le 27/6 à Saoû (G. Trochard) et 1 le 13/7 à Moras-en-Valloire (F. Légise). Des migrateurs en halte sont notés à la mi-août : 1 le 12/8 à Bourdeaux (S. Stoecklé) et 1 le 15/8 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Gobemouche noir : aucune observation entre le 17/04 et le 2/08, date à laquelle un premier migrateur est observé à Gervans (V. Palomares) ; max de plus de 40 le 15/8 à Omblèze (J. Girard-Claudon)

Tichodrome échelette : becquées notées les 14 et 26/6 à Saint-Jean-en-Royans (A. Hargreaves et V. Palomares), seules données certaines de reproduction. Ailleurs, noté à Treschenu-Creyers (J. Dumoutier, B. Veillet et C. Delage), Saoû (C. Gallo), Saint-Julien-en-Vercors (E. Le Moigne)

Pie-grièche écorcheur : nid avec 4 œufs détruit par une débroussailleuse le 10/6 à Saint-Julien-en-Vercors (J. Cou-tier) ; premiers jeunes non volants le 22/6 à Saint-Martin-en-Vercors (N. Renous)

Pie-grièche à tête rousse : unique donnée d'une femelle observée le 6/6 à Saint-May (C-H. Traversier)

Niverolle alpine : des becquées et des groupes familiaux sont notés le 4/7 sur les hauteurs de Lus-la-Croix-Haute, le long de la limite départementale avec les Hautes-Alpes (V. Palomares) ; unique donnée de reproduction saisie au cours de l'enquête atlas et probable unique secteur de nidification en Drôme...

Bruant ortolan : peu de données après début juillet ;



Photo : Vincent Palomares

Pouillot fitis : hors baguage, premier migrateur post-nuptial remarqué le 1/8 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

rassemblement d'une dizaine le 21/8 à Aucelon (J. Traversier)
Bruant proyer : plus de 40 le 17/8 à Anneyron (V. Palomares) ; unique donnée du mois d'août... ■

chronique naturaliste - herpétofaune

Cette chronique centrée sur l'herpétologie également réalisée à partir de la sélection d'observations ornithologiques saisies en ligne sur Faune-Drôme.

Beaucoup moins d'espèces d'amphibiens ont été transmises sur l'été, par rapport au printemps : 237 données, dont la moitié en juin (contre 649).

Pour les reptiles, on note également une diminution du nombre de données par rapport au printemps (348 contre 700). Elles restent en revanche assez bien réparties sur les trois mois (juin à août 2012).

Compilation et rédaction par Loïc David

amphibiens

Alyte accoucheur : 48 observations, rarement au-dessus de 600 m d'altitude. La plupart des données sont établies grâce à un repérage sonore. Malgré cela, quelques individus ont été vus : un mâle avec ses œufs le 14 juillet à Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendrault), et un autre, récupéré dans une piscine le 6 juillet à Colonzelles (S. Moreno) !



Photo : Cindie Arlaud

Sonneur à ventre jaune : 23 observations, avec notamment 11 individus repérés le 15 août à Moras-en-Valloire (C. Arlaud)

Crapaud commun : 31 observations, soit deux tiers de moins que ce printemps. Belle découverte de plus de 500 imagos le 13 juin à Montrigaud (F. Légli)

Crapaud calamite : 11 observations dont environ 80 larves à Alixan le 7 juin (Y. Masse), ou encore une cinquantaine d'adultes sur 5 sites de Châteauneuf-sur-Isère le 3 juillet (V. Chartendrault).

Grenouille rieuse : 31 observations et seulement 3 pour le mois d'août

Grenouille agile : 6 observations, toutes dans le Nord-Est du département, et presque toutes à l'unité

Grenouille rousse : 16 observations dont 80 larves le 14 juin à Saoû (Y. Masse). Le 24 juin, à Lus-la-Croix-Haute, ce sont d'innombrables têtards ou jeunes grenouilles qui sont trouvés (E. Blancard)

Triton alpestre : 5 observations dont plus de 100 individus à Vassieux-en-Vercors le 28 juin

Triton palmé : 9 observations dont 25 larves à Livron sur Drôme le 25 août (N. Parrain)

Triton crêté : 2 individus à Grâne le 8 juin (J. Armand), et 18 larves à Livron-sur-Drôme le 1^{er} août (N. Parrain et P-J Riou), dans une mare pratiquement atterrie

Salamandre tachetée : 15 observations dont une centaine de larves présentes le 4 juin à Saint-Bardoux. Le 27 juin, sur le même site, certaines larves étaient prêtes à sortir de l'eau (A. Movia). A cette même période, le 14 juin, de nombreuses larves furent observées sur deux sites de Saoû (Y. Masse et P. Lloret). Enfin, une dernière observation à 1500 m d'altitude le 4 juillet (V. Palomares)

reptiles

Tortue à tempes rouges : 14 observations avec un maximum de 6 à Saulce-sur-Rhône le 22 juin (V. Fort).

Tortue d'Hermann : 1 individu échappé ou relâché a été trouvé sur une piste forestière à Boulc (observateur anonyme)

Orvet fragile : 4 observations : le 21 juin à Saint-Paul-Trois-Châteaux (A. Ville), le 15 juillet et le 26 août à Mollans-sur-Ouvèze (B. Grzemski), et un jeune le 12 août à Montmeyran (L. Lacoste)

Couleuvre d'Esculape : 14 observations dont 3 écrasées... et une en train de se chauffer sur une route le 27 juin à Gignors-et-Lozeron

Coronelle lisse : seulement 3 observations (contre 12 le trimestre précédent, principalement en avril) : le 10 juin à Plan-de-Baix (B. Pascal), le 11 juin à La-Motte-Chalancon (E. Blancard), et un jeune le 24 août à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet)

Coronelle girondine : 6 observations dont 2 écrasées, et d'autres bien vivantes comme cet individu lové sous un morceau de bois à Die, lors de la très chaude journée du 23 juin (G. Billy).

Couleuvre vipérine : 23 observations, avec un maximum de 5 sous une plaque à Clérieux le 4 juin (A. Movia)

Couleuvre à collier : 16 observations, principalement au Nord du département et sur le Vercors

Couleuvre verte et jaune : 48 observations dont les deux tiers (32) en juin. Encore 6 individus écrasés...

Tarente de Maurétanie : 1 jeune vu les 22 et 29 août à Romans-sur-Isère. Egalement le 29 août, 3 jeunes et 3 adultes à Valence, dans un secteur connu pour abriter cette espèce. Observations faites par A. Movia.

Lézard vert occidental : 74 observations presque partout dans le département

Lézard vivipare : unique observation le 2 juin à Omblièze (Y. Masse)

Lézard des murailles : 103 observations presque partout dans le département

Lézard ocellé : 4 observations, toutes de J. Traversier, et toutes dans le sud du département : les 3 et 14 juillet à Villeperdrix (sur 3 sites), et un écrasé le 9 juillet à Saint-Jalles.

Seps strié : unique observation le 9 juillet à Saint-Jalles (A. Hargreaves)

Vipère aspic : 24 observations dont une femelle au repos sur une piste de Menglon, cherchant un peu de fraîcheur, le 19 août, à la tombée de la nuit (J-P. Choisy). ■



Photo : Alexandre Movia