

L'identification des Coulicous

Les coulicous (genre *Coccyzus*) sont des coucou américains. 4 espèces peuvent être rencontrées en Guyane : 1 résidente, le **Coulicou manioc** (*Coccyzus minor*), 1 migratrice d'Amérique du Nord, le **Coulicou à bec jaune** (*C. americanus*), et 2 migratrices australes, le **Coulicou de Vieillot** (*C. melacorhyphus*) et le très rare **Coulicou d'Euler** (*C. euleri*). Leur identification est parfois délicate et repose sur la **combinaison de critères morphologiques** (couleur du dessous, couleur des ailes, couleur du bec et du cercle orbital). **L'habitat et la date d'observation** sont aussi de bons indices. Leurs voix sont très semblables, leur chant est composé d'une série de notes répétées graves, appuyées et bien détachées (« how-how-how-how... »), leur cri le plus fréquent est une sorte de crécelle rapide.

Caractères communs à tous :

- Silhouette élancée, longue queue étagée tenue dans l'axe du corps, taches blanches sous la queue ;
- Ailes pointues, souvent légèrement pendantes (posé), tenues sous l'horizontale (en vol) ;
- Bec pointu, légèrement courbe ;
- Dessus de la tête et dos gris-brun, masque sombre sur les yeux, dessous du corps gris-blanc ou ocre.

	Coulicou à bec jaune <i>Coccyzus americanus</i> ⚠ Soumis à homologation !	Coulicou d'Euler <i>Coccyzus euleri</i> ⚠ Soumis à homologation !	Coulicou de Vieillot <i>Coccyzus melacorhyphus</i> ⚠ Soumis à homologation !	Coulicou manioc <i>Coccyzus minor</i>
Dessous	Blanc	Blanc, poitrine souvent grise	Ocre (gorge plus colorée que le ventre)	Ocre (gorge moins colorée que le ventre)
Ailes	Du roux sur les rémiges (visible surtout en vol, parfois difficile à voir sur l'aile fermée)	Pas de roux sur les ailes	Pas de roux sur les ailes	Pas de roux sur les ailes
Bec	Jaune et noir	Jaune et noir	Entièrement noir	Jaune et noir
Cercle orbital	Jaune (parfois gris)	Gris (rarement jaune)	Jaune (parfois gris)	jaune
Masque	Peu marqué	Peu marqué	Souligné de gris sur la joue	Bien marqué, sans gris sur la joue
Habitat	Semi ouvert, varié	Canopée de forêt	Semi ouvert, varié	Mangrove
Dates de présence	Mars à mai Septembre- octobre	(Juin) Juillet à septembre	Juin à août (septembre)	Toute l'année

Dessous blanc ou gris

Du roux sur les ailes
(parfois difficile à voir !)

Pas de roux sur les ailes



→ Coulicou à bec jaune



→ Coulicou d'Euler

Dessous coloré

Bec entièrement noir

Bec jaune et noir



→ Coulicou de Vieillot



→ Coulicou manioc