

7

ANISOPTERES



Plan Régional d'Actions en faveur des Odonates - Limousin

Cordulie à deux tâches

Epitheca bimaculata

Burmeister, 1839

VU CR

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Répartition




Bien présent en Europe dans l'est mais plus fragmenté vers l'ouest. En limite de répartition en France et Italie, disparu de la quasi-totalité du Bénélux.



Espèce connue dans l'Est et le centre du Pays.



Cette cordulie a été découverte en 1996 à la Réserve Naturelle de l'Etang des Landes. Elle est bien implantée sur le nord de la région sur des étangs du nord de la Haute-Vienne du Bassin de Gouzon et des monts de la Marche (d'Ambazac et de Blond).



Détermination



♂ appendices anaux en V




Ailes légèrement fumées. Tache noire à la base des ailes postérieures



Abdomen jaune orangé avec une large bande noire centrale.

Famille : Corduliidae
Genre : Epitheca
Taille : 55-65 mm

Exuvie



Présence d'une pyramide anale (Anisoptères), masque en forme de cuillère, dents plutôt régulières, sillon à la base du masque (Corduliidae), 2 cornes sur le dessus de la tête, longues épines latérales sur le segment 9.





A NOTER :

Espèce découverte récemment sur des étangs récents et pauvres en végétation. Efforts de prospections à réaliser en mai. (exuvies à rechercher)

Plan Régional d'Actions en faveur des Odonates - Limousin

Cordulie à deux tâches

Epitheca bimaculata

Burmeister, 1839



Principes de conservation

La répartition de *E. bimaculata* semble progresser ces dernières années, avec la découverte de nouveaux sites plus au Sud (cas des étangs des monts de la Marche). Outre la destruction de zones humides, l'espèce peut être défavorisée par une activité piscicole trop marquée ou une gestion des berges trop intensive. L'abondance de végétation est un facteur positif à la présence de cette Cordulie.

Habitats

La Cordulie à deux taches se reproduit dans les eaux stagnantes variées (étangs forestiers ou ouverts, marais, lacs, gravières,...) bien ensoleillées et pourvues de végétation aquatique immergée (potamots,...). En Limousin, il s'agit essentiellement de plans d'eau anciens avec une ceinture de végétation abondante.

Etang des Landes
Lussat, 23



Etang du Brudoux-
Cieux, 87



Domaine des Sauvages
Saint-Sylvestre, Ambazac (87)



Plus d'informations :
www.conservatoirelimousin.com
<http://assoslo.free.fr/>
<http://odonates.pnaopie.fr/>

Avec le soutien financier de

