



CONSEILS ET CONSIGNES POUR L'ATTRIBUTION DES CODES DE NIDIFICATION EN PAYS DE LA LOIRE



Chevêche d'Athéna (Louis-Marie Préau ©)

Guide n°4 : du Pigeon colombin au Pic épeichette

V1 - 29.04.2010



PAYS DE LA LOIRE



L'ensemble des informations composant ce guide sont principalement issues de documents suivants :

- « Vade-mecum de l'Ornitho en Poitou-Charentes » réalisé et coordonné par Poitou-Charentes Nature
- « Consignes par espèces, commentaire sur le statut et le comportement des espèces nicheuses en Bretagne » réalisé par le Groupe Ornithologique Breton.

Nous tenons vivement à remercier les ornithologues et les associations nous ayant permis de reprendre divers informations concernant la biologie et l'écologie des espèces et tout particulièrement : Charente Nature, le Groupe Ornithologique Breton, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, la LPO Charente-Maritime, la LPO Vienne et Poitou-Charentes Nature ainsi que Christian Bavou, Sandrine Bracco, Raphaël Bussière, Rudi Chabanais, Jean-Marie Clavery, Jean-Claude Descombes, Matthieu Dorfiac, Alain Doumeret, Bruno Dubrac, Bruno Fleurant, Bernard Fontenaud, Jacqueline Gautier, Michel Granger, Frédéric Grellier, Philippe Jourde, Olivier Lалуque, Katia Lipovoi, Michel Matard, Daniel Rainaud et Jean-Pierre Sardin.

Une grande partie des informations proviennent également de l'état des lieux sur l'avifaune en Pays de la Loire réalisé en 2008.

Espèces présentes dans ce guide

- Pigeon colombin
- Pigeon ramier
- Tourterelle turque
- Tourterelle des bois
- Coucou gris
- Effraie des clochers
- Petit-duc scops
- Chevêche d'Athéna
- Chouette hulotte
- Hibou moyen-duc
- Hibou des marais
- Engoulevent d'Europe
- Martinet noir
- Martin-pêcheur d'Europe
- Guêpier d'Europe
- Huppe fascié
- Torcol fourmilier
- Pic cendré
- Pic vert
- Pic noir
- Pic épeiche
- Pic mar
- Pic épeichette


Légendes

Phénologie de la reproduction

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

La période de reproduction de l'espèce est indiquée par le dégradé bleu. Pour les migrateurs, attention aux individus de passage en début et fin de période.

Carte de présence



Columbidés

Pigeon colombin (*Columba oenas*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : se reproduit principalement en milieux forestiers où il niche dans les cavités d'arbres ainsi qu'en vallées alluviales dans des secteurs boisés.

Conseils : attention aux hivernants tardifs en début de période de reproduction (ne pas mettre de code s'il ne chante pas) ; chante à proximité de son nid (de mars à juin) ; c'est le principal indice à repérer ainsi que le vol nuptial (vol plané les ailes en V).



Pigeon ramier (*Columba palumbu*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : utilise divers types de milieux pour se reproduire : bois clairs, bocage, lisière de forêts, parcs, jardins... Nid pouvant être sur un support artificiel.

Conseils : vol nuptial caractéristique (ascension rapide en claquant des ailes suivie d'une lente descente, ailes écartées) ; repérer les transports de matériaux.



Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : divers types de milieux notamment en zones urbaines.

Conseils : attention chante toute l'année ; parades en février (révérences du mâle à proximité du site de nidification) ; les pontes peuvent avoir lieu très tardivement jusqu'à octobre.



Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : principalement en milieux bocagers mais également dans les zones cultivées où elle pourra trouver des supports pour son nid, notamment des haies.

Conseils : chante et parade dès son arrivée sur les sites de nidification, vers la fin du mois d'avril.



Cuculidés

Coucou gris (*Cuculus canorus*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux très variés mais les populations sont plus denses en milieux boisés.

Conseils : confirmer le cantonnement du mâle constitue le meilleur indice en réalisant un deuxième passage, à moins de trouver des jeunes qui sont souvent très bruyants.



Tytonidés

Effraie des clochers (*to alba*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : divers types de milieux, principalement en zone rurale, à proximité de hameau. Niche principalement dans des bâtiments (greniers, églises, fermes...) et plus rarement dans les arbres creux.

Conseils : l'observation ou l'écoute d'individus sur un même secteur sont de bons indices ; l'idéal est de trouver les sites de nidification (fientes et pelotes récentes) ; ne pas hésiter à questionner les agriculteurs et les riverains.



Strigidés

Petit-duc scops (*Otus scops*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : dans les boisements clairs de feuillus, à proximité des villages où il pourra trouver des cavités pour nicher.

Conseils : repérer le chant typique (attention proche de celui du Crapaud accoucheur) principalement émis au crépuscule et en début de nuit les mois de mai et de juin.



Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) :

Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	-------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : principalement en milieu bocager où la présence de cavités naturelles (arbres) ou artificielles (nichoirs, bâtiments) ainsi que de zones d'alimentation dégagées (surtout prairies) est déterminante ; également dans les marais littoraux vendéens.

Conseils : parades et chants sont les indices les plus faciles à constater surtout aux mois de mars et avril (la repasse peut-être envisagée au cours du mois de mars) ; par la suite, les jeunes peuvent être facilement observés en fin de journée.



Chouette hulotte (*Strix aluco*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : principalement en milieux boisés mais également dans les parcs et certains jardins arborés ; nid dans les cavités d'arbres.

Conseils : les hululements du mâle constituent le meilleur indice ainsi que les cris de la femelle lui répondant ; les jeunes se font entendre à partir d'avril.



Chouette hulotte (Francis Cauet ©)

Hibou moyen-duc (*Asio otus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux ouverts parsemés d'arbres (bocage) ainsi qu'en lisière de boisements ; utilise un ancien nid souvent de Corvidés, de préférence dans un conifère.

Conseils : écouter les chants du mâles dès la fin janvier, jusqu'à mars ; l'indice le plus facile à obtenir sont les cris des jeunes (miaulements puissants) aux mois de mai, juin et juillet.



Hibou des marais (*Asio flammeus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux ouverts notamment en zone de cultures et de prairies ; présence fortement liée à l'abondance de campagnols. Niche directement au sol.

Conseils : **attentions aux migrateurs tardifs** ; des contacts en avril doivent être confirmés au cours du mois suivant ; repérer les comportements territoriaux (chasse les autres rapaces, claquements d'ailes) et le nourrissage des jeunes (transports de proies fréquents et réalisés en journée).



Caprimulgidés

Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : typiquement dans les landes mais plus fréquemment en milieux boisés où il trouve des parcelles en régénération suffisamment rase, des clairières et parfois des taillis pour y nicher ; niche directement au sol.

Conseils : chant caractéristique dès mai puis surtout en juin et juillet (émis la nuit) ; parades typiques avec claquement d'ailes. Prospecter les secteurs favorables, les chants sont faciles à détecter ; la repasse peut-être utilisée mais n'est souvent pas nécessaire.




Apodidés

Martinet noir (*Apus apus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieu urbain où il trouve les supports nécessaires (bâtiments divers et variés) pour installer son nid ; niche souvent en petites colonies ; entrée des nids sous les avant-toits, les tuiles, trous de mur...

Conseils : **éviter les codes « possible » voire « probable » pour cette espèce.** Repérer les rondes, courses-poursuite accompagnées de cris stridents. Le meilleur indice reste l'observation d'un individu entrant dans une cavité.



Alcédinidés

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : différents types de milieux aquatiques pourvu qu'il y ait de l'eau libre suffisamment profonde pour y pêcher : cours d'eau, étangs, lacs, marais avec canaux... Niche dans une cavité, directement dans la berge ou entre les racines d'arbre.

Conseils : repérer les parades dès le mois de février ainsi qu'en mars (offrande par le mâle) ; le cri à l'envol constitue également un bon indice de présence ; surveiller le transport de proie.



Martin-pêcheur d'Europe (Francis Cauet ©)

Méropidés

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : le long de la Loire ou dans les carrières d'extraction de roches meuble (sable, argile) ; creuse son nid (entrée d'environ 6 cm de diamètre) dans les berges abruptes et assez hautes.

Conseils : chant caractéristique et fréquent en pleine période d'activité ; chercher les nids lors de la découverte d'individus ; activité maximum en juillet et août avec le nourrissage des jeunes (chant, apport de nourriture).



Upupidés

Huppe fasciée (*Upupa epops*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : différents types de milieux notamment ouverts lui permettant de s'alimenter (prairies, chemins...) et présentant des cavités pour nicher (arbres creux, vieux murs, terrier de lapin, tas de pierre).

Conseils : **éviter les codes « possible » avant le mois d'avril** ; repérer le chant caractéristique ainsi que les cris émis à proximité du nid.



Picidés

Un dossier spécial « inventorier et déterminer les abondances de pics » est téléchargeable sur le portail national de l'atlas à cette adresse : <http://files.biolovision.net/www.atlas-ornitho.fr/pdf/Dossierpics1-1261.pdf>

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers, bocagers voire également dans les parcs. Niche dans une cavité (arbres creux, loges de pics, murs...).

Conseils : le meilleur indice est le chant aux mois d'avril et de mai (possible en juillet si deuxième pontes) ; **éviter les codes « possible » en avril** étant donné la présence de migrateur.



Pic cendré (*Picus canus*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers dans les vieux boisements de feuillus, parfois en mélange avec des résineux.

Conseils : à rechercher aux mois de mars (voire avril), période de chant et de tambourinage la plus active ; confirmer les chants par un contact visuel et suivre au mieux la reproduction.



Pic vert (*Picus viridis*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : principalement en milieux boisés ouverts (bocage, bois, parcs et jardins) mais également dans des secteurs moins boisés, pourvu qu'il trouve des feuillus pour y creuser une cavité.

Conseils : commence à chanter (cris caractéristiques) au mois de janvier mais cantonnement à partir de février ; **éviter code « possible » au mois de janvier** ; observation du nourrissage au nid.



Pic noir (*Dryocopus martius*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers mais également en milieu plus ouvert avec la présence de boisements ; creuse sa loge dans des feuillus ou des résineux ; souvent plusieurs loges ; ouverture ovale d'environ 12/15 cm de haut.

Conseils : parades en janvier et loge creusée en mars ; cris et chants fréquents à partir de février ; les loges caractéristiques sont de bons indices ; **s'assurer qu'elles sont occupées.**



Pic épeiche (*Dendrocopos major*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux forestiers ainsi les zones boisées, pas forcément denses (bocage, parcs urbains, jardins, vergers...) ; creuse sa loge dans des feuillus ou résineux (ouverture circulaire d'environ 4 à 4,5 cm.

Conseils : premiers tambourinages dès janvier, souvent à proximité du site de nidification ; forage de la loge en mars ; les jeunes sont très bruyants à partir de mai.



Pic mar (*Dendrocopos medius*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieu forestier, dans des futaies de feuillus âgées ; nid creusé dans des arbres morts ou dépérissant.

Conseils : tambourine très peu, l'indice le plus facile à repérer est son chant aux mois de janvier et février ; les cris des jeunes sont facilement repérables à partir du mois de mai.



Pic épeichette (*Dendrocopos minor*) :

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Habitats : milieux boisés riches en feuillus : forêts, bois, parcs et jardins, ripisylves... Loge circulaire de petite taille (3,2 à 3,8 cm de diamètre).

Conseils : espèce assez discrète ; repérer les chants et tambourinages (séquence longue, environ 2 sec) dès le mois de janvier.



Bibliographie

Groupe Ornithologique Breton, 2004. *Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Annexe 3 : Consignes par espèce, commentaires sur le statut et le comportement des espèces nicheuses en Bretagne*. Groupe Ornithologique Breton, 6 p.

Marchadour B. & Séchet E. (coord.), 2008. *Avifaune prioritaire en Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 221 p.

Poitou-Charentes Nature, (éds.) 2005. *Vade-mecum de l'ornitho en Poitou-Charentes*. Poitou-Charentes Nature, Poitiers, 186 p.