



## Les observations remarquables de l'hiver 2016 en Mayenne : 22 décembre 2015 au 19 mars 2016

Données de [www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)

(sous réserve d'homologation des données par le CHMaine–nom de l'espèce suivi d'une étoile)

Extrait du site LPO : « avec 7,9° C de température nationale moyenne, l'hiver dépasse de 2,3°C la normale saisonnière. Selon les données de MétéoNews, c'est l'hiver le plus chaud observé en France depuis les premiers relevés météo en 1900. Les spécialistes du climat considèrent que le printemps a commencé le... 21 février ! »

A noter une nouvelle espèce pour la Mayenne : le Grand Corbeau.

### Anatidés et grèbes

**Oie cendrée** : 12 vols sont détectés entre le 05/02 et le 01/03 pour un total de 900 inds. Quelques autres données d'oiseaux locaux ? 1 donnée de **Bernache cravant** à Changé le 22/12 : s'agit-il de l'oiseau qui a hiverné sur ce site l'an dernier ? Le **Tadorne de Belon** est observé jusqu'au 05/03 surtout à La Rincerie avec 11 inds maximum, un des seuls sites favorables. **Canard pilet** : un seul hivernant à Beaucoudray et passage marqué à la mi-mars. Le Canard siffleur est quasi absent, à noter un groupe record le 02/03 à Bourgon. Les comptages Wetlands à la mi-janvier sont parmi les plus faibles sauf pour le **Fuligule morillon**. L'étang de Beaucoudray accueille jusqu'à 700 **Fuligules milouins** mais d'autres groupes sont présents sur Olivet et Launay-Villiers. Plusieurs hybrides dont 3 **hybrides milouin-nyroca** sont notés dans ces groupes. La femelle de **Nette rousse\*** hiverne sur la carrière de Maisoncelles. Le **Garrot à œil d'or** est observé jusqu'au 30/12. Un petit groupe de **Harles bièvres** hiverne à Jublains (revenants de l'hiver précédent ?). Jusqu'à 6 **Erismaures rousses** sont présentes le 02/01 ; à partir de mars cette espèce est notées sur 5 sites. Première et seule donnée pour la **Sarcelle d'été** le 18/03.

Une seule donnée de **Grèbe à cou noir** les 02 et 03/01 à Beaucoudray avant le retour fin février sur un des sites de nidification. Le **Râle d'eau** est noté sur seulement 6 sites classiques.

### Grands échassiers

Les **Hérons garde boeufs** se font discrets, 1 seul hiverne sur le secteur traditionnel de la Rincerie et un groupe de 12 au Bourgneuf la forêt en janvier. 2 données de **Cigogne blanche** (6 le 23/01 et 1 le 19/02). La **Spatule blanche** effectue son premier hivernage à Beaucoudray avec 3 inds jusqu'au 13/01, puis revues à partir du 05/03. Aucune Grue cendrée.

### Rapaces

2 données toujours aussi rares de **Autour des palombes** au Bourgneuf la forêt et à La Chapelle Rainsouin. 1 donnée de **Milan royal** à Argentré le 14/01. 1 donnée de **Milan noir** le 18/03. Un seul **Faucon émerillon** le 12/01 à Villiers Charlemagne. Hors des sites de reproduction et de l'oiseau hivernant à Beaucoudray, 2 données de **Faucon pèlerin** ! Avec l'inventaire des rapaces nocturnes, le nombre de données concernant la Chevêche d'Athéna atteint des records. 1 **Hibou des marais\*** à Congrier le 08/02.

### Limicoles

Rarement un hiver a fourni aussi peu de données : 1 **Avocette élégante** et 3 **Bécasseaux variables** à la Rincerie, fin janvier grâce aux vasières découvertes favorables. Un seul **Courlis cendré** le 14/01 au Horps et un migrateur le 10/03 à Renazé. Seulement 10 observations de **Pluvier doré** surtout à la mi-janvier ! La **Bécassine sourde** est découverte sur 5 sites. 2 données hivernales du **Chevalier guignette** mais aucune pour l'Oedicnème criard.

### Laridés

Seulement 3 ou 4 **Goélands cendrés** notés au cours de l'hiver et aucun **Goéland marin** (2 données de passage le 26/02 à La Rincerie et le 02/03 à Bourgon). 3 **Goélands pontiques\*** seulement ce qui s'explique par l'absence de suivi du site de Saint-Fraimbault. Une donnée remarquable tardive mais classique en France de **Goéland à ailes blanches\*** le 27/02 à La Rincerie. Une donnée de **Mouette pygmée** suite à un coup de vent avec 4 oiseaux à La Rincerie le 13/01 et 1 jusqu'au 29/01. 1 jeune **Mouette mélanocéphale** mi-janvier à La Rincerie et surtout un passage record en Mayenne fin février début mars sur 7 sites au moins avec jusqu'à 11 inds.

### Passereaux

Le **Pipit spioncelle** est noté sur toute la période principalement sur les étangs en assec (Les Rochettes, Curécý, La Rincerie...) L'hiver doux explique la rareté de la **Bergeronnette de yarrell** comme la faible abondance des autres hivernants : **Grives mauvis et litorne**, **Tarin des aulnes**, **Pinson du nord**. Par contre la **Bouscarle de cetti** est notée sur plus de 10 sites. 1 nouveau cas d'hivernage de **Serin cini** à Renazé. Nombreuses données hivernales pour le **Pouillot véloce**. Les **Roitelets huppé et à triple-bandeaux** semblent plus abondants que les hivers précédents sûrement en lien avec l'afflux de l'automne. Quelques données de **Mésange noire**. Le **Moineau friquet** (2 données à La selle Craonnaise et à Lesbois) et le **Bouvreuil pivoine** confirment leur régression. 1 seule donnée hivernale de **Fauvette à tête noire** mais son retour est très précoce le 18/02 ainsi que les premiers chants le 19/02. Retour des premiers migrateurs : **Hirondelle rustique** le 27/02, **Hirondelle de rivage** le 29/02, **Traquet motteux** le 18/03. A noter en mars 2 nouvelles données de **Grimpereau des bois** à Averton. et Le **Grand Corbeau\*** qui fournit sa première observation documentée en Mayenne le 16/03 au Mont des Avaloirs. Cette observation pourrait être mise en relation avec l'extension récente de l'espèce en Bretagne sur des sites intérieurs.

Photos de l'hiver 2016 sur [www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org) : Pinson du nord, Philippe Boulvrais – Fuligule hybride milouin-nyroca, Garrot à œil d'or François Duchenne - Goéland marin, Mouette pygmée et Goéland à ailes blanches, Siméon Béasse – Chevêche d'Athéna, Sylvain Périgois – Bruant des roseaux, Anthony Garry – Pipit farlouse, Michel Dréano

