



LES OISEAUX RARES

EN 2008 DANS LE MAINE

(MAYENNE et SARTHE)



Faucon kobez *Falco vespertinus*, femelle 2^{ème} année, La Ferté-Bernard, Sarthe, 17 mai 2008,
(F.Jallu, photo montage).

1^{er} rapport du Comité d'Homologation du Maine

Les oiseaux rares dans le Maine (Mayenne et Sarthe) en 2008

1^{er} rapport du Comité d'Homologation du Maine

Dominique TAVENON, Christian KERIHUEL et le CH Maine

Regroupant les 2 départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de 4 associations locales: Mayenne- Nature- Environnement (MNE) , Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), LPO Sarthe et Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et dont l'espèce ne fait pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale. Pour l'instant, il existe un coordinateur départemental pour chacun des 2 départements (D.Tavenon pour le 53 et E. Lapous pour le 72), chargé de collecter, centraliser et transmettre les observations départementales d'espèces rares sur le plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Celui-ci publie chaque année un rapport annuel dans la revue d'ornithologie française *Ornithos* (Zucca & le CMR, 2004, 2005, 2007).

Ce premier rapport du CH Maine couvre l'année 2008, 1^{ère} année de son fonctionnement. Les membres du Comité ont été invités à examiner 70 fiches concernant des données d'espèces homologables à compter du 1^{er} janvier 2008. Le taux de validation atteint 93%. La classification suit la liste des taxons observés en France métropolitaine établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française) en date du 30 juin 2007.

En 2008, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Hervé Julliot, Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), François Morazé, Jean-Luc Reuzé et Dominique Tavenon (secrétaire).

A la fin de l'année 2009, le CH Maine procédera, en accord avec les associations locales citées plus haut, au renouvellement d'un de ces membres sur cooptation, après appel à candidature. Les observateurs qui souhaiteraient intégrer le comité sont invités à en informer dans les meilleurs délais son secrétaire, par courriel ou par courrier postal.

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont disponibles à l'adresse du secrétariat, et sur les sites Internet des associations:

MNE : <http://mayennenatureenvironnement.fr>

GSO : <http://gso72.free.fr>

LPO Sarthe : <http://sarthe.lpo.fr>

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :

Dominique Tavenon / Secrétaire du CH Maine, 2 chemin du Laurier, 53270 Blandouet

ou aux adresses mail suivantes: dominique.tavenon525@orange.fr,
christian.kerihuel@wanadoo.fr

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifiques.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux chiffres représentent le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour 2008.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
- 8- Date(s) d'observations .
- 9- Nom(s) du (ou des)observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental (CAF/LPO 2003).
- 11- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (2/5)

Est du Groenland, Spitzberg et Nouvelle- Zemble

Sarthe- Saint-Denis d'Orques, 4 ind, phot., 19 octobre au 30 décembre, puis 3 ind. au-delà du 30 décembre (J-Y.Bourreau, Ch. Kerihuel et al.); Connerré, 14 décembre, (Th.Andrieu).

Un stationnement de plus de 2 mois, à Saint-Denis d'Orques (Sarthe), pour le petit groupe de 4 inds., très souvent farouches, qui autorisent tout de même le doute quant à l'origine sauvage.



Fig.1 :
Bernaches
nonnettes
*Branta
leucopsis*, Saint-
Denis d'Orques
(Sarthe), 25
octobre 2008
(Ch.Kerihuel).

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (1/1)

Europe du sud-est

Sarthe- Vion, ad.nuptial, phot.,15 avril, (J-F. Darras)

L'observation d'un mâle ad. nuptial entre bien dans le pattern d'apparition de l'espèce en migration pré-nuptiale, sans autre certitude.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (3/3)

France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu'en Asie centrale.

Sarthe- Saint-Denis d'Orques, fem.,11 février, (A .Darras) ; 30 décembre, fem., phot.,

(Ch.Kerihuel) ; La Flèche, m.ad.,31 décembre, phot., (B.Basoge et al.)

Les trois données en provenance de la Sarthe, pour une espèce d'occurrence quasi annuelle dans les deux départements.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (1/1)

Balkans et Europe centrale jusqu'à Asie centrale.

Sarthe- La Flèche, fem.ad., 23 octobre, (B.et C.Basoge)

Une seule donnée de la Sarthe, la deuxième sur ce site semblant particulièrement attractif pour les anatidés plongeurs.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (1/1)

Islande, nord des îles britanniques, et de Scandinavie jusqu'à Sibérie.

Mayenne- Sainte-Suzanne, mâle 2 E probable, 27 juin, (D.Madiot).

L'observation anachronique d'un individu en période estivale mérite d'être soulignée. Espèce déjà observée antérieurement sur cet étang.

HARLE HUPPE *Mergus serrator* (2/4)

Autour de l'hémisphère nord, en Europe, au-delà de 55°N.

Mayenne- Saint-Denis d'Anjou, fem.ad., 18 novembre, (A.Darras).

Sarthe- La Ferté-Bernard, 1m ,1f et 1f/juv, 14 novembre, (J-F.Blanc et F.Jallu).

Les deux données, du mois de novembre, cadrent bien avec le pattern d'apparition de l'espèce dans notre région, lors de la migration post-nuptiale, et à la faveur d'un coup de vent d'ouest. (troisième donnée pour le site sarthois).

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (2/2)

Région circumarctique.

Sarthe- Sillé le Guillaume, 17 décembre, 1^{ère} année, (Th.Andrieux). La Flèche, 18, 19 et 21 décembre, 1^{ère} année, phot., (B.Basoge, Ch.Kerihuel).

Deux données sarthoises, à des dates classiques, lors de la migration post-nuptiale de l'espèce. Il s'agit de la deuxième donnée pour chaque site.



Fig.2 : Plongeon catmarin *Gavia stellata*, La Flèche (Sarthe), 19 décembre 2008 (Ch.Kerihuel)

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (1/1)

De la Scandinavie à la Russie. Quelques couples au nord de la Grande-Bretagne.

Sarthe- La Flèche, 31 octobre, (B. et C.Basoge).

Une donnée à une date classique pour cet hivernant côtier rare à l'intérieur des terres.

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (1/1)

De l'Europe à l'Asie et ponctuellement Afrique du Nord.

Mayenne- Jublains, 28 décembre 2008 au 9 janvier 2009, (A.Dordoigne, D.Madiot).

Une seule donnée, sur un des rares étangs mayennais possédant quelques îlots de roselières sans dérangement.

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax* (2/2)

Zones tempérées du Paléarctique.

Mayenne- Aron, 19 avril, (D.Madiot, G.Bouteloup, D.Quinton).

Sarthe- Saint-Germain sur Sarthe, juv., 23 juillet, phot., (J.Depeint).

Deux données à des dates conformes en migration pré-nuptiale et en dispersion des jeunes fin juillet –août.



Fig.3: Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax,
Saint-Germain s/ Sarthe,
(Sarthe), 23 juillet 2008
(J.Depeint).

CIRCAETE JEAN LE BLANC *Circaetus gallicus* (1/1)

Sud de l'Europe, nord de l'Afrique, Turquie, Pologne à Sibérie centrale et Inde.

Sarthe- Lamnay, 19 juin, phot., (F.Jallu).

Une seule donnée d'un oiseau de cette espèce qui se trouve à la marge nord-ouest de son aire de répartition en France.

FAUCON KOBZ *Falco vespertinus* (3/3)

De la Hongrie à la Russie (fleuve Léna).

Mayenne- Bais, mâle ad., 6 mai, (D.Tavenon).

Sarthe- La Ferté-Bernard, fem.2A, 17 mai, phot., (F.Jallu, F.Morazé, Ch.Kerihuel); Parcé, fem.ad., 6 au 8 mai, (E.Lapous, F.Jallu, Ch.Kerihuel).

Ces trois données remarquables s'inscrivent dans le contexte particulier d'un afflux important en migration pré-nuptiale sur l'ensemble du territoire français. (première donnée pour chacun des sites).

OUTARDE CANEPETIERE *Tetrax tetrax* (1/1)

Maroc, Europe de l'ouest à Asie centrale, jusqu'au nord de la Chine.

Sarthe- Parcé, mâle ad., 17 avril, phot., (J-F.Darras et al.)

Une donnée intéressante d'un oiseau en migration pré-nuptiale, sur la plaine du sud-ouest de la Sarthe, qui a dépassé la limite nord de son aire de répartition dans le grand ouest. La moitié des 10 données sarthoises provient de la plaine de Parcé. (*comm. pers.* H. Julliot).

HUITRIER-PIE *Haemantopus ostralegus* (1/1)

Europe et ouest Russie jusqu'à l'Altai.

Sarthe- La Ferté-Bernard, ad., 27 mars, phot., (F.Jallu et al.)

Une donnée pour cette espèce migratrice dont les retours culminent de mars à mi-mai. Ce site est le plus fréquenté par l'espèce en Sarthe (4 données au moins depuis 1998, (*comm. pers.* H. Julliot).

GLAREOLE A COLLIER *Glareola pratincola* (1/1)

Sud de l'Europe au Pakistan.

Sarthe- Parcé, mâle ad., 1er mai, (Eric Lapous, H.Davière-Lapous).

Nicheuse très rare le long du littoral méditerranéen, et migratrice rare en France, cette espèce est occasionnelle ailleurs et fournit pour le sud- Sarthe sa première donnée remarquable.

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (2/2)

Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland.

Sarthe- La Ferté-Bernard, juv., 17 et 21 septembre, phot., (F.Jallu, J-F. Blanc). Parigné l'Evêque, juv., 19 septembre, phot., (J-Y.Boureau, Ch.Kerihuel).

Deux données sarthoises, concernant deux oiseaux juvéniles, qui cadrent bien avec le pic de migration post-nuptiale de l'espèce, entre début septembre et mi-octobre. Il est possible/probable que ces 2 données concernent le même oiseau (*comm. pers.* F.Jallu)

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (2/2)

Arctique : sud de la Norvège à l'est de la Sibérie.

Sarthe- La Ferté- Bernard, ad., 26 et 27 avril, phot., (F.Jallu). La Ferté-Bernard, ad., 6 au 8 mai, phot., (F.Jallu, C.Kerihuel).

Egalement deux données pour cette espèce qui apparaît surtout en mai dans nos régions. A noter, l'intérêt marqué des limicoles pour le site sarthois des Ajeux, à La Ferté-Bernard.



Fig. 3 : Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*, La Ferté-Bernard, Sarthe, 7 mai 2008 (F.Jallu).

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (1/1)

Arctique nord américain et Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Ecosse 2004.
Mayenne- Sainte-Suzanne, juv., 26 septembre, (D.Madiot).

Une donnée de ce limicole surtout nord-américain, qui fréquente aussi les plans d'eau à l'intérieur des terres, à une date se situant juste après le pic de passage post-nuptial, à mi-septembre, (première mention pour le site).

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (2/2)

Extrême nord de la Sibérie centrale.

Mayenne- Aron, 5 juillet, (D.Madiot, A.Dordoigne).

Sarthe- La Ferté-Bernard, juv., 17 et 21 septembre, phot., (F.Jallu, J-F.Blanc).

La donnée de début juillet concerne un oiseau tardif au passage pré-nuptial, alors que l'observation d'un juvénile en Sarthe entre dans le pic de migration post-nuptiale.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (2/2)

Nord de la Scandinavie, Russie d'Europe jusqu'à l'Iénissei.

Mayenne- Bouère, 23 novembre, (A.Darras).

Une donnée mayennaise pour cette espèce, rare et en très petit nombre à l'intérieur des terres. Cette donnée est la plus tardive pour le Maine.

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius* (1/1)

Arctique, autour de l'hémishère nord, au delà de 70°N, et Islande.

Mayenne- Sainte-Suzanne, juv., 12 septembre, phot., (D.Madiot).

Une donnée de ce limicole plutôt pélagique et côtier, suite à un afflux sur les côtes bretonnes et vendéennes dû aux forts coups de vent de début septembre.



Fig.4 : Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*, Sainte-Suzanne (Mayenne), 12 septembre 2008 (D.Madiot).

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (2/2)

De la Mer Noire au Kazakhstan. Ponctuellement Allemagne orientale et Pologne.

Mayenne- Saint-Fraimbault, H1 (2CY), 18 janvier, phot., (D.Madiot).

Sarthe- Marçon, H1, 2CY, 3 janvier, phot., (N.Issa).

Deux données pour cette espèce, d'apparition hivernale dans notre région, découverte en Mayenne en 2006. En Sarthe, il s'agit de la première mention. Des prospections assidues sur les centres d'enfouissements techniques des ordures ménagères et les dortoirs de laridés à proximité permettraient certainement d'obtenir des données plus nombreuses, et ainsi de préciser le statut de cette espèce, d'apparition récente dans l'ouest de la France.



Fig. 5 : Goéland pontique *Larus cachinnans*, Marçon, Sarthe, 3 janvier 2008 (N.Issa).

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (1/25)

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.

Mayenne- Louvigné, 25 minimum, 26 février au 17 mars, encore 1 ind. le 22 avril, phot., (D.Madiot, G.Bouteloup, A.Dordoigne).

Une donnée hivernale concernant un dortoir qui a dépassé la trentaine d'individus, après l'afflux de l'hiver 2003 dans l'ouest de la France.

MARTINET A VENTRE BLANC *Apus melba* (1/1)

Sud de l'Europe, Portugal à Asie Mineure, et nord du Maroc.

Sarthe- La Chapelle Saint-Aubin, 12 mai, (C. et J.Corvaisier) .

Une donnée sarthoise pour cette espèce. Lors des mouvements migratoires, des oiseaux isolés peuvent être occasionnellement rencontrés loin de l'aire de nidification.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster* (2/15)

Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud.

Sarthe- Laigné en Belin, 14 ind ., 10 mai, (F.Vaidie).

- La Flèche, 10 juillet, (B.Même-Lafont).

Deux données sarthoises qui totalisent 15 oiseaux. A noter que les observations printanières, loin des sites de reproduction, ne sont pas courantes.

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris* (1/1)

Paléarctique occidental jusqu'en Iran, Sibérie et N-O du Kazakhstan.

Sarthe- Vezot, 31 août, (F.Morazé).

Une donnée du nord-Sarthe qui s'inscrit dans le passage post-nuptial classique de l'espèce en France.

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (1/1)

Anthus p.petrosus, sédentaire: côtes d'Europe occidentale.

Sarthe- La Ferté-Bernard, 1^{er} et 2 octobre, phot., (F.Jallu, J-F.Blanc).

Il s'agit de la date la plus précoce dans le Maine pour le passage post-nuptial de cette espèce. Deuxième mention pour ce site.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (1/1)

L. s. svecica: de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidentale; L.s.namnetum: régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde.

Sarthe : - La Ferté-Bernard, ad., 20 mars, phot., (F.Jallu et al.).

Une donnée à une date classique du passage pré-nuptial connu de l'espèce. Espèce quasi annuelle sur ce site depuis 2003.



Fig. 6 : Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, La Ferté-Bernard, Sarthe, 20 mars 2008 (F.Jallu).

LOCUSTELLE LUSCINOIDE (*Locustella luscinioides*) (1/1)

N-O de l'Afrique et de l'Europe jusqu'à l'ouest de la mer d'Azov.

Sarthe- Vaas, 15 mai, (O.Vannucci, B.Même-Lafond).

Cette donnée se situe plutôt à la fin du passage pré-nuptial connu pour l'espèce. Vaas est une station connue pour cette espèce depuis 25 ans : des chanteurs notés quasi annuellement entre fin avril et juin, dans les années 1980 et 1990. Elle n'y avait pas été rencontrée depuis 1998 (*comm.pers.* H. Julliot).

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (1/1)

S.u.undata : Méditerranée occidentale, de l'Espagne à l'Italie, et sud de la France.

S.u.dartfordiensis : dans l'ouest de la France.

Mayenne- Saint-Fraimbault de Prières, 7 juin, (D.Madiot, A.Dordoigne).

Une donnée pour cette espèce, en limite de son aire de répartition, mais toute proche du petit noyau de population historique du nord-est mayennais.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (1/1)

Europe de l'ouest, jusqu'au nord de l'Italie, le nord de la Yougoslavie, le Grand Caucase et le bassin moyen de la Volga, en Sibérie, jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.

Mayenne- Ballée, 16, 20, 21 et 26 mai, (D.Madiot).

La date correspond à la fin du pic de passage pré-nuptial de l'espèce.

GOBEMOUCHE NAIN (*Ficedula parva*) (1/1)

De la Pologne et du sud de la Suède à 65° E, et de l'Allemagne à la Slovaquie et à la Roumanie.

Mayenne- Pré en Pail, juv., 30 Août, (L.et J-P.Rousselet).

Donnée remarquable d'un oiseau cadrant bien avec le début du passage post-nuptial connu pour cette espèce.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* (1/1)

L.e.excubitor: de la France et des Carpates jusqu'en Europe du Nord et à la Sibérie(fleuve Iénissei) ;

Mayenne- Villepail, 26 octobre, phot.,(D.Madiot).

Donnée conforme au pattern d'apparition de l'espèce dans notre région où elle a déjà hiverné par le passé. A rechercher en hiver en lisière de forêt et dans des parcelles en régénération.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*) (1/5)

L.s.senator : depuis les Pyrénées jusqu'à l'ouest de la Turquie à l'est, et à la Pologne au nord .

Mayenne- Saulges, 15 et 18 septembre, phot., (D.Madiot, A Dordoigne).

Sarthe- Chevillé, 1 couple et 2 juv., 22 mai au 20 août, phot., (J-F.Darras, E.Lapous).

Donnée remarquable d'un couple nicheur avec 2 juv. à l'envol en Sarthe. L'espèce est nicheuse occasionnelle dans le Maine. L'espèce n'avait pas niché en Sarthe depuis 1967 ! (comm .pers. H. Julliot).



Fig. 7 et 8 : Pie-grèche à tête rousse *Lanius senator*, juv. et adultes, Chevillé (Sarthe), juillet 2008 (J-F.Darras).

SIZERIN FLAMME *Carduelis flamma* (6/23)

De la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N.

Mayenne- L'Huisserie, 18 octobre, (B.et F.Duchenne). Bouère, 2 ind., 11 novembre, (D.Tavenon). L'Huisserie, 2 ind., 13 novembre, (J-L.Reuzé).

Sarthe- Le Mans sud, 15 ind., 2 mars, (H.Julliot). La Ferté-Bernard, 22 novembre, phot., (F.Jallu). Saint-Célerin, 2 ind., 21 décembre au 10 Janvier, phot., (C.Van Den Ham, G.Carreau).

L'année 2008 fournit 6 données totalisant 23 oiseaux de cette espèce passant facilement inaperçue, ce qui cadre bien avec l'arrivée des migrateurs post-nuptiaux, puis des hivernants, dans la région.



Fig.9 : Sizerin flammé *Carduelis flamma*, Saint-Célerin (Sarthe), décembre 2008 (G.Carreau).

SOUS-ESPECES

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *ssp. thunbergi* *Motacilla flava thunbergi* (1/1)

De la Norvège au nord de la Sibérie.

Sarthe- La Ferté-Bernard, ad., 7 mai, phot., (F.Jallu).

Un migrateur pré-nuptial, contacté encore sur le site sarthois des Ajeux, à la Ferté-Bernard. Troisième mention pour ce site.



Fig. 10 : Bergeronnette printanière *Motacilla flava thunbergi*, La Ferté-Bernard (Sarthe), 7 mai 2008 (F.Jallu).

HYBRIDES

CANARD COLVERT X CANARD PILET *Anas platyrhynchos x Anas acuta* (1/1)

Mayenne- Sainte-Suzanne, 11 et 18 janvier, puis 31 octobre au 7 novembre, phot., (D. Madiot).

Déjà observé en 2006 et 2007 sur deux étangs des Coëvrons, en Mayenne, cet hybride est de nouveau trouvé dans ce secteur.

FULIGULE MORILLON X FULIGULE NYROCA *Aythya fuligula X Aythya nyroca* (1/1)

Sarthe- Spay, 26 octobre, phot., (P-V.Vanderveghe).

Date classique pour l'arrivée des fuligules et de cet hybride de 1^{ère} génération.

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES

CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix* (1/1)

Sarthe- Parcé, 15 mars, (E.Lapous).

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius* (1/2)

Sarthe- La Ferté- Bernard, 2 ad., 1^{er} mars, phot., (F.Jallu).



Fig.11 : Petit Gravelot *Charadrius dubius*, La Ferté-Bernard, 1^{er} mars 2008 (F.Jallu).

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia* (1/2)

Mayenne- Aron, 2 ind., 27 février, (D.Madiot).

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*- Sarthe- Cré sur Loir, 9 octobre, (*description insuffisante et conditions de lumière bien médiocres*).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* - Sarthe- Marçon, 3 Janvier, (*la description laisse planer quelques doutes sur une identification certaine, en raison de l'évocation de la taille d'un Grèbe huppé. Le cou gris et blanc et les flancs clairs ne permettent pas d'écarter de façon certaine d'autres espèces voisines*).

Faucon kobez *Falco vespertinus* - Mayenne- Entrammes, 18 mai, (*La description, en raison de la distance et du matériel d'observation, n'évoque pas tous les critères qui permettraient de trancher en faveur du F. kobez. Dans ces conditions, difficile d'accepter pour une espèce délicate pour qui ne l'a jamais vue auparavant*).

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* - Sarthe- Nogent sur Loir, 16 mars, (*la description est totalement absente, pour une espèce qui est quand même très occasionnelle dans le Maine. Il n'y a pas de mention des conditions météo et d'éclairage, et du matériel d'observation utilisé*).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*- Sarthe- La Flèche, 25 février, (*La description est totalement absente, pour une espèce qui, certes, paraît facile. Il n'y a pas de mention des conditions météo et d'éclairage, ni du matériel d'observation utilisé*).

OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2008.

CHEVALIER BARGETTE *Xenus cinereus* (1/1)

Mayenne- Bourgon : lac de haute-Vilaine, du 13 au 15 septembre (F.Rose *et al.*)

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (1/1)

Mayenne- Saint-Fraimbault de Prières, 2^{ème} hiver, phot., du 1^{er} au 15 février (D.Madiot *et al.*)

CATEGORIE E

SARCELLE MARBREE *Marmaronetta angustirostris* (1/2)

Sarthe- Fillé sur Sarthe, couple, phot., du 1^{er} au 8 mai (C.Kerihuel *et al.*)

REMERCIEMENTS

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2008 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne- Nature- Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe et la liste de diffusion ObsMaine.
- l'ensemble des ornithologues, observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

Commission de l'Avifaune Française, 2007- Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). Ornithos14 (4) : p.234-246.

DUBOIS P.-J., LE MARECHAL P., OLIOSSO G. & YESOU P., 2008- Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.

ISSA N. et le CHR Centre, 2008- Les oiseaux rares en région Centre en 2007.

REEBER S. et le CHN, 2009- Les oiseaux rares en France en 2008. 26^{ème} rapport du Comité d'Homologation National.

FREMONT J.-Y., REEBER S. & le CHN, 2008 – Les oiseaux rares en France en 2007. 25^{ème} rapport du Comité d'Homologation National.