



---

# LES OISEAUX RARES

## EN 2009 DANS LE MAINE

(MAYENNE et SARTHE)

2ème rapport du Comité d'Homologation du Maine



© Christian Kerihuel 2009

**Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*, Le Mans (Sarthe), le 20/03/2009**  
(Ch. Kerihuel)

# Les oiseaux rares dans le Maine (Mayenne et Sarthe) en 2009

## 2ème rapport du Comité d'Homologation du Maine

*Dominique TAVENON, Christian KERIHUEL et le CH Maine*

Regroupant les 2 départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de 4 associations locales: Mayenne- Nature- Environnement (MNE) , Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), LPO Sarthe et Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et dont l'espèce ne fait pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale. Pour l'instant, il existe un coordinateur départemental pour chacun des 2 départements (D.Tavenon pour le 53 et E. Lapous pour le 72), chargé de collecter, centraliser et transmettre les observations départementales d'espèces rares sur le plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Celui-ci publie chaque année un rapport annuel dans la revue d'ornithologie française *Ornithos* (Zucca & le CMR, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010).

Ce deuxième rapport du CH Maine couvre l'année 2009, 2<sup>ème</sup> année de son fonctionnement. Les membres du Comité ont été invités à examiner 65 fiches concernant des données d'espèces homologables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2009. Le taux de validation atteint 97%. La classification suit la liste des taxons observés en France métropolitaine établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française) en date du 30 juin 2007.

En 2009, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Hervé Julliot, Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), François Morazé, Jean-Luc Reuzé et Dominique Tavenon (secrétaire).

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont disponibles à l'adresse du secrétariat, et sur les sites Internet des associations:

MNE : <http://mayennenatureenvironnement.fr>

GSO : <http://gso72.free.fr>

LPO Sarthe : <http://sarthe.lpo.fr>

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :

Dominique Tavenon / Secrétaire du CH Maine, 2 chemin du Laurier, 53270 Blandouet

ou aux adresses mail suivantes: [dominique.tavenon525@orange.fr](mailto:dominique.tavenon525@orange.fr),  
[christian.kerihuel@wanadoo.fr](mailto:christian.kerihuel@wanadoo.fr)

## **LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES (catégories A & C)**

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifiques.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2009 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour 2009.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
- 8- Date(s) d'observations .
- 9- Nom(s) du (ou des)observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental (CAF/LPO 2003).
- 11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme «présentant les caractéristiques » de la sous –espèce concernée.
- 12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

### **OIE DES MOISSONS *Anser fabalis ssp. rossicus* (0/0-1/12)**

*Niche dans la zone boréale du Paléarctique, en Sibérie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kathanga. Hivernent en Asie orientale et dans une grande partie de l'Europe (Nord, centre et ouest), dans l'est de la France, ainsi que dans une grande moitié nord du pays lors de vagues de froid. Elle fréquente principalement les zones cultivées.*

Mayenne- Mayenne, 12 ind., 3 au 5 janvier, (B.Brault, J-F.Darras)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *rossicus* ou Oie de la toundra  
Une donnée à une date classique pour cette espèce hivernante rare dans l'ouest de la France.

### **OIE RIEUSE *Anser albifrons* (0/0-1/25)**

*Se reproduit au nord de la Russie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kolyma. Hivernent principalement au nord-est de la France, plus rarement ailleurs.*

Mayenne- Mézangers/étang du Gué de Selle, 25 ind., 4 janvier, phot., (D.Madiot) ;  
Jublains/étang de Neuville, même groupe de 25 ind., 9 au 15 Janvier (A.Dordoigne,  
D.Madiot et J-F. Arcanger).

Une donnée pour deux observations du même groupe d'oiseaux, en 2 endroits différents. Une petite troupe a stationné 12 jours en Mayenne sur 2 étangs des Coëvrons distants de 6 km, dans une fourchette de dates qui s'inscrit bien dans le pattern d'apparition de l'espèce.



**Fig.1:** Oies rieuses,  
Mézangers (Mayenne),  
4 janvier 2009  
(D.Madiot)

**BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (2/5- 2/9)**

*Est du Groënland, Spitzberg et Nouvelle-Zemble. Des populations férales en nette augmentation en mer Baltique et en mer du Nord.*

Mayenne- Saint-Fraimbault de Prières/lac de Hte Mayenne, 8 ind., 25 et 26 décembre, phot., (H. Guédon, D.Madiot, A. Dordoigne)

Sarthe- Sillé le Guillaume/grand étang, 1 ind., 16 décembre 2009 au 2 janvier 2010, (P.Mur, P-J. Lacampagne)

Les observations de groupes ou d'individus isolés de cette espèce autorisent le doute quant à leur origine sauvage. Il est difficile de faire la part des choses entre les individus d'origine sauvage en stationnement hivernal et les individus en dispersion issus de populations férales ou échappées de captivité.

**NETTE ROUSSE *Netta rufina* (3/3- 2/2)**

*France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu'en Asie centrale. Hiverne autour du bassin méditerranéen.*

**Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne.**

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, fem., 21 juin, phot., (D.Madiot).

Sarthe- La Flèche/ La Monnerie, fem., du 13 au 28 octobre, (B.Basoge, O.Vannucci *et al.*)

L'observation anachronique pour le Maine d'un oiseau en période de reproduction mérite d'être soulignée.

**FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (1/1- 5/3)**

*Balkans et Europe centrale jusqu'à Asie centrale.*

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, m., 20 septembre, phot., (D.Madiot)

Sarthe- Saint-Ouen en Belin/étang de Clairefontaine, m. ad., 19 septembre (H.Julliot) ; La Flèche/ La Monnerie, m., 24 septembre, phot. (B.Basoge, O.Vanucci *et al.*); Saint-Ouen en Belin/étang de Clairefontaine, 1 m. et 1f. ad., du 2 au 4 octobre (H.Julliot) ; La Flèche/ La Monnerie, 1f., 13 octobre, (B.Basoge *et al.*).

Bonne année pour cette espèce, avec 5 données ne totalisant probablement pas plus de 3 oiseaux, contactés lors du passage post-nuptial. En effet, même si un turn-over n'est pas exclu, la proximité des sites et des dates d'observation et l'absence de données simultanées plaident en faveur de la présence de 2 oiseaux en Sarthe.





**Fig.2:**  
Fuligule  
nyroca, Saint-  
Ouen en Belin  
(Sarthe),  
2 octobre 2009  
(Ch. Kerihuel).

**FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (0/0-1/2)**

*Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu'au fleuve Léna, à l'est.*

**Espèce homologable uniquement en Sarthe.**

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 2 m.ad., 8 mars, phot., (F.Jallu).

Une seule donnée de ce fuligule en halte migratoire pré-nuptiale, et qui n'apparaît à l'intérieur des terres qu'à la faveur d'un gros coup de vent marin. (En Mayenne, Aron, 1 fem.H1., 10 au 14 mars ; Jublains puis Mézangers, 3 ind. différents (1 fem.H1, 1m.H1, 1 m.ad., 13 nov. au 11 déc., D.Madiot, D.Tavenon).



**Fig.3:** Fuligules milouinans, La Ferté-Bernard (Sarthe), 8 mars 2009 (F.Jallu).

**PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (0/0-1/1)**

*Niche au nord de l'Amérique du Nord et en Islande.*

Mayenne- Mézangers, 1<sup>ère</sup> année, 1<sup>er</sup> au 13 décembre, phot., (D.Madiot, F.Noël, *et al.*)

Une nouvelle donnée mayennaise, après celle de novembre 2005 à Aron, à une période classique d'apparition de cet oiseau, hivernant peu commun le long des côtes et également à l'intérieur des terres, sur étangs, lacs, grands réservoirs et parfois sur le cours des fleuves.



**Fig.4** : Plongeon imbrin, Mézangers (Mayenne), 11 décembre 2009 (C.Kerihuel).



**Fig 4a** : Plongeon imbrin en vol, Mézangers (Mayenne), 10 décembre 2009 (F.Jallu)

**GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (1/1- 1/1)**

*Niche de la Scandinavie à la Russie ; quelques couples en Ecosse. Hiverne le long des côtes françaises de l'Atlantique, en mers du nord, Baltique, Adriatique et Mer noire, à l'est.*

Sarthe- Fillé sur Sarthe, 14 au 24 décembre, phot., (J-M. Rialland, Ch. Kerihuel)

Une nouvelle donnée sarthoise pour cet hivernant littoral plutôt rare à l'intérieur des terres.



**Fig.5:** Grèbe esclavon, Fillé sur Sarthe (Sarthe), 14 décembre 2009 (Ch.Kerihuel).

**BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (1/1- 2/2)**

*De l'Europe à l'Asie et ponctuellement Afrique du Nord.*

Mayenne- Mézangers/étang du Gué de Selle, 24 février, phot., (A.Dordoigne, D.Madiot) ; Jublains/étang de Neuville, 15 novembre 2009 au 19 février 2010, 2 ind. à partir du 15 janvier 2010, phot., (D.Madiot *et al.*)

Deux nouvelles données mayennaises, obtenues sur deux étangs des Coëvrons possédant quelques îlots de roselières, avec un dérangement important à Mézangers, où l'oiseau n'est resté qu'une journée.

Noter que le Butor observé à Jublains/ étang de Neuville du 28/12/2008 au 9/01/ 2009, a encore été noté le 17 /01/2009 et pourrait être le même que celui de l'étang du Gué de Selle, à Mézangers, objet de cette fiche.

**BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (0/0-1/1)**

*Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.*

**Espèce homologable en dehors du site de nidification connu en Sarthe.**

Sarthe- Saosnes/étang de Gué-Chaussée, 1m.ad., 23 septembre, phot ., (F.Morazé)

Une donnée remarquable, pour cette espèce rare et discrète, à une date conforme à la migration post-nuptiale.





**Fig.6:** Blongios nain avec un héron pourpré, Saosnes (Sarthe), 23 septembre 2009 (F.Morazé).

**BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax* (2/2- 1/1)**

*Zones tempérées du Paléarctique.*

**Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne.**

Mayenne- La Selle-Craonnaise, 1<sup>er</sup> hiver( ?), 12 mars, (C.Braud *et al.*)  
 Une donnée précoce d'un oiseau en plumage de 1<sup>er</sup> hiver.

**VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (0/0-1/5)**

*Niche en Europe, entre 35 et 45°N, dans l'extrême nord de l'Afrique, au Moyen-Orient et dans l'ouest de l'Asie. Essentiellement sédentaire, c'est une espèce erratique occasionnelle en France, en dehors de ses zones de réintroduction.*

Sarthe- Bessé sur Braye, 5 juv., 11 juin, phot., (J.Niel, F.Jallu).

Une donnée remarquable qui constitue la première mention de l'espèce pour la Sarthe, avec 5 individus notés ensemble, à la faveur d'un erratisme de plus en plus marqué d'individus juvéniles ou immatures, essentiellement, dans la moitié nord de la France et en Belgique, ces dernières années.



**Fig.7:** Vautours fauves, Bessé sur Braye (Sarthe), 11 juin 2009 (F.Jallu).



**AIGLE BOTTE *Aquila pennata* (1/1-0/0)**

Europe, Afrique du Nord, jusqu'en Asie centrale. La population européenne niche en France, Espagne, et des pays d'Europe centrale à la Grèce. Elle hiverne en Afrique subsaharienne. Deux formes dites « claire » et « sombre » sont distinguées selon leur plumage.

**2008-** Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, 1<sup>er</sup> mai, (D.Tavenon).

Sixième donnée mayennaise- oiseau de forme claire- pour ce rapace rare dans l'ouest de la France, mais première donnée homologable, la précédente datant de 2006.

**MAROUETTE PONCTUEE *Porzana porzana* (0/0-2/2)**

Niche de l'Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes. Hiverne en Afrique subsaharienne.

Mayenne- Mézangers/étang de la Chevalière, juv., 17 septembre au 2 octobre, phot., (D.Tavenon, J-L. Reuzé *et al.*).

Sarthe- Saosnes/étang de Gué-Chaussée, 28 août, (F.Morazé, R.Ledunois).

Deux données pour cette espèce discrète et rare contactée au passage post-nuptial.



**Fig.8:** Marouette ponctuée, Mézangers (Mayenne), 1<sup>er</sup> octobre 2009 (J-L.Reuzé).

**PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (0/0-1/7)**

Niche de l'Ecosse et des Pyrénées espagnoles jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et en Sibérie orientale. Hiverne du Maghreb à l'Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et en petit nombre entre l'Andalousie et Chypre.

**Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud-Sarthe.**

Mayenne- Thorigné en Charnie, 7 ind. (au moins 6 juv.), 10 Septembre (D.Tavenon).

Quatrième donnée mayennaise, après celles de 1987, 2002 et 2003, pour cette espèce d'occurrence rare dans le département. (En Sarthe, Vezot /plaine de Mamers, 9 ind., 27 août 2009, (R.Ledunois). L'année précédente, Vezot/ plaine de Mamers, 5 ind., 25 au 27 août 2008, puis 3 ind., 9 sept., (F.Morazé, R.Ledunois).

**BECASSEAU MAUBECHÉ *Calidris canutus* (0/0-1/1)**

*C. c. canutus* niche en Sibérie et hiverne en Afrique atlantique ; *C. c.islandica* niche du nord-est canadien au Groënland et hiverne dans le nord-ouest de l'Europe.

Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, 29 avril, (J-F. Arcanger).

Une donnée de cette espèce qui fréquente volontiers lagunes et vasières littorales, mais aussi plans d'eau intérieurs, pour peu que des zones d'alimentation soient dégagées, à la faveur d'une baisse du niveau des eaux.

**BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (2/2- 1/1)**

*Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland.*

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 1 ad., 6 mai, phot., (D.Madiot).

Une donnée mayennaise qui s'inscrit bien dans le passage post-nuptial classique de l'espèce en France.

**BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (2/2- 3/5)**

*Arctique : sud de la Norvège à l'est de la Sibérie.*

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, ad., 18 mai, (D.Tavenon).

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, ad., 5 mai, phot., (F.Jallu) ; La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 3 ad., 12 mai, phot., (F.Jallu).

Trois données sur les 2 départements concernant à chaque fois l'observation d'un ad. nuptial à des dates classiques pour l'espèce en migration pré-nuptiale.

**BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (1/1- 1/1)**

*Arctique nord américain et Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Ecosse 2004.*

**2008-** Mayenne- Bourgon/Le Plessis, juv., 11 au 13 septembre, (M.Letue, J-L.Reuzé *et al.*).

Une nouvelle donnée de ce limicole surtout nord-américain, qui fréquente aussi les plans d'eau à l'intérieur des terres, à une date se situant juste dans le pic de passage post-nuptial, à mi-septembre, (2ème mention pour le site). Une autre observation du 21/09 pourrait concerner un nouvel oiseau. Une fiche sera prochainement adressée au CH Maine.



**Fig. 9:**  
Bécasseau  
tacheté,  
Bourgon  
(Mayenne), 12  
septembre  
2009 (J-L.  
Reuzé).

**BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (2/2- 3/33)**

*Nord de la Scandinavie, Russie d'Europe jusqu'à l'Énisei.*

Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, 29 ind., 29 avril, (J-F. Arcanger) ; Aron/étang de Beaucoudray, 3 ad., 3 mai, phot., (D.Madiot).

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, ad., 29 avril, phot., (F.Jallu).

Deux données du 29 avril sur 2 sites très prisés des limicoles aux passages pré et post-nuptial.

**TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* ( 0/0- 1/2)**

*Nord-est du Canada, Alaska et littoral arctique, du Groenland à l'Eurasie (hors Islande), mais jusqu'au sud de la Baltique.*

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 2 ad., 29 avril, phot., (F.Jallu).

Une donnée sarthoise pour cette espèce restant rare à l'intérieur des terres, toujours sur le site sarthois très prisé des limicoles. Le 29 avril a donc été une journée de fort passage pour les limicoles.



**Fig.10:** Tournepierres à collier, La Ferté-Bernard (Sarthe), 29 avril 2009 (F.Jallu).

**GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (2/2- 2/2)**

*Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne. Hiverné dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.*

Mayenne- Jublains/étang de Neuville, ad, 27 novembre au 8 janvier 2010, phot., (D.Madiot, D.Tavenon *et al.*).

Sarthe- Marçon, 1<sup>er</sup> hiver, 12 février, (F.Vaidie)

Deux nouvelles données, après les deux de 2008, sur des étangs qui ont déjà accueilli l'espèce. L'oiseau trouvé en Mayenne a stationné un peu plus de 5 semaines, au minimum. Troisième donnée pour la Mayenne et deuxième donnée pour la Sarthe d'une espèce d'apparition hivernale de moins en moins occasionnelle ces dernières années dans le grand ouest de la France. A rechercher sur les centres d'enfouissement techniques et les étangs proches.





**Fig.11:** Goéland pontique, Jublains (Mayenne), 11 décembre 2009 (D.Madiot).



**Fig.12:** Mouette tridactyle, Mézangers (Mayenne), 11 février 2009 (B.& F.Duchenne)

**MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (0/0- 3/3)**

*Autour de l'Atlantique nord, archipels arctiques au nord, jusqu'au Portugal, au sud.*

*Migrateur commun le long des côtes, l'espèce apparaît occasionnellement à l'intérieur des terres à la faveur de tempêtes venues de l'Atlantique.*

Mayenne- Mézangers/Gué de Selle, ad., 11 février, phot., (F.Noël, B.& F.Duchenne)  
Sarthe- Laigné en Belin, ad., 26 janvier, phot., F.Vaidie) ; Marçon, ad., 12 février, (F.Vaidie).  
Trois données, dont deux sarthoises, de cette espèce maritime dont l'apparition à l'intérieur des terres est généralement liée aux forts coups de vent d'ouest.

**STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (0/0- 2/6)**

*Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverné en Afrique subsaharienne. Migrateur peu commun sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée, rare à l'intérieur des terres.*

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 4 inds., 9 avril, phot., (A. Dordoigne, D.Madiot) ;  
Mézangers/étang du Gué de Selle, 1ad. et 1 imm., 6 septembre, phot., (D.Madiot).  
Deux données mayennaises totalisant 6 oiseaux pour cette espèce rare dans l'ouest de la France et plus encore à l'intérieur des terres.



**Fig.13:** Sternes caspiennes, Aron (Mayenne), 9 avril 2009 (D.Madiot)

**HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (3/34- 2/2)**  
*Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.*

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 11 avril, phot., (F.Jallu) ; Lamnay, 21 septembre, (F.Jallu).

Deux données sarthoises, aux deux passages, d'un oiseau en halte migratoire.

**2008-** Mayenne- Saint-Aignan sur Roë, 4 février, (J-F. Arcanger); Saulges, 2 ind.,12 février, (D.Tavenon).



**Fig. 14:** Hibou des marais, La Ferté-Bernard (Sarthe), 11 avril 2009 (F.Jallu).

**GUEPIER D' EUROPE *Merops apiaster* (2/15- 2/12)**

*Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun, localisé et migrateur rare.*

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 5 ind., 18 mai, (D.Tavenon)

Sarthe- carrière de l'est-sarthe, 2 ind. du 7 au 16 juin, puis 4 ind. du 17 juin au 11 juillet, puis 1 couple nicheur et 3 juv. à l'envol, du 12 juillet au 9 août, phot., (F. Jallu).

Donnée sarthoise remarquable du second cas avéré d'une nidification certaine de l'espèce dans la Sarthe (après celle de 1966 !), suivie très assidûment par son découvreur.

Donnée mayennaise à une date conforme au passage migratoire prénuptial.



**Fig.15:** Guêpiers d'Europe, est-Sarthe, 1<sup>er</sup> août 2009, (F.Jallu).

**PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (0/0-1/1)**

*Niche du nord de la Scandinavie à la Sibérie septentrionale, et jusqu'en Alaska. Migrateur rare mais régulier.*

Sarthe- La Ferté-Bernard/ Les Ajeux, ad., 7 mai, phot., (F.Jallu)

Seconde donnée sarthoise et pour le site des Ajeux, remarquable pour cette espèce dont le flux migratoire pré-nuptial est beaucoup plus oriental. (1<sup>ère</sup> mention de l'espèce obtenue le 6 mai 2007, F.Jallu).



**Fig.16:** Pipit à gorge rousse, La Ferté-Bernard (Sarthe), 7 mai 2009 (F.Jallu).

**GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (1/1- 2/4)**

*L. s. svecica: de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidentale; L.s.namnetum: régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. Hiverne en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient. Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.*

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 1m. et 1 f., 21 mars, (D.Madiot)

Sarthe- Saosnes/étang de Gué-Chaussée, 1 m. puis 1m. et 1f., 11 juin au 7 juillet, phot., (F.Morazé)

Première donnée mayennaise de cette espèce attendue, et première donnée sarthoise en période de nidification, non moins attendue.

A noter les observations d'oiseaux de cette espèce à La Ferté-Bernard/ Les Ajeux, où elle n'est plus homologable car devenue annuelle, mais qui méritent d'être mentionnées:

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 1 ind. différent de celui vu les 12 et 13 mars; 15 mars: 2 m. et 1 f.; 19 mars: 1 f.; 21 mars: 1 ind.; 26 mars, 1 ind., phot., (F.Jallu).

**ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus* (0/0-1/1)**

*Niche depuis les rives de la Méditerranée jusqu'aux mers du Nord et Baltique (sud de la Suède et Finlande) à l'ouest, en Russie, jusqu'au fleuve Ienisseï, à l'est, et atteignant le sud de la mer Noire et la Syrie au sud.*

Mayenne- Entrammes, ad, 2 mai , (J-L. Reuzé)

Deuxième donnée mayennaise pour cette espèce rare en migration pré-nuptiale, au moins dans le grand ouest, après celle de 1988, à Beaulieu sur Oudon.



**POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita ssp. tristis* (0/0-1/1)**

*Niche en Sibérie (Petchora, Oural, jusqu'au fleuve Iénisseï).*

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 3 et 4 janvier, phot., (J-F.Blanc, F.Jallu).

Première donnée sarthoise pour ce Pouillot véloce présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis*, ou Pouillot de Sibérie, qui suggère un hivernage très disséminé. Des recherches ciblées en hiver pourraient s'avérer fructueuses dans quelques milieux favorables. Rappelons qu'il est important d'entendre le cri pour identifier cette sous-espèce.



**Fig.17:** Pouillot véloce *ssp.tristis*, La Ferté-Bernard (Sarthe), 3 janvier 2009 (F.Jallu).

**REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (0/0-1/1)**

*La sous-espèce nominale niche à travers l'Europe, de la péninsule ibérique à la Russie. En France, niche en Alsace, Lorraine et Languedoc- Roussillon. Migrateur et hivernant rare ailleurs.*

Mayenne- Mézangers/étang de la Chevalière, 1 ad., 6 avril, phot., (D.Madiot).

Deuxième donnée mayennaise, après celle de 2004, pour cette espèce migratrice de passage rare, qui ne trouve pas beaucoup de milieux favorables dans le département.

**TICHODROME ECHELETTE *Tichodroma muraria* (0/0-1/1)**

*Nicheur rare localisé dans les montagnes du sud de l'Europe, du nord de l'Espagne à la Bulgarie, dans le Caucase, ainsi que dans le nord et l'ouest de l'Iran. Une petite partie de la population erratique en hiver.*

Sarthe- Le Mans, 1er hiver, 2 janvier au 31 mars, phot., (M. Jamois, C. et J. Corvaisier, G. Theude, C. Kerihuel, G. Carreau *et al.*)

Une donnée remarquable de cette espèce qui n'avait pas été observée en Sarthe depuis 1966, au Prytanée de La Flèche. L'oiseau, qui a fait un hivernage complet, a été particulièrement bien suivi par les observateurs sarthois, pendant toute la durée de son séjour.

Il a aussi attiré de nombreux observateurs des départements limitrophes!



**Fig.18:** Tichodrome échelette, Le Mans (Sarthe), 20 mars 2009 (G.Carreau).

**CASSENOIX MOUCHETE *Nucifraga caryocatactes ssp. macrorhynchos* (1/1-0/0)**

*Nicheur des massifs montagneux du centre et du sud-est de l'Europe, et du sud de la Scandinavie à l'est de la Russie d'Europe. La sous-espèce *N.c. macrorhynchos* niche dans les Ardennes et de l'Oural au Kamtchatka. C'est aussi un migrateur invasionnel irrégulier et rare.*

**2008- 2009-** Mayenne- Marigné-Peuton, 14 décembre 2008 au 25 février 2009, phot., (B.& F. Duchenne, M.Houdayer *et al.*)

Cet individu, présentant les caractéristiques de la sous-espèce *macrorhynchos*, a fait un hivernage quasi complet dans le sud du département, sur un territoire assez restreint, mais n'était pas toujours facile à voir.



**Fig.19:** Cassenoix moucheté, Marigné-Peuton (Mayenne), 7 janvier 2009 (B. & F. Duchenne)

**OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES**

**CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix* (1/1- 1/1)**

Sarthe- Vion, 12 mars, phot., ( J-F. Darras).

**AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avosetta* (0/0- 1/1)**

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 4 juin, phot., (F.Jallu)

**PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius* (1/1- 1/1)**

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 28 février, phot., (F.Jallu)

**GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (0/0- 1/1)**

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 1 m.,12 et 13 mars, phot., (F.Jallu)

**HERON POURPRE *Ardea purpurea* (1/1)**

**2008-** Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 1 juv., 23 au 27 octobre, phot., (A.Dordoigne, D.Madiot, D.Tavenon).

**GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula* (1/1)**

**2008-** Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 2 novembre, phot.,(F.Jallu).

## HYBRIDES

### **FULIGULE NYROCA x FULIGULE MORILLON *Aythya nyroca* x *Aythya fuligula* (0/0- 1/1)**

Sarthe- Fillé sur Sarthe, 30 janvier, phot., (Ch.Kerihuel et al.)



**Fig.20:** Hybride Fuligule nyroca x F.morillon, Fillé sur Sarthe (Sarthe), 30 janvier 2009 (Ch.Kerihuel).

### **FULIGULE NYROCA x FULIGULE MILOUIN *Aythya nyroca* x *Aythya ferina* (1/1)**

2008- Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 18 octobre au 8 novembre, phot., (D.Madiot et al.)

Date classique pour l'arrivée de cet hybride au sein d'un groupe important de fuligules.

### **PROBABLE HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x FULIGULE MORILLON (*Aythya ferina* x *Aythya fuligula*) (1/1)**

2008- Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 17 et 18 octobre, phot., (A.Dordoigne, D.Madiot).

Cette donnée restera en « probable », car difficile de trancher avec un hybride F.milouin x F.nyroca ou encore F.morillon x F.milouin, qui pourrait, dans ce dernier cas, être un hybride de 2<sup>ème</sup> génération.

## LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES EN 2009

**Hirondelle rustique *Hirundo rustica***- Sarthe- Château-L'Hermitage, 22 février,

*La description est totalement absente, pour une espèce qui, certes, paraît facile, mais n'exclut pas une espèce voisine, l'Hirondelle de rivage, par exemple, qui arrive dans les mêmes moments, voire plus tôt, dans nos régions. Il n'y a pas de mention des conditions météo et d'éclairage. Pas de matériel d'observation utilisé.*

**Gobemouche à collier *Ficedula albicollis***- Sarthe- Lombron, 20 juin, 1 ad.

*La description est très insuffisante et laisse planer des doutes sur l'identification certaine de cette espèce, à une date où elle est sur ses sites de reproduction, les plus proches du Maine se trouvant en Lorraine. De plus, elle utilise régulièrement le couloir migratoire oriental.*



## OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2009.

### **SARCELLE A AILES VERTES *Anas carolinensis***

*Niche en Amérique du Nord.*

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 1m., 27 février au 25 mars, phot., (D.Madiot, J-L.Reuzé & al.)



**Fig.21:** Sarcelle à ailes vertes, Aron (Mayenne), 6 mars 2009 (J-L.Reuzé).

### **GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides***

*La sous-espèce nominale niche dans le sud et l'ouest du Groënland.*

Mayenne- Saint-Fraimbault de Prières/lac de Hte Mayenne, 2<sup>ème</sup> année, 7 mars, phot., (A Dordoigne, D.Madiot).

### **BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava* (1/1)**

*Balkans jusqu'en Iran et en Afghanistan.*

Individu présentant des caractéristiques intermédiaires entre *M.f.feldegg* –ou « Bergeronnette des Balkans »-et d'autres sous espèces.

Sarthe- La Ferté-Bernard/ Les Ajeux, 1 m. de la forme « *xanthophrys* » (forme désignant les hybrides entre *feldegg* et *lutea/beema* à l'est ou *flava* à l'ouest), 4 avril, phot., (F.Jallu) .

Noter que le CHN ne souhaite homologuer que les oiseaux typiques, comme indiqué dans Ornithos 16-5 :300 et 312.

## RAPPORT 2008 CH MAINE

### **Compléments (en gras dans le texte):**

Nette rousse: Sarthe- Saint-Denis d'Orques, **fem.**, 11 février (A.Darras); **fem.**, 30 déc., phot., (C.Kerihuel); La Flèche, **m.ad.**, 31 déc., phot., (B.et C.Basoge).

Plongeon catmarin: Sarthe- La Flèche, 18 au **21** déc., phot., (B.Basoge, **J-F. Darras**, C.Kerihuel).

Hibou des marais: (1/31) - Mayenne- Louvigné, **31 ind.**, 26 février au 17 mars, encore 1 ind. le 22 avril, phot., (D.Madiot, G.Bouteloup, A.Dordoigne) .

Fauvette pitchou: Mayenne- Saint-Fraimbault, 7 et **21** juin, (D.Madiot, A.Dordoigne).

Fauvette babillarde: Mayenne- Ballée, 16, **20, 21 et 26** mai, (D.Madiot).

## Erratum :

Vautour Percnoptère: figure à tort dans ce rapport, en réexamen.

## REMERCIEMENTS

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2009 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne- Nature- Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, le CPIE, SNE, et le CPNS,
- la liste de diffusion Obsmaine, et la base de données en ligne Faune-Maine, ouverte en mars 2010 et qui a engrangé plus de 35 000 données d'oiseaux, sur les 2 départements Mayenne et Sarthe, depuis cette date,
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.

## BIBLIOGRAPHIE

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007- Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4) : p.234-246.
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008- Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008- Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- F. Lécureur, J-Y. Renvoisé, M. Ameline, 2008- La Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) : résultats de dix années de recensement, de protection et de sensibilisation. LPO Sarthe, DREAL Pays de la Loire, Parc naturel régional Normandie-Maine. 37p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1991- Les oiseaux nicheurs de la Sarthe, enquête 1985-1989. GSO. Le Mans. 169 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2000- La migration des oiseaux en Sarthe, observations 1975-2000. GSO. Le Mans. 204 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009- Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. *Sitta cénomane*- suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2010- Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 40.
- LAPOUS E. & DARRAS J-F., 1994 à 2005- Synthèse des observations ornithologiques du sud-ouest de la Sarthe. Revue *Désirs d'Ailes* n° 1 à 13.
- LPO Sarthe, 2000 à 2009- *Le Tarier pâtre*. Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 9.
- Mayenne- Nature- Environnement, 1991- Les Oiseaux de la Mayenne. Atlas des oiseaux nicheurs de la Mayenne 1984-1988. Editions Rives Reines, 207 p.
- Mayenne- Nature- Environnement, 1982 à 2009- Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 1 à 26.
- ISSA N. et le CHR Centre, 2009- Les oiseaux rares en région Centre en 2008.

- REEBER S. et le CHN, 2010- Les oiseaux rares en France en 2009. 27<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 17-6, nov-décembre 2010.
- REEBER S. et le CHN, 2009- Les oiseaux rares en France en 2008. 26<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 16-5, sept.- octobre 2009.
- FREMONT J-Y., REEBER S. & le CHN, 2008 – Les oiseaux rares en France en 2007. 25<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 15-5, sept.-octobre 2008.
- ZUCCA M. & le CMR, 2009- les observations d'oiseaux migrateurs rares en France, 5<sup>ème</sup> rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2006). *Ornithos* 16-1, janv.-février 2009.
- ZUCCA M. & le CMR, 2010- les observations d'oiseaux migrateurs rares en France, 6<sup>ème</sup> rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2007), *Ornithos* 17-1, janv.- février 2010.