



LES OISEAUX RARES

EN 2011 DANS LE MAINE (MAYENNE et SARTHE)

4ème rapport du Comité d'Homologation du Maine



Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*, Bouër, Sarthe, 5 février, (C.Kerihuel)

Guêpiers d'Europe, *Merops apiaster*, Montmirail, Sarthe, 9 juillet, (F.Jallu)



© Fabrice Jallu 2011

Les oiseaux rares dans le Maine (Mayenne et Sarthe) en 2011

4ème rapport du Comité d'Homologation du Maine

Dominique TAVENON, Christian KERIHUEL et le CH Maine

Regroupant les 2 départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de 4 associations locales: Mayenne- Nature- Environnement (MNE) , Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), LPO Sarthe et Groupe Ornithologique des Avoalors (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et dont l'espèce ne fait pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale. Pour l'instant, il existe un coordinateur départemental pour chacun des 2 départements (D.Tavenon pour le 53 et C.Kerihuel pour le 72), chargés de collecter, centraliser et transmettre les observations départementales d'espèces rares sur le plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Celui-ci publie chaque année un rapport annuel dans la revue d'ornithologie française ***Ornithos*** (Zucca & le CMR, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010).

Ce quatrième rapport du CH Maine couvre l'année 2011, 4^{ème} année de son fonctionnement. Les membres du Comité ont été invités à examiner 102 fiches concernant des données d'espèces homologables à compter du 1^{er} janvier 2011, y compris quelques fiches en retard de 2008 (2) et 2010 (4). Le taux de validation atteint 95 %.

La classification suit la « Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental » établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française, Ornithos 18-3, n° 89, mai-juin 2011). Pour les espèces ayant été observées en France, figure la catégorie de la liste des Oiseaux de France dans laquelle elles ont été inscrites.

En 2011, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Hervé Julliot, Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), David Madiot, François Morazé, et Dominique Tavenon (secrétaire).

Aucune nouvelle candidature n'ayant été enregistrée début 2012, les 2 membres sortants, F. Morazé et F. Jallu, ont souhaité renouveler leur mandat et ont été reconduits dans leurs fonctions, à l'unanimité des membres du CH Maine.

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont disponibles à l'adresse du secrétariat, et sur les sites Internet des associations:

MNE : <http://mayennatureenvironnement.fr>

GSO : <http://gso72.free.fr>

LPO Sarthe : <http://sarthe.lpo.fr>

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :

Dominique Tavenon / Secrétaire du CH Maine, 2 chemin du Laurier, 53270 Blandouet

ou aux adresses mail: dominique.tavenon525@orange.fr, christian.kerihuel@wanadoo.fr

TRAVAUX ET DECISIONS DU CH MAINE

1) Révision de la liste soumise à homologation du CH Maine

Après consultation du statut de certaines espèces et de leur pattern d'apparition dans la région du Maine, il a été décidé de modifier la liste des espèces homologables à compter du 1^{er} janvier 2012 comme suit:

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

Critères de sortie de liste atteints en Mayenne comme en Sarthe : espèce retirée.

Oie rieuse *Anser albifrons*

Critères de sortie de liste atteints en Mayenne: retirée de la liste des espèces soumises à homologation du CH Maine en Mayenne.

Le cas de quelques autres espèces a été évoqué :

Fuligule nyroca : *Aythya nyroca*

Même si cette espèce arrive à la limite d'atteindre les critères de sortie de liste, il est décidé de la maintenir à cause de confusion possible avec quelques hybrides de fuligules.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

Ces 2 espèces sont également maintenues en raison des possibilités de confusion avec d'autres espèces voisines déjà constatées.

Hibou des marais *Asio flammeus*

Comme il arrive fréquemment que de bonnes conditions d'observation ne soient pas réunies pour une identification certaine (lumière insuffisante, observation en vol), cette espèce est également maintenue.

Harle piette *Merqellus albellus*

Actuellement, cette espèce est loin de fournir une donnée par an sur les 10 dernières années. Il est décidé de la réintégrer dans la liste des espèces homologables dans les 2 départements.

2) Modification de la liste des espèces soumises à homologation nationale

La Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris*, devenue « hivernant extrêmement localisé en France et très peu nombreux », sort de la liste du CH Maine pour être réintégrée à la liste CHN à compter du 1^{er} janvier 2012.

La liste CH Maine est consultable et téléchargeable sur le site des associations, sur la base de données en ligne Faune Maine et sur la liste de diffusion d'Obsmaine.

3) Révision de la liste des dates extrêmes d'arrivée et de départ des oiseaux migrateurs

Cette liste peut être consultée et/ou téléchargée sur le site des associations, la base de données en ligne Faune Maine et la liste de diffusion d'Obsmaine.

4) Cas des données homologables antérieures à 2008

Le comité a adopté un principe de validation, au cas par cas, **par le CH Maine.**

QUELQUES FAITS MARQUANTS

L'année 2011 a été marquée par trois premières mentions remarquables, deux mayennaises (Accenteur alpin *Prunella collaris*, Vanneau sociable *Vanellus gregarius*), et une sarthoise (Etourneau roselin *Pastor roseus*), homologuées par le CH Maine pour la première, et par le CHN pour les deux autres.

On peut retenir également, en Sarthe, la nidification de deux couples de Guêpiers d'Europe, l'un pour la seconde fois dans le nord-est Sarthe, et qui semble apprécier le site choisi, l'autre pour la première fois dans le sud-ouest, ainsi que la première mention récente, tout aussi remarquable, du Goéland bourgmestre (dernière mention en 1874 !). Enfin, la deuxième mention, en Sarthe, du Vautour fauve, après celle de 2009, et la deuxième mention récente du Jaseur boréal (apparition furtive de 2 individus), après celle de 2005, complètent ce tableau.

A noter aussi le petit passage post-nuptial de Sternes arctiques en Mayenne, la belle présence automnale et hivernale de la Pie-grièche grise (7 données concernant 7 oiseaux) et du Sizerin flammé (6 données, 106 ind.) dans les deux départements, toutes homologuées par le CH Maine.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifiques.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2011 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour 2011.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
- 8- Date(s) d'observations .
- 9- Nom(s) du (ou des)observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental (CAF/LPO 2011).
- 11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous –espèce concernée.
- 12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

CYGNE DE BEWICK/CHANTEUR *Cygnus columbianus/ cygnus* (1/1)

C. c. bewickii : Niche en Sibérie arctique, à partir de la péninsule de Kola, vers l'est.

Cygnus cygnus : Niche de l'Islande et la Scandinavie jusqu'au nord-est de la Sibérie ; également en Mongolie.

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 22 mars, (A.Darras).

Cette donnée a été acceptée comme « cygne de Bewick/chanteur ». La description sommaire autorise en effet le doute quant à l'identification certaine de cet oiseau.

OIE RIEUSE *Anser albifrons* (4/40- 5/13)

Se reproduit au nord de la Russie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kolyma. Hiverné principalement au nord-est de la France, plus rarement ailleurs.

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 6 (7) ind., phot., 1^{er} au 14 janvier (présentes depuis le 26 décembre 2010), (J-F.Arcanger, J.Nezan, D.Madiot et al) ; 1 ad., 17 décembre, (F.Noël, J-F.Arcanger) ; Bouère/étang de Curécy, 1ad., phot., 2 janvier, (B.Poincet, A.Darras) ; Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne, 2 ad. et 1juv., phot., 3 février, (D.Tavenon)

Sarthe- Parigné l'Evêque/étang de Loudon, 1 ad., phot., 26 février au 10 mars, (Bruno Duchenne, A.Beautru)

Cinq données dans une fourchette de dates qui s'inscrit bien dans le pattern d'apparition de l'espèce. Noter deux stationnements de 2 semaines en Mayenne et en Sarthe; l'origine sauvage de l'oiseau sarthois n'est pas établie.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (7/7- 1/3)

France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu'en Asie centrale. Hiverné autour du bassin méditerranéen.

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne.

Sarthe- La Flèche/ La Monnerie, les Poulriers, 2m. et 1fem., du 9 au 12 juillet, (B.Basoge, R.Provost).

Pour mémoire: Mayenne-Sainte-Suzanne/étang des Landes, m. ad., du 7 au 22 juillet, (J-F.Arcanger, D.Madiot)

Une nouvelle donnée sarthoise anachronique de 3 ind., en période de reproduction, et qui peut faire douter de l'origine sauvage des oiseaux. Espèce observée chaque année depuis la création du CH Maine.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (14/9- 6/4)

Balkans et Europe centrale jusqu'à Asie centrale.

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, du 8 au 29 avril, m., phot., (D.Madiot)

Sarthe- Arnage/La Gémerie, m., 6 janvier, (F.Vaidie) ; Fercé sur Sarthe, m., phot., 19 octobre, (F-M.Bouton, J.Moquet) ; m., phot., 24 novembre, (F-M.Bouton) ; Luché-Pringé, m., 13 novembre, (H.Julliot) ; Spay/Loigné, m., phot., 14 au 22 novembre, (H.Julliot, P-V.Vandenweghe).

Six données cette année, dont 4 proviennent du passage post-nuptial, totalisant probablement 4 oiseaux. Les observations de nyrocas du secteur Spay / Fillé/ Arnage /Voivres/Fercé sur Sarthe doivent se rapporter aux mêmes individus, vu la proximité des sites et l'absence de chevauchement de dates. Il est bon de signaler que l'origine sauvage de ces oiseaux est douteuse.

A noter cette donnée pré-nuptiale mayennaise la plus tardive avec l'observation d'un mâle qui stationne 3 semaines à Aron en avril. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (1/2- 1/1)

Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu'au fleuve Léna, à l'est.

Espèce homologable uniquement en Sarthe.

Aucune donnée hors de la Mayenne.

Pour mémoire: Mayenne- Loiron, /étang des Rochettes, fem., 24 janvier, (X.Rozec) ;
Mézangers/étang du Gué de Selle, fem. ad., 31 décembre, (Bruno Duchenne).

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (0/0)

Niche en Amérique du Nord. Introduite en Grande-Bretagne au début des années 1960, elle se trouve en petit nombre autour de la mer du Nord et, au sud, jusqu'en Espagne et au Maroc.

Espèce homologable hors de la Mayenne et des étangs de Saint-Denis d'Orques (Sarthe).

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire, 210 données en Mayenne en 2011. Principalement observée sur les étangs des Coëvrons, Juvigné/étang Neuf, étang d'Olivet, Bouère/étang de Curécy, et Saint-Denis d'Anjou/étang de la Morinière. Jusqu'à 32 individus ensemble à Aron/étang de Beaucoudray. Elles peuvent être consultées sur la base de données en ligne Faune-Maine.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (1/1-1/2)

Islande, nord des îles britanniques, et de Scandinavie jusqu'à Sibérie.

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 2 m.ad., phot., 24 février, (F.Jallu)

Une donnée sarthoise qui s'inscrit bien dans le pattern d'apparition de l'espèce en fin d'hiver.



Fig. 1: Macreuses noires, La Ferté-Bernard, (Sarthe), m. ad., 24 février, (F.Jallu).



fig.2: Plongeon catmarin, Sillé le Guillaume, (Sarthe), ad., 19 décembre, (C.Kerihuel)

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (2/2-1/1)

Région circumarctique.

Sarthe- Sillé le Guillaume, ad., phot., 6 au 25 décembre, (F.Noël, C.Kerihuel et al.)

Une nouvelle donnée sarthoise, sur un site où l'espèce a déjà été observée en 2008, à une plage de dates classique pour l'espèce.

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (1/1-1/1)

Niche dans le Paléarctique occidental, à l'est d'une ligne allant du nord de l'Allemagne à la Roumanie. Hivernant rare sur les côtes, étangs et lacs artificiels.

Mayenne- Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne, phot., du 23 au 28 avril, ad., (D.Madiot, J-L. Reuzé & al.)

Une donnée mayennaise pour cette espèce migratrice et hivernante rare, en plumage nuptial, et que l'on est plus enclin à trouver en migration post-nuptiale.



Fig. 3: Grèbe jougris , Saint-Fraimbault, Lac de Haute-Mayenne, (Mayenne), m.ad, 25 avril, (J-L. Reuzé)

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (4/4-1/1)

Niche de la Scandinavie à la Russie ; quelques couples en Ecosse. Hivernent le long des côtes françaises de l'Atlantique, en mers du nord, Baltique, Adriatique et Mer noire, à l'est.

2010- Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 23 décembre, (O.Vannucci)

Une nouvelle donnée, pour cet hivernant littoral plutôt rare à l'intérieur des terres.

Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (9/9- 9/9)

De l'Europe à l'Asie et ponctuellement Afrique du Nord.

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, phot., du 7 au 20 janvier, (D.Madiot) ; Ahuillé, phot., du 9 au 26 janvier, (R.Rousset, Benoît.&F.Duchenne) ; Le Bourgneuf la Forêt, phot., 20 février, (E.Médard) ; Mézangers/étang de la Chevalière, phot., 3 et 4 mars, (Benoît & F.Duchenne et al.) ; Aron/étang de Beaucoudray, 30 novembre, (D.Madiot)

Sarthe- Saint-Denis d'Orques/étang des Cordelières, phot., du 2 au 9 janvier, (D.Tavenon); Saint-Mars la Brière, phot., 3 février, ad., (F.Jallu) ; Roullée, le Moulin, 23 janvier, (F-M. Bouton) ; Connerré / Peloin, 11 novembre, (P-J.Lacampagne) .

Une bonne année avec 9 données, sur 8 sites (4 en Mayenne et 4 en Sarthe), et totalisant 9 oiseaux de cette espèce. Un peu surprenante l'observation d'un ind. sur l'un des étangs de Saint-Denis d'Orques qui n'a rien d'attractif pour l'espèce ! Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine. A noter que le Butor étoilé sortira de la liste des espèces à homologuer en 2012.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (2/2- 1/1)

Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.

Espèce homologable en dehors du site de nidification connu en Sarthe.

Sarthe- Cré sur Loir, 7 juin, (O.Vannucci)

Une nouvelle donnée sarthoise pour cette espèce rare et discrète, à une date tardive pour la migration pré-nuptiale, qui constitue la 12^{ème} donnée pour le département.

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax* (5/5- 3/3)

Zones tempérées du Paléarctique. Distribution irrégulière dans les zones humides européennes au sud de 53° N.

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne.

Mayenne- La Croixille/l'Epine, 5 août, (F.Rose)

Sarthe- La Flèche, 20 avril, 2^{ème} année, (O.Vannucci) ; Greez sur Roc, phot., 24 juin, juv., (F.Jallu)

Deuxième donnée mayennaise, hors région des Coëvrons, à l'ouest du département, donc homologable.

Noter que la donnée printanière sarthoise concerne un individu de 2^{ème} année, comme l'an passé.

Pour mémoire, l'espèce a été observée en Mayenne, dans les Coëvrons, à Aron/étang du Vieil Aulnay/étang de Beaucoudray, phot., du 24 au 31 juillet, (D.Madiot) ; étang de la Forge, 2 ind., 3 août, (D.Tavenon) ; Aron/étang de la Forge, 2 septembre, (D.Tavenon) ; 4 octobre, phot., (D.Tavenon, G.Deslais) ; canaux d'Aron, 5 octobre, (D.Madiot) ; soit six données totalisant probablement 1 à 2 individus, de 1^{ère} année.



Fig.4 : Bihoreau gris,
Greez sur Roc,
(Sarthe), juv., 24 juin,
(F.Jallu).

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (1/5- 1/3)

Niche en Europe, entre 35 et 45°N, dans l'extrême nord de l'Afrique, au Moyen-Orient et dans l'ouest de l'Asie. Essentiellement sédentaire, c'est une espèce erratique occasionnelle en France, en dehors de ses zones de réintroduction .

Sarthe- Aubigné-Racan, 3 imm., phot., 24 mars (O.Vannucci).

Une donnée remarquable qui constitue la deuxième mention de l'espèce pour la Sarthe, avec 3 individus immatures observés ensemble. Les données d'individus juvéniles ou immatures, essentiellement observés en erratisme, sont de moins en moins occasionnelles dans la moitié nord de la France et en Belgique notamment, ces dernières années.



Fig. 5, à gauche : Vautour fauve, Aubigné-Racan, (Sarthe), imm., 24 mars, (O.Vannucci)

Fig. 6, à droite: Circaète Jean le Blanc, La Flèche, (Sarthe), 10 juin, (O.Vannucci)

CIRCAETE JEAN LE BLANC *Circaetus gallicus* (2/2- 1/1)

Niche dans la moitié sud de la France, le sud de l'Europe, l'Afrique du nord, la Turquie, et de la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde.

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 10 et 11 juin (O.Vannucci, J-Y. Renvoisé et *al.*)

Quinzième donnée sarthoise d'un oiseau observé plus ou moins régulièrement dans de nombreux départements au nord de son aire de répartition.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (1/7)

Niche de l'Ecosse et des Pyrénées espagnoles jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et en Sibérie orientale. Hiverne du Maghreb à l'Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et en petit nombre entre l'Andalousie et Chypre.

Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud-Sarthe.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire, en plaine du sud Sarthe, Parcé (La Richardière), 7 ind., 17 avril, (A. & J-F.Darras), 2 ind., 18 avril ; 3 ind., 19 avril, (O.Lapous, J-F.Darras, N.Houdouin) ; puis 2 ind. les 1^{er} et 2 mai, (O.Lapous).

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (6/6- 1/1)

Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland.

2010- Sarthe- Sillé le Guillaume, ad., 15 mai, (F.Noël)

Une nouvelle donnée à une date classique en migration pré- nuptiale. Signalons que cette espèce a été observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (8/11- 1/2)

Arctique : sud de la Norvège à l'est de la Sibérie.

Mayenne- Bourgon/limite 53/35, 2 ad., 7 septembre, (Benoît Duchenne).

Une seule donnée, en Mayenne, à une date classique pour l'espèce en migration post-nuptiale. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (3/3- 1/1)

Arctique nord américain et Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Ecosse 2004.
Mayenne- Bourgon/Le Plessis, juv., phot., 25 septembre au 3 octobre, (F.Duchenne, B.Poincet et al.).

Une nouvelle donnée mayennaise, sur le site du Lac de haute-Vilaine, à une date conforme pour cette espèce en migration post-nuptiale.



Fig.7: Bécasseau tacheté, Bourgon, Lac de Haute-Vilaine, (Mayenne), juv., 3 octobre , (B.Poincet).

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (3/3- 1/1)

Extrême nord de la Sibérie centrale.

Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, ad., phot., 16 septembre, (D.Madiot)

Une nouvelle donnée mayennaise, sur le même site, après les deux données mayennaise et sarthoise de juillet et septembre 2008.

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (2/5-1/1)

Niche au N-E du Canada , en Alaska, et sur le littoral arctique hors Islande, mais jusqu'au sud de la Baltique. Hivernant rare à l'intérieur des terres.

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 1 ad., phot., 22 mai, (O.Vannucci)

Une nouvelle donnée sarthoise de printemps, et toujours à l'étang de la Monnerie, qui a apporté cette année son lot d'espèces d'anatidés et de limicoles.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (9/9- 10/8)

Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne. Hiverné dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.

Mayenne- Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne et CET de Glaintain, 2^{ème} année, phot., 9 février au 25 mars, (D.Madiot et al.); Changé, 2^{ème} année, phot., 15 février, (S.Guérin) ; Saint-Fraimbault/ Lac de Haute-Mayenne, 2^{ème} année, phot., 20 mars, (S.Guérin); Saint-Fraimbault/ Lac de Haute-Mayenne/ CET de Glaintain, 3^{ème} année, phot., 11 au 25 mars,

(D.Madiot); Saint-Fraimbault/ CET de Glaintain, 2^{ème} année, 25 mars, (D.Madiot et al) ; Saint-Fraimbault/ sablière de Glaintain, 2^{ème} année, 16 septembre, (D.Madiot et al) ; Mézangers/étang du Gué de Selle, 3^{ème} année, 9, 10 et 16 novembre, (D.Tavenon, D.Madiot, F.Noël).

Dix données, toutes mayennaises, concernent au moins 8 oiseaux, et proviennent de Saint-Fraimbault, sur les sites du CET, des sablières de Glaintain et du lac de Haute-Mayenne, seulement distant de 4 à 5 km, et qui accueille l'espèce au dortoir depuis 2008. Espèce d'apparition hivernale régulière ces dernières années en Mayenne, Maine et Loire et Touraine. A noter le stationnement d'un mois et demi pour un oiseau sur les sites du nord-Mayenne, ainsi que la première mention de l'espèce sur un autre CET, à Changé, près de Laval. Un suivi régulier en Sarthe, notamment sur Marçon, permettrait certainement des découvertes intéressantes. Des échanges sont notés entre plusieurs sites similaires des départements cités plus haut. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.



Fig.8 , à gauche: Goéland pontique, Saint- Fraimbault, CET de Glaintain ,(Mayenne), 1^{er} hiver, 18mars, (D.Madiot) ; Fig. 9, à droite : Goéland pontique, Saint- Fraimbault, CET de Glaintain, (Mayenne), 1^{er} hiver, 25mars, (D.Madiot)

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus* (1/1)

Nicheur arctique, depuis l'île de Jan Mayen et du Spitzberg jusqu'à la péninsule de Taïmyr à l'est.

Sarthe- Marçon/ lac des Varennes, 1^{er} hiver, gouache, phot. non fournie, 26 décembre et 8 janvier, (G.Paineau, P.Lefevre)

Première observation récente remarquable, en Sarthe, la mention précédente datant de ...1874 !

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (3/8- 1/1)

Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverné en Afrique subsaharienne. Migrateur peu commun sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée, rare à l'intérieur des terres.

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, ad., phot., 15 septembre, (F.Jallu)

Une nouvelle donnée sarthoise, après la donnée de 2010, en Mayenne, pour cette espèce rare dans l'ouest de la France et plus encore à l'intérieur des terres.



Fig.10 : Sterne caspienne, La Ferté-Bernard/Les Ajeux, (Sarthe), ad., 15 septembre, (F.Jallu).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (1/1- 1/4)

Niche de l'Europe de l'Ouest à la mer Caspienne.

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 4 ind., 18 mai, (B.Basoge, O.Vannucci)

Nouvelle donnée sarthoise à une date conforme à la normale.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea* (2/4- 4/4)

Niche en Grande-Bretagne, en Europe du Nord, et en Asie, au nord du cercle polaire. Aussi au Groenland, en Alaska, et jusqu'en Colombie Britannique et dans l'Etat de New-York.

Mayenne- Ballots/étang de la Rincerie, juv., phot., 26 août, (B.Poincet) ; Juvigné/étang Neuf, 1^{ère} année, du 8 au 13 septembre, (D.Tavenon) ; Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne, 1^{ère} année, 9 septembre, (D.Tavenon) ; 1^{ère} année, 4 et 5 octobre, (D.Tavenon, D.Madiot).

Quatre nouvelles données mayennaises signent une bonne année pour cette espèce, rare à l'intérieur des terres et surtout détectée en passage post-nuptial dans l'ouest de la France, comme en témoignent ces différentes observations.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (6/41- 5/8)

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.

Mayenne- Bonchamp, 23 février, (W.Raitière)

Sarthe- La Ferté- Bernard, phot., 1^{er} janvier, (F.Jallu) ; La Flèche/La Mergeoire, 4 ind., 2 avril, (B.& C.Basoge) ; Parcé sur Sarthe, ad., 3 mai, (J-F.Darras) ; La Ferté- Bernard, ad., phot., 17 novembre, (F.Jallu).

Cinq nouvelles données dans le Maine, concernant 8 individus. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

© Fabrice Jallu 2011



Fig.11 : Hibou des marais, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 1^{er} janvier, (F.Jallu)

GUEPIER D' EUROPE *Merops apiaster* (4/27- 2/9)

Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun, localisé et migrateur rare.

Sarthe- La Flèche, 5 ind. dont 3 ad., phot., 6 juin au 31 juillet, (O.Vannucci) ; Montmirail, 2 ad. et 2 juv, phot., du 12 juin au 9 août, (F. Jallu).

Deux nouvelles données sarthoises remarquables avec 2 nouveaux cas avérés d'une nidification certaine de l'espèce (après celles de 1966 –suspectée- et de 2009 !).

PIC CENDRE *Picus canus* (1/1- 0/0)

Niche de la Bretagne jusqu'à l'Altaï, et jusqu'à 65 ° N.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire- Sarthe- forêt de Bercé/Jupilles, ad., 21 mars, (F-M.Bouton) ; forêt de Perseigne/ Fresnaye sur Chedouet, 1^{er} avril, phot., (F-M.Bouton) .



Fig.12 : Pic cendré , La Fresnaye sur Chedouet, (Sarthe), 1^{er} avril, (F-M. Bouton).

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata* (0/0- 1/1)

Niche de l'Europe centrale jusqu'au nord-ouest de l'Espagne et au nord-est de l'Italie.

Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, et du plateau calaisien.

Sarthe- Laigné en Belin, 7 mars, (F.Vaidie).

Pour mémoire, les données sur les secteurs où l'espèce n'est pas homologable sont les suivantes :

Sarthe- Valennes, 2 ind., 1^{er} mars, (F.Jallu) ; 19 novembre, (F.Jallu) ; La Flèche, 11 avril, (A.Darras) ; 14 avril, (O.Vannucci) ; 16 avril, (N.Houdouin) ; 23 avril, (V.Chauchet, Bruno Duchenne) ; 3 mai, (M.Banasiak) ; Montabon, 14 mai, (O.Vannucci).

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (1/1-1/1)

Anthus p.petrosus, sédentaire: côtes d'Europe occidentale.

Sarthe- La Ferté-Bernard, ad., phot., 23 mars, (F.Jallu).

Il s'agit de la date la plus tardive dans le Maine pour le passage pré-nuptial de cette espèce, et de la troisième mention pour ce site.



Fig.13 : Pipit maritime, La Ferté-Bernard. (Sarthe), 23 mars, (F.Jallu)

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus* (1/2)

Niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Hivernant et migrateur occasionnel que des mouvements invasifs irréguliers rendent localement assez commun, surtout dans la moitié est de la France.

Sarthe- Bouër, 2 ind., phot., 5 février, (R.Ledunois, F.Jallu, C.Kerihuel)

Une donnée sarthoise remarquable, avec 2 oiseaux pour cette espèce rare dans l'ouest de la France.

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris* (1/1)

Niche des montagnes de France à l'Afrique du Nord, jusqu'en Europe centrale à l'est.

Mayenne- Sainte-Suzanne, phot., du 14 au 22 novembre, (D.Madiot, F.Noël, D.Tavenon)

Une première pour la Mayenne, d'une espèce qui fait des incursions occasionnelles dans le grand ouest de la France, et détectée à la faveur d'un petit afflux en fin d'année jusque dans nos limites.



Fig.14 : Accenteur alpin, Sainte-Suzanne, (Mayenne), 14 novembre, (anonyme, pour D.Madiot)

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (3/5- 1/1)

L. s. svecica: de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidentale; *L. s. namnetum*: régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde.

Hivernent en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient.

Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.

Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, type fem. 1^{ère} année, phot., 16 septembre, (D.Madiot).

Deuxième donnée mayennaise de cette espèce, la 1^{ère} pour le site. A noter les observations d'oiseaux de cette espèce à La Ferté-Bernard/ Les Ajeux, où elle n'est plus homologable car devenue annuelle, mais qui méritent d'être mentionnées:

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 1 à 5 ind., phot., 19 mars; 1 ind., phot., 24, 25 et 29 mars, (F.Jallu).



Fig.15 : Gorgebleue à miroir, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 19 mars, (F.Jallu)

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (1/1)

Niche du nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et à l'Oural.

Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.

Mayenne- Marcillé la Ville, phot., du 4 au 25 juin, (D.Madiot et al.)

Quatrième mention mayennaise de l'espèce, en limite sud-ouest de son aire de répartition, dont la reproduction, un temps suspectée, n'est pas allée à son terme en raison des conditions météorologiques défavorables.



Fig. 16: Fauvette pitchou, La Flèche, (Sarthe), 15 mai, (F.Cudennec)

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (1/1- 0/0)

S. u.undata niche en Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, y compris le sud de la France. S.u.dartfordiensis niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l'Angleterre.

Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné...), la forêt de Bercé, et le Nord-Est de la Mayenne.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire, en Sarthe- La Flèche , 2 ind., 2 avril, (F.Vaidie, N.Houdouin) ; 6 avril, (F.Cudennec) ; 15 mai, (F.Cudennec) ; 3 ind., 4 juillet, (O.Vannucci) ; Pontvallain, 2 ind., 8 mai, (M.Banasiak).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (3/2- 1/1)

Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d'une ligne Sillé le Guillaume- La Ferté-Bernard.

S. c. curruca niche de l'Europe de l'ouest jusqu'au nord de l'Italie et de la Slovénie jusqu'en Grèce et Turquie, dans le Grand Caucase et la moyenne vallée de la Volga, en Sibérie jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.

Sarthe- Champfleury, ad., 21 mai, (G.Vaillant, B.Tilly)

Pour mémoire, en Sarthe- La Ferté-Bernard, 22 avril, (F.Jallu).

POUILLOT DE SIBERIE *Phylloscopus collybita ssp. tristis* (1/1-1/1)

Niche en Sibérie (Petchora, Oural, jusqu'au fleuve Ienisseï).

Sarthe- Saosnes, 23 novembre, (F.Morazé).

Deuxième donnée sarthoise pour ce Pouillot véloce présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis*, ou Pouillot de Sibérie. A noter qu' en plus d'une description circonstanciée, il est essentiel d'entendre le cri pour identifier cette sous-espèce, qui reste délicate à différencier des autres taxons *abietinus* et *fulvescens*.

PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus* (1/1-1/1)

Niche de façon éparse du centre de l'Espagne et de l'est de l'Angleterre jusqu'à la Grèce et la Transcaucasie.

Sarthe- Saosnes, 23 novembre, (F.Morazé)

Une nouvelle donnée sarthoise de cette espèce plutôt considérée comme sédentaire, mais parfois sujette à des mouvements irréguliers de type « éruptionnel ».

MESANGE BOREALE *Poecile montanus* (1/1)

Poecile. m. montanus: niche des Alpes à l'Autriche et la Grèce ; P. m. salicarius : de l'est du Rhin jusqu'à la Pologne et du nord des Alpes à la République tchèque; P. m. rhenanus : des Pays-Bas à l'ouest de l'Allemagne, et nord-est de la France.

2010- Mayenne- Ahuillé/Bois de Gouillat, 15 janvier, (J-F.Arcanger)

Cette donnée, d'une espèce pas si facile à repérer d'autant qu'elle se trouve en limite d'aire de répartition, est la première que le CH Maine ait eu à examiner depuis sa création. Il est essentiel d'entendre les cris et/ou le chant pour identifier cette espèce.

TICHODROME ECHELETTE *Tichodroma muraria* (1/1-1/1)

Nicheur rare localisé dans les montagnes du sud de l'Europe, du nord de l'Espagne à la Bulgarie, dans le Caucase , ainsi que dans le nord et l'ouest de l'Iran. Une petite partie de la population erratique en hiver.

Sarthe- Le Mans, 1er hiver, phot., du 5 février au 25 mars, (C.Felloni, C. Kerihuel et al.)

Une nouvelle donnée remarquable de cette espèce , après celle de 2009, également dans le Vieux Mans. L'oiseau, qui a séjourné 7 semaines, a été particulièrement bien suivi pendant toute la durée de son séjour et a attiré, comme en 2009, de nombreux observateurs.



Fig.17 : Tichodrome échelette, Le Mans, (Sarthe),6 février, (C.Kerihuel)

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* (3/3- 7/7)

Niche de la France et des Carpathes jusqu'en Europe du Nord et à la Sibérie centrale, jusqu'au fleuve Ienisseï. Hivernante et migratrice partielle peu commune.

Mayenne- Hardanges/La Verderie, ad., du 8 au 21 mars, (F.Noël) ; Villepail, phot., du 30 octobre au 19 novembre, (D.Madiot et al.) ; Hardanges/L'Oasis, ad., 14 au 21 novembre, phot., (F.Noël).

Sarthe- Souvigné sur Sarthe, phot., du 12 janvier au 27 mars (A.& J-F.Darras) ; Neuville en Charnie, ad., phot., du 6 au 20 février, (E.Lapous, D.Tavenon, F.Jallu) ; Champfleur, du 18 au 21 novembre, (D.Lechat, P-J. Lacampagne) ; Saint-Denis d'Orques, ad., phot., du 2 au 31 décembre, (D.Tavenon).

Une très bonne année pour cette espèce avec sept nouvelles données dans le Maine, à des dates conformes à la normale. Espèce certainement sous-prospectée en automne et hiver.

© Fabrice Jallu 2011



Fig.18 : Pie-grièche grise, Neuville en Charnie, (Sarthe), 16 février, (F.Jallu)

Fig. 19 : Sizerin flammé, Pré en Pail, (Mayenne),14 novembre, (D.Tavenon)



SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea* (7/34- 9/109)

C. f. flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. C. f. cabaret niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.

Mayenne- Villepail, 2 ind., 22 octobre, (D.Madiot) ; Pré en Pail, 7 ind., 30 octobre, (L.Rousselet) ; au moins 54 ind., phot., 14 novembre, (D.Tavenon) ; Laval, fem. ad., 23 novembre, (F.Duchenne).

Sarthe- Saint-Ouen en Belin, 40 ind., phot., 30 janvier, (F-M.Bouton) ; Saint-Denis d'Orques, au moins 2 ind., 17 novembre, (D.Tavenon).

2010- L'Huisserie, 29 décembre, (J-L.Reuzé)

2008- Saint-Martin de Connée, du 15 octobre au 18 novembre, (F.Noël) ; Mézangers, 6 décembre, (F.Noël).

Une bonne année avec six données de cette espèce qui passe assez souvent inaperçue au sein de groupes d'autres fringilles, et notamment les Tarins des aulnes ou les Linottes mélodieuses. Les dates sont conformes au pattern d'apparition des migrateurs post-nuptiaux puis des premiers hivernants. Trois autres données antérieures à 2011.

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

Sarthe- Sablé sur Sarthe, fem., **28 juillet, date la plus tardive, anachronique** (A.Darras)

MILAN NOIR *Milvus migrans* date la plus précoce

Mayenne- Le Bourgneuf la Forêt, **4 février, date la plus précoce** (N.Boileau)

BUSARD CENDRE *Circus pygargus* **(0/0- 1/1)**

Sarthe- Berfay, m.ad., **30 mars, date la plus précoce** (J-M. Guérécheau)

BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus*

Mayenne- Villiers-Charlemagne, phot., **du 16 au 30 novembre, date la plus tardive** (G.Bodinier)



Fig.20 : Balbuzard pêcheur, Villiers-Charlemagne,(Mayenne), 23 novembre, (G.Bodinier)

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius* **(2/3- 1/1)**

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, phot., **27 février, date la plus précoce**, (F.Jallu)

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, phot., **28 novembre, date la plus tardive, (F.Jallu)**

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*

Sarthe- Saint-Mars d'Outillé, **11 mars, date la plus précoce**, (F.Vaidie)

MARTINET NOIR *Apus apus*

Sarthe- Allonnes, 5 ind., **9 octobre, date la plus tardive**, (F-M.Bouton)

HYBRIDES

Néant

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

2011- Oie des neiges *Anser caerulescens*- Sarthe- Vion, **22 février**.

La description est très insuffisante autant qu'imprécise. Pas de référence de taille. Même si quelques éléments vont dans le bon sens, il manque certains critères comme la présence ou non de liserés aux couvertures alaires et la couleur des ailes en vol, pour éliminer d'autres espèces voisines.

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*- Sarthe, 14 janvier. Beaucoup trop d'imprécisions dans la –courte- description de l'oiseau : «... taches noires observées sur le dessous de l'oiseau ;...sur les bords extérieurs des ailes... ». Observation sur ce site d'une Buse variable très claire, le lendemain.

Faucon kobez *Falco vespertinus*- Mayenne- Le Genest- Saint- Isle, 1 type fem., 16 août. Même si quelques éléments accréditent l'observation d'un F.kobez, sans matériel optique, la détermination peut-être erronée, et la description laisse planer des doutes sur l'identification certaine de cette espèce. Le Faucon hobereau n'est pas écarté.

2010 - Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla*- Mayenne- Villiers-Charlemagne, 23 mai.

Bien que des éléments plaident en faveur de cette espèce, il manque des critères diagnostiques, notamment au niveau de la structure de l'aile (tertiaires qui recouvrent quasiment les primaires, projection presque nulle). Un autre risque de confusion avec l'Alouette des champs en plumage de printemps usé peut exister du fait que la huppe a disparu, le bec peut paraître assez fort et les barres alaires bien visibles.

2009- Caille des blés *Coturnix coturnix*- Sarthe- Vion, 12 mars.

Complément à cette donnée :

Le sexe (indication d'une femelle) n'a pas été retenu dans la mesure où les femelles arrivent plus tard que les mâles sur les sites de nidification. D'autre part, le lieu d'observation (un jardin) autorise le doute quant à l'origine sauvage de cet oiseau (*P.Mur, comm. pers.*).

OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE

D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2011.

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (1/1)

Sarthe- Parc/La Ladronnière, 1^{ère} année, phot., 13 octobre, (J-F.Darras)

Première donnée sarthoise remarquable, à une date conforme d'apparition de l'espèce en France.

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius*

Mayenne- Chammes, 1^{ère} année, phot., 4 novembre, (D.Madiot)

Première donnée mayennaise remarquable pour cette espèce observée en France aux passages migratoires, principalement entre fin février et début avril puis entre fin octobre et fin novembre.



Fig.21 : Vanneau sociable, Chammes,(Mayenne), 4 novembre, (D.Madiot)

REMERCIEMENTS

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2011 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne- Nature- Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, le CPIE, SNE, et le CPNS,
- la liste de diffusion Obsmaine, et la base de données en ligne Faune-Maine, ouverte en mars 2010 et qui a engrangé près de 195 000 données d'oiseaux récentes et anciennes, sur les 2 départements Mayenne et Sarthe, jusqu'à fin 2011,
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.

EN HOMMAGE A PIERRE-VICTOR VANDENWEGHE

Co- fondateur en 1999 et animateur infatigable de la liste de diffusion Obsmaine, observateur avisé, il nous a quittés fin novembre 2012.

Homme de partage, de convivialité, engagé et pédagogue, il était l'âme d'Obsmaine. Nous nous devons de poursuivre son action dans le même esprit.



Fig. 22 : Tichodrome échelette, Le Mans, (Sarthe), 6 février, (P-V. Vandenweghe)

BIBLIOGRAPHIE

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 in *Biotopes* 53 & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007- Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4) : p.234-246.
- Commission de l'Avifaune Française, 2011- Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental . *Ornithos* 18-3, n° 89, mai-juin 2011.
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008- Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008- Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- F. LECUREUR, J-Y. RENVOISE, M. AMELINE, 2008- La Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) : résultats de dix années de recensement, de protection et de sensibilisation. LPO Sarthe, DREAL Pays de la Loire, Parc naturel régional Normandie-Maine. 37p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1991- Les oiseaux nicheurs de la Sarthe, enquête 1985-1989. GSO. Le Mans. 169 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2000- La migration des oiseaux en Sarthe, observations 1975-2000. GSO. Le Mans. 204 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009- Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. *Sitta cénomane*- suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2012- Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 42.
- VAIDIE F., 2006. Observation d'un Jaseur boréal sur la commune de Jupilles, mars 2005. *Sitta cénomane* bulletin du GSO 36.
- LAPOUS E. & DARRAS J-F., 1994 à 2005- Synthèse des observations ornithologiques du sud-ouest de la Sarthe. Revue *Désirs d'Ailes* n° 1 à 13.
- LPO Sarthe, 2000 à 2011- *Le Tarier pâtre*. Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 11.

- Mayenne- Nature- Environnement, 1991- Les Oiseaux de la Mayenne. Atlas des oiseaux nicheurs de la Mayenne 1984-1988. Editions Rives Reines, 207 p.
- Mayenne- Nature- Environnement, 1982 à 2011- Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne *in Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 1 à 28.
- ISSA N. et le CHR Centre, 2009- Les oiseaux rares en région Centre en 2008.
- REEBER S. et le CHN, 2012- Les oiseaux rares en France en 2011. 29^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 19-6, nov- décembre 2012.
- REEBER S. et le CHN, 2011- Les oiseaux rares en France en 2010. 28^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 18-6, nov- décembre 2011.
- REEBER S. et le CHN, 2010- Les oiseaux rares en France en 2009. 27^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 17-6, nov- décembre 2010.
- REEBER S. et le CHN, 2009- Les oiseaux rares en France en 2008. 26^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 16-5, sept.- octobre 2009.
- FREMONT J-Y., REEBER S. & le CHN, 2008 – Les oiseaux rares en France en 2007. 25^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 15-5, sept.-octobre 2008.
- ZUCCA M. & le CMR, 2010- les observations d'oiseaux migrateurs rares en France, 6ème rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2007), *Ornithos* 17-1, janv.- février 2010.
- LEGENDRE F., OLIOSSO G. & le CMR, 2012- - les observations d'oiseaux migrateurs rares en France, 7ème rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2008), *Ornithos* 19-2, mars-avril 2012.