



LES OISEAUX RARES

EN 2012 DANS LE MAINE (MAYENNE et SARTHE)

5ème rapport du Comité d'Homologation du Maine

Les oiseaux rares dans le Maine (Mayenne et Sarthe) en 2012



**Elanion blanc, adulte,
Beaumont Pied de Boeuf
(Mayenne), 3 novembre,
(C. Kerihuel)**

**Goéland à ailes blanches, 1^{er}
hiver, Saint-Fraimbault
(Mayenne), 9 mars,
(D. Madiot)**



5ème rapport du Comité d'Homologation du Maine

Dominique TAVENON, Christian KERIHUEL et le CH Maine

Regroupant les 2 départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de 4 associations locales: Mayenne- Nature- Environnement (MNE) , Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), LPO Sarthe et Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et dont l'espèce ne fait pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale. Pour l'instant, il existe un coordinateur départemental pour chacun des 2 départements (D.Tavenon pour le 53 et C.Kerihuel pour le 72), chargés de collecter, centraliser et transmettre les observations départementales d'espèces rares sur le plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Celui-ci publie chaque année un rapport annuel dans la revue d'ornithologie française **Ornithos** (Zucca & le CMR, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010).

Ce cinquième rapport du CH Maine couvre l'année 2012, 5^{ème} année de son fonctionnement. Les membres du Comité ont été invités à examiner 89 fiches concernant des données d'espèces homologables à compter du 1^{er} janvier 2012, y compris quelques fiches en retard de 2008 (2) et 2010 (4). Le taux de validation atteint 95 %.

La classification suit la « Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental » établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française, Ornithos 18-3, n° 89, mai-juin 2011). Pour les espèces ayant été observées en France, figure la catégorie de la liste des Oiseaux de France dans laquelle elles ont été inscrites.

En 2012, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Hervé Julliot, Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), David Madiot, François Morazé, et Dominique Tavenon (secrétaire).

Aucune nouvelle candidature n'ayant été enregistrée début 2012, les 2 membres sortants, D.Tavenon et C.Kerihuel, ont souhaité renouveler leur mandat et ont été reconduits dans leurs fonctions, à l'unanimité des membres du CH Maine.

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont disponibles à l'adresse du secrétariat, et sur les sites Internet des associations:

MNE : <http://mayennenatureenvironnement.fr>

GSO : <http://gso72.free.fr>

LPO Sarthe : <http://sarthe.lpo.fr>

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :

Dominique Tavenon / Secrétaire du CH Maine, 2 chemin du Laurier, 53270 Blandouet

ou aux adresses mail: dominique.tavenon525@orange.fr, christian.kerihuel@wanadoo.fr

TRAVAUX ET DECISIONS DU CH MAINE

1) *Modification de la liste des espèces soumises à homologation nationale et révision de la liste soumise à homologation du CH Maine :*

A compter du 1er janvier 2013, et suite à la modification des critères d'inscription sur la liste CHN, quatre espèces ne sont plus soumises à homologation nationale, et sont désormais prises en charge par les CHR ou CHD: **le Busard pâle** *Circus macrourus*, **la Buse pattue** *Buteo lagopus*, **le Goéland à ailes blanches** *Larus glaucoides* (à l'exception de la sous-espèce *kumlieni*, qui reste à homologuer au niveau national), **l'Etourneau roselin** *Pastor roseus*.

Les données de ces espèces restent bien entendu à homologuer par le CHN pour l'année 2012 et les années antérieures. Vous trouverez les détails de cette révision sur le site du CHN, à l'adresse suivante: http://chn-france.org/chn_actualites.php?id=26.

Après consultation du statut de certaines espèces et de leur phénologie de présence dans la région du Maine, il a été décidé de modifier la liste des espèces homologables à compter du 1^{er} janvier 2013 comme suit:

Fuligule nyroca : *Aythya nyroca*

La preuve est apportée que, depuis deux ans au moins, quatre oiseaux semi-captifs sont régulièrement observés sur le secteur de Spay-Fillé et proviennent d'un élevage proche. En conséquence, l'espèce n'est plus homologable en Sarthe, au sud d'une ligne Saint-Denis d'Orques- La Ferté-Bernard, à compter du 1^{er} janvier 2013. Les données de cette espèce continueront cependant d'être archivées par le CH Maine dans le cadre de sa collaboration avec le Comité des Migrateurs Rares (CMR) de France. Les données restent donc à signaler avec précision. Cette espèce reste soumise à homologation pour les cas d'individus avérés d'origine naturelle observés en dehors de ce secteur.

Nette rousse *Netta rufina*

Mêmes remarques et décisions que pour le Fuligule nyroca.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* ; Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

Ces 2 espèces sont également maintenues en raison des possibilités de confusion avec d'autres espèces voisines déjà constatées.

Hibou des marais *Asio flammeus*

Cette espèce est également maintenue. De bonnes conditions d'observation ne sont pas souvent réunies pour une identification certaine.

Pouillot véloce *ssp.tristis*: retrait de la liste du CHN de cette ssp., suite aux difficultés rencontrées récemment en Europe pour séparer de façon certaine les 3 taxons *abietinus*, *fulvescens* et *tristis*. Le CH Maine n'examinera donc pas les éventuelles données qui continueront cependant d'être archivées par le CH Maine dans le cadre de sa collaboration avec le CHN et le Comité des Migrateurs Rares (CMR) de France. Les données restent donc à signaler avec précision.

2) *Révision de la liste des dates extrêmes d'arrivée et de départ des oiseaux migrants :*

Cette liste peut être consultée et/ou téléchargée sur le site des associations, la base de données en ligne Faune Maine et la liste de diffusion d'Obsmaine.

3) *Cas des données homologables antérieures à 2008:*

Le comité a adopté un principe de validation, au cas par cas, par l'interface Faune Maine.

QUELQUES FAITS MARQUANTS

L'événement ornithologique majeur, pour le Maine, est sans conteste la première nidification avérée de l'Elanion blanc, avec 3 jeunes à l'envol, à Beaumont Pied de Bœuf, au sud-est de la Mayenne, et le stationnement prolongé de 2 (3) adultes sur le secteur de nidification, et de 2 jeunes à Azé (16 km au sud). L'année 2012 a aussi été marquée par la première mention sarthoise remarquable du Goéland à ailes blanches, à Marçon, et la première mention récente du Pygargue à queue blanche, également en Sarthe, à Thorée les Pins (dernière mention en 1950, à Sillé le Guillaume !).

Il convient de noter également, en Mayenne, les nouvelles mentions du Goéland à ailes blanches ! Qui plus est, 5 individus au moins, de 2^{ème} et 3^{ème} année, ont fréquenté les sites du CET et des sablières de Glaintain, et du lac de Haute-Mayenne, entre le 29 janvier et le 23 mars, alors que l'oiseau sarthois, de 2^{ème} année, a séjourné du 15 au 23 janvier sur le lac des Varennes. Ce qui porte à huit le nombre d'oiseaux de cette espèce, dans le Maine, après ceux de février 2008 et mars 2009. Toutes ces données ont été homologuées par le CHN.

Notons encore, en Mayenne, la deuxième mention de l'Erismaure à tête blanche, à Juvigné, du Goéland bourgmestre, à Saint-Fraimbault, ainsi que le petit afflux de Harles piettes dans les deux départements, en février, espèce fraîchement réintégrée dans la liste des espèces homologables du CH Maine.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifiques.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2012 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour 2012.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
- 8- Date(s) d'observations.
- 9- Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental (CAF/LPO 2011).
- 11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
- 12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (8/10- 7/9)

France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu'en Asie centrale. Hiverné autour du bassin méditerranéen.

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne .

Sarthe- Fillé sur Sarthe, couple, phot., du 5 mai au 16 juin, (C. Kerihuel) ; Saint-Jean du Bois, 2 fem., phot., 1^{er} novembre, (C. Kerihuel) ; Fercé sur Sarthe, fem., 6 décembre, (F-M. Bouton & S. Douet) ; Spay, fem., phot., 7 décembre, (C. Kerihuel) ; Saint-Ouen en Belin, fem., 9 décembre, (V. Chauchet) ; La Flèche, fem., 13 décembre, (B.& C. Basoge) .

2011- Sarthe- La Flèche/ La Monnerie, les Poulriers, imm., 16 septembre, (O. Vannucci) ;

Les observations de Nette rousse du secteur Spay / Fillé / Fercé sur Sarthe et alentours autorisent le doute quant à l'origine sauvage de ces oiseaux, qui proviennent d'un parc voisin où ils sont détenus en semi-captivité.

Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (20/13- 6/6)

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne .

Balkans et Europe centrale jusqu'à Asie centrale.

Mayenne-Sainte-Suzanne, m. ad., phot., 27 mars, (D. Madiot).

Sarthe- Le Mans, fem. , phot., 12 février, (P-J. Lacampagne) ; Fercé sur Sarthe, 11 avril, (F-M. Bouton) ; Fercé sur Sarthe, m. , 20 juin au 21 août, (F-M. Bouton & D. Lehebel) ; Spay, m. , phot., 7 décembre, (C. Kerihuel).

2011- Mayenne- Saint-Denis d'Anjou, m. , phot., 10 novembre au 4 décembre, (B.Poincet & N. Houdouin).

Les observations de nyrocas du secteur Spay / Fillé / Fercé sur Sarthe autorisent le doute quant à l'origine sauvage de ces oiseaux, qui proviennent d'un parc voisin où ils sont détenus en semi-captivité. En particulier pour ce mâle présent durant deux mois dans la période estivale.

Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

HARLE PIETTE *Mergus albellus* (9/21)

Espèce monotypique qui niche de la Suède à la Sibérie orientale ; Hivernant peu commun qui fréquente essentiellement lacs, plans d'eau, rivières et fleuves.

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 2 type femelle, du 8 au 20 février (D. Madiot);

Nuillé sur Vicoin, m. , 16 février, (B. Poincet) ; Entrammes/Origné, 3 fem. , 17 au 19 février (S. Béasse, B. Duchenne *et al.*) ; Olivet, fem. , 9 mars, (D. Tavenon) ; Chalons du Maine, m. , 10 mars, (A. Garry).

Sarthe- Le Mans, 1m. et 2 fem. , phot., 9 au 11 février, (C. Kerihuel) ; Souvigné sur Sarthe, 3 type fem. , 13 février, (A. Lefloch) ; La Flèche/La Bruère, 2 type fem., 15 février, (B. & C. Basoge) ; Bazouges sur le Loir, 5 type fem. , 21 février, (M. Banasiak).

Cette espèce, loin de fournir au moins une donnée par an ces dix dernières années, a été réintégrée cette année dans la liste des espèces homologables au CH Maine . Un afflux de harles, observé en France au cours du mois de février, apporte neuf nouvelles données dans le Maine, cinq en Mayenne et quatre en Sarthe, et qui concernent vingt et un oiseaux, dont trois mâles, le sexe- ratio étant toujours aussi faible (moins de 20%).



1. Harles piettes, mâle et femelle, Le Mans, 9 février, (C. Kerihuel)

HARLE HUPPE *Mergus serrator* (3/6- 1/1)

Niche en Europe, principalement au nord de 55° N et tout autour de l'hémisphère nord. Migrateur et hivernant peu commun.

Mayenne- Bourgon/lac de Haute Vilaine, fem. 1^{ère} année, phot., 9 décembre, (F. Duchenne).

Une donnée mayennaise de cette espèce qui apparaît surtout de mi-octobre à décembre, hivernant assez rare à l'intérieur des terres.



2. Harle huppé, 1^{ère} année, Bourgon (Mayenne), 9 décembre, (F. Duchenne)

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (2/4)

Niche en Amérique du Nord. Introduite en Grande-Bretagne au début des années 1960, elle se trouve en petit nombre autour de la mer du Nord et, au sud, jusqu'en Espagne et au Maroc.

Espèce homologable hors de la Mayenne et des étangs de Saint-Denis d'Orques (Sarthe).

Sarthe- La Flèche, 1m. et 2 fem. , 1^{er} février, (B.& C. Basoge) ; Saint-Jean du Bois, fem. , phot., 18 au 30 mars, (C. Kerihuel).

Pour mémoire, 273 observations en Mayenne en 2012. Principalement observée sur les étangs des Coëvrons, Juvigné/étang Neuf, étang d'Olivet, Bouère/étang de Curécý, et Saint-Denis d'Anjou/étang de la Morinière. Elles peuvent être consultées sur la base de données en ligne Faune-Maine.

La Sarthe fournit ses deux premières données hors des étangs de Saint- Denis d'Orques. L'espèce est à surveiller sur tous les étangs sarthois et à signaler au Service départemental de l'ONCFS.

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica* (1/1- 1/1)

Niche de l'Europe du Nord jusqu'à la Russie à l'est. Hiverné principalement sur les côtes de l'Atlantique.

Sarthe- Arnage, ad. , phot., 22 et 23 décembre, (Bruno Duchenne, C. Kerihuel).

La huitième donnée sarthoise de cette espèce, après celle de 2010, à une période classique d'apparition. Hivernant peu commun le long des côtes et également à l'intérieur des terres, sur étangs, lacs, grands réservoirs et parfois sur le cours des fleuves.



3. Plongeon arctique, adulte, Arnage (Sarthe), 23 décembre 2012, (C. Kerihuel)

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (1/1- 1/1)

Niche au nord de l'Amérique du Nord et en Islande.

Sarthe- Arnage, 1^{ère} année, phot., 10 décembre au 8 mars au moins, (M. Oudiard, R. Pellion, C. Kerihuel , J-F. Le Bihan *et al.*)

Une nouvelle donnée sarthoise, après celle de 2009 à Mézangers, en Mayenne, à une période classique d'apparition de cet oiseau, hivernant peu commun le long des côtes et également à l'intérieur des terres, sur étangs, lacs, grands réservoirs et parfois sur le cours des fleuves.



4. Photo ci-dessus : Plongeon imbrin, 1^{ère} année, Arnage (Sarthe), J-F. Le Bihan
5. Photo ci-dessous : Plongeon imbrin , 1^{ère} année, à gauche et Plongeon arctique, 1^{ère} année, à droite, Arnage (Sarthe), 22 décembre 2012, (C. Kerihuel)



GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (2/2-1/1)

Niche dans le Paléarctique occidental, à l'est d'une ligne allant du nord de l'Allemagne à la Roumanie. Hivernant rare sur les côtes, étangs et lacs artificiels.

Sarthe- Saint-Jean du Bois, phot., 18 au 30 mars, (H. Julliot, C. Kerihuel *et al.*)

Une donnée sarthoise pour cette espèce migratrice et hivernante rare, en plumage nuptial, et que l'on est plus enclin à trouver en migration post-nuptiale.

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (5/5-1/1)

Niche de la Scandinavie à la Russie ; quelques couples en Ecosse. Hivernent le long des côtes françaises de l'Atlantique, en mers du nord, Baltique, Adriatique et Mer noire, à l'est.

Mayenne-Saint-Fraimbault, phot., 5 décembre, (D. Madiot).

Une nouvelle donnée, pour cet hivernant littoral plutôt rare à l'intérieur des terres.

Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax* (8/8-0/0)

Zones tempérées du Paléarctique. Distribution irrégulière dans les zones humides européennes au sud de 53° N.

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire- Mayenne/région des Coëvrons- Hambers/étang des Landes de Chellé, 5 juin, (J-F. Arcanger) ; Aron/canaux d'Aron, 12 août, (D. Madiot) et étang du Vieil Aulnay, 14 août, (A. Garry). Ces trois données concernent certainement 2 oiseaux.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (3/3- 1/1)

Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.

Espèce homologable en dehors du site de nidification connu en Sarthe.

2011- Sarthe- La Flèche/Les Pouliers, m. ad. , 13 mai, (O. Vannucci).

Une nouvelle donnée sarthoise pour cette espèce rare et discrète, à une date classique pour la migration pré- nuptiale, qui constitue la treizième donnée pour le département.

ELANION BLANC *Elanus caeruleus* (1/6)

Espèce polytypique. La sous-espèce nominale niche dans le sud-ouest de l'Europe, en Afrique (hors zones sahariennes), en Inde et dans le sud-est asiatique.

Mayenne- Bannes, m.ad. , phot., 20 juin, (D. Tavenon, P. Mur, A. Lefloch *et al.*) ; Beaumont Pied de Bœuf, ad. , 2 octobre, (A. Lefloch) ; jusqu'à 2 ad. (couple) et 3 juv., phot., du 1^{er} au 15 novembre, puis 1 à 2 ad. jusqu'au 15 janvier, et du 3 au 25 mars, (D. Tavenon, A. Garry, A. Lefloch *et al.*, collectif www.faune-maine.org).) ; Azé, 2 juv. , phot., 4 décembre au 22 janvier ; 1 juv. seul jusqu'au 26 mars, phot., (C. Letessier, collectif www.faune-maine.org.) ; Bouessay, 2 le 10 novembre, (R. Lelasseux, collectif www.faune-aine.org.); 1 ad. , 11 novembre au 10 février ; 1 à 2 ad. , 4 au 31 mars, (D. Tavenon, R Lelasseux, collectif www.faune-maine.org.).

L'évènement de l'année dans le Maine. La Mayenne devient le département le plus septentrional de nidification de l'espèce. Les observations simultanées, le 28 décembre, de 2 adultes à Beaumont et d'un autre adulte -ou en plumage d'adulte- présent à Bouessay (qui ne pouvait être un des jeunes) montrent qu'il y a eu au moins six oiseaux différents. En mars,

il est probable que les oiseaux observés sur Bouessay et Beaumont Pied de Bœuf soient les mêmes, puisqu'à plusieurs reprises, les oiseaux observés sur un site n'étaient pas simultanément présents sur l'autre.



6. Elanion blanc, juvénile, Azé (Mayenne),
9 décembre, (B. Poincet)

7. Pygargue à queue blanche, 3^e ou 4^e
année, Thorée les Pins, (Sarthe), 14
janvier, (O. Vannucci)



PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (1/1)

Niche du Groënland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu'aux régions boréales et à la toundra. Espèce liée à la proximité des milieux aquatiques.

Sarthe- Thorée les Pins, 3^{ème} ou 4^{ème} année, phot., 14 janvier, (O. Vannucci & A. Charré) ; Luché-Pringé, le même oiseau revu les 21 janvier, (H. Julliot) , 10 février, (B. Dufour) et 11 février, (H. Julliot).

Première donnée sarthoise récente remarquable. Cette espèce ne fournit qu'une donnée au XX^{ème} siècle en Sarthe, en 1950, à Sillé le Guillaume.

CIRCAETE JEAN LE BLANC *Circaetus gallicus* (3/3- 2/2)

Niche dans la moitié sud de la France, le sud de l'Europe, l'Afrique du nord, la Turquie, et de la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde.

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, ad., 11 mai, (Bruno Duchenne) ; Parigné l'Evêque, ad., 29 mai, (A. Beautru).

Quinzième donnée sarthoise d'un oiseau observé plus ou moins régulièrement dans de nombreux départements au nord de son aire de répartition.

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana* (2/2- 2/2)

Niche de l'Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes. Hiverné en Afrique subsaharienne.

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, juv., phot., 23 août, (A. Garry)

Sarthe- La Flèche, ad., 27 mars, (B. & C. Basoge) ; Parigné l'Evêque, juv., phot., 5 au 9 septembre, (R. Pellion) ; oiseau revu les 8 et 9 septembre, phot., (F. Jallu).

Deux données intéressantes (une en Mayenne et une en Sarthe) pour cette espèce discrète et rare contactée cette fois aux deux passages pré et post-nuptial.



8. Marouette ponctuée, juvénile, Parigné l'Evêque (Sarthe), 6 septembre 2012, (R. Pellion)

OUTARDE CANEPETIERE *Tetrax tetrax* (1/1-1/1)

Maroc, Europe de l'ouest à Asie centrale, jusqu'au nord de la Chine.

Sarthe- Parcé, f. ad. , phot., 6 mai, (J-F. & A. Darras et al.)

Une donnée intéressante d'un oiseau en migration pré-nuptiale, sur la plaine du sud-ouest de la Sarthe, qui a dépassé la limite nord de son aire de répartition dans le grand ouest. Plus de la moitié des onze données sarthoises provient de la plaine de Parcé.

GLAREOLE A COLLIER *Glareola pratincola* (1/1-1/1)

Sud de l'Europe au Pakistan.

Sarthe- Laigné en Belin, m. ad. , 4 mai, (F. Vaidie).

Nicheuse très rare le long du littoral méditerranéen, et migratrice rare en France, cette espèce est occasionnelle ailleurs et fournit pour le sud- Sarthe sa deuxième donnée remarquable.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (1/1)

Niche de l'Europe de l'Ouest et du nord-ouest de l'Afrique, à travers le Moyen-Orient et l'Asie centrale jusqu'au nord-est de la Chine et l'Extrême-Orient russe. En France, niche le long des côtes de la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Occasionnel à l'intérieur des terres.

Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, ad. , 8 au 10 avril, (A. Desnos, D. Madiot)

Quatrième donnée mayennaise d'un individu de cette espèce, mais première donnée depuis la création du CH Maine, à une date conforme du passage pré- nuptial, peu commun à l'intérieur des terres.

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus* (5/7-2/2)

C. c. canutus niche en Sibérie et hiverne en Afrique atlantique ; C. c. islandica niche du nord-est canadien au Groënland et hiverne dans le nord-ouest de l'Europe.

Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, ad., 6 mai, (D.Madiot) ; Sainte-Suzanne/étang des Landes, phot., 7 septembre, (D. Madiot)

Deux nouvelles données de cette espèce qui fréquente volontiers lagunes et vasières littorales, mais aussi plans d'eau intérieurs, sur des zones de vasières dégagées à la suite d'une baisse du niveau des eaux.

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (8/8- 2/3)

Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland.

Mayenne- Jublains, 2 ind., phot., 6 mai, (D. Madiot)

Sarthe- La Flèche, ad. , 11 avril, (B. & C. Basoge).

Deux nouvelles données à une date classique en migration pré- nuptiale. Signalons que cette espèce a été observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (4/4- 2/8)

Extrême nord de la Sibérie centrale.

Mayenne- Sainte-Suzanne/ étang des Landes, 1^{ère} année, phot., 11 septembre, (D. Madiot) .

Sarthe- La Ferté-Bernard, 7 ind., phot., 29 avril, (F. Jallu).

Deux nouvelles données mayennaises .Une nouvelle donnée sarthoise, après celle de septembre 2008, sur le même site.



9. Bécasseaux cocorlis, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 29 avril (F. Jallu)

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (6/42- 1/1)

Nord de la Scandinavie, Russie d'Europe jusqu'à l'Énisei.

Mayenne- Aron/étang de Beaucourday, ad., phot., 21 avril, (D.Madiot).

Une donnée sur un site toujours très prisé des limicoles au passage pré -nuptial.

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (4/4- 1/1)

Autour de l'Atlantique nord, archipels arctiques au nord, jusqu'au Portugal, au sud. Migrateur commun le long des côtes, l'espèce apparaît occasionnellement à l'intérieur des terres à la faveur de tempêtes venues de l'Atlantique.

Mayenne- Saint-Fraimbault, ad., phot., 17 mars, (D.Madiot).

Une nouvelle donnée de cette espèce maritime qui n'apparaît à l'intérieur des terres qu' à la suite de forts coups de vent d'ouest.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (19/17- 4/4)

Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne. Hiverné dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.

Mayenne- Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne et CET de Glaintain, 2^{ème} année, phot., 31 janvier au 16 mars, (D. Madiot, F. Noël et al) ; Port-Brillet, 2^{ème} année, phot., 15 février, (F. Duchenne) ; Mézangers/Gué de Selle, 3^{ème} année, 25 février, (D. Madiot, A. Dordoigne).

2011- Mayenne- Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne et CET de Glaintain, 1^{ère} année, phot., 25 novembre, (D. Madiot).

Deux des quatre données concernent certainement deux oiseaux différents du même âge, l'un stationnant sur les sites habituels du CET et sablières de Glaintain, et lac de Haute-Mayenne, à Saint-Fraimbault, l'autre provenant de l'ouest du département. Espèce d'apparition hivernale régulière ces dernières années en Mayenne, Maine et Loire et Touraine. A noter le stationnement d'un mois et demi pour un oiseau sur les sites du nord-Mayenne. Un suivi régulier en Sarthe, notamment sur Marçon, permettrait certainement des découvertes intéressantes. Des échanges sont notés entre plusieurs sites similaires des départements cités plus haut, ainsi qu'au nord de la Loire-Atlantique pour la 2^{ème} année consécutive, au moins (collectif www.faune-loire-atlantique.org). Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.



10. Goéland pontique, 1^{er} hiver, Saint-Fraimbault, (Mayenne), 10 février, (F. Noël)

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus* (1/1-1/1)

Nicheur arctique, île de Jan Mayen et du Spitzberg jusqu'à la péninsule de Taïmyr à l'est.

Mayenne- Saint- Fraimbault, 2^{ème} année, phot., 13 janvier au 28 février, puis du 9 au 17 mars, (D. Madiot *et al*).

Deuxième observation récente remarquable, en Mayenne, après celle de 1995, d'un oiseau qui a stationné sept semaines ; probablement le même oiseau que celui observé en Sarthe, au lac des Varennes, au cours des trois semaines précédentes.



11. Goéland bourgmestre, 1^{er} hiver, Saint-Fraimbault, (Mayenne), 16 mars, (D. Madiot)

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (11/49- 4/7)

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.

Mayenne- La Chapelle au Riboul, 1 à 3 inds., du 1^{er} Janvier au 10 mars (présents depuis le 24 décembre 2011), (G. Claës) ; Maisoncelles du Maine, 2 ind., phot., 22 janvier, (D. Madiot) .
Sarthe- Saint-Georges du Bois, 25 septembre, (R. Pellion) ; La Flèche, 4 novembre, (B. & C. Basoge).

Quatre nouvelles données dans le Maine, concernant sept individus. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.



12. Hibou des marais,
Maisoncelles du Maine
(Mayenne), 22 janvier,
(D. Madiot)

PIC CENDRE *Picus canus* (1/1- 1/1)

Niche de la Bretagne jusqu'à l'Altai, et jusqu'à 65 ° N.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.

Sarthe- Pontvallain, fem., 23 septembre, (V. Chauchet)

Pour mémoire- Sarthe- forêt de Bercé/Jupilles, Lavernat, Pruillé l'Ecuillé, Saint –Pierre de Lourouer, Saint-Vincent de Lourouer, 10 données entre le 20 février et le 1^{er} juin (F. Vaidie) ; Saint-Pierre de Lourouer, 24 mars (F-M. Bouton). Ces données concernent à chaque fois un seul oiseau.

Une seule donnée sarthoise de cette espèce discrète, hors des zones d'exclusion, non loin de la forêt de Bercé.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata* (1/1- 1/1)

Niche de l'Europe centrale jusqu'au nord-ouest de l'Espagne et au nord-est de l'Italie.

Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, et du plateau calaisien.

Mayenne- Saint-Denis d'Anjou, dessin, 26 février, (B. Poincet).

Pour mémoire, les données où l'espèce n'est pas homologable sont les suivantes :

Sarthe- Dissé sous le Lude, 2 ind., 6 janvier (F. Vaidie) ; Lamnay, 2 ind., 1^{er} avril (F. Jallu) ; 20 mai, (F. Jallu) ; 7 juillet, 3 ind., (F. Jallu) ; La Flèche, 17 mars, (A. Darras) ; 11 avril, B. & C. Basoge) ; 27 avril, (J-F. Darras) ; 20 mai, (F. Cudennec) ; 26 mai, (J-F. Darras) ; Champrond, 14 mai, (F. Jallu) ; Cérans-Foulletourte, 20 octobre, (J. Mellocco).

Première donnée mayennaise intéressante, depuis la création du CH Maine, en 2008.



13. Cochevis huppé, Lamnay, (Sarthe), 1er avril 2012, (F. Jallu)

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (4/6- 1/1)

L. s. svecica: de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidentale; *L. s. namnetum*: régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. Hiverné en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient.

Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.

Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, type fem. 1^{ère} année, phot., 16 septembre, (D. Madiot).

Deuxième donnée mayennaise, à une date conforme à l'apparition de cette espèce en migration post-nuptiale, et la première pour le site.

Pour mémoire, les données sur les secteurs où l'espèce n'est pas homologable, mais qui méritent d'être mentionnées sont les suivantes :

- Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 17 mars, (F. Jallu) ; fem., phot., 24 mars, (F. Jallu) ; 2^{ème} année, phot., 28 mars, (F. Jallu).

A noter que ces données sarthoises datent de la deuxième quinzaine de mars, et qu'il s'agit le plus souvent, d'une année sur l'autre, d'oiseaux observés en migration pré-nuptiale.



14. Gorgebleue à miroir, femelle, La Ferté-Bernard (Sarthe), 28 mars 2012, (F. Jallu)

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE *Locustella luscinioides* (1/1-1/1)

N-O de l'Afrique et de l'Europe jusqu'à l'ouest de la mer d'Azov.

Sarthe- Vaas, m., 21 avril, (O. Vannucci).

Deuxième donnée depuis la création du CH Maine, après celle de 2008, sur le même site. Elle se situe à une date conforme au passage pré-nuptial pour l'espèce. Vaas est une station connue depuis plus de 25 ans : des chanteurs sont notés quasi annuellement entre fin avril et juin, dans les années 1980 et 1990.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (1/1-2/2)

Niche du nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et à l'Oural.

Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard et du nord-Sarthe.

Mayenne- Voutré, m.ad., 22 mai, (D. Tavenon) ; Evron/le Grand Verger, 1ad. et 1 juv., 26 juin au 28 juillet, (D. Madiot).

Pour mémoire- Sarthe- La Ferté-Bernard, 24 mai, (F. Jallu) ; 29 mai, (F. Jallu) ; Les Mées, 23 mai, (F. Morazé) ; Roullée, 29 mai, (F. Morazé).

Cinquième et sixième mentions mayennaises de l'espèce, en limite sud-ouest de son aire de répartition, dont la reproduction a pu aller à son terme, sur un site banal- talus de gravats à végétation rudérale, dont un massif d'orties- et malgré des conditions météorologiques peu favorables les premières semaines de son installation.



15. Rousserolle verderolle adulte, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 15 juillet, (F. Jallu)

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (1/1-0/0)

S. u.undata niche en Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, y compris le sud de la France. S.u.dartfordiensis niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l'Angleterre.

Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné...), la forêt de Bercé, et le Nord-Est de la Mayenne.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire- Sarthe- Lavernat, 20 février et 24 juillet, (F. Vaidie) ; Pontvallain, 6 et 16 mai, puis 26 août, (V. Chauchet) ; La Flèche/aérodrome , 1ad. et 1 juv., 7 octobre, (J. Verger) ; 31 octobre, (F. Cudenneq) ; Luché-Pringé, t. fem., 10 novembre, (C. Kerihuel).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (4/3- 1/1)

La sous-espèce nominale niche de l'Europe de l'ouest, de 65° de latitude Nord jusqu'au nord de l'Italie et dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu'en en Sibérie occidentale.

Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d'une ligne Sillé le Guillaume- La Ferté-Bernard.

S. c. curruca niche de l'Europe de l'ouest jusqu'au nord de l'Italie et de la Slovénie jusqu'en Grèce et Turquie, dans le Grand Caucase et la moyenne vallée de la Volga, en Sibérie jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.

Sarthe- Beaufay, 28 juin, (G. Vaillant)

Pour mémoire- Sarthe- La Ferté-Bernard, 1 à 4 ind., 16 mai au 27 août (J-F. Blanc) ; Souvigné sous Même, 1 à 2 ind., 20 juillet au 22 août, (J-F. Blanc)

Une donnée sarthoise en un lieu assez proche de la zone d'exclusion de l'homologation.

MESANGE BOREALE *Poecile montanus* (1/1-1/1)

Poecile. m. montanus: niche des Alpes à l'Autriche et la Grèce ; P. m. salicarius : de l'est du Rhin jusqu'à la Pologne et du nord des Alpes à la République tchèque; P. m. rhenanus : des Pays-Bas à l'ouest de l'Allemagne, et nord-est de la France.

Mayenne- Loigné, ad., phot., 15 mars, (D. Tavenon)

Cette donnée, d'une espèce en limite d'aire de répartition, est la deuxième depuis la création du CH Maine, après celle de 2011. Il est essentiel d'entendre les cris et/ou le chant pour identifier cette espèce.

TICHODROME ECHELETTE *Tichodroma muraria* (1/1-1/1)

Nicheur rare localisé dans les montagnes du sud de l'Europe, du nord de l'Espagne à la Bulgarie, dans le Caucase , ainsi que dans le nord et l'ouest de l'Iran. Une petite partie de la population erratique en hiver.

Sarthe- Le Mans, 1er hiver, phot., 14 janvier au 25 mars, (H. Julliot, C. Kerihuel et al.)

Nouvelle donnée remarquable d'un individu de cette espèce en hivernage, et qui prend goût à son site d'accueil, dans le Vieux Mans, après la donnée de 2010.



Le Mans - Cathédrale - 19/01/2012
© Christian Kerihuel

16. Tichodrome échelette, 1^{er} hiver, Le Mans, (Sarthe), 19 janvier, (C. Kerihuel).

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (1/1- 5/12)

C.f. familiaris niche en Scandinavie, Europe de l'est, jusqu'à la Bulgarie et Russie centrale.

C.f. macrodactyla niche de l'Europe de l'ouest à l'Europe centrale.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.

Mayenne- Averton/La Pyramide, 3 ind., 24 mai et 6 juin, (D. Tavenon, J-F. Arcanger) ; Champfrémont : Tombeau, au moins 3 ind., 3 juillet au 3 août ; forêt de Multonne, au moins 4 ind., 30 juillet au 5 août ; Bel Event, 31 juillet au 4 août, (C. Pinçon) ; Pré en Pail/Beunècheville, 5 août, (C. Pinçon).

Pour mémoire- Sarthe- Pruillé l'Écuillé, 1 puis 2 ind., 1^{er} mai, (F.Vaidie) ; Marigné-Laillé, 2 ind., 10 mai, (F. Vaidie) ; Thoiré sur Dinan, 2 ind., 24 mai, (F. Vaidie) ; Jupilles, 2 ind., 1^{er} décembre, (F. Vaidie) ; Parigné l'Évêque, au moins 1 ind., 6 juillet, (R. Pellion).


Ces six données mayennaises proviennent toutes des forêts de Pail et de Multonne, près du Mont des Avaloirs. Espèce peu recherchée et discrète mais qui sait se montrer aux observateurs qui persévèrent dans sa recherche. Quatre des cinq données sarthoises, signalées pour mémoire, proviennent de la forêt de Bercé.

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (1/1-1/1)

La sous-espèce nominale niche à travers l'Europe, de la péninsule ibérique à la Russie. En France, niche en Alsace, Lorraine et Languedoc- Roussillon. Migrateur et hivernant rare ailleurs.

Sarthe- La Ferté-Bernard, 5 ind., phot., 29 mars, (F. Jallu).

Cinquième donnée sarthoise, la dernière remontant 2006, pour cette espèce migratrice de passage rare, à chercher dans les massifs de roselières avec massettes notamment.



17. Réviz penduline, La Ferté- Bernard, (Sarthe), 29 mars, (F. Jallu)

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* (10/10- 3/3)

Niche de la France et des Carpathes jusqu'en Europe du Nord et à la Sibérie centrale, jusqu'au fleuve Ienisseï. Hivernante et migratrice partielle peu commune.

Mayenne- Bouère, phot., 10 au 30 novembre, (G. Thébault, A. Darras et al.)

Sarthe- Saint-Ouen en Belin, phot., 2 janvier au 19 mars, (H. Julliot, C. Kerihuel et al.) ; forêt de Bercé/ Lavernat, phot., 29 février et 9 mars, (F. Vaidie).

Trois nouvelles données pour cette espèce, toujours observée à l'unité, certainement sous-prospectée en automne et hiver dans le Maine, à des dates conformes à la phénologie connue.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator* (1/5- 2/2)

L. s. senator : depuis les Pyrénées jusqu'à l'ouest de la Turquie à l'est, et à la Pologne au nord .

Mayenne- Louvigné/ Marbois, juv., 9 août, (N. Boileau)

Sarthe- Le Mans, 30 avril, (P-V. Vandenweghe).

Deux nouvelles données aux deux passages migratoires, après celles de mai 2010 et du printemps 2008, au cours duquel l'espèce a été trouvée nicheuse en Sarthe. Plus surprenante est cette observation dans un jardin en ville du Mans !

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea* (16/143- 2/3)

C. f. flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. C. f. cabaret niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.

Mayenne- La Selle-Craonnaise, t. fem., 2 décembre, (F. Duchenne)

Sarthe- Guécelard, 2 ind., 7 mars, (F. Vaidie).

Seulement deux données de cette espèce qui passe assez souvent inaperçue au sein de groupes d'autres fringilles, et notamment les Tarins des aulnes ou les Linottes mélodieuses. Les dates sont conformes à la phénologie de l' espèce .

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES

MARTINET NOIR *Apus apus*

Sarthe- Le Mans, 28 mars, date extrême la plus précoce, (J-M. Paumier)

TARIER DES PRES *Saxicola rubetra*

Mayenne- Hambers, 1^{ère} année, 30 octobre, date extrême la plus tardive, (B. & F. Duchenne)

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*

2011- Sarthe- Parigné l'Évêque, 26 septembre, date extrême la plus tardive.

La description est inexistante ; seules, quelques conditions d'observation sont mentionnées ; En l'absence d'éléments, le CH Maine ne peut donc pas accepter cette fiche, même s'il reste persuadé que l'auteur a bien observé cet oiseau.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*

Sarthe- Ruillé en Champagne, 12 août.

La description est inexistante ; seules, quelques conditions d'observation sont mentionnées ; En l'absence d'éléments, le CH Maine ne peut donc pas accepter cette fiche, même s'il reste persuadé que l'auteur a bien observé cet oiseau.

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata*

Sarthe- Saint-Symphorien, 10 août.

La description est inexistante ; seules, quelques conditions d'observation sont mentionnées. En l'absence d'éléments, le CH Maine ne peut donc pas accepter cette fiche, même s'il reste persuadé que l'auteur a bien observé cet oiseau.

POUILLOT DE SIBERIE *Phylloscopus collybita ssp. tristis* (1/1-1/1)

Mayenne- Villiers-Charlemagne, 8 janvier.

Cette sous-espèce a été retirée de la liste du CHN, suite aux difficultés rencontrées récemment en Europe et en France pour séparer de façon certaine les 3 taxons *abietinus*, *fulvescens* et *tristis*. En conséquence, le CH Maine n'a actuellement pas vocation à examiner les données jusqu'à nouvel ordre ; elles seront cependant archivées dans le but d'un éventuel examen futur. Les données restent donc à signaler avec précision.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*

Sarthe- Le Luart, 4 octobre.

La description quasi-inexistante et le milieu décrit de façon sommaire indiquent qu'il y a eu manifestement confusion avec le Grimpereau des jardins.

OBSERVATIONS D' OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTÉES PAR LE COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2012.

ERISMATURE A TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala* (1/1)

Espèce monotypique . Nicheur localisé du sud de l'Espagne au Maroc et jusqu'en Asie centrale. Espèce occasionnelle sur plans d'eau douce et saumâtre.

Mayenne- Juvigné, mâle ad., phot., 3 mars au 20 avril, (E. Médard, collectif www.faune-maine.org).

Deuxième donnée mayennaise remarquable pour cette espèce, après celle de janvier 1989 à Bonchamp, observée en France aux passages migratoires, principalement entre fin février et début avril puis entre fin octobre et fin novembre.



18. Erismature à tête blanche, mâle ad., Juvigné, 3 mars, (Mayenne), (E. Médard)

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides* ((2/2- 6/6)

Polytypique. Larus. g. glaucoides niche au Groënland. Hivernant néarctique rare, très occasionnel à l'intérieur des terres.

Mayenne- Saint-Fraimbault/CET et sablières de Glaintain, Lac de Haute-Mayenne, 3 ind. de 2ème année, phot., entre le 29 janvier et le 23 mars, et 2 ind. de 3ème année, phot., le 24 février, (D.Madiot *et al*).

Sarthe- Marçon/Lac des Varennes, 2ème année, phot., 15 au 23 janvier, (F.Jallu, C. Kerihuel). L'autre événement de l'année avec au moins 6 oiseaux différents pour le Maine, contactés entre le 15 janvier et le 23 mars, dont la première mention remarquable en Sarthe.

Il faut croire que l'espèce a apprécié l'ouest de la France, puisqu'au moins 18 oiseaux ont été dénombrés (dont 17 homologués par le CHN au 11/03/2013), sur des sites similaires et sur quelques grands plans d'eau dans le Maine et Loire, plusieurs (au moins le 3A qui ressemblait à un G. de Kumlien – voir bibliographie, et photos site A. Fossé <http://www.digimages.info/goeail/goeail.htm>)- ayant probablement fait la navette entre ce département voisin et la Mayenne, au moins.

Cet afflux sans précédent a touché l'ouest de l'Europe (effectifs historiques dans les îles Britanniques et les îles Féroës, (Fray *et al.* 2012).), et le nord-ouest de la France, notamment la façade atlantique et la basse vallée de la Loire, qui ont recueilli la majorité des données.



19. Goéland à ailes blanches, ssp ?, 2^{ème} hiver, Saint-Fraimbault (Mayenne), 24 février, (D. Madiot)

REMERCIEMENTS

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2012 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne- Nature- Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, le CPIE, SNE, et le CPNS,

- la liste de diffusion Obsmaine, le site Biolovision et sa base de données en ligne Visionature Faune-Maine, qui a engrangé 115233 données d'oiseaux, au cours de l'année 2012, sur les 2 départements Mayenne et Sarthe.
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- BESLOT É., COURANT S., FOSSE A., BELLION M., MARCHADOUR B., 2013- Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 1^{er} trimestre 2012. Éd. LPO Anjou, Bouchemaîne, 19 p. ([pdf](#)).
- CLEVA D., DUCHENNE B. & TAVENON. D., 2014- Élanion blanc *Elanus caeruleus* à paraître, in Marchadour B. (coord.), à paraître. Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux & Niestlé, Paris.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007- Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4) : p.234-246.
- Commission de l'Avifaune Française, 2011- Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental . *Ornithos* 18-3, n° 89, mai-juin 2011.
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008- Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008- Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- DUCHENNE B., GARRY A., LEFLOCH A. & TAVENON D., 2014- Découverte tardive d'une reproduction d'Élanion blanc *Elanus caeruleus* en Mayenne, à paraître, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30, à paraître.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1991- Les oiseaux nicheurs de la Sarthe, enquête 1985-1989. GSO. Le Mans. 169 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2000- La migration des oiseaux en Sarthe, observations 1975-2000. GSO. Le Mans. 204 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009- Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. *Sitta cénomane*- suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2013- Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 43.
- ISSA N. et le CHR Centre, 2009- Les oiseaux rares en région Centre en 2008.
- LAPOUS E. & DARRAS J-F., 1994 à 2005- Synthèse des observations ornithologiques du sud-ouest de la Sarthe. Revue *Désirs d'Ailes* n° 1 à 13.
- LEGENDRE F., OLIOSO G. & le CMR, 2012- Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France, 7ème rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2008), *Ornithos* 19-2, mars-avril 2012.
- LPO Sarthe, 2000 à 2013- *Le Tarier pâtre*. Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 11, (n° 12 et 13 à paraître).
- Mayenne- Nature- Environnement, 1991- Les Oiseaux de la Mayenne. Atlas des oiseaux nicheurs de la Mayenne 1984-1988. Editions Rives Reines, 207 p.

- Mayenne- Nature- Environnement, 1982 à 2013- Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne *in Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 1 à 29, n° 30 (à paraître).
- REEBER S. et le CHN, 2012- Les oiseaux rares en France en 2011. 29^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 19-6, nov.- décembre 2012.
- REEBER S. et le CHN, 2011- Les oiseaux rares en France en 2010. 28^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 18-6, nov- décembre 2011.
- ZUCCA M. & le CMR, 2010- les observations d'oiseaux migrateurs rares en France, 6ème rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2007), *Ornithos* 17-1, janv.- février 2010.