LES OISEAUX RARES

EN 2013 DANS LE MAINE
(MAYENNE et SARTHE)

6ème rapport du Comité d'Homologation du Maine

Les oiseaux rares dans le Maine (Mayenne et Sarthe) en 2013

Rousserolle turdoïde, adulte, La Flèche, site de La Monnerie, (Sarthe), 1er juin, (C. Kerihuel)

6 ème rapport du Comité d'Homologation du Maine

Dominique TAVENON, Christian KERIHUEL et le CH Maine

Regroupant les 2 départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de 4 associations locales: Mayenne- Nature- Environnement (MNE), Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), LPO Sarthe et Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et dont l'espèce ne fait pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale. Pour l'instant, il existe un coordinateur départemental pour chacun des 2 départements (D.Tavenon pour le 53 et C.Kerihuel pour le 72), chargés de collecter, centraliser et transmettre les observations départementales d'espèces rares sur le plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Celui-ci publie chaque année un rapport annuel dans la revue d'ornithologie française ***Ornithos*** (Zucca & le CMR, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010).

Ce sixième rapport du CH Maine couvre l'année 2013, 6ème année de son fonctionnement. Les membres du Comité ont été invités à examiner 75 fiches concernant des données d'espèces homologables à compter du 1er janvier 2013, y compris quelques fiches en retard de 2011 (6) et 2012(7). Le taux de validation atteint 92 %.
La classification suit la « Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental » établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française, Ornithos 18-3, n° 89, mai-juin 2011). Pour les espèces ayant été observées en France, figure la catégorie de la liste des Oiseaux de France dans laquelle elles ont été inscrites.
En 2013, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Hervé Julliot, Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), David Madiot, François Morazé, et Dominique Tavenon (secrétaire).
Hervé Julliot et David Madiot étaient les 2 membres sortants début 2014. Hervé Julliot, étant parvenu au terme de son deuxième mandat consécutif, ne pouvait pas se représenter ; il doit attendre deux années avant de pouvoir le faire à nouveau, s'il le souhaite. Nous remercions tous vivement Hervé pour son travail sérieux et sa grande compétence qu'il a mise au service du CH Maine. Pour le remplacer, Jean-Luc Reuzé, qui a proposé sa candidature, a réintégré le CH Maine, après trois ans d'absence, à l'unanimité des membres du CH Maine.
David Madiot a souhaité renouveler son mandat et il a été reconduit dans ses fonctions, à l'unanimité des membres du CH Maine. L'équilibre « trois mayennais et trois sarthois » est donc réalisé cette année !

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont disponibles à l'adresse du secrétariat, et sur les sites Internet des associations:

MNE : http://mayennenatureenvironnement.fr
GSO : http://gso72.free.fr LPO Sarthe : http://sarthe.lpo.fr

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :
Dominique Tavenon / Secrétaire du CH Maine, 2 chemin du Laurier, 53270 Blandouet
ou aux adresses mail: dominique.tavenon525@orange.fr, christian.kerihuel@wanadoo.fr

TRAVAUX ET DECISIONS DU CH MAINE

1) Révision de la liste soumise à homologation du CH Maine :
Après consultation du statut de certaines espèces et de leur phénologie de présence dans la région du Maine, il a été décidé de modifier la liste des espèces homologables à compter du 1er janvier 2014 comme suit:
Fuligule nyroca *Aythya nyroca*
Le CH Maine rappelle que l'espèce n'est plus homologable en Sarthe, au sud d'une ligne Saint-Denis d'Orques- La Ferté-Bernard, depuis le 1er janvier 2013. Les données de cette espèce continueront cependant d'être archivées par le CH Maine dans le cadre de sa collaboration avec le Comité des Migrateurs Rares (CMR) de France. Les données restent donc à signaler avec précision. Cette espèce reste soumise à homologation pour les cas d'individus avérés d'origine naturelle observés en dehors de ce secteur, soit au nord d'une ligne Saint-Denis d'Orques- La Ferté- Bernard.
Nette rousse *Netta rufina*
L'espèce n'est plus homologable en Sarthe, alors qu'en Mayenne, elle reste homologable en dehors de la région des Coëvrons.
Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii ;* Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*
Ces 2 espèces sont toujours maintenues en raison des possibilités de confusion avec d'autres espèces voisines déjà constatées.
Hibou des marais *Asio flammeus*
Cette espèce est également maintenue. De bonnes conditions d'observation ne sont pas souvent réunies pour une identification certaine.
Pouillot véloce *ssp.tristis, abietinus, fulvescens:* Le CH Maine n'examinera pas les éventuelles données, mais demandera la rédaction de fiches qui seront archivées dans le cadre de sa collaboration avec le CHN et le Comité des Migrateurs Rares (CMR) de France, d'une part, et pour la reprise d'un éventuel examen futur, d'autre part.

2) Révision de la liste des dates extrêmes d'arrivée et de départ des oiseaux migrateurs :
Cette liste peut être consultée et/ou téléchargée sur le site des associations, la base de données en ligne Faune Maine et la liste de diffusion d'Obsmaine.

3) Cas des données homologables antérieures à 2008:
Le comité a adopté un principe de validation, au cas par cas, par l'interface Faune Maine.

4) Informations sur les modifications de la Liste de Oiseaux de France (LOF) :
Pour plus de détails sur les changements apportés à cette liste (taxons nouveaux pour la LOF-catégorie A ; modifications de noms scientifiques ; données nouvelles pour la LOF), se reporter aux comptes rendus des travaux de la Commission de l'Avifaune Française publiés dans *Ornithos* (Crochet et al. 2013), ainsi qu'aux Notes d'Ornithologie Française publiées également dans *Ornithos*(= NOF 1 ; Dubois et al. 2012 ; = NOF2 ; Dubois et al. 2014).

QUELQUES FAITS MARQUANTS

Les événement ornithologiques majeurs, pour le Maine, sont, d'une part, la première mention remarquable de la Mouette de Franklin à La Flèche, et d'autre part, le retour de la Rousserolle turdoïde en Sarthe, nicheuse de surcroît, sur le site de La Monnerie à La Flèche, et qui n'avait pas été revue depuis juin 1972. L'année 2013 a aussi été marquée par la première mention mayennaise du Goéland à bec cerclé, à Olivet, et la deuxième mention printanière, à Javron, du Pipit de Richard, et à Mézangers, de la Sterne hansel à l'étang du Gué de Selle. Notons encore en Sarthe la première nidification réussie du Blongios nain, à La Flèche, sur le site de La Monnerie. Rappelons que cette espèce a également réussi sa nidification sur le site historique de Saint-Mars-la-Brière.

Il convient de noter également, en Mayenne, la troisième mention pour le Fuligule à bec cerclé, et en Sarthe, la cinquième mention automnale de l'Eider à duvet.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

1- Noms français et scientifiques.
2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2013 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour 2013.
3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
7- Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
8- Date(s) d'observations .
9- Nom(s) du (ou des)observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
10- La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental (CAF/LPO 2011).
11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous –espèce concernée.
12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (15/19- 0/0)

France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu'en Asie centrale. Hiverne autour du bassin méditerranéen.

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne , et hors Sarthe.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire : 19 données, provenant toutes de la zone d'exclusion, notamment Spay, Fillé-sur-Sarthe, Fercé-sur-Sarthe, Saint-Jean-du-Bois et La Flèche. (collectif www.faune-maine.org.).
Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (2/3-0/0)
Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu'au fleuve Léna, à l'est.
Espèce homologable uniquement en Sarthe.
Aucune donnée hors de la Mayenne.
Pour mémoire: Mayenne- 10 données concernent probablement 3 individus, 2 mâles 1ère et 2ème année observés entre le 15 janvier et le 16 mars, à Mézangers/ étang de Gué de Selle, Saint-Fraimbault/ lac de Haute-Mayenne, et à Aron/étang de Beaucoudray, puis une femelle 1ère année le 29 octobre, à l'ouest du département, à Launay-Villiers/étang du Bas. (Collectif Faune Maine).

FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris* (0/0 -1/1)
Espèce monotypique qui niche en Amérique du Nord, de la Colombie Britannique à Terre-Neuve, au nord, jusqu'au Michigan et au Maine, au sud.
Mayenne- Aron/étg de Beaucoudray, fem., phot., du 31 janvier au 22 avril, (D.Madiot *et al.*).
Troisième donnée mayennaise après celles de 1996 et 2000, de ce visiteur égaré, rare sur les plans d'eau intérieurs. Première donnée depuis la création du CH Maine.

ci-dessus : Fuligule à bec cerclé, femelle, 1er plan, Aron, étang de Beaucoudray, (Mayenne), 5 février, (D. Madiot).

ci-dessous : Eider à duvet, femelle, 1er hiver, Le Mans, lac des Sablons (Sarthe), 11 octobre, (C. Kerihuel)

EIDER A DUVET *Somateria mollissima* (0/0 -1/1)
Espèce polytypique qui niche en France et des îles Britanniques aux pays bordant la Mer du Nord, et jusqu'à la Nouvelle Zemble.

Sarthe- Le Mans/lac des Sablons, 1er hiver, phot., du 10 au 18 octobre, (C. Kerihuel *et al*.). Première donnée de cette espèce depuis la création du CH Maine, en 2008. Migrateur rare et hivernant peu commun surtout en eaux marines, et parfois sur les plans d'eau intérieurs. Il s'agit de la 5ème donnée d'un oiseau erratique à l'automne.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (2/3 – 1/1)

Islande, Nord des îles Britanniques, et de la Scandinavie jusqu'en Sibérie.

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 1er hiver, phot., 10 novembre 2013, (C. Kerihuel).

Une nouvelle donnée sarthoise, après celle de 2011, qui s'inscrit bien dans le pattern d'apparition de l'espèce, en novembre, ou en fin d'hiver, en fin février et mars notamment.

ci-dessus : Macreuse noire, 1er hiver, La Flèche, (Sarthe), 11 novembre, (C. Kerihuel).

ci-dessous: Harle piette, mâle, Châlons du Maine, (Mayenne), 6 mars ,(A. Garry)

HARLE PIETTE *Mergus albellus* (9/21-5/5)

Espèce monotypique qui niche de la Suède à la Sibérie orientale ; hivernant peu commun qui fréquente essentiellement lacs, plans d'eau, rivières et fleuves.

Mayenne- Olivet, fem., phot., 26 janvier, (F. Duchenne) ; Ahuillé/étang de la Chaussée, fem., 25 février au 25 mars, phot., (F. Duchenne, J-F. Arcanger) ; Châlons-du-Maine, m.ad., phot., 6 mars, (A. Garry) ; Olivet, fem. ad., 20 novembre au 23 décembre, (B. Duchenne).

Sarthe- Fercé-sur-Sarthe, 2 ind., 21 janvier, (F-M. Bouton).

Cette espèce, loin de fournir au moins une donnée par an ces dix dernières années, a été réintégrée en 2013 dans la liste des espèces homologables au CH Maine. Cinq nouvelles données, dont 4 en Mayenne, font suite au petit afflux de 2012, qui avait apporté neuf nouvelles données dans le Maine, cinq en Mayenne et quatre en Sarthe, totalisant 21 oiseaux.

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (2/4-2/2)

Niche en Amérique du Nord. Introduite en Grande-Bretagne au début des années 1960, elle se trouve en petit nombre autour de la mer du Nord et, au sud, jusqu'en Espagne et au Maroc.

Espèce homologable hors de la Mayenne et des étangs de Saint-Denis-d'Orques (Sarthe).

Sarthe- Saosnes, m. ad., 14 juin, (J. Lacampagne) ; La Flèche, fem. ad., 17 octobre, (B. Basoge) .

Pour mémoire, 169 observations en Mayenne en 2013. Principalement observée sur les étangs de Juvigné/Étang Neuf, Olivet, Launay-Villiers, les étangs des Coëvrons, Bouère/étang de Curécy, et Saint-Denis-d'Anjou/étang de la Morinière. Elles peuvent être consultées sur la base de données en ligne Faune-Maine (collectif www.faune-maine.org.).
Également, une nouvelle donnée sur l'étang de Saint- Denis-d'Orques/ La Cordelière, le 18 février (J. Lacampagne).

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (2/2- 1/1)
Niche au nord de l'Amérique du Nord et en Islande.
Mayenne- Saint-Denis-d'Anjou/étang de la Morinière, 1er hiver, 27 décembre, (A. Lefloch).
Une nouvelle donnée mayennaise, après celles de 2009 à Mézangers, en Mayenne, et de 2012 à Arnage, en Sarthe, à une période classique d'apparition de cet oiseau, hivernant peu commun le long des côtes et également à l'intérieur des terres, sur étangs, lacs, grands réservoirs et parfois sur le cours des fleuves.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (4/4- 2/4)
Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.
Espèce homologable en dehors du site de nidification connu en Sarthe.
Sarthe- La Flèche/Les Pouliers, m. ad. , phot., 21 mai, (J-Y. Renvoisé et al.) ; La Flèche/La Monnerie, m.ad., 1er au 7 juin, puis 3m. et 1 f., 7 juin au 27 août, (C.Kerihuel, Bruno Duchenne, B. & C. Basoge *et al*.).
Deux nouvelles données sarthoises pour cette espèce rare et discrète, après celles de 2011 et 2012, à une date classique pour la migration prénuptiale, qui apportent la première nidification remarquable réussie sur le site de La Flèche, et qui portent à quinze le nombre de données pour le département, hors du site de nidification connu antérieurement, qui, lui, permet de porter à dix-huit le nombre total de données en Sarthe, avec la nidification réussie d'un couple avec 2 juvéniles. Voir ci-dessous :
Pour mémoire, 1 donnée sarthoise, sur le site connu de nidification : 1m. le 11 juillet, 1 couple le 24 juillet, puis un couple et 2 juv., le 31 juillet (F.Jallu).

Photo ci-dessous : Blongios nain, mâle ad., La Flèche, (Sarthe), 9 juin, (C. Kerihuel)

IBIS SACRE *Threskiornis aethiopicus* (0/0-1/1)
Espèce polytypique qui niche en Afrique subtropicale, en Irak(?), d'autres sous-espèces à Madagascar et Aldabra. Nicheur peu commun, introduit.
Mayenne- Bouère/étang de Curécy, phot., 14 au 17 septembre (A.Desnos, A. Darras et B. Poincet).

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus (*5/5 – 1/1*)*
Niche dans la moitié sud de la France, le sud de l'Europe, l'Afrique du nord, la Turquie, et de la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde.
Sarthe- Sud Sarthe, localité tenue secrète pour suspicion de nidification, 3ème année ou ad., phot., 17 mai au 5 juillet, (F. Vaidie). Seizième donnée sarthoise d'un oiseau observé plus ou moins régulièrement dans de nombreux départements au nord de son aire de répartition.

Circaëte Jean-le-Blanc, 3ème année ou adulte, sud Sarthe, 5 juillet, (F. Vaidie).

ELANION BLANC *Elanus caeruleus* (4/6- 0/0)

Espèce polytypique. La sous-espèce nominale niche dans le sud-ouest de l'Europe, en Afrique (hors zones sahariennes), en Inde et dans le sud-est asiatique.

Beaumont-Pied-de-Bœuf, 1 à 2 ad. du 1er au 15 janvier, et du 3 au 25 mars, (D. Tavenon, A. Garry, A. Lefloch *et al*., collectif www.faune-maine.org.).) ; Azé, 2 juv. , phot., présents du 7 décembre jusqu'au 22 janvier ; 1 juv. seul jusqu'au 26 mars, phot., (C. Letessier, collectif www.faune-maine.org.) ; Bouessay,; 1 ad ., présent du 11 novembre au 10 février ; 1 à 2 ad. , 4 au 31 mars, (D. Tavenon, R Lelasseux, collectif www.faune-maine.org.).

L'événement de l'année 2012 dans le Maine, largement relaté dans le 5ème rapport du CH Maine de 2012, et qui s'est prolongé jusqu'à fin mars 2013. Nous relatons ici les données de présence des élanions sur l'année 2013.

MAROUETTE PONCTUEE *Porzana porzana* (4/4 – 1/1)

Niche de l'Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes. Hiverne en Afrique subsaharienne.

Mayenne- Bouère/étang de Curécy, 1ère année, 6 septembre, (A. Lefloch).

La douzième donnée en Mayenne pour cette espèce discrète et rare, contactée au passage postnuptial.

OUTARDE CANEPETIERE *Tetrax tetrax* (2/2-1/1)

Maroc, Europe de l'ouest à Asie centrale, jusqu'au nord de la Chine.

Sarthe- Parcé, f. ad. , phot., 29 avril au 2 mai, (J-F.& A. Darras *et al*.)

Une nouvelle donnée intéressante d'un oiseau en migration prénuptiale, sur la plaine du sud-ouest de la Sarthe, qui a dépassé la limite nord de son aire de répartition dans le grand ouest. Plus de la moitié des douze données sarthoises provient de la plaine de Parcé.

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus* (7/9 – 2/3)

C. c. canutus niche en Sibérie et hiverne en Afrique atlantique ; C. c .islandica niche du nord-est canadien au Groenland et hiverne dans le nord-ouest de l'Europe.

Mayenne- L'Huisserie, 6 septembre, (J-L. Reuzé).

2012- Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 2 inds, phot., 11 juin, (A. Garry).

Deux nouvelles données de cette espèce qui fréquente volontiers lagunes et vasières littorales, mais aussi plans d'eau intérieurs, sur des zones de vasières dégagées à la suite d'une baisse du niveau des eaux.

Bécasseaux maubèches, adultes (nuptial et en mue), Aron, étang de Beaucoudray, (Mayenne), 11 juin 2012, (A. Garry).

Bécasseaux sanderlings, ad., La Flèche (Sarthe), 10 mai, (Br. Duchenne)

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (10/11- 1/5)
Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland.
Sarthe- La Flèche, 5 ad. , phot., 9 au 12 mai, (Bruno Duchenne, C. Kerihuel) ; La Flèche , 1 à 5 ind., 10 au 17 mai, (B. & C. Basoge)
Une nouvelle donnée à des dates classiques, et sur un site devenu classique aussi, en migration prénuptiale. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (9/13-1/1)
Arctique : sud de la Norvège à l'est de la Sibérie.
Sarthe- La Flèche, phot., 4 mai, (Bruno Duchenne, C. Kerihuel).
Une seule donnée, en Sarthe, à une date classique pour l'espèce en migration prénuptiale. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (6/12- 2/2)
Extrême nord de la Sibérie centrale.
Mayenne- Bourgon/ Le Plessis, juv., 27 août, (B.Poincet) ; juv., phot., 28 août, A. Garry) .
Sarthe- La Flèche/La Monnerie, ad., 26 mai, (B. & C. Basoge).
Une donnée mayennaise, sur un site classique. Une nouvelle donnée sarthoise, après celle de septembre 2008, sur le même site.

A gauche : Bécasseau cocorli, juv., Bourgon, Lac de Haute-Vilaine, (Mayenne), 28 août, (A. Garry).
A droite : Tournepierre à collier, La Flèche (Sarthe), 31 août, (C. Kerihuel)

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres (*3/6- 2/7*)*

Niche au N-E du Canada , en Alaska, et sur le littoral arctique hors Islande, mais jusqu'au sud de la Baltique. Hivernant rare à l'intérieur des terres.

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 1 à 5 ind., 27 avril au 15 mai, (B. & C. Basoge) ; 2 ad., phot., 31 août, (B. & C. Basoge).

Deux nouvelles données sarthoises aux 2 passages migratoires, et toujours à l'étang de la Monnerie, qui a apporté cette année encore son lot d'espèces de limicoles.

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis* (0/0 - 1/1)

Espèce monotypique qui niche dans le centre, le sud-ouest et l'est de l'Amérique du Nord.

Mayenne- Olivet, 3ème année, 27 février, (F. Duchenne).

Première donnée remarquable pour cette espèce néarctique, migratrice et hivernante rare, occasionnelle à l'intérieur des terres.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (23/21- 7/8)

Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne. Hiverne dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.

Mayenne- Olivet, 5ème année, phot., 26 janvier, (F.Duchenne); Maisoncelles, ad., phot., 14 juillet, (B. & F. Duchenne) ; Olivet, 1ère année, phot., 24 novembre 2013, (F. Duchenne) ; Saint-Fraimbault/sablières de Glaintain, 2 1ère année, phot., 7 au 30 décembre, (F. Duchenne,D. Madiot,) ; 1ère année, phot., 15 au 20 décembre, (F. Duchenne).

2012- Mayenne- Saint-Fraimbault/sablières de Glaintain, ad., phot., 27 janvier, (F. Noël) ; Saint-Fraimbault/CET de Glaintain, 4ème année, phot., 9 mars, (D. Madiot).

Sept nouvelles données mayennaises (y compris les deux données de 2012), dont quatre sur les sites habituels du CET et des sablières de Glaintain, à Saint-Fraimbault, et deux autres provenant de l'ouest du département, à Olivet, non loin du CET de Changé. Espèce d'apparition hivernale régulière ces dernières années en Mayenne, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Touraine. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

Ci-dessus: Goéland pontique, 5ème année, Olivet, (Mayenne), 26 janvier, (F. Duchenne).

Ci-dessous: Goéland pontique, 1ère année, Saint-Fraimbault, Lac de Haute-Mayenne, (Mayenne), 7 décembre, (F. Duchenne)

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (8/8- 2/1)

Polytypique. Larus. g. glaucoides niche au Groënland. Hivernant néarctique rare, occasionnel à l'intérieur des terres.

Mayenne- Olivet, 2ème année, phot., 2 au 9 février, (B.& F. Duchenne) ; Saint-Fraimbault, 2ème année, phot., 22 février au moins, (D. Madiot).

Huitième donnée mayennaise pour ce goéland venu du froid, après le stationnement de 6 oiseaux dans le Maine (5 en Mayenne et 1 en Sarthe), au cours de l'hiver 2011-2012. L'oiseau de Saint-Fraimbault est très probablement le même que celui d'Olivet.

Goéland à ailes blanches, 2ème année, Saint-Fraimbault, CET de Glaintain, (Mayenne), 22 février, (D. Madiot)

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica* (1/1-1/1)

Niche du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-ouest de la Chine.

Mayenne- Mézangers/étang du Gué de Selle, 2 ad., 14 juin, (D. Tavenon).

Deuxième donnée mayennaise pour cette espèce migratrice, occasionnelle à l'intérieur des terres, de fin mai à mi-juillet.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (15/56- 5/7)

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.

Mayenne- Ballée, 1 à 3 ind., 17 décembre 2012 au 10 février 2013, (D.Tavenon, A. Lefloch *et al.*) ; Montourtier, 25 janvier, (D. Madiot) ;

Sarthe- Auvers-le-Hamon, 25 janvier, (A. Lefloch) ; Vezot, 18 mars, (P-J. Lacampagne).

2012- Mayenne- Saint-Pierre-sur-Orthe, 1er décembre, (F. Noël).

Quatre nouvelles données dans le Maine, plus une de 2012, concernent sept individus. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

PIC CENDRE *Picus canus* (2/2- 0/0)

Niche de la Bretagne jusqu'à l'Altaï, et jusqu'à 65 ° N.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire- Sarthe- forêt de Bercé/Jupilles, fem., 7 avril, (V. Chauchet) ; Pruillé l'Ecuillé, 9 avril, (P-J. Lacampagne) ; Saint –Pierre de Lourouer, par. N° 173, 2 ind., 19 mai, (R. Bourigault) ; par. N° 227, 20 mai, (O. Vannucci).

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata* (2/2-0/0)
Niche de l'Europe centrale jusqu'au nord-ouest de l'Espagne et au nord-est de l'Italie.
Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, et du plateau calaisien.
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.
Pour mémoire, les données où l'espèce n'est pas homologable sont les suivantes :
Sarthe- 12 données entre le 10 mars et le 20 juillet, (collectif www.faune-maine.org.). A noter : Valennes, 3 ind. dont un juv., le 20 juillet (F. Jallu).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (1/1-1/1)
Niche en Russie, du sud-ouest de la Sibérie au lac Baïkal, et dans l'est du Kazakhstan.
Mayenne- Javron, 2ème année, phot., 24 avril, (F. Noël).
Deuxième donnée mayennaise, printanière également, de ce migrateur rare et hivernant très rare, devenu régulier dans le Midi, et peut-être en passe de le devenir en baie du Mont-Saint-Michel.

Pipit de Richard, 2ème année (?), Javron, (Mayenne), 24 avril, (F. Noël).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava thunbergi* (0/0-1/1)
Nord Scandinavie. Passage printanier, surtout dans le sud et la moitié est de la France, également confirmé dans l'ouest à partir des années 1970, entre mi avril et mi-mai pour les retardataires.
Sarthe- Parcé-sur-Sarthe, 2 m., 2 mai, (E. Lapous, J-F. Darras *et al.*).
Il s'agit de la dixième donnée en Sarthe pour cette sous-espèce.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (4/6- 2/6)
L. s. svecica: de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidental; L .s. namnetum: régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. Hiverne en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient.
Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.
Sarthe- Yvré-l'Evêque, 1 à 5 ind., phot., 5 au 8 avril, (C. Kerihuel, Br. Duchenne) ; Vion, fem., 7 avril, (J-F. Darras).
Deux nouvelles données sarthoises, de début avril. Le site d'Yvré l'Evêque a quand même accueilli jusqu'à 5 individus.
Pour mémoire, les données sur les secteurs où l'espèce n'est pas homologable, mais qui méritent d'être mentionnées sont les suivantes :

- Sarthe- près de 80 observations à La Ferté-Bernard et les communes voisines de Cherré, Avezé et Souvigné-sur-Même, entre le 17 mars et le 10 avril, avec un record de 50 oiseaux vus le 6 avril sur les sites suivis de La Ferté-Bernard (F. Jallu, J-F. Blanc). Il reste cependant délicat de donner une estimation du nombre d'oiseaux différents observés, mais il s'agit là d'un afflux sans précédent sur ce secteur.

Gorgebleue à miroir, femelle, Yvré-l'Evêque (Sarthe), 7 avril, (C. Kerihuel)

Différents types de plumage de Gorgebleues à miroir observés entre le 14 mars et le 7 avril, en Sarthe, sur les sites de La Ferté-Bernard, Avezé et Yvré-l'Evêque :

Mâle adulte, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 14 mars, (F. Jallu)

Mâle adulte, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 16 mars, (F. Jallu)

Mâle adulte, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 17 mars, (F. Jallu)

Mâle adulte, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 21 mars, (F. Jallu)

Mâle et femelle adultes, Avezé, (Sarthe), 30 mars, (F. Jallu).

Mâle adulte, Avezé, (Sarthe), 30 mars, (F. Jallu)

Mâle adulte, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 30 mars, (F. Jallu)

Femelle , Yvré-l'Evêque, (Sarthe), 7 avril, (C. Kerihuel)

Femelle adulte, La Ferté-Bernard ,(Sarthe), 7 avril, (F. Jallu)

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (3/5-1/1)
Niche du nord- ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et à l'Oural.
Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard et du nord-Sarthe.
Mayenne- Entrammes/Persigand, 8 juin, F. Duchenne).
Septième mention mayennaise de l'espèce, en limite sud-ouest de son aire de répartition, à une date classique d'apparition.
Pour mémoire- Sarthe- Sept données entre le 12 et le 30 mai, avec un record de 5 oiseaux à La Ferté-Bernard le 27 mai (F. Jallu). Deux autres données à Peray, les 7 et 9 juin, 1 puis 2 ind., G. Vaillant).

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus* (1/1- 1/6)
Niche depuis les rives de la Méditerranée jusqu'aux mers du Nord et Baltique (sud de la Suède et Finlande) à l'ouest, en Russie, jusqu'au fleuve Ienisseï, à l'est, et atteignant le sud de la mer Noire et la Syrie au sud.
Sarthe- La Flèche/La Monnerie, m, 26 mai, (G. Paineau *et al*) ; 29 mai au 15 juillet, au moins 2 ad., phot., B. & C. Basoge *et al*).
En Sarthe, l'espèce fait son retour, après plus de 40 années d'absence. De plus, elle a niché sur le site de la Monnerie, à La Flèche, où il a été observé probablement 6 oiseaux en tout : 2 juv. nourris par les parents (O. Vannucci, *comm.pers*.), et un autre couple observé plus tôt en saison. La dernière observation connue de la Rousserolle turdoïde date de 1972 : 3 à 5 chanteurs entendus le 11 juin sur les bords de l'étang de la Croix de Bonlieue, à Château-du-Loir (J-M. Cartignies et G. Paineau).

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (1/1- 0/0)
S. u.undata niche en Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, y compris le sud de la France. S.u.dartfordiensis niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l'Angleterre.
Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné…), la forêt de Bercé, et le Nord-Est de la Mayenne.
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire- Sarthe- La Flèche, 2 ind., 7 janvier, (O. Vannucci) ; 10 mars, (M. Sineau) ; Thorée-les-Pins, 2 ind., 17 février et 22 mars, (J. Verger) ; Pontvallain, 10 mars et 7 avril, (V. Chauchet) . Six données totalisant 9 individus.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (5/4- 1/1)

La sous-espèce nominale niche de l'Europe de l'ouest, de 65° de latitude Nord jusqu'au nord de l'Italie et dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu'en en Sibérie occidentale.

Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d'une ligne Sillé le Guillaume- La Ferté-Bernard.

S .c. curruca niche de l'Europe de l'ouest jusqu'au nord de l'Italie et de la Slovénie jusqu'en Grèce et Turquie, dans le Grand Caucase et la moyenne vallée de la Volga, en Sibérie jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.

Mayenne- Javron, m. ad., 8 août, (F. Noël)

Une nouvelle donnée mayennaise, dans un secteur proche des sites historiques de nidification connus en Corniche de Pail et au Mont des Avaloirs.

Pour mémoire, en Sarthe : quatre données, avec 16 observations à La Ferté-Bernard, sur 3 sites : Le Grand Parc, 2 puis 3 ind., 12 mai ; 1 ind. entre 29 août et 10 septembre ; Les jardins potagers, 1 ind., 29 août ; Le Veau d'Argent, 1 ind., 31 août. Egalement, une donnée à Dehault, 1 ind., 4 juillet, (collectif www.faune-maine.org.).

TICHODROME ECHELETTE *Tichodroma muraria* (2/2-1/1)

Nicheur rare localisé dans les montagnes du sud de l'Europe, du nord de l'Espagne à la Bulgarie, dans le Caucase , ainsi que dans le nord et l'ouest de l'Iran. Une petite partie de la population erratique en hiver.

Sarthe- Le Mans, phot., 29 décembre 2012 au 4 avril 2013, (J-M. Cartignies, C. Kerihuel *et al*.)

Nouvelle donnée remarquable d'un individu de cette espèce en hivernage, toujours fidèle à son site d'accueil, dans le Vieux Mans, après les données de 2009, 2011 et 2012.

Tichodrome échelette, Le Mans (Sarthe), 28 mars, (C. Kerihuel).

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (6/13- 0/0)

C.f. familiaris niche en Scandinavie, Europe de l'est, jusqu'à la Bulgarie et Russie centrale.

C.f. macrodactyla niche de l'Europe de l'ouest à l'Europe centrale.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.
Pour mémoire- Sarthe- 17 données en forêt de Bercé et Perseigne. Jusqu'à quatre ind. notés en forêt de Bercé le 11 janvier (F. Vaidie)

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (2/2-4/10)
La sous-espèce nominale niche à travers l'Europe, de la péninsule ibérique à la Russie. En France, niche en Alsace, Lorraine et Languedoc-Roussillon. Migrateur et hivernant rare ailleurs.
Sarthe- La Ferté-Bernard, phot., 2 avril, (F. Jallu & J-F. Blanc) ; 2 ind., phot., 11 avril, (F. Jallu) ; 3 octobre, 2 ind., phot., (F. Jallu) ; Cherré, 6 ind., phot., 7 avril, phot., (F. Jallu) .
Quatre nouvelles données sarthoises, totalisant au moins dix oiseaux, pour cette espèce migratrice de passage rare, à chercher dans les massifs de roselières avec massettes notamment.

À gauche: Rémiz penduline, mâle adulte, La Ferté- Bernard, (Sarthe), 2 avril, (F. Jallu)

À droite : Rémiz penduline, mâle adulte, La Ferté- Bernard, (Sarthe), 3 octobre, (F. Jallu)

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* (13/13- 2/2)
Niche de la France et des Carpathes jusqu'en Europe du Nord et à la Sibérie centrale, jusqu'au fleuve Ienisseï. Hivernante et migratrice partielle peu commune.
Mayenne- Saint- Pierre-sur-Orthe, 1ère année, phot., 28 mars au 6 avril, (F. Noël).
2011- Mayenne- Jublains, 1ère année, phot., 30 octobre au 12 novembre, (A. Garry, S. Guérin *et al*.)
Une nouvelle donnée mayennaise pour cette espèce, toujours observée à l'unité, certainement sous-prospectée en automne et hiver dans le Maine, à des dates conformes à la phénologie connue. Également, une autre donnée mayennaise de 2011.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea* (18/146- 7/14)
C. f . flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. C. f. cabaret niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.
2011- Mayenne- Saint-Martin-de-Connée, 17 janvier au 6 février, (F. Noël) ; Saint-Pierre-sur-Orthe, au moins 1 ind., 24 mars, (F. Noël).
Sarthe- Roullée, phot., 5 mars, (F. Morazé) ; Yvré-l'Evêque, phot., 12 au 15 mars,(R. Pellion & L. Rioche) ; Parigné-l'Evêque/étang de Loudon, au moins 10 ind., 17 novembre, (R.

Bourigault) ; Parigné-l'Evêque/tourbière, au moins 6 ind., phot., 21 novembre, (R. Bourigault) ; phot., 23 novembre, (A. Beautru).
2011- Sarthe- Mont-Saint-Jean, 2 ind., 17 novembre, (F. Noël).
Quatre nouvelles données sarthoises totalisant au moins 14 oiseaux de cette espèce qui passe assez souvent inaperçue au sein de groupes d'autres fringilles, et notamment les Tarins des aulnes ou les Linottes mélodieuses. Les dates sont conformes à la phénologie de l' espèce . Également deux autres données mayennaises et une autre sarthoise de 2011.

À gauche : Sizerin flammé cabaret, Yvré-l'Evêque, (Sarthe), 12 mars, (L. Rioche)

À droite : Bouvreuil trompettant, Parigné-l'Evêque, (Sarthe), 18 février, (R. Pellion)

BOUVREUIL TROMPETTANT ou Bouvreuil des Komis *Pyrrhula p. pyrrhula* (0/0-1/3)
Sarthe- Parigné-l'Evêque, 1m. et 2 fem., les 18 et 20 février, phot., (R. Pellion et M. Oudard); puis 1 m. et 1 fem., 22 février, phot., (R. Pellion, A. Beautru) ; puis 2 fem., 28 février et 1er mars, phot., (R. Pellion).
Il s'agit de la cinquième donnée pour la Sarthe, pour ces migrateurs dont l'origine n'est pas connue avec certitude. Elle pourrait se situer dans le nord-ouest de la Russie. Rappelons qu'au cours de l'hiver 2004-2005, un important afflux de ces oiseaux au cri si particulier, proche de celui du Roselin githagine *Bucanethes githagineus* et appelés Bouvreuils trompetteurs, a eu lieu dans le nord et l'ouest de l'Europe.

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES : NEANT

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*
Sarthe- Luché-Pringé, fem., phot., 2 janvier
La photo montre plutôt un hybride Fuligule morillon X Fuligule milouinan, ou une femelle atypique de Fuligule morillon. Une femelle de Fuligule milouinan n'a pas cette structure, elle a de plus une tête bien arrondie, le manteau et le dos vermiculés de gris, un onglet noir restreint, ainsi qu'une zone blanche étendue à la base du bec, que peuvent cependant avoir certaines femelles F. morillon .

CIRCAETE JEAN LE BLANC Circaetus gallicus
2011- Sarthe- Thoiré-sur-Dinan, 14 mai.

La description très sommaire ne permet pas de trancher en faveur de cette espèce. De plus, la rédaction d'une fiche avec compléments demandée à un autre observateur est restée sans réponse. En l'absence d'éléments nouveaux, le CH Maine ne peut donc pas accepter cette fiche, même s'il reste plutôt persuadé que l'auteur a bien observé cet oiseau.

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*
Sarthe- Le Mans/Les Sablons, 23 février.
En l'absence de description, le CH Maine ne peut pas accepter cette fiche, même s'il pense qu'il peut s'agir de cette espèce.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*
Mayenne- Andouillé, 3 ind., 23 octobre.
Une description trop sommaire ne permet pas au CH Maine de trancher en faveur de cette espèce, même s'il pense que l'observateur a pu la contacter. Il est utile de rappeler également qu'on ne peut écarter l'Ibis de la Puna, déjà observé en Mayenne, à Bourgon, et déterminé initialement comme Ibis falcinelle, même si l'observation de trois individus ensemble paraît tout à fait improbable.

<u>OBSERVATIONS D' OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE CHN EN 2012.</u>

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (1/1)
Niche dans le centre de l'Amérique du Nord. Espèce occasionnelle qui fréquente les côtes, les rivières et les lacs intérieurs.
Sarthe- La Flèche/Les Pouliers, phot., 20 et 21 avril, (O.Vannucci, F. Vaidie, A. Rougeron).
Première mention sarthoise remarquable de cette espèce occasionnelle qui fréquente les côtes, les rivières et parfois les lacs intérieurs. Malheureusement, sa courte apparition n'a profité qu'à quelques observateurs.

Mouette de Franklin, La Flèche/Les Pouliers (Sarthe), 20 avril, (O. Vannucci).

Rapport 2012 du CH Maine

Suppression de la donnée mayennaise de Gorgebleue, car figurant au rapport 2011.

Lire : ELANION BLANC *Elanus caeruleus* **(4/6)** ; paragraphe replacé **après « Circaëte Jean le Blanc ».**

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (1/1-**2/4**).

TICHODROME ECHELETTE *Tichodroma muraria* : « Nouvelle donnée…après les données de **2009 et 2011** »

REMERCIEMENTS

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2013 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne- Nature- Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, le CPIE, SNE, et le CPNS,
- la liste de diffusion Obsmaine, le site Biolovision et sa base de données en ligne Visionature Faune-Maine, qui a engrangé 95845 données d'oiseaux, au cours de l'année 2013, sur les 2 départements Mayenne et Sarthe.
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 *in Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- BOUTON F.-M., 2013 - Première approche de la population nicheuse de Grimpereaux des bois (*Certhia f. macrodactyla*) en forêt de Perseigne (Sarthe). Le Tarier pâtre, 13 : 1-6
- CLEVA D., DUCHENNE B. & TAVENON. D., 2014- Elanion blanc *Elanus caeruleus*, *in* Marchadour B. (coord.). Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux & Niestlé, Paris.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007- Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4*)* : p.234-246.
- Commission de l'Avifaune Française, 2011- Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental . Ornithos 18-3, n° 89, mai-juin 2011.
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008- Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- CROCHET *et al*., 2013- Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2010-2012), *13 ème rapport de la CAF , Ornithos 20-3 : p.164-173 (2013)*
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008- Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- DUBOIS P-J., DUQUET M., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P.,2014- *Notes d'Ornithologie Française*, deuxième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France, *Ornithos 21-4 : p. 169-213 (2014)*
- DUCHENNE B. & F., 2014- Synthèse des observations d'espèces occasionnelles en Mayenne, *in Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30.
- DUCHENNE B., GARRY A., LEFLOCH A. & TAVENON D., 2014- Découverte tardive d'une reproduction d'Élanion blanc *Elanus caeruleus* en Mayenne, *in Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30.

- Groupe Sarthois Ornithologique, 1991- Les oiseaux nicheurs de la Sarthe, enquête 1985-1989. GSO. Le Mans. 169 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2000- La migration des oiseaux en Sarthe, observations 1975-2000. GSO. Le Mans. 204 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009- Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. *Sitta cénomane*- suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2014- Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 44.
Groupe Sarthois Ornithologique, 2013- 2ème atlas des oiseaux nicheurs de la Sarthe-Enquête 2005-2010/12, Tome 1.
- ISSA N. et le CHR Centre, 2009- Les oiseaux rares en région Centre en 2008.
-KAYSER Y., PAEPEGAEY B. & le CHN, 2013- Les oiseaux rares en France en 2012. 30ème rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 21-2, mars-avril 2014., nov.- décembre 2012.
- LAPOUS E. & DARRAS J-F., 1994 à 2005- Synthèse des observations ornithologiques du sud-ouest de la Sarthe. Revue *Désirs d'Ailes* n° 1 à 13.
- LEGENDRE F., OLIOSO G. & le CMR, 2012- Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France, 7ème rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2008), *Ornithos* 19-2, mars-avril 2012.
- LPO Sarthe, 2000 à 2013- *Le Tarier pâtre.* Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 13.
- MARCHADOUR B.(coord.), 2014. *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire.* Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014, 576 p.
- Mayenne- Nature- Environnement, 1991- Les Oiseaux de la Mayenne. Atlas des oiseaux nicheurs de la Mayenne 1984-1988. Editions Rives Reines, 207 p.
- Mayenne- Nature- Environnement, 1982 à 2013- Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne *in Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 1 à 30 .
- REEBER S. et le CHN, 2012- Les oiseaux rares en France en 2011. 29ème rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 19-6, nov.- décembre 2012.
- ZUCCA M. & le CMR, 2010- les observations d'oiseaux migrateurs rares en France, 6ème rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2007), *Ornithos* 17-1, janv.- février 2010.