



LES OISEAUX RARES EN 2015 DANS LE MAINE (MAYENNE et SARTHE)

-
8^{ème} rapport du Comité d'Homologation du Maine



© Christian Kerihuel 2015

Harle huppé, Lac des Sablons, Le Mans (Sarthe), 23 mars (C. Kerihuel)

EN HOMMAGE A JEROME LACAMPAGNE

Ce rapport est dédié à Jérôme Lacampagne qui nous a malheureusement quitté au mois d'août 2016. Jérôme était un grand passionné d'ornithologie, il avait contribué à la création de la Ligue de protection des oiseaux en Sarthe en 2003, ainsi qu'au comité d'homologation du Maine en 2008. Ardent défenseur de la biodiversité, Jérôme Lacampagne a œuvré activement à de nombreuses actions de sensibilisation du grand public sur l'environnement.

8^{ème} rapport du Comité d'Homologation du Maine, année 2015

DAVID MADIOT, BRUNO DUCHENNE et le CH Maine

Regroupant les 2 départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de 4 associations locales : Mayenne-Nature-Environnement (MNE), le Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), la LPO Sarthe et le Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et dont l'espèce ne fait pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale.

Ce huitième rapport du CH Maine couvre l'année 2015, 8^{ème} année de son fonctionnement. Les membres du Comité ont été invités à examiner 41 fiches concernant des données d'espèces homologables à compter du 1er janvier 2015, y compris quelques fiches en retard de 2013 et 2014 ; ils ont procédé à l'examen de 71 données candidates à la validation directe sur photos via l'interface Faune Maine. Le taux de validation atteint 90%.

La classification suit la « Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental » établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française, Ornithos 18-3, n° 89, mai-juin 2011). Pour les espèces ayant été observées en France, figure la catégorie de la liste des Oiseaux de France dans laquelle elles ont été inscrites.

En 2015, le CH Maine était composé des 5 membres suivants : Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), David Madiot, Jean-Luc Reuzé, Dominique Tavenon (secrétaire), et Olivier Vannucci.

Christian Kerihuel et Dominique Tavenon étaient les 2 membres sortants début 2016. Tous les deux étant parvenus au terme de leur deuxième mandat consécutif, ne pouvaient pas se représenter ; ils doivent attendre deux années avant de pouvoir le faire à nouveau, s'ils le souhaitent.

Nous remercions tous vivement Dominique et Christian pour leur travail sérieux et leur grande compétence qu'ils ont mis au service du CH Maine. Après 8 années passées en tant que secrétaire du CH Maine, nous exprimons notre profonde gratitude à Dominique pour le temps et l'énergie consacrés au bon fonctionnement du comité. Christian est aussi vivement remercié pour les nombreuses photos de grande qualité qu'il a fournies pour l'illustration des rapports du comité notamment.

Pour les remplacer, trois candidatures ont été déposées, celles de Benoît Duchenne, Bruno Duchenne et Frédéric Vaidie. Tous intègrent le CH Maine début 2016, à l'unanimité des membres du comité.

Le CH Maine fonctionne donc de nouveau avec 6 membres en 2016.

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont disponibles sur le site Faune Maine.

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :

Bruno Duchenne / Secrétaire adjoint du CH Maine, 58 rue du Villaret, 72000 LE MANS

Adresse mail: duchenne.bruno@orange.fr

QUELQUES FAITS MARQUANTS

On relève très peu d'observations notables au cours de cette année 2015.

Retenons néanmoins la première donnée d'Elanion blanc en Sarthe avec 1 oiseau observé et photographié le 29 octobre à Marollette. L'espèce a été signalée un mois plus tôt sur la commune de Conlie, mais la donnée n'a à ce jour toujours pas fait l'objet d'une fiche d'homologation.

On notera également la deuxième mention mayennaise du Pipit rousseline, ainsi que la 1^{ère} observation du Plongeon catmarin en Mayenne depuis la création du CH Maine. Cette dernière espèce n'avait plus été notée dans le département depuis 2004.

Enfin, la Sarthe enregistre sa deuxième donnée d'Aigle botté, avec 1 ind. contacté le 05 août à Neuvy-en-Champagne.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifiques.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2015 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour 2015.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
- 8- Date(s) d'observation(s).
- 9- Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental (CAF 2011).
- 11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
- 12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (15/19 - 1/1)

France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu'en Asie centrale. Hiverné autour du bassin méditerranéen.

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne, et hors Sarthe.

Mayenne – Maisoncelles du Maine, 1 fem. ad., 14 novembre, photo, (B. et F. Duchenne).

Pour mémoire – Sarthe – 16 données sur Spay, Fillé-sur-Sarthe et Saint-Jean-du-Bois, (collectif www.faune-maine.org) avec un maximum de 3 inds. le 2 avril.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (26/19 - 0/0)

Balkans et Europe centrale jusqu'en Asie centrale.

Espèce homologable hors étangs des Coëvrons en Mayenne, et hors étangs au sud d'une ligne Saint-Denis d'Orques - la Ferté Bernard.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire – Sarthe – 18 données sur Fercé-sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe et Parigné l'Evêque (collectif www.faune-maine.org).

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (3/4 - 0/0)

Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu'au fleuve Léna, à l'est.

Espèce homologable uniquement en Sarthe.

Aucune donnée hors de la Mayenne.

Pour mémoire – Mayenne – 10 données, toutes recueillies à Aron/étangs de Beaucoudray et de la Forge, entre le 5 février et le 3 mars, avec 3 inds (1 mâle et 2 fem.) le 3 mars (collectif www.faune-maine.org).

HARLE PIETTE *Mergus albellus* (17/31 - 2/1)

Espèce monotypique qui niche de la Suède à la Sibérie orientale ; hivernant peu commun qui fréquente essentiellement lacs, plans d'eau, rivières et fleuves.

Mayenne – Le-Genest-Saint-Isle/étang d'Olivet, fem. ad., présente du 19 novembre 2014 au 6 février 2015, phot., (A. Garry, F. et B. Duchenne *et al*) ; Ahuillé/étang de la Chaussée, fem. ad., 13 au 24 mars, (A. Giret, J.F. Arcanger).

A noter que l'oiseau observé à Olivet (signalé dans le rapport 2014 jusqu'au 24 décembre) est probablement le même que celui noté sur l'étang de la Chaussée. Espèce contactée dans le Maine au cours des quatre dernières années.

HARLE HUPPE *Mergus serrator* (4/10 - 1/1)

Niche en Europe, principalement au nord de 55° N et tout autour de l'hémisphère nord. Migrateur et hivernant peu commun.

Sarthe – Le Mans (lac des Sablons), 1 ind., 20 au 25 mars, photo, (C. Kerihuel *et al*).

Une nouvelle donnée en Sarthe, pour cette espèce assez rare à l'intérieur des terres. A noter que le lac des Sablons a accueilli les 3 harles ces dernières années : piette en 2012, bièvre en 2014, et donc huppé en 2015.



Harle huppé, lac des Sablons, Le Mans (Sarthe), 20 mars (C. Kerihuel)

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (6/8 - 5/4)

Niche en Amérique du Nord. Introduite en Grande-Bretagne au début des années 1960, elle se trouve en petit nombre autour de la mer du Nord et, au sud, jusqu'en Espagne et au Maroc.

Espèce homologable hors de la Mayenne et des étangs de Saint-Denis-d'Orques (Sarthe).

Sarthe – Saosnes (Etang de Gué Chaussée), 1 mâle ad., 14 juin, (J. Lacampagne) ;

Saosnes (Etang de Gué Chaussée), 1 type fem., 15 septembre, phot., (S. Cavallès) ;

Luché-Pringé (Le Bourg Nouveau), 1 fem., 2 novembre, phot., (R. Bourigault) ;

La Flèche (Les Poulriers), 1 fem., 11 au 22 novembre, phot., (C. et B. Basoge *et al*) ;

Fillé-sur-Sarthe (Champfleury), 1 mâle ad., 23 juillet au 17 septembre, phot. (J.Y. Renvoisé et ONCFS).

Cinq données sarthoises concernant 4 oiseaux différents, l'individu de la Flèche étant le même que celui de Luché-Pringé, pour cette espèce qui devient plus régulière à l'intérieur du département.

Pour mémoire, 65 observations en Mayenne en 2015. Espèce principalement observée sur les étangs des Coëvrons, ainsi que sur les étangs de Curécý (Bouère), et des Roseraies (Chemazé). Les données peuvent être consultées sur la base en ligne Faune-Maine (collectif www.faune-maine.org).

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (2/2 - 1/1)

Région circumarctique.

Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières, 1 1^{ère} année, phot., 16 au 19 décembre, (D. Madiot, D. Quinton, A. Garry *et al.*).

Donnée Mayennaise, à une plage de dates classique pour l'espèce. A noter qu'il s'agit de la 4^{ème} observation de l'espèce sur le lac de Haute Mayenne depuis 1985.



Plongeon catmarin,
Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne),
18 décembre
(D. Quinton)

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (6/6 - 1/1)

Niche de la Scandinavie à la Russie ; quelques couples en Ecosse. Hivernent le long des côtes françaises de l'Atlantique, en mers du nord, Baltique, Adriatique et Mer noire, à l'est.

Mayenne – Mézangers/Etang du Gué de Selle, 2 inds., phot., 30 mars, (G. Deslais).

Une nouvelle donnée, pour cet hivernant littoral plutôt rare à l'intérieur des terres.

Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (7/12 - 1/4)

Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.

Espèce homologable en dehors des sites de nidification connus en Sarthe.

Sarthe – La Flèche, de 1 à 4 inds., 2 m., 1 fem. et 1 juv., du 23 mai au 22 juillet, phot., (O. Vannucci, C. et B. Basoge, C. Kerihuel, et al., collectif www.faune-maine.org).



Blongios nain,
La Flèche (Sarthe),
31 mai
(C. Kerihuel)

© Christian Kerihuel 2015

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax* (14/14 - 6/6)

Zones tempérées du Paléarctique. Distribution irrégulière dans les zones humides européennes au sud de 53° N.

Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne.

Mayenne – Saint Brice (Etang de Curécy), 1 2^{ème} année, 3 au 10 janvier, (A. Darras)

Saint Brice (Etang de Curécy), 1 1^{ère} année, 10 septembre, (A. Garry)

Sarthe – Souigné Flacé, 1 2^{ème} année, 7 février, phot., (T. Verdon)

La Flèche, 1 1^{ère} année, 17 juillet, phot. (Br. Duchenne)

Parigné l'Evêque, 1 1^{ère} année, 2 août, phot., (C. Kerihuel).

Pour mémoire, 1 1^{ère} année à Aron (Mayenne) le 7 septembre (G. Claes).



Héron bihoreau, La Flèche, (Sarthe), 17 juillet (Br. Duchenne)

IBIS SACRE *Threskiornis aethiopicus* (3/7 - 1/1)

Espèce polytypique qui niche en Afrique subtropicale, en Irak(?), d'autres sous-espèces à Madagascar et Aldabra. Nicheur peu commun, introduit.

Sarthe – La Flèche (Les Poulriers), 1 ind., 26 mars, phot., (O. Vannucci).

ELANION BLANC *Elanus caeruleus* (4/6 - 1/1)

Espèce polytypique. La sous-espèce nominale niche dans le sud-ouest de l'Europe, en Afrique (hors zones sahariennes), en Inde et dans le sud-est asiatique.

Sarthe – Marollette, 1 ind., 29 octobre, phot., (E. Ville).

Première donnée pour le département de la Sarthe.

Aucune donnée Mayennaise en 2015.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (4/4 - 1/1)

Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu'aux régions boréales et à la toundra. Espèce liée à la proximité des milieux aquatiques.

Sarthe – La Flèche, 1 adulte, 15 novembre, (C. et B. Basoge).

Quatrième donnée Sarthoise.

AIGLE BOTTE *Aquila pennata* (2/2 - 2/2)

Europe, Afrique du Nord, jusqu'en Asie centrale. La population européenne niche en France, Espagne, et des pays d'Europe centrale à la Grèce. Elle hiverne en Afrique subsaharienne. Deux formes dites « claire » et « sombre » sont distinguées selon leur plumage.

Mayenne – Villiers Charlemagne, 1 ind., 18 septembre, (L. Rousselet).

Sarthe – Neuvy en Champagne, 1 ind., 5 aout, (J. Lacampagne).

8^{ème} donnée Mayennaise, et 2^{ème} donnée Sarthoise pour cette espèce (collectif www.faune-maine.org).

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana* (7/7 - 1/1)

Niche de l'Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes. Hiverne en Afrique subsaharienne.

Sarthe – La Ferté-Bernard, 1 ind., 10 juin, phot., (O. Vannucci, et étudiants en BTS GPN de la MFR des Forges).

Huitième donnée en Sarthe pour cette espèce discrète et rare, le plus souvent contactée au passage postnuptial.



Marouette Ponctué, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 10 juin, (Etudiants en BTS GPN de la MFR des Forges).

HUITRIER-PIE *Haemantopus ostralegus* (1/1 - 1/1)

Europe et ouest Russie jusqu'à l'Altai.

Sarthe – Guécelard/Bufte, 1 ad., 2 août, phot., (J.J Démotier, S. Faubert).

Une donnée pour cette espèce migratrice qui semble avoir estivé (origine sauvage de l'oiseau douteuse, porteur d'une unique bague couleur ne correspondant pas à un programme européen référencé). La dernière donnée remonte au 27/03/2008 à La Ferté Bernard (Ajeux - F. Jallu). Ce dernier site demeure d'ailleurs le plus fréquenté par l'espèce en Sarthe, avec 4 données au moins depuis 1998 (comm. pers. H. Julliot).



Huitrier-pie, Guécelard (Sarthe), 2 août, (J.J. Démotier).

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (2/9 - 0/0)

Niche de l'Ecosse et des Pyrénées espagnoles jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et en Sibérie orientale. Hiverné du Maghreb à l'Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et en petit nombre entre l'Andalousie et Chypre.

Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud Sarthe.

Aucune donnée collectée en zone homologable.

1 seule donnée provenant des plaines du nord Sarthe.

Sarthe – Vezot, 4 juvéniles, 15 septembre, phot., (S. Cavallès).



Pluvier guignard, Vezot, (Sarthe), 15 septembre, (S. Cavallès).

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (10/20 - 9/12)

Niche au N-E du Canada, en Alaska, et sur le littoral arctique hors Islande, mais jusqu'au sud de la Baltique. Hivernant rare à l'intérieur des terres.

Mayenne – Maisonnelles-du-Maine/Le Mesnil, 6 inds. , 1 mai, phot., (F. Duchenne) ;

Launay-Villiers/Etang du Bas, 4 inds. , 1 mai, phot. , (F. Duchenne) ;

Aron/Etang de Beaucourday, 1 ind. de 1^{ère} année, 10 septembre, (G. Claes).

Sarthe – La Ferté Bernard/Les Ajeux, 1 ad. , 22 juin, phot., (C. Kerihuel).

Contrairement à 2014, l'espèce est observée cette année aux deux passages migratoires en Mayenne. La donnée Sarthoise concerne la migration prénuptiale.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (40/43 - 12/15)

Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne. Hiverné dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.

Mayenne – Le Genest-Saint-Isle/Etang d'Olivet :

- 4 oiseaux (3 ind. de 2^{ème} année, 1 ad.), 1 janvier, phot., (F. et B. Duchenne) ;

- 7 oiseaux (4 ind. de 2^{ème} année, 2 ind. de 3^{ème} année, 1 ad.), 2 février, phot., (F. Duchenne) ;

- 2 oiseaux (1 ind. de 2^{ème} année, 1 ind. de 3^{ème} année), 4 février, phot., (F. Duchenne) ;

- 3 oiseaux de 2^{ème} année, 1 mars, phot., (F. Duchenne) ;

- 1 ind. de 4^{ème} année, 13 décembre, phot., (F. et B. Duchenne).

Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières/CET et Sablière de Glaintain :

- 4 oiseaux (3 ind. de 2^{ème} année, 1 ind. de 3^{ème} année), 2 janvier, phot., (F. et B. Duchenne) ;

- 3 ind. de 2^{ème} année, 3 février, phot., (F. Duchenne).

- 1 oiseau de 1^{ère} année, 22 décembre, phot., (F. et B. Duchenne).

Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières/Lac de Haute Mayenne :

- 1 oiseau de 1^{ère} année, 22 décembre, phot., (F. et B. Duchenne) ;

Mayenne – Ballots/Etang de la Rincerie :

- 1 oiseau de 4^{ème} année, 16 décembre, phot., (S. Béasse).

Sarthe – Marçon/Lac des Varennes :

- 1 ind. de 3^{ème} année, 4 janvier, phot., (C. Kerihuel, JM. Paumier, Br. Duchenne) ;

- 1 ind. de 2^{ème} année, 10 janvier, phot., (C. Kerihuel, Br. Duchenne) ;

- 1 ind. de 3^{ème} année, 17 janvier, phot., (C. Kerihuel, P. Houalet, Br. Duchenne) ;

- 1 ind. de 2^{ème} année, 31 janvier, phot., (C. Kerihuel, Br. Duchenne).

Une bonne pression d'observation montre l'intérêt porté par l'espèce aux principaux sites d'accueil Mayennais, localisés sur les communes de Saint-Fraimbault-de-Prières et Olivet.

En Sarthe, le site de Marçon (dortoir du Lac des Varennes) est propice à l'observation de l'espèce, bénéficiant de la proximité du centre de traitement des déchets de Sonzay (37).

Rappelons que les fiches d'homologation non accompagnées de documents photographique ou vidéo, concernant cette espèce, ne sont pas examinées.




Goéland pontique, Marçon, (Sarthe), 3^{ème} année, 17 janvier, (C. Kerihuel).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (4/7 - 1/4)

Niche de l'Europe de l'Ouest à la mer Caspienne.

Sarthe – La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 4 ind., 25 juin, phot., (F. Jallu).

Une seule donnée cette année sur un des deux sites habituels Sarthois.



© Fabrice Jallu 2015

Sterne Caugek, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 15 juin, (F. Jallu).

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (5/11 - 2/2)

Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverné en Afrique subsaharienne.

Migrateur peu commun sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée, rare à l'intérieur des terres.

Mayenne – Bourgon/ Lac de Haute Vilaine-Limite 35, 1 ad., 15 août, phot., (F. Duchenne).

Sarthe – Beillé/Les Mézières, 1 ad. , 30 mars, (R. Bourigault).

Huitième donnée mayennaise, de cette espèce qui semble particulièrement apprécier deux sites de l'ouest mayennais : le lac de Haute-Vilaine à Bourgon, et l'étang de La Rincerie à La Selle-Craonnaise.

Deuxième donnée Sarthoise, la première datant du 15/09/2011, La Ferté-Bernard (F. Jallu).



Sterne Caspienne, Bourgon, (Mayenne), 15 août, (F. Duchenne).

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea* (6/8 - 1/1)

Niche en Grande-Bretagne, en Europe du Nord, et en Asie, au nord du cercle polaire. Aussi au Groenland, en Alaska, et jusqu'en Colombie Britannique et dans l'Etat de New-York.

Sarthe – La Flèche/La Mergeoire, 1 1ère année, 14 septembre, (O. Vannucci).

2^{ème} donnée Sarthoise (1^{ère} donnée obtenue le 02 juin 2011, JF. Blanc).

Espèce d'apparition rare à l'intérieur des terres et surtout détectée au passage postnuptial dans l'ouest de la France. Plus fréquemment contactée en Mayenne (dernière donnée le 05/11/2011, D. Madiot) qu'en Sarthe.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (24/67 - 11/7)

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.

Mayenne – La Chapelle-Craonnaise, 2 ind., 28 janvier, (JF. Arcanger) ;

La Chapelle-Rainsouin, 1 ind., 06 au 08 novembre, (N. Boileau, A. Garry).

Sarthe – Parcé-sur-Sarthe, 1 à 2 ind., 27 février au 03 mars, (A. et JF. Darras) ;

Chantenay-Villedieu, 06 mai, (J. Melocco, AL. Chesnier).

Saint-Calais, 1 ind., 19 décembre, (R. Bourigault).

Onze données dans le Maine, concernant au moins sept individus différents.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster* (7/45 - 49/37)

Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun, localisé et migrateur rare.

Mayenne – Cossé-en-champagne, 3 ind., 09 juin, (G. Paineau).

Sarthe – Montmirail, 8 ads et 5 juvs, espèce observée sur le site du 1^{er} juin au 19 août, (F. Jallu) ;

Marçon, 3 ads le 09 mai, (R. Bourigault) ; puis 4 ad. et 1 juv. le 25 juillet, (Br. Duchenne) ;

Avezé, 16 ind. du 3 au 6 août, (J. Aureau, JY. Renvoisé).



© Fabrice Jallu 2015

Guêpier d'Europe, Montmirail (Sarthe), 1 août, (F. Jallu).

PIC CENDRE *Picus canus* (2/2 - 0/0)

Niche de la Bretagne jusqu'à l'Altaï, et jusqu'à 65° N.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.

Aucune donnée soumise au CHM.

Pour mémoire, Sarthe – forêts de Bercé/Perseigne : 4 données concernant 5 oiseaux.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata* (4/6 - 0/0)

Niche de l'Europe centrale jusqu'au nord-ouest de l'Espagne et au nord-est de l'Italie.

Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, et du plateau calaisien.

Aucune donnée soumise au CHM.

Pour mémoire, Sarthe – 25 données recueillies sur les secteurs où l'espèce n'est pas homologable, dont une se rapportant à l'observation de 5 ind. à Saint-Vincent-du-Lorouer, le 15 août, (R. Bourigault).

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* (3/4 - 1/1)

Nicheur dans le sud de l'Europe. Hiverné en Afrique.

Mayenne – Bazougers, 1 ind. le 11 septembre, (A. Garry).

2011 – Mayenne - Hardanges, 2 ind. le 01 septembre, (F. Noel).

Une première départementale qui n'avait malencontreusement pas été consignée dans les rapports précédents. On notera la similitude entre les dates avec cette deuxième donnée Mayennaise.

Cette espèce demeure extrêmement rare en halte migratoire dans le Maine, des oiseaux en migration active peuvent toutefois être détectés occasionnellement.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (6/12 - 0/0)

L. s. svecica : de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidentale; *L. s. namnetum*: régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. Hiverné en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient.

Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.

Aucune donnée hors secteur pour la période.

Pour mémoire, Sarthe – La Ferté-Bernard/Les Ajeux, cinq observations entre le 19 mars et le 04 avril, concernant 1 à 4 oiseaux le 23 mars (F. Jallu).

A noter que ces données Sarthoises concernent presque exclusivement le passage pré-nuptial, avec des observations concentrées le plus souvent sur la deuxième quinzaine de mars.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (5/7 - 0/0)

Niche du nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et à l'Oural.

Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard et du nord-Sarthe.

Aucune donnée hors secteur pour la période.

Pour mémoire, Sarthe – La Ferté-Bernard, 6 observations du 25 mai au 22 juin avec un maximum de 4 ind. le 13 juin (F. Jallu) ; Roullée, 1 ind. le 13 juin (F. Morazé).

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (1/1 - 0/0)

S. u. undata niche en Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, y compris le sud de la France.

S. u. dartfordiensis niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l'Angleterre.

Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné...), la forêt de Bercé, et le nord-est de la Mayenne.

Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.

Pour mémoire, Sarthe – espèce contactée sur les communes de Marigné-Lailly, Champagné, Parigné-l'Évêque, Pontvallain, Yvré-le-Pôlin, Le Grand-Lucé, Aubigné-Racan, Thorée-les-Pins (R. Bourigault, S. Cavaillès, V. Chauchet, R. Lépinay, F. Vaidie).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (7/6 - 0/0)

La sous-espèce nominale niche de l'Europe de l'ouest, de 65° de latitude Nord jusqu'au nord de l'Italie et dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu'en Sibérie occidentale jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.

Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d'une ligne Sillé-le-Guillaume - La Ferté-Bernard.

Aucune donnée obtenue en dehors de la zone d'exclusion.

Pour mémoire, Sarthe – La Ferté-Bernard, et Roullée, 5 observations se rapportant à 4 ou 5 oiseaux, données obtenues entre le 04 juin et le 10 juillet (F. Jallu, H. Touzé, Y. Brillant, F. Morazé).

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (9/17 - 3/3)

C. f. familiaris niche en Scandinavie, Europe de l'est, jusqu'à la Bulgarie et Russie centrale.

C. f. macrodactyla niche de l'Europe de l'ouest à l'Europe centrale.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.

Mayenne – Averton, 1 ind. le 06 mars, (JF. Arcanger) ; Champfrémont, 1 ind. le 05 mars, (JF. Arcanger) ; Pré-en-Pail, 1 ind. le 10 mars, (A. Garry).

Pour mémoire, Sarthe – des données obtenues du 22 février au 06 juin en Forêts de Perseigne et Bercé (FM. Bouton, J. Lacampagne, H. Touzé).

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (6/10 - 1/1)

La sous-espèce nominale niche à travers l'Europe, de la péninsule ibérique à la Russie. En France, niche en Alsace, Lorraine et Languedoc-Roussillon. Migrateur et hivernant rare ailleurs.

Sarthe – Bazouges-sur-le-Loir, 1 ind., 19 octobre, (J. Pilon).

Une espèce migratrice qui demeure rare, à rechercher dans les massifs de roselières avec massettes notamment.



Rémiz penduline, Bazouges-sur-le-Loir (Sarthe), 19 octobre, (J. Pilon).

SIZERIN INDETERMINÉ *Acanthis* sp. (0/0 - 2/2)

A. flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. *A. cabaret* niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes. Sarthe – Sillé-le-Guillaume, 1 ind. mâle, 18 mars, (G. Paineau) ; Thorée-les-Pins, 1 ind., 22 décembre, (R. Bourigault).

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (1/5 - 0/0)

Niche dans de nombreux pays d'Eurasie, du sud de la Scandinavie au sud de l'Espagne et en Turquie, Iran, Afghanistan, à l'est jusqu'en Russie et en Mongolie. Migre à l'automne au Proche-Orient (Iran et Arabie notamment) et en Afrique.

2013 – Mayenne - Argentré, 5 ind., 05 septembre, (F. Noel).

Une première donnée départementale non mentionnée dans le précédent rapport, concernant un groupe de 5 oiseaux contactés au cours d'un suivi de la migration en zone bocagère ouverte.

Mention exceptionnelle pour cette espèce qui n'avait, depuis la création du CH Maine, jamais été contactée, et dont la détection en dehors des sites de suivi de la migration les plus emblématiques de l'hexagone relève de l'exploit.

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES :**COUCOU GRIS *Cuculus canorus***

Mayenne – Une donnée tardive obtenue le 10 octobre au Souprat, à Pré-en-Pail (L. Rousselet).

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES :**CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus***

Sarthe – Bonnétable, 1 ind., 9 mai. Critères diagnostics insuffisants, la Bondrée apivore ne peut être totalement exclue, description trop succincte.

FAUCON KOBZ *Falco vespertinus*

Mayenne – Villiers-Charlemagne, 1 ind. 21 septembre. Description trop imprécise, un Faucon hobereau de 1^{ère} année ne peut être exclu. Donnée convertie sur Faune Maine, classée en Faucon indéterminé.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*

Mayenne – Aron, étang de Beaucourday, 1 ind., 14 septembre. La description et le comportement, peu concordants avec les caractéristiques de l'espèce proposée, mettent le doute sur la détermination précise de l'oiseau.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

Mayenne – Aron, étang de Beaucourday, 3 ind., 4 mars. La description et les critères diagnostics sont insuffisants.

Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières, 3 ind., 30 janvier. Oiseaux de 1^{ère} année, différents, observés sur le CET et les sablières de Glaintain. Photos prises ne correspondant pas aux oiseaux proposés, absence de description.

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*

Mayenne – Pré-en-Pail, 1 ind., 25 novembre. Description insuffisante qui ne permet pas d'exclure un ind. leucique ou au plumage aberrant d'une autre espèce (fringille notamment), comportement décrit éloigné du comportement habituel de l'espèce proposée.

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES NON HOMOLOGUEES :

BUSARD CENDRE *Circus pygargus*

Mayenne – Fontaine-Couverte, 1 juv., 27 septembre. Description incomplète et trop imprécise. De plus, compte tenu de la date, le Busard pâle ne peut être exclu. Donnée convertie, classée en Busard indéterminé.

OBSERVATIONS D'OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE CHN EN 2015 :

NEANT.

OBSERVATIONS D'OISEAUX OCCASIONNELS EN ATTENTE D'ACCEPTATION PAR LE CHN EN 2015 :

PELICAN GRIS *Pelecanus rufescens*

Sarthe – Spay, 1 ind., 1^{er} au 20 décembre, phot., (FM. Bouton et al).
Oiseau retrouvé mort le 13 avril 2016 à Spay (comm. pers. H. Julliot).

REMERCIEMENTS

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2015 :

- Claire Chatagnon (MNE), pour le travail important de compilation et l'envoi groupé de données à homologuer sur photos aux membres du CH Maine ;
- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne Nature Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, les CPIE du Bas Maine (53) et Vallées de la Sarthe et du Loir (72), SNE, et le CEN Pays de la Loire ;
- la liste de diffusion Obsmaine, le site Biolovision et sa base de données en ligne Faune-Maine, qui a engrangé 89 766 données d'oiseaux, au cours de l'année 2015, sur les 2 départements (Mayenne et Sarthe).
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., MADIOT D. & TAVENON D., 2015- Statut des Oiseaux de la Mayenne, nouvelle mise à jour, décembre 2015, à paraître, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences.
- BOUTON F.-M., 2013 - Première approche de la population nicheuse de Grimpereaux des bois (*Certhia f. macrodactyla*) en forêt de Perseigne (Sarthe). Le Tariet pâtre, 13 : 1-6.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007 - Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4) : p.234-246.
- Commission de l'Avifaune Française, 2011- Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental. *Ornithos* 18-3, n° 89, mai-juin 2011.
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008 - Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- CROCHET et al., 2013 - Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2010-2012), 13^{ème} rapport de la CAF, *Ornithos* 20-3 : p.164-173 (2013).
- DUBOIS P.-J., LE MARECHAL P., OLIOSSO G. & YESOU P., 2008 - Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.

- DUBOIS P.-J., DUQUET M., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2014 - *Notes d'Ornithologie Française*, deuxième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France, *Ornithos* 21-4 : p. 169-213 (2014).
- DUCHENNE B. & F., 2014 - Synthèse des observations d'espèces occasionnelles en Mayenne, in *Biotopes* 53 & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1991 - Les oiseaux nicheurs de la Sarthe, enquête 1985-1989. GSO. Le Mans. 169 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2000 - La migration des oiseaux en Sarthe, observations 1975-2000. GSO. Le Mans. 204 p.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009- Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. *Sitta cénomane* - suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2014 - Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 44.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2013- 2^{ème} atlas des oiseaux nicheurs de la Sarthe-Enquête 2005-2010/12, Tome 1.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2014- 2^{ème} atlas des oiseaux nicheurs de la Sarthe-Enquête 2005-2010/12, Tome 2.
- G.S.O., 2015 – 2^{ème} atlas des oiseaux nicheurs de la Sarthe. Tome 3 «des alouettes aux pouillots» – Enquête 2005-2010.
- G.S.O., 2016 – 2^{ème} atlas des oiseaux nicheurs de la Sarthe. Tome 4 «des roitelets aux bruants» – Enquête 2005-2010.
- REEBER S., KAYSER Y. & le CHN, 2016 - Les oiseaux rares en France en 2015. 33^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 23-6 : 300-329 (2016).
- LEGENDRE F., OLIOSO G. & le CMR, 2012- Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France, 7^{ème} rapport du Comité de suivi des Migrateurs Rares (année 2008), *Ornithos* 19-2, mars-avril 2012.
- LPO Sarthe, 2000 à 2014 - *Le Tarier pâtre*. Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 14.
- MARCHADOUR B. (coord.), 2014. *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014, 576 p.
- Mayenne-Nature-Environnement, 1991 - Les Oiseaux de la Mayenne. Atlas des oiseaux nicheurs de la Mayenne 1984-1988. Editions Rives Reines, 207 p.
- Mayenne-Nature-Environnement, 1982 à 2014 - Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne in *Biotopes* 53 & bulletins de Mayenne-Sciences n° 1 à 31.
- Commission de l'Avifaune Française, 14^{ème} rapport de la CAF - Liste officielle des oiseaux de France – version 2016. *Ornithos* 23-5, n° 121, Septembre-Octobre 2016.