

11^e rapport du Comité d'homologation régional

CE RAPPORT PRÉSENTE la synthèse de 3 années d'observations ornithologiques rares pour la région Bourgogne, de 2012 à 2014. Ont été considérées comme rares les espèces observées moins de 5 fois par an, pendant au moins 5 années consécutives. Il s'agit de la dernière production du CHR, dont l'activité a cessé au 31 décembre 2014. Le comité a en effet pris la décision de mettre un terme à son travail, initié 15 ans plus tôt, en raison du manque de renouvellement des membres et de l'impossibilité de pourvoir le poste de secrétaire qu'Antoine Rougeron souhaitait quitter. Cette décision a également été motivée par le développement de la photographie numérique et des bases de données en ligne qui permettent une validation plus simple et plus rapide des observations, rares ou moins rares, transmises par les ornithologues.

Vous pouvez retrouver tous les rapports du comité depuis sa création en 2000 sur son site Internet (<http://chr.bourgogne.free.fr>) ainsi que la liste des espèces homologables. Celle-ci avait été revue au 1^{er} janvier 2014 avec le retrait de l'Ibis sacré et du Grand Corbeau. Ce dernier reste évidemment une espèce rare mais il est facile à identifier. Paradoxalement, le taux de refus des fiches était élevé pour cette espèce, les descriptions fournies étant souvent trop réduites car l'identification était évidente pour les observateurs. La présence de l'espèce dans la liste du CHR était donc contre-productive, d'où ce retrait.

En 2013 et 2014, le CHR était composé de 8 membres : Olivier Bardet, Patrick Dagnas, Jean-Marc Frolet, Hervé Gauche, Philippe Gayet, Simon Rolland, Antoine Rougeron (secrétaire), ainsi que Brigitte Grand qui a remplacé Johann Pitois à partir de décembre 2013.

Le nombre de fiches examinées par le CHR s'établit à 351, dont 24 concernent les années antérieures (tableau 1). Le nombre annuel de fiches traitées est globalement supérieur à la normale. Cela est particulièrement vrai pour 2013, qui a connu un printemps très pluvieux ayant donné lieu à des inondations importantes et prolongées. En conséquence, le nombre d'observations d'oiseaux des zones humides durant cette période a été sans précédent depuis la création du CHR, notamment pour les limicoles et les marouettes.

Tableau 1 : répartition annuelle et départementale des fiches traitées dans ce rapport.

Département	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Côte-d'Or (21)			2	2	40	39	49	132
Nièvre (58)			0	2	11	5	11	29
Saône-et-Loire (71)			1	0	36	76	6	119
Yonne (89)	2	1	5	9	12	25	17	71
Total	2	1	8	13	89	145	83	351



11^e rapport du CHR

Par ailleurs, 23 fiches ont été refusées par le CHR soit un taux d'acceptation de 93,5 %, comparable à celui du rapport précédent. Ces refus peuvent concerner des observations trop furtives ou lointaines, des hybrides possibles, ou des espèces d'identification délicate pour lesquelles il est difficile de regrouper les caractères discriminants.

On retiendra, pour ce 11^e rapport, les premières homologations pour 5 espèces : le Busard pâle *Circus macrourus*, la Buse pattue *Buteo lagopus* (tous deux sortis de la liste CHN en 2013), le Grand Labbe *Catharacta skua*, la Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (soumise à homologation à partir de 2012) et la Lusciniole à moustaches *Acrocephalus melanopogon*.

Enfin, notons qu'une fiche concernant une Effraie des clochers *Tyto alba* de la sous-espèce *guttata* a été soumise à examen et acceptée. Elle n'est cependant pas intégrée au présent rapport car cette sous-espèce n'est a priori pas rare pour la région, son statut exact restant toutefois à préciser.

Données acceptées par le CHR de 2012 à 2014

L'ordre systématique est celui proposé par la CAF (Commission de l'avifaune française) qui tient compte des nouvelles données concernant la taxonomie des oiseaux.

À la suite du nom latin, la première information entre parenthèses indique le nombre de données suivi du nombre d'individus homologués entre 2000 et 2011 ; la deuxième parenthèse indique le nombre de données homologuées de 2012 à 2014, suivi du nombre d'individus correspondant.

Le(s) découvreur(s) (à défaut le rédacteur de la fiche) est mentionné en premier, suivi des dessinateurs et photographes, et enfin des autres observateurs (parfois regroupés sous la mention *et al.*).

Le CHR rappelle que les illustrations (dessins et photographies) et les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Ces dernières doivent être citées comme telles dans la littérature. Par exemple : Mars-sur-Allier : 1 adulte le 11 février 2012 (Coquery in Rolland et le CHR, 2015).

ANATIDAE

Cygne de Bewick - *Cygnus bewickii* (6/34) (4/19)

Se reproduisant dans la toundra eurasiennne, le Cygne de Bewick hiverne en Asie orientale et à l'extrémité occidentale de l'Europe. Il se concentre surtout en Grande-Bretagne, Irlande et Pays-Bas, laissant des hivernants en Allemagne et au Danemark. Il est beaucoup plus localisé en Europe de l'Ouest.

Crisey / Lans / Lux (71) : 8 adultes et 3 individus de 1^{re} année du 24 décembre 2010 au 2 janvier 2011 (P. Gayet *et al.*)

Mars-sur-Allier (58) : 1 adulte le 11 février 2012 (S. Coquery)

Thois-le-Désert (21) : 8 adultes et 1 individu de 1^{re} année du 7 au 15 novembre 2012 (G. Bedrines *et al.*)

Charrette / Lays-sur-le-Doubs / Pierre-de-Bresse (71) : 2 adultes et 2 individus de 1^{re} année du 22 décembre 2012 au 9 février 2013 (J.-M. Frolet *et al.*)

Épervans (71) : 5 individus le 17 février 2013 (P. Gayet)

L'essentiel des données concerne des oiseaux de passage hivernant en Camargue, observés au mois de novembre et février-mars. Les deux données hivernales de Saône-et-Loire, dont un hivernage complet d'un groupe familial, sont donc remarquables.

Cygne chanteur - *Cygnus cygnus* (5/5) (2/6)

Cygne boréal qui se reproduit dans la toundra arctique, en Islande et jusqu'au sud de la Suède. Hivernant très rare sur quelques sites du nord-est de la France.

Marnay (71) : 1 adulte du 20 mai au 16 juin 2013 (F. Tillier, J. Untermaier)

Saunières (71) : 2 adultes et 3 individus de 2^e année du 18 janvier au 7 février 2014 (J.-M. Frolet *et al.*)

*Étant donné la rareté de l'espèce dans notre région, le séjour hivernal d'un groupe de 5 individus est tout aussi original que la donnée tardive de mai 2013. Cette dernière est sans doute à mettre en relation avec la première nidification française dans le département voisin de l'Ain, l'année précédente (Benmergui *et al.*, 2012).*



11^e rapport du CHR



CYGNE CHANTEUR - SAUNIÈRES (71) - 18 JANVIER 2014 (JEAN-MARC FROLET).

Oie des moissons - *Anser fabalis rossicus* (3/20) (2/6)

La sous-espèce *rossicus* se reproduit en Sibérie de la péninsule de Kanin, à la rivière Kathanga. Hiverné dans l'est de la France, principalement en Alsace et en Champagne humide.

Lamarche (21) : 1 individu le 12 février 2012 (J.-P. Morizot)

Vergigny (89) : 5 individus de 1^{re} année le 12 février 2012 (M. Chardon)

Deux données très synchrones, à l'occasion d'une vague de froid importante qui aura fait fuir vers le sud nombre d'anatidés hivernant au Benelux.

Oie rieuse - *Anser albifrons* (19/320) (9/60)

La sous-espèce *albifrons* se reproduit dans le nord de la Russie, tandis qu'au sud-ouest du Groenland, on trouve la sous-espèce *flavirostris*. Hivernante et migratrice rare en France.

Drambon / Saint-Léger-Triey (21) : 33 individus du 16 janvier au 15 février 2010 (A. Rougeron, S. Guillebault et al.)

Tintury (58) : 2 adultes du 14 janvier au 21 février 2012 (S. Merle, J. Pitois et al.)

Larrey (21) : 2 individus le 17 mars 2012 (C. Durlet, F. Durlet)

Varenes-le-Grand (71) : 1 adulte du 13 au 14 novembre 2012 (P. Gayet et al.)

Meursanges (21) : 1 individu le 22 janvier 2013 (B. Fontaine)

Saunières (71) : 1 adulte le 24 janvier 2013 (B. Grand)

Saint-Marcel (71) : 47 individus le 30 janvier 2013 (G. Bedrines)

Marnay / Ouroux-sur-Saône (71) : 1 adulte et 3 individus de 2^e année du 23 au 24 février 2013 (P. Gayet)

Gron (89) : 1 adulte le 9 avril 2013 (F. Bouzendorf)

Tournus (71) : 1 individu de 1^{re} année le 15 décembre 2013 (D. Perreau)

Les hivers relativement froids de ces dernières années ont permis une relative régularité de l'espèce dans l'est de la région. La vague de froid de février 2012 fournit seulement 2 données alors que les épisodes de froid de janvier-février 2013, moins prononcés mais plus précoces qu'en 2012, fournissent 5 données dont 1 relativement tardive dans l'Yonne.

Bernache nonnette - *Branta leucopsis* (12/47) (1/1)

Se reproduit essentiellement à l'est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Populations férales reproductrices au Benelux. Afflux importants certains hivers, pour la plupart en provenance des zones d'hivernage des Pays-Bas et de Belgique.

Localité tenue secrète (89) : 1 individu le 11 juillet 2013 (S. Rolland, Q. Burgard)

*La date d'observation de cet oiseau, accompagnant des Bernaches du Canada (*Branta canadensis*), suggère une appartenance aux populations férales du Benelux.*

Fuligule nyroca - *Aythya nyroca* (26/28) (13/16)

Nicheur en Espagne et en Europe centrale. En France, nicheur occasionnel, migrateur et hivernant rare.

Gron (89) : 1 mâle du 4 octobre au 14 novembre 2009 (F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 mâle du 14 au 22 mars 2011 (F. Bouzendorf, A. Rolland)



11^e rapport du CHR

Fontaine-Française (21) : 1 mâle adulte du 19 février au 11 mars 2012 (J. Pitois, G. Oriol)

Vergigny (89) : 1 mâle adulte le 29 août 2012 (F. Bouzendorf)

Les Maillys (21) : 1 mâle adulte du 31 octobre au 4 novembre 2012 (A. Rougeron et al.)

Fontaine-Française (21) : 1 mâle du 25 décembre 2012 au 11 février 2013 (G. Bedrines et al.)

Villemanoche (89) : 1 mâle du 12 février au 5 avril 2013 (F. Bouzendorf, Q. Burgard)

Marliens / Rouvres-en-Plaine (21) : 1 mâle du 22 novembre 2014 au 11 février 2015 (S. Desbrosses, L. Gautherin, A. Rougeron)

Le nombre de données est important pour la période considérée, en lien avec des observations répétées sur certains sites privilégiés pour l'espèce. C'est notamment le cas d'une petite gravière récente dans le nord de l'Yonne qui accueille très régulièrement l'espèce, avec jusqu'à 4 individus présents simultanément le 19 novembre 2014. Le Fuligule nyroca reste cependant une espèce rare à l'échelle de la région de par son aire d'occurrence restreinte (gravières de la vallée de l'Yonne et de Côte-d'Or). On remarquera son absence en Saône-et-Loire et dans la Nièvre.

Fuligule milouinan - Aythya marila (25/30) (1/8)

En Europe, nicheur de l'Islande à la Scandinavie. L'hivernage de ce canard est quasi exclusivement maritime.

Gron (89) : 1 mâle de 2^e année du 14 au 17 mars 2010 (F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 8 individus du 4 au 12 novembre 2013 (A. Dupré, G. Bedrines)

Cette espèce, auparavant annuelle dans la région, semble se raréfier, ne donnant lieu qu'à une seule donnée au cours de la période couverte par ce rapport. Il est probable que cela soit dû à un glissement de l'aire d'hivernage vers le



FULIGULE NYROCA - ARC-SUR-TILLE (21) - 27 NOVEMBRE 2014 (GEORGES BEDRINES).

Gron (89) : 1 femelle le 7 décembre 2013 (A. Rolland)

Vergigny (89) : 1 mâle de 1^{re} année du 13 au 15 décembre 2013 (J. Ardelet et al.)

Côte-d'Or - Fontaine-Française (21) : 1 mâle adulte du 22 décembre 2013 au 16 février 2014 (G. Bedrines et al.)

Rouvres-en-Plaine / Gevrey-Chambertin (21) : 1 femelle du 5 au 30 janvier 2014 (A. Rougeron et al.)

Villemanoche (89) : 1 mâle le 11 janvier 2014 (L. Albesa)

Les Maillys (21) : 1 mâle adulte du 1 novembre au 13 décembre 2014 (D. Crozier, S. Crozier)

Arc-sur-Tille / Magny-sur-Tille (21) : 1 mâle du 15 novembre 2014 au 28 février 2015 (C. d'Adamo, R. Desbrosses, T. Meskel et al.)

Villemanoche (89) : 2 mâles et 2 femelles le 19 novembre 2014 (F. Bouzendorf)



HARELDE BORÉALE -GURGY (89) - 10 DÉCEMBRE 2012 (JEAN-PAUL LEAU).



11^e rapport du CHR


nord, en réponse au changement climatique, comme cela est le cas pour d'autres anatidés hivernant en mer, par exemple la Macreuse noire (*Melanitta nigra*).

Harelda boréale - *Clangula hyemalis* (4/5) (1/1)

Nicheur circumboréal, essentiellement au-delà de 65°N. Hivernant et migrateur rare sur le littoral et à l'intérieur des terres.

Gurgy (89) : 1 femelle de 1^{re} année du 10 décembre 2012 au 16 janvier 2013 (J. Ardelet et al.)

C'est seulement la 5^e donnée homologuée depuis la création du CHR, soit 1 tous les 3 ans environ. Il s'agit également de la 1^{re} donnée hors de Côte-d'Or.



MACREUSE NOIRE - SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE (21) - 3 MARS 2013 (GEORGES BEDRINES).

Macreuse noire - *Melanitta nigra* (4/5) (4/4)

Ses zones de reproduction s'étendent de l'Islande à la Sibérie, en passant par la Scandinavie. Hivernante assez commune sur le littoral, beaucoup plus rare dans les terres.

Verjux (71) : 1 mâle adulte du 19 au 30 janvier 2013 (B. Grand et al.)

Saint-Marcel (71) : 1 mâle adulte du 2 au 10 mars 2013 (P. Gayet et al.)

Saint-Seine-sur-Vingeanne (21) : 1 mâle adulte du 3 au 6 mars 2013 (G. Bedrines et al.)

Chalon-sur-Saône (71) : 1 individu de 1^{re} année le 17 décembre 2013 (P. Gayet, J.-M. Frolet)

Deux données au passage pré-nuptial, à des dates étonnamment synchrones avec celles des années précédentes, et qui concernent systématiquement des mâles adultes. Les données hivernales sont plus originales, notamment celle du stationnement d'un adulte en janvier.

Macreuse brune - *Melanitta fusca* (17/31) (10/30)

La sous-espèce nominale niche dans les zones circumpolaires arctiques. La zone d'hivernage principalement littorale se situe en Baltique et mer du Nord; le littoral atlantique constitue sa limite méridionale d'hivernage.

Dijon (21) : 1 femelle du 6 au 14 février 2012 (A. Rougeron et al.)

Auxonne (21) : 1 mâle de 2^e année le 11 février 2012 (A. Rougeron, B. Fontaine)

Les Maillys (21) : 1 femelle du 9 au 29 mars 2012 (L. Gautherin, G. Schneider et al.)

Saint-Didier-sur-Arroux (71) : 1 mâle de 2^e année et 4 femelles du 9 au 15 mars 2012 (O. Léger et al.)

Gron (89) : 2 mâles de 2^e année le 25 mars 2012 (J.-M. Guilpain)

Gron (89) : 1 individu le 20 janvier 2013 (J.-M. Guilpain)

La-Celle-sur-Loire (58) : 4 mâles de 2^e année du 16 au 28 février 2013 (C. Barge et al.)

Magny-sur-Tille (21) : 5 individus dont 2 mâles de 1^{re} année le 26 novembre 2013 (G. Bedrines, A. Rougeron)

Arc-sur-Tille (21) : 8 individus dont 3 mâles et 2 femelles de 2^e année et 1 femelle du 28 janvier au 22 février 2014 (G. Bedrines et al.)

Gron (89) : 2 individus le 28 décembre 2014 (S. Rolland, A. Rolland)

La période 2012-2014 a donné lieu à un grand nombre de données de cette espèce, rare mais presque régulière sur les plans d'eau du nord de la région. De manière inhabituelle, plusieurs groupes comptant 5 à 8 individus ont été observés.



11^e rapport du CHR

Harle huppé - *Mergus serrator* (23/39) (4/5)

Nicheur en Europe surtout au-delà de 55°N. Nicheur occasionnel en France et hivernant peu commun sur le littoral, rocheux principalement.

Thoisyl-le-Désert (21) : 1 individu le 29 décembre 2012 (O. Mariotte, T. Mariotte)

Vandenesse-en-Auxois (21) : 2 individus du 17 au 18 novembre 2013 (G. Bedrines, H. Gauche)

Vinneuf (89) : 1 mâle de 1^{re} année du 7 au 8 décembre 2013 (S. Rolland, L. Albesa)

Arc-sur-Tille (21) : 1 mâle de 1^{re} année du 9 décembre 2013 au 4 mars 2014 (G. Bedrines et al.)

Belle série de données en 2013 avec une observation dans l'Yonne, où l'espèce n'avait pas été observée depuis près de 10 ans.

GAVIIDAE

Plongeon catmarin - *Gavia stellata* (16/18) (4/4)

Cette espèce holarctique se reproduit au Groenland, en Islande, dans le nord des îles Britanniques et s'étend de la Scandinavie à l'est de la Russie. En France, il hiverne sur les zones sableuses et peu profondes du littoral.

Mesves-sur-Loire (58) : 1 individu le 9 novembre 2012 (N. Pointecouteau et al.)

Gron (89) : 1 adulte le 30 novembre 2013 (A. Rolland, J.-M. Guilpain)

Gurgy (89) : 1 individu de 1^{re} année du 30 décembre 2013 au 23 mars 2014 (A. Rolland et al.)

Saint-Marcel (71) : 1 individu de 2^e année du 24 au 25 janvier 2014 (J.-M. Frolet, L. Joly)

Deux données classiques d'oiseaux de passage en novembre, une donnée de fin d'hiver et un stationnement remarquable de près de 3 mois sur un complexe de gravières icaunais où l'espèce n'avait pourtant encore jamais été observée.

Plongeon arctique - *Gavia arctica* (13/12) (3/3)

En Europe, ce plongeon niche du nord du continent à la Scandinavie. En France, il hiverne principalement sur les côtes de la moitié nord du pays.

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 adulte le 8 avril 2013 (P. Gayet)

Arc-sur-Tille (21) : 1 adulte du 30 décembre 2013 au 22 février 2014 (G. Bedrines et al.)

Athée (21) : 1 individu de 2^e année du 16 au 21 mars 2014 (A. Rougeron et al.)

Également un long stationnement (près de 2 mois) pour cette espèce et 2 données originales qui concernent le passage pré-nuptial, incluant un adulte en plumage nuptial!

Plongeon imbrin - *Gavia immer* (8/8) (3/3)

Il niche en Amérique et en Islande. Dans le Paléarctique occidental, son aire d'hivernage est limitée aux côtes septentrionales de l'Europe.

Chazilly (21) : 1 adulte ou subadulte du 3 au 16 janvier 2012 (B. Fontaine et al.)

Gron (89) : 1 individu de 1^{re} année le 22 décembre 2012 (S. Rolland, A. Mauss et al.)

Magny-sur-Tille (21) : 1 adulte (plus de 2 ans) du 20 au 24 décembre 2014 (P. Devoucoux, J. Pernin)

On remarquera l'âge peu habituel des oiseaux côte-d'oriens (adultes/subadultes) et la seconde mention de l'espèce pour l'Yonne, près de 30 ans après la première.

PODICIPEDIDAE

Grèbe jougris - *Podiceps grisegena* (11/12) (3/3)

La sous-espèce nominale niche en Europe septentrionale, orientale et centrale. Nicheur extrêmement rare, migrateur et hivernant rare mais régulier en France.

Vitry-Laché (58) : 1 individu du 15 au 25 février 2011 (D. Simpson)

Gron (89) : 1 individu du 24 au 29 mai 2011 (F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain)

Mesves-sur-Loire (58) : 1 individu le 10 février 2012 (N. Pointecouteau, R. Heslot)

Tailly (21) : 1 individu le 14 mars 2012 (B. Fontaine)

Magny-sur-Tille (21) : 1 individu du 18 novembre au 21 décembre 2014 (S. Desbrosses et al.)

Avec l'installation durable d'au moins un couple nicheur sur le lac de la Forêt-d'Orient (Crosset et Thiollay, 2007) dans le département voisin



11^e rapport du CHR

de l'Aube, la fréquence d'observation est logiquement en augmentation. Il faut signaler l'observation remarquable d'un oiseau en train de construire un nid, en mai 2011, dans l'Yonne, département qui avait accueilli la première nidification française de l'espèce en 1978 (Tostain et al., 1979).

ARDEIDAE

Crabier chevelu - *Ardeola ralloides* (16/19) (6/7)

En Europe occidentale, cet ardeidé se reproduit au niveau des pourtours méditerranéens, de la mer Noire et de la mer Caspienne. En France, l'essentiel de la population se situe en Camargue auquel il convient d'ajouter quelques cas de nidification comme en Brenne, en Dombes et sur la façade atlantique.

Épervans (71) : 1 individu le 11 avril 2012 (A. Révillon, J. Devevey) puis 1 adulte du 21 avril au 16 juin 2012 (J.M. Frolet, G. Gauthier et al.)

Vielverge (21) : 1 adulte du 1 au 3 mai 2012 (J.-P. Morizot)

Crissey (71) : 1 individu du 17 au 19 mai 2013 (L. Joly et al.)

Saunières (71) : 2 individus le 2 juin 2013 (P. Gayet) puis 1 adulte du 11 au 16 juin 2013 (J. Devevey, A. Révillon et al.)

Saint-Martin-en-Bresse (71) : 1 individu le 7 juin 2013 (E. Thomas)

Jaulges (89) : 1 individu le 21 avril 2014 (S. Rolland, A. Rolland)

La Saône-et-Loire, voisine des secteurs de reproduction de l'Ain, fournit logiquement l'essentiel des données. L'observation d'adultes stationnant aux alentours de colonies d'ardéidés au printemps est un signe encourageant pour l'installation de l'espèce en Bourgogne. Notons également la première mention documentée de l'espèce pour l'Yonne, après une donnée non circonstanciée à l'automne 2012 et une donnée du XIX^e siècle. Enfin, il faut remarquer l'absence inhabituelle de donnée postnuptiale pour ces trois dernières années.

THRESKIORNITHIDAE

Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus* (3/3) (4/4)

Cette espèce se reproduit en Europe, principalement à l'est et au sud-est (Russie, Ukraine

et Turquie). Un petit noyau de population a été découvert en Petite-Camargue gardoise avec 14 couples en 2006.

Baugy (71) : 1 adulte le 25 mars 2012 (B. Dury, C. Dury)

Saunières / Épervans / Marnay (71) : 1 individu du 6 au 10 octobre 2013 (J.-M. Frolet, B. Grand) puis 1 individu de 1^{re} année du 26 octobre au 9 novembre 2013 (P. Gayet, L. Joly)

Précy-sous-Thil (21) : 1 individu le 25 janvier 2014 (A. Rougeron, C. Lefebvre, J. Pilier)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu le 22 mai 2014 (G. Bedrines)

Quatre oiseaux en 3 ans, c'est bien plus que la moyenne depuis la création du CHR, qui était d'un oiseau tous les 4 ans jusqu'en 2011. Cet accroissement était attendu depuis que l'espèce s'est installée avec succès en Camargue (Kayser et al., 2006), et devrait se poursuivre dans les années à venir. La Nièvre et l'Yonne pourraient dans ce contexte donner elles aussi lieu à des observations de l'espèce.

Spatule blanche - *Platalea leucorodia* (15/17) (18/27)

Espèce eurasiatique et africaine dont la distribution s'avère très morcelée. En nette progression en Europe de l'Ouest. Nicheur rare en France dans les grandes zones humides, migrateur peu commun sur le littoral.

Épervans (71) : 2 dont 1 adulte le 1^{er} juin 2012 (C. Gelée) puis 2 individus dont 1 immature le 3 juillet 2012 (C. Gelée) et 1 adulte ou subadulte du 4 au 5 août 2012 (J.-M. Frolet, L. Joly, P. Gayet)

Gergy (71) : 1 immature le 29 juin 2012 (P. Gayet)

Athée (21) : 1 adulte du 3 au 26 juillet 2012 (J. Leblanc, A. Rougeron et al.)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 immature le 30 juillet 2012 (A. Dupré)

Pouilly-sur-Loire (58) : 7 individus du 10 au 16 octobre 2012 (J.-F. Ozbolt et al.)

Germigny (89) : 1 adulte ou subadulte le 20 mars 2013 (F. Bouzendorf)

Lays-sur-le-Doubs (71) : 1 immature le 15 avril 2013 (P. Gayet)



11^e rapport du CHR

Crissey / Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 adulte et 1 immature le 15 avril 2013 (P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 adulte le 20 mai 2013 (P. Gayet)

Sassenay (71) : 1 individu de 2^e année le 22 mai 2013 (P. Gayet, L. Joly)

Crissey (71) : 1 adulte/subadulte du 28 au 30 mai 2013 (L. Joly, P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 4 dont 2 immatures le 29 mai 2013 (B. Grand)

Préty (71) : 2 individus dont 1 adulte ou subadulte du 1 au 6 juin 2013 (G. Échallier, D. Perreau et al.)

Marnay / Saunières (71) : 1 immature du 27 au 30 juin 2013 (P. Gayet)

Labergement-lès-Seurre (21) : 1 individu le 1^{er} juillet 2013 (S.-P. Babski)

Marnay (71) : 1 adulte et 2 immatures le 2 juillet 2013 (P. Gayet)

Courtois-sur-Yonne (89) : 3 adultes le 11 avril 2014 (F. Bouzendorf)

Laperrière-sur-Saône (21) : 6 dont 1 individu de 2^e année du 8 mai au 14 août 2014 (J.-P. Morizot et al.)

Si le nombre d'observations dans l'ouest de la région reste faible (1 par an pour ce rapport), l'est de la région a, en revanche, accueilli plusieurs individus en période de reproduction sur la période considérée. Même si la proportion d'immatures reste forte, des adultes ont été observés, y compris au sein de colonies d'ardéidés en Saône-et-Loire (en 2012 au moins). Une première reproduction pour la région peut être espérée si la dynamique actuelle se poursuit.

ACCIPITRIDAE

Vautour moine – *Aegypius monachus* (4/4) (1/1)

Niche en Espagne, France, Grèce et de l'Ukraine à la Chine. La principale colonie française est établie dans les Cévennes. Fréquente également les Alpes et les Pyrénées.

Rouy (58) : 1 immature le 21 mai 2014 (G. Claustre fide J. Pitois)

Une nouvelle donnée d'un immature en fin de printemps pour cette espèce très occasionnelle dans la région.



PYGARGUE À QUEUE BLANCHE - FONTAINE-FRANÇAISE (21) - 20 JANVIER 2013 (GEORGES BEDRINES).

Pygargue à queue blanche - *Haliaeetus albicilla* (4/5) (1/1)

Ce grand rapace niche et hiverne en Europe du Nord et de l'Est. L'erratisme est cependant plus important durant la période hivernale.

Fontaine-Française (21) : 1 immature de 2^e ou 3^e année le 20 janvier 2013 (G. Bedrines)

Cette espèce reste toujours aussi rare et mythique dans la région. La fréquence des observations pourrait augmenter si l'on tient compte de la progression de ses effectifs et de son aire de reproduction en Europe du Nord (e.g. Helander in Helander et al., 2003).

Milan noir - *Milvus migrans* (1/1) (2/2)

Niche surtout en Europe et en Afrique du Nord. En France, nicheur assez commun, migrateur commun et hivernant très rare.

Chagny (71) : 1 adulte le 6 janvier 2012 (B. Grand, J. Jansonius)

Rouvres-sous-Meilly (21) : 1 individu de 2^e année le 16 janvier 2012 (B. Fontaine)

Deux oiseaux différents le même hiver alors qu'il n'y avait qu'une donnée hivernale homologuée depuis 2000, c'est remarquable. S'agit-il de réels hivernants ou d'oiseaux ayant passé le début de l'hiver en Europe du Sud et amorçant leur montée dans la deuxième moitié de l'hiver ?



BUZARD PÂLE - SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE (71) - 8 MAI 2013 (ALEXIS RÉVILLON).

Busard pâle - *Circus macrourus* (0/0) (3/3)

Niche en Asie centrale, jusqu'aux rives occidentales de la Mer Noire à l'ouest. L'aire d'hivernage s'étend de l'Afrique de l'Ouest et du Sud à la Birmanie. Observé chaque année en petit nombre en France aux deux passages. Homologable au niveau régional depuis le 1^{er} janvier 2013 et sa sortie de la liste CHN.

Lays-sur-le-Doubs (71) : 1 individu de 2^e année le 13 avril 2013 (B. Grand)

Saint-Aubin (21) : 1 individu de 2^e année le 23 avril 2013 (A. Rougeron et al)

Saint-Maurice-en-Rivière (71) : 1 mâle de 2^e année le 8 mai 2013 (B. Grand et al.)

Excellent printemps pour l'espèce, qui fournit ainsi 3 données dès sa première année dans la liste du CHR.

Buse pattue - *Buteo lagopus* (0/0) (2/2)

Niche dans la toundra tout au long du Cercle polaire arctique, en Scandinavie et en Europe. Hiverné en Europe du Nord et de l'Est. Atteint la France certains hivers, généralement à

la suite de bonnes années de reproduction. Homologable au niveau régional depuis le 1^{er} janvier 2013 et sa sortie de la liste CHN.

Varennes-Vauzelles (58) : 1 mâle le 6 janvier 2014 (S. Merle)

Lays-sur-le-Doubs (71) : 1 individu de 1^{re} année le 21 novembre 2014 (P. Gayet)

Premières données pour le CHR, lors d'hivers pourtant peu favorables à l'observation de l'espèce en France.

PANDIONIDAE

Balbusard pêcheur - *Pandion haliaetus* (0/0) (1/1)

Espèce cosmopolite nichant dans une grande partie de l'hémisphère nord. En Europe, niche principalement en Scandinavie et en Russie et hiverné en Afrique subsaharienne mais aussi en faible nombre en région méditerranéenne.

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu le 15 novembre 2014 (A. Dupré)



11^e rapport du CHR



BUSE PATTUE - LAYS-SUR-LE-DOUBS (71) - 21 NOVEMBRE 2014 (PHILIPPE GAYET).

Première homologation de cette espèce, observée principalement en période de migration dans la région. Il s'agit ici d'un migrateur tardif plutôt que d'un hivernant.

FALCONIDAE

Faucon kobez - *Falco vespertinus* (23/46) (7/9)

Niche depuis la Hongrie jusqu'à 120°E en Russie. Nicheur occasionnel en France, migrateur rare mais régulier aux deux passages.

Effectue une migration en boucle, ce qui explique le nombre d'observations plus élevé au passage pré-nuptial (surtout mai) qu'au passage post-nuptial, où l'espèce emprunte des voies migratoires plus orientales.

Marliens (21) : 2 mâles de 2^e année et 1 femelle de 2^e année du 21 au 25 mai 2012 (A. Rougeron et al.)

Saint-Germain-du-Bois (71) : 1 femelle adulte le 23 mai 2012 (B. Grand)

Baubigny (21) : 1 mâle le 2 septembre 2012 (D. Guizon, B. Fontaine)

Épervans (71) : 1 femelle de 2^e année le 20 mai 2013 (F. Tillier, J. Untermaier)

Saint-Seine-sur-Vingeanne (21) : 1 mâle de 2^e année le 2 juin 2013 (G. Schneider, G. Bedrines)

Pont (21) : 1 femelle de 2^e année le 3 avril 2014 (A. Rougeron, N. Pierrat)

Baubigny (21) : 1 mâle adulte le 4 octobre 2014 (D. Guizon)

Dates et localités classiques. Pas d'afflux important sur la période considérée.

RALLIDAE

Marouette ponctuée - *Porzana porzana* (17/17) (25/30)

Nicheuse discrète et localisée en France, la Marouette ponctuée rejoint le sud de l'Espagne et l'Afrique pour passer l'hiver.

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu de 1^{re} année le 6 octobre 2010 (F. Bouzendorf et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 adulte le 23 septembre 2011 (F. Bouzendorf, J.-P. Leau et al.)

Savigny-en-Revermont (71) : 1 individu le 25 mars 2012 (W. Guillet)

Ourox-sur-Saône (71) : 1 individu le 2 avril 2012 (P. Gayet)

Labergement-lès-Seurre (21) : 1 individu le 11 avril 2012 (A. Rougeron, B. Ravard)

La Collancelle (58) : 1 individu de 1^{re} année le 10 août 2012 (J.-M. Coquillat et al.)

Frontenard (71) : 1 chanteur le 14 avril 2013 (B. Grand)

Localité tenue secrète (89) : 1 chanteur le 21 avril 2013 (S. Rolland, Q. Burgard)

Saint-Maurice-en-Rivière (71) : 1 poussin le 13 juillet 2013 (B. Grand, M. Petit)



11^e rapport du CHR

Saint-Maurice-en-Rivière (71) : 2 poussins le 15 juillet 2013 (B. Grand et al.)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 individu de 1^{re} année du 6 au 25 août 2013 (P. Gayet)



MARQUETTE PONCTUÉE - SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE (71) - 15 JUILLET 2013 (ALEXIS RÉVILLON).

Larrey (21) : 1 individu le 21 août 2013 (J. Pitois et al.)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 individu de 1^{re} année du 25 août au 5 septembre 2013 (P. Gayet, L. Joly)

Chaume-lès-Baigneux (21) : 1 individu le 30 août 2013 (C. Durlet)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu du 2 au 24 septembre 2013 (G. Bedrines et al.)

Verjux (71) : 1 individu de 1^{re} année du 4 au 13 septembre 2013 (B. Grand et al.)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 individu de 1^{re} année du 5 au 8 septembre 2013 (P. Gayet)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu de 1^{re} année et 1 adulte du 10 au 13 septembre 2013 (F. Bouzendorf, S. Rolland et al.)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 individu de 1^{re} année du 11 au 12 septembre 2013 (P. Gayet)

Pontoux (71) : 4 individus dont 3 de 1^{re} année du 13 au 29 septembre 2013 (B. Grand, A. Révillon et al.)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu du 14 au 24 septembre 2013 (A. Rougeron et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 adulte le 21 septembre 2013 (S. Rolland et al.)

Larrey (21) : 1 individu de 1^{re} année le 7 août 2014 puis 1 individu le 9 août 2014 (J. Pitois et al.)

Fontaine-Française (21) : 1 individu de 1^{re} année le 16 août 2014 (G. Schneider, B. Schneider)

Moutiers-en-Puisaye (89) : 1 individu le 20 août 2014 (F. Bouzendorf)

Tailly (21) : 1 individu de 1^{re} année du 18 septembre au 10 octobre 2014 (B. Fontaine)

Les années 2012 et 2013 ont été fastes pour l'espèce et fournissent à elles seules plus de données que les 12 années précédentes ! Les précipitations importantes ont permis le cantonnement de l'espèce dans les vallées sur nombre de sites non favorables en dehors de ce contexte exceptionnel (prairies de fauche par exemple).

Marouette poussin - *Porzana parva* (1/1) (2/2)

Espèce nicheuse en France, mais extrêmement rare. Les données concernent des individus chanteurs sur de grands étangs. Ces données sont irrégulières et très aléatoires (entre 0-5 chanteurs entre 2002 et 2010). Le CHN l'a retirée des espèces soumises à homologation le 1^{er} janvier 2006.

MARQUETTE POUSSIN - ROUVRES-EN-PLAINE (21) - 1^{er} AVRIL 2014 (GEORGES BEDRINES).





11^e rapport du CHR

Saint-Seine-sur-Vingeanne (21) : 1 femelle du 28 avril au 4 mai 2013 (G. Bedrines et al.)

Rouvres-en-Plaine (21) : 1 femelle du 1 au 5 avril 2014 (L. Gautherin et al.)

Deux oiseaux en Côte-d'Or sur deux printemps consécutifs. Contrairement à l'oiseau de l'Yonne en 2010, ceux-ci ont été revus pendant plusieurs jours, pour la plus grande joie de nombreux observateurs.

HAEMATOPIDAE

Huîtrier pie - *Haematopus ostralegus* (9/17) (2/3)

Été comme hiver, en Europe de l'Ouest, ce grand limicole ne fréquente habituellement que les zones littorales.

Localité tenue secrète (89) : 1 individu le 7 avril 2013 (S. Rolland, Q. Burgard)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 2 individus de 1^{re} année le 6 septembre 2014 (A. Dupré et al.)

Données classiques, en période de migration, pour cette espèce côtière d'apparition irrégulière dans la région.

BURHINIDAE

Œdicnème criard - *Burhinus oedicnemus* (3/3) (1/1)

Sa distribution va de l'Europe de l'Ouest à l'Ukraine et au Caucase en passant par les Balkans. Nicheur peu commun en France dans les plaines agricoles et sur les îlots de galets, voire de sable des cours d'eau.

La Charité-sur-Loire (58) : 11 individus le 15 novembre 2014 (J. Pitois, Z. Pitois)

Une seule donnée en tout début de période d'homologation. L'hivernage de l'espèce semble être très occasionnel, mais est peut-être sous-détecté étant donné la discrétion de l'espèce.

CHARADRIIDAE

Gravelot à collier interrompu - *Charadrius alexandrinus* (3/3) (1/1)

Niche de l'Europe de l'Ouest et du nord-ouest de l'Afrique jusqu'au nord-est de la Chine et l'Extrême-Orient russe. Nicheur peu commun

sur les côtes de l'Ouest-Atlantique et du bassin méditerranéen.

Tailly (21) : 1 femelle du 30 au 31 mars 2013 (B. Fontaine et al.)

Une nouvelle donnée de Côte-d'Or pour une espèce très rare en Bourgogne.



PLUVIER GUIGNARD - PRENOIS (21) - 16 AOÛT 2014 (GEORGES BEDRINES).

Pluvier guignard - *Charadrius morinellus* (14/76) (9/66)

Espèce paléarctique des massifs montagneux et de toundra du nord de l'Europe (Écosse, Scandinavie), mais aussi d'Europe centrale et méridionale. Nicheur éteint en France depuis la fin des années 1990. Migrateur rare, mais régulier du littoral à la haute montagne.

Vauchignon (21) : 1 individu le 12 novembre 2011 (D. Guizon)

Viéville (21) : 15 adultes et 9 individus de 1^{re} année du 25 au 26 août 2013 (G. Bedrines et al.)

Prenois (21) : 7 individus de 1^{re} année le 28 août 2013 (G. Bedrines)

Chichery (89) : 5 individus de 1^{re} année le 7 septembre 2013 (S. Rolland et al.)

Viéville (21) : 7 adultes et 2 individus de 1^{re} année du 16 au 17 août 2014 (J.-P. Couasné)

Prenois (21) : 8 adultes et 1 individu de 1^{re} année le 16 août 2014 (G. Bedrines)

Baubigny (21) : 2 adultes le 22 août 2014 (S. Desbrosses et al.)



11^e rapport du CHR

Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21) : 2 adultes et 1 individu de 1^{re} année du 23 au 25 août 2014 (G. Bedrines, R. Soudagne)

Beire-le-Châtel (21) : 9 individus du 26 au 27 août 2014 (A. Rougeron, S. Desbrosses)

Busserotte-et-Montenaille (21) : 1 individu le 4 septembre 2014 (C. Pollyn-Millot)

De nombreuses données en provenance de Côte d'Or récompensent les prospections spécifiques qui y sont menées et confirment le passage régulier de cette espèce dans la région. La première donnée circonstanciée et dans un contexte « classique » pour l'Yonne rappelle que ce département mériterait également un effort de recherche conséquent.

SCOLOPACIDAE

Bécasseau maubèche - *Calidris canutus* (28/60) (12/22)

Ce bécasseau niche à l'extrême nord de l'Europe. Ses zones d'hivernage se trouvent exclusivement sur le littoral.

Auxerre (89) : 1 individu le 26 août 2012 (M. Abbott, A. le Calvez)

Vandenesse-en-Auxois (21) : 3 individus de 1^{re} année du 3 au 4 septembre 2012 (P. Vernet et al.)

Lays-sur-le-Doubs (21) : 1 adulte du 14 au 16 octobre 2012 (P. Gayet et al.)

Pouilly-sur-Saône (21) : 1 individu du 11 au 12 mai 2013 (A. Rougeron et al.)

Crissey (71) : 2 individus du 11 au 12 mai 2013 (J.M. Frolet, L. Joly et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 11 mai 2013 (P. Gayet)

Thoisy-le-Désert (21) : 1 individu de 1^{re} année du 27 août au 7 septembre 2013 (O. Bardet et al.)

Jaulges (89) : 2 individus de 1^{re} année le 14 septembre 2013 (S. Rolland, S. Vincent)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 2 au 3 mai 2014 (F. Bouzendorf)

Vergigny (89) : 3 individus le 13 mai 2014 (F. Bouzendorf, E. Halley)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le 13 mai 2014 (F. Bouzendorf)

Thoisy-le-Désert (21) : 5 individus de 1^{re} année du 9 septembre au 5 octobre 2014 (P. Vernet et al.)

Trois bonnes années pour cette espèce. L'essentiel des observations est réalisé dans l'Yonne et l'Auxois, ce qui n'est pas surprenant pour cette espèce dont les effectifs se concentrent sur la façade atlantique.



BÉCASSEAU DE TEMMINCK - MARLIENS (21) - 9 MAI 2014 (GEORGES BEDRINES).

Bécasseau de Temminck - *Calidris temminckii* (43/78) (21/28)

Nicheur en Arctique, Scandinavie et est de la Sibérie, le Bécasseau de Temminck est un migrateur rare en France.

Athée (21) : 1 individu le 1^{er} mai 2012 (A. Rougeron et al.)

Artaix (71) : 1 individu le 1^{er} mai 2012 (B. Dury, G. Barguil, C. Dury)

Charrette (71) : 1 individu le 22 mai 2012 (J.-M. Frolet)

Tréclun (21) : 2 individus le 9 août 2012 (A. Rougeron)

Rouvres-en-Plaine (21) : 1 adulte le 16 août 2012 (A. Rougeron)

Préty (71) : 1 individu le 3 mai 2013 (P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 7 mai 2013 (P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 2 individus le 7 mai 2013 (P. Gayet)



11^e rapport du CHR

Labergement-lès-Seurre (21) : 1 individu le 11 mai 2013 (A. Rougeron)

La Collancelle (58) : 1 individu le 5 septembre 2013 (S. Merle)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 25 au 26 avril 2014 (F. Bouzendorf, E. Bouzendorf)

Tailly (21) : 1 individu le 6 mai 2014 (B. Fontaine)

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 individu le 7 mai 2014 (J. Pitois)

Athée (21) : 1 individu le 8 mai 2014 (A. Rougeron)

Marliens (21) : 1 individu le 9 mai 2014 (G. Bedrines, A. Leborne)

Jaulges (89) : 1 individu du 9 au 10 mai 2014 (F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain, S. Rolland)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 4 individus le 17 mai 2014 (S. Desbrosses)

Rouvres-en-Plaine (21) : 3 individus de 1^{re} année du 3 au 4 septembre 2014 (S. Desbrosses)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu de 1^{re} année du 6 au 11 septembre 2014 (S. Desbrosses)

Gergy (71) : 1 individu de 1^{re} année le 8 septembre 2014 (B. Grand)

Vandenesse-en-Auxois (21) : 1 individu de 1^{re} année le 18 octobre 2014 (F. Spinnler et al.)

Les observations printanières, majoritaires, sont concentrées durant les deux premières décades de mai, avec un pic centré autour du 7 de ce mois. À l'inverse de l'espèce précédente, le Bécasseau de Temminck s'observe essentielle-

ment dans la marge orientale de la région, notamment sur les gravières de Côte-d'Or. Il est beaucoup plus rare dans l'ouest de la région, sauf peut-être dans le val de Loire, ce qui rend exceptionnelles les deux données icaunaises obtenues lors d'un même passage prénuptial.

Bécasseau tacheté - *Calidris melanotos* (4/4) (5/3)

Nicheur dans l'Arctique nord-américain et en Sibérie. Il s'agit du bécasseau néarctique le plus commun en France.

Saint-Aubin-en-Charollais (71) : 1 individu de 1^{re} année du 3 au 6 septembre 2012 (A. Morlet, E. Bonnefoy)

Crissey (71) : 1 individu du 10 au 12 mai 2013 (L. Joly et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 17 mai 2013 (P. Gayet) puis 1 individu le 2 juin 2013 (J.-M. Frolet et al.)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 adulte du 1 au 2 août 2014 (G. Bedrines, L. Gautherin et al.)

Au moins 3 individus en 2 ans, c'est exceptionnel pour une espèce qui a été observée en moyenne tous les 3 ans depuis 2000.

Bécasseau sanderling - *Calidris alba* (33/55) (10/16)

Le Bécasseau sanderling quitte l'extrême nord de l'Europe (région Arctique) pour venir hiverner principalement le long des côtes.

Gurgy (89) : 1 individu le 14 mai 2010 (S. Rolland, A. Rolland)

Vergigny (89) : 1 individu le 18 mars 2012 (R. Geoffrin)

La Charité-sur-Loire (58) : 1 individu le 23 mai 2012 (J. Pitois)

Héry (89) : 1 individu du 1 au 2 avril 2013 (A. Rolland, M. Cattagni)

Labergement-lès-Seurre (21) : 1 individu le 11 mai 2013 (A. Rougeron)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 2 individus du 18 au 19 mai 2013 (P. Gayet et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 28 mai 2013 (J.-M. Frolet)

Rouvres-en-Plaine (21) : 1 individu du 24 au 26 avril 2014 (G. Bedrines et al.)



BÉCASSEAU TACHETÉ - SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS (71)
6 SEPTEMBRE 2012 (ANTHONY MORLET).



11^e rapport du CHR

Saint-Marcel (71) : 6 individus le 2 mai 2014 (P. Gayet)

Marzy (58) : 1 individu le 13 mai 2014 (S. Merle)

Germigny-sur-Loire (58) : 1 individu du 13 au 14 mai 2014 (S. Merle)

La période considérée comprend uniquement des données printanières. Le recul accumulé depuis la création du CHR a permis de montrer que le nombre d'observations peut varier fortement selon les années.

Barge rousse - *Limosa lapponica* (21/27) (3/5)

La sous-espèce nominale niche en Scandinavie et en Russie. Migratrice et hivernante peu commune en France, principalement sur les vasières littorales.

Fourchambault (58) : 1 individu le 6 mai 2012 (S. Merle, D. Merle)

Thoisyle-Désert (21) : 3 individus de 1^{re} année du 8 au 26 septembre 2013 (A. Rougeron et al.)

Chichery (89) : 1 individu de 1^{re} année du 16 au 19 septembre 2013 (S. Rolland, T. Koffel, N. Saint-Germès)

Tréclun (21) : 1 individu du 17 au 20 septembre 2014 (L. Gautherin et al.)

*Dates d'apparition habituelles pour cette espèce. L'observation icaunaise est originale car l'oiseau se nourrissait dans un chaume sur un plateau agricole, et a même été rejoint par un Combattant varié (*Philomachus pugnax*) lors de son court séjour.*

Tournepièrre à collier - *Arenaria interpres* (14/18) (8/15)

Ce limicole niche de la Scandinavie au nord de l'Europe et jusqu'au Groenland. En France, lors de la migration, il fréquente surtout le littoral atlantique.

Vergigny (89) : 1 individu du 15 au 17 mai 2012 (F. Bouzendorf, R. Geoffrin)

Lacanche (21) : 1 individu du 17 au 19 mai 2012 (A. Rougeron, J.-C. Dumay et al.)

Marcigny (71) : 1 individu le 19 mai 2012 (B. Dury, C. Dury)

Crissey (71) : 1 individu du 11 au 12 mai 2013 (L. Joly et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 7 individus le 25 mai 2013 (J.-M. Frolet, P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 26 mai 2013 (J.-M. Frolet et al.)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu du 2 au 7 septembre 2013 (G. Bedrines et al.)

Pouilly-sur-Loire (58) : 2 individus le 2 mai 2014 (S. Merle et al.)

Les printemps humides de 2012 et 2013 fournissent pas moins de 6 données. L'observation d'un groupe de 7 individus en Saône-et-Loire est exceptionnelle pour la région.



PHALAROPE À BEC ÉTROIT - VERDUN-SUR-LE-DOUBS (71) - 12 MAI 2013 (ALEXIS RÉVILLON).

Phalarope à bec étroit - *Phalaropus lobatus* (4/4) (1/1)

Nicheur en Arctique (dont l'Islande) et dans le nord de la Grande-Bretagne. Migrateur rare en France.

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 femelle du 12 au 17 mai 2013 (B. Grand et al.)

Première homologation pour la Saône-et-Loire, lors du passage prénuptial, ce qui est remarquable.

Phalarope à bec large - *Phalaropus fulicarius* (3/3) (1/1)

Nicheur de l'Islande à la Sibérie, en passant par le nord de la Grande-Bretagne. La migration se fait presque exclusivement à travers l'Europe de l'Est.

Vandenesse-en-Auxois (21) : 1 individu de 1^{re} année le 23 novembre 2011 (C. Pollynn-Millot et al.)

De nouveau une donnée sur les réservoirs de l'Auxois en fin d'automne pour cette espèce



11^e rapport du CHR

essentiellement pélagique en dehors de la période de reproduction.

STERCORARIIDAE

Grand Labbe - *Catharacta skua* (0/0) (1/1)

Espèce pélagique régulièrement visible des côtes. Se reproduit à l'extrême nord de l'Europe et jusqu'au Spitzberg.

Visible le reste de l'année dans tout l'Atlantique Nord et, plus rarement, en Méditerranée.

La Celle-sur-Loire (58) : 1 individu le 30 décembre 2012 (M. Jouve)

Première donnée homologuée depuis la création du CHR et première mention pour la Nièvre. C'est assurément le labbe le plus rare à l'intérieur des terres.



GOÉLAND ARGENTÉ - DIJON (21) - 13 FÉVRIER 2012 (ANTOINE ROUGERON).

LARIDAE

Goéland argenté - *Larus argentatus* (12/12) (11/10)

La sous-espèce nominale se répartit de la Scandinavie à la péninsule de Kola (Russie). De l'Europe occidentale à l'Islande, c'est la sous-espèce "argenteus" qui se reproduit.

Marnay (71) : 1 individu de 2^e année le 30 janvier 2012 (P. Gayet)

Dijon (21) : 1 individu de 2^e année du 8 au 14 février 2012 (A. Rougeron et al.) puis

Saint-Marcel (71) du 22 au 25 février 2012 (P. Gayet)

Chalon-sur-Saône / Saint-Marcel (71) : 1 individu de 3^e année du 9 au 12 février 2012 (P. Gayet)

Chalon-sur-Saône / Saint-Marcel (71) : 1 individu de 2^e année du 9 au 26 février 2012 (P. Gayet, J.M. Frolet)

Épervans (71) : 1 individu de 3^e année le 6 janvier 2013 (P. Gayet)

Dijon (21) : 1 individu de 2^e année le 21 janvier 2013 (A. Fleixas)

Épervans / Lux (71) : 1 individu de 2^e année du 14 février au 6 mars 2013 (P. Gayet et al.)

Préty (71) : 1 individu de 2^e année le 21 avril 2013 (P. Gayet)

Saunières / Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu de 2^e année du 24 au 31 mai 2013 (P. Gayet et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 adulte du 24 au 25 mai 2013 (P. Gayet, J.-M. Frolet)

Les années 2012 et 2013 fournissent un nombre élevé de données. L'absence d'observations dans l'ouest de la région est surprenante, mais l'observation d'au moins 4 individus dans l'Yonne début 2015 vient nuancer ce constat.

Goéland pontique - *Larus cachinnans* (7/7) (3/3)

Très proche des Goélands argenté et leucophée, mais récemment reconnu comme une espèce. Nicheur en Europe orientale (pourtour de la mer Noire) et en Asie centrale. Sa récente extension vers l'ouest et une meilleure connaissance des critères de détermination expliquent qu'il soit plus régulièrement contacté en France, en particulier au cours de son hivernage.

Saint-Marcel (71) : 1 adulte le 27 janvier 2013 (P. Gayet, L. Joly)

Saint-Marcel (71) : 1 individu de 3^e année du 20 février au 3 mars 2013 (P. Gayet et al.)

Saint-Marcel (71) : 1 individu de 3^e année le 25 février 2013 (P. Gayet)

Succession inédite de trois oiseaux en un mois sur le même site. Les 10 données homologuées par le CHR proviennent toutes de la darse de Saint-Marcel, sans aucun doute le haut-lieu de l'observation des laridés rares en Bourgogne.



Mouette tridactyle - *Rissa tridactyla* (9/26) (1/1)

La Mouette tridactyle niche sur les falaises des côtes de la façade atlantique. Inféodée au milieu marin.

Magny (89) : 1 adulte trouvé mort le 14 février 2014 (A. Bechennec, D. Voillot)

Une seule donnée pour cette espèce pélagique qui n'apparaît à l'intérieur des terres qu'à la suite de forts coups de vent provenant de l'Atlantique. Les individus concernés sont alors rarement en bonne santé, et connaissent souvent la même fin que celui trouvé dans ce contexte inattendu du nord du Morvan.

Sterne hansel - *Gelochelidon nilotica* (14/21) (4/9)

Outre le Bassin méditerranéen, l'espèce est également présente en mer Noire et en petit nombre en mer du Nord. En France, elle a quasiment disparu de la Camargue et c'est un site dans l'Hérault qui accueille le gros des effectifs.

Pontoux (71) : 2 adultes le 30 juin 2012 (J.-M. Frolet)

Épervans (71) : 1 adulte le 7 mai 2013 (A. Révillon)

Saunières (71) : 4 adultes le 15 juin 2013 (L. Joly)

Couternon (21) : 2 adultes le 18 mai 2014 (J.-P. Couasné)

L'espèce semble devenir régulière dans le sud-est de la région au printemps mais ses apparitions restent brèves.

Sterne caspienne - *Hydroprogne caspia* (4/6) (2/2)

Nicheuse sur le littoral de la Baltique, en Europe de l'Est et, depuis quelques années, en Camargue. Elle hiverne en Afrique.

Saint-Didier-sur-Arroux (71) : 1 individu le 27 juin 2012 (O. Léger)

Véron (89) : 1 adulte ou subadulte le 18 avril 2014 (F. Bouzendorf)

Les nicheurs scandinaves survolent probablement la région chaque printemps et chaque automne, mais leurs stationnement sont suffisamment rares et brefs pour que leur observation reste irrégulière et imprévisible.

Guifette leucoptère - *Chlidonias leucopterus* (7/8) (5/12)

Cette guifette a une répartition plutôt orientale et est irrégulièrement répandue en Europe de l'Est. Sur son trajet migratoire depuis l'Afrique tropicale, elle apparaît en Europe occidentale surtout au printemps de façon rare et irrégulière.

Athée (21) : 2 adultes le 29 avril 2013 (G. Bedrines et al.)

Baugy (71) : 3 individus le 1^{er} mai 2013 (B. Dury)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 adulte le 11 mai 2013 (P. Gayet)

Préty (71) : 1 individu le 1 juin 2013 (G. Échalier, D. Perreau)

Nevers (58) : 1 adulte le 5 mai 2014 puis 3 à 5 individus les 6 et 7 mai (C. Paillet et al.)

Deux printemps consécutifs exceptionnels pour cette espèce avec 7 individus en 2013 et au moins 5 en 2014. L'espèce n'est pas annuelle en Bourgogne.

Sterne caugék - *Sterna sandvicensis* (3/6) (2/3)

Se reproduit ça et là sur les côtes et îles de la Baltique, du Danemark, de l'Allemagne, de la Hollande, de Grande-Bretagne et de l'Irlande. En France, elle niche essentiellement au banc d'Arguin, en Gironde (54 % des effectifs nicheurs), en Bretagne (23 %) et sur le littoral méditerranéen (14 %). Rare à l'intérieur des terres.

Saint-Marcel (71) : 2 individus le 30 avril 2012 (P. Gayet)

Fourchambault (58) : 1 adulte le 11 avril 2013 (J.-L. Sydney)

Espèce d'apparition toujours aussi rare et imprévisible. Les oiseaux observés ne stationnent jamais plus de quelques heures.

Sterne arctique - *Sterna paradisaea* (3/3) (1/1)

Nicheuse en Islande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, jusqu'en Scandinavie et en Asie, au nord du cercle polaire. Nicheuse occasionnelle sur des îlots sableux ou rocheux du nord-ouest de la France (2-3 couples en 2006). Rare à l'intérieur des terres.



STERNE ARCTIQUE - DIJON (21) - 16 MAI 2014 (GEORGES BEDRINES).

Dijon (21) : 1 adulte du 16 au 18 mai 2014 (A. Rougeron, C. Lanaud, P. Lacroix et al.)

Séjour remarquable pour cette espèce qui, au printemps, fait en général des apparitions très brèves. Un suivi plus régulier des grands plans d'eau permettrait sans doute d'augmenter la fréquence des observations. En effet, l'espèce est observée régulièrement à cette période dans l'ouest de la Lorraine (lac de Madine).

CORACIIDAE

Rollier d'Europe - *Coracias garrulus* (5/6) (2/2)

Nicheur en Afrique du Nord, en Europe et en Asie Mineure jusqu'au sud-ouest de la Sibérie. Nicheur rare confiné aux départements méditerranéens. La France abrite un petit millier de couples.

Sermoise (58) : 1 individu le 5 mai 2013 (L. Robert)

Étormay (21) : 1 individu de 1^{re} année du 17 au 27 août 2014 (C. Durlet, B. Ravenet et al.)

Cette espèce méditerranéenne reste rare en Bourgogne, et jamais observée dans l'Yonne. Notons le long séjour de l'oiseau de Côte-d'Or, ce qui n'est pas inhabituel lors de la dispersion post-nuptiale en août.

MOTACILLIDAE

Pipit de Richard - *Anthus richardi* (1/1) (1/1)

Cette espèce ne niche pas dans le Paléarctique occidental, mais est originaire de

Sibérie et d'Asie centrale. Hivernant rare, mais régulier, notamment dans la plaine de la Crau où quelques individus sont contactés chaque année, au point que le CHN l'a retiré des espèces soumises à homologation le 1^{er} janvier 2006.

Artaix (71) : 1 individu du 29 au 30 décembre 2012 (B. Dury)

Deuxième donnée homologuée pour cette espèce sibérienne. L'oiseau aura peut-être passé une partie de l'hiver dans le secteur. Les effectifs hivernants en France, en augmentation ces dernières années, se répartissent habituellement le long des côtes méditerranéennes et atlantiques.

Pipit à gorge rousse - *Anthus cervinus* (7/12) (1/1)

Niche du nord de la Scandinavie à l'Alaska et dans toute la partie nord de la Sibérie. En France, c'est un migrateur rare mais régulier, surtout dans la moitié est du pays.

Busserotte-et-Montenaille (21) : au moins 1 adulte le 3 septembre 2014 (C. Pollyn-Millot)

Seulement une donnée pour cette espèce orientale qui reste très rare en Bourgogne, et même exceptionnelle dans l'Yonne et dans la Nièvre.

Bergeronnette de Yarrell - *Motacilla alba yarrelli* (8/9) (6/6)

Il s'agit de la sous-espèce des îles Britanniques. Nicheuse très rare en France, sur la frange nord-ouest du pays. Hivernante et migratrice relativement commune dans la moitié ouest du pays.

Gurgy (89) : 1 mâle le 20 avril 2008 (S. Rolland)

Athée (21) : 1 femelle le 10 mars 2012 (A. Rougeron)

Germigny (58) : 1 mâle du 18 au 21 mars 2012 (S. Merle)

Charrette (71) : 1 individu le 29 décembre 2012 (J.-M. Frolet)

Tailly (21) : 1 mâle le 1^{er} mars 2013 (L. Joly)

Tailly (21) : 1 mâle du 12 au 19 mars 2013 (B. Fontaine)

Marzy (58) : 1 mâle le 13 mai 2014 (S. Merle)

Cette sous-espèce semble pouvoir être observée régulièrement en période de migration dans toute la région, au moins au printemps où



11^e rapport du CHR

son identification est relativement aisée. La donnée hivernale de Saône-et-Loire est en revanche inattendue.

PRUNELLIDAE

Accenteur alpin - *Prunella collaris* (15/25) (5/10)

En France, on trouve l'espèce nicheuse dans l'arc alpin, les Pyrénées, en Corse et localement dans le Massif central et les Vosges. L'Accenteur alpin hiverne à plus basse altitude dans les milieux rocheux.

Baulme-la-Roche (21) : 2 individus le 11 avril 2012 (G. Bedrines)

Baubigny (21) : 1 individu du 18 au 19 avril 2012 (B. Fontaine)

Messigny-et-Vantoux (21) : 1 individu le 18 mars 2013 (F. Spinnler)

Saint-Romain (21) : 1 individu le 6 avril 2013 (L. Joly)

Vergisson (71) : 5 individus le 4 mai 2013 (P. Mourier et al.)

Localités classiques à des dates exclusivement printanières. L'espèce est-elle réellement présente surtout au printemps ou est-elle peu détectée en hiver, période où les observateurs préfèrent visiter les plans d'eau ?

SYLVIIDAE

Bouscarle de Cetti - *Cettia cetti* (1/1) (5/9)

Espèce sédentaire d'affinité méditerranéenne dont la présence en Bourgogne est devenue anecdotique suite aux hivers rigoureux du milieu des années 1980. Seuls les bords de Loire dans la Nièvre accueillent encore régulièrement des chanteurs cantonnés.

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 5 au 6 octobre 2011 (F. Bouzendorf, A. Rolland, S. Vincent)

Tracy-sur-Loire (58) : 1 individu du 10 mai au 27 juillet 2012 (J. Pitois)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le 28 septembre 2012 (F. Bouzendorf et al.)

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 chanteur le 24 juin 2013 (J. Pitois)

Tracy-sur-Loire (58) : au moins 4 chanteurs du 1^{er} mars au 19 octobre 2014 (J. Pitois et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 2 individus du 13 septembre 2014 au 8 mars 2015 (F. Bouzendorf et al.)

Toutes les données proviennent de la marge ouest de la région, et notamment des bords de Loire où l'espèce niche encore en petit nombre. Les données icaunaises semblent être les prémices d'une installation nouvelle puisque le site où les 3 données récentes ont été obtenues a accueilli au moins un oiseau jusqu'en mars 2015, alors qu'un autre oiseau a stationné sur un ancien secteur de nidification à la même période. Aucun n'a cependant été revu par la suite.

Locustelle luscinoïde - *Locustella luscinioides* (4/6) (6/6)

Espèce nicheuse du nord-ouest de l'Afrique et de l'Europe jusqu'à l'ouest de la mer d'Azov, elle fréquente principalement les roselières. Passage migratoire très discret.

Larrey (21) : 2 individus de 1^{re} année, le 16 puis le 23 août 2013 (J. Pitois et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu de 1^{ère} année le 27 septembre 2013 (F. Bouzendorf et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le 8 juillet 2014 (F. Bouzendorf)

Larrey (21) : 1 individu de 1^{re} année le 8 août 2014 (J. Pitois et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 6 au 7 septembre 2014 (F. Bouzendorf et al.)

Des données inédites du camp de baguage de l'Yonne viennent s'ajouter aux données maintenant classiques fournies par le baguage à l'étang de Marcenay. La seule donnée obtenue hors baguage, en juillet 2014, dans l'Yonne, pourrait concerner une reproduction. C'est d'autant plus remarquable que l'espèce est actuellement considérée comme nicheuse éteinte en Bourgogne.

Lusciniole à moustaches - *Acrocephalus melanopogon* (0/0) (1/1)

Niche de l'Espagne au Kazakhstan. Les populations européennes, d'affinité méditerranéenne, sont sédentaires hormis les populations d'Europe centrale et d'Ukraine. Les apparitions de cette espèce au nord de son aire de reproduction sont donc extrêmement rares en Europe de l'Ouest.



LUSCINIOLÈ À MOUSTACHES - SAINT-JULIEN-DU-SAULT (89) - 10 MARS 2014
(FRANÇOIS BOUZENDORF).

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 9 au 15 mars 2014 (J.-M. Guilpain, F. Bouzendorf et al.)

Première mention régionale inattendue ! Il s'agirait seulement de la quatrième mention française en dehors du littoral méditerranéen et de la vallée du Rhône (Dubois et al., 2008). Étant donnée la faible capacité de dispersion des nicheurs du sud de la France, il est plus probable que cet oiseau provienne des populations migratrices d'Europe centrale ou orientale. L'analyse isotopique d'une rectrice prélevée sur lors de la capture de l'oiseau apportera peut-être des éléments de réponse à ce sujet (Bouzendorf et Guilpain, 2015).

Phragmite aquatique - *Acrocephalus paludicola* (2/2) (2/2)

Nicheur en milieu marécageux (zone de cariçaies, végétation rase) dont le principal bastion se situe à l'est de la Pologne. Il figure parmi les passereaux les plus rares et les plus menacés d'Europe. En France, il est bien connu lors de sa migration postnuptiale en août sur le littoral. Il reste exceptionnel dans les terres.

Larrey (21) : 1 individu de 1^{re} année le 20 août 2013 (J. Pitois et al.)

Verjux (71) : 1 individu de 1^{re} année du 8 au 10 septembre 2013 (B. Grand, J.-M. Frolet)

Troisième et quatrième données homologuées dont la première hors opération de baguage. Cette espèce est sans doute annuelle dans les secteurs favorables mais reste très difficile à détecter.

Rousserolle verderolle - *Acrocephalus palustris* (15/38) (8/24)

Se reproduit en Europe centrale et orientale, surtout. Mais, elle atteint au nord le sud de la Scandinavie et s'étend vers l'est à travers la Russie jusqu'au cours supérieur de la Volga et en Transcaucasie en Asie.

Foissy-sur-Vanne / Molinons (89) : 4 chanteurs le 31 mai 2011 (F. Bouzendorf)

Fontaine-Française (21) : 1 individu le 28 mai 2012 (G. Bedrines et al.)

Foissy-sur-Vanne / Molinons (89) : 4 chanteurs du 31 mai au 29 juin 2012 (F. Bouzendorf, S. Rolland)

Chalon-sur-Saône (71) : 1 individu le 14 juin 2012 (A. Révillon, P. Aghetti)

Larrey (21) : 3 individus de 1^{re} année et 2 adultes du 2 au 14 août 2012 (J. Pitois et al.)

Foissy-sur-Vanne / Molinons (89) : 5 chanteurs le 27 mai 2013 (F. Bouzendorf)

Pontoux (71) : 1 individu le 29 mai 2013 (A. Révillon)

Localité tenue secrète (89) : 1 individu le 25 juin 2013 (S. Rolland)

Larrey (21) : 5 individus de 1^{re} année, dont 1 le 15, 2 le 16 et 2 le 21 août 2013 (J. Pitois et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 2 individus de 1^{re} année le 9 septembre 2013 (F. Bouzendorf, S. Rolland et al.)

Larrey (21) : 1 adulte le 6 août 2014 puis 2 individus de 1^{re} année les 11 et 19 août 2014 (J. Pitois et al.)

Les trois données du nord de l'Yonne concernent le seul site de nidification régulier connu pour la région, découvert en 2011. Il faut toutefois savoir que la quasi-totalité de l'habitat fréquenté par l'espèce sur ce site était détruit au printemps 2015...



11^e rapport du CHR

Pouillot à grands sourcils - *Phylloscopus inornatus* (1/1) (2/2)

Niche en Sibérie de l'Oural septentrional jusqu'à la mer d'Okhotsk. En France, migrateur très rare sur le littoral Manche-Atlantique, très occasionnel ailleurs. Hivernant exceptionnel.

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu de 1^{re} année du 28 au 30 septembre 2013 (F. Bouzendorf et al.)

Spoys (21) : 1 individu le 14 octobre 2014 (G. Bedrines)



POUILLOT À GRANDS SOURCILS - SPOYS (21) - 14 OCTOBRE 2014
(GEORGES BEDRINES).

Deux nouvelles données pour cette espèce sibérienne de plus en plus régulière à l'intérieur des terres. Fait marquant : l'espèce a de nouveau été capturée sur le site de baguage icaunais, 2 ans après la première donnée régionale. Enfin, la donnée de 2014 constitue la première observation régionale hors baguage.

Pouillot véloce de Sibérie - *Phylloscopus collybita tristis* (4/6) (1/1)

L'appellation "de type sibérien" concerne les sous-espèces *Phylloscopus collybita tristis* (Sibérie), *P.c. abietinus* (de la Scandinavie à l'Oural) et *P.c. fulvescens* (forme intermédiaire), toutes trois d'identifications très délicates. Migrateurs (fin d'automne) et hivernants rares en France.

Champdotre (21) : 1 individu le 25 octobre 2014 (A. Rougeron)

Seulement une donnée en 3 ans pour cette sous-espèce sibérienne délicate d'identification, alors qu'elle avait été observée à 4 reprises entre 2007 et 2011.

TIMALIIDAE

Panure à moustaches - *Panurus biarmicus* (1/3) (1/2)

Niche dans les régions marécageuses d'Europe, de l'Espagne à la Grèce et au Caucase. Plutôt sédentaire et donc rarement notée en dehors des zones de nidification.

Larrey (21) : 1 mâle et 1 femelle le 13 décembre 2014 (C. Durlet, B. Ravenet)

C'est seulement la deuxième donnée homologuée depuis la création du CHR, de nouveau dans le nord de la région.

REMIZIDAE

Rémiz penduline - *Remiz pendulinus* (50/312) (0/0)

Cette espèce se reproduit à travers toute l'Europe, de la Russie à la péninsule Ibérique. Nicheuse très rare en France, migratrice et hivernante peu commune.

Saint-Julien-du-Sault (89) : 10 individus du 28 septembre au 8 octobre 2010 (F. Bouzendorf, E. Bouzendorf et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 4 individus du 18 mars au 1^{er} avril 2011 (F. Bouzendorf)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 32 individus du 28 septembre au 30 octobre 2011 (F. Bouzendorf, M. Bonnet et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 15 individus dont 3 mâles et 1 femelle adultes et 4 individus de 1^{re} année le 1^{er} octobre 2011 (S. Rolland, F. Bouzendorf et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le 2 octobre 2011 (S. Rolland, F. Bouzendorf)

Cette espèce n'est plus homologable depuis 2012. Il s'agit ici de données antérieures qui n'avaient pas encore été soumises au CHR. Les passages pré-nuptial et post-nuptial de l'espèce sont maintenant bien connus et réguliers, notamment dans l'Yonne.



11^e rapport du CHR

CERTHIDAE

Grimpereau des bois - *Certhia familiaris* (1/1) (1/1)

En France, l'espèce est présente en Montagne ou en Bretagne et Normandie.

Longvic (21) : 1 individu le 21 novembre 2010 (P. Vernet, M. Dupuy)

C'est seulement la deuxième donnée homologuée pour cette espèce qui était jusqu'à récemment considérée comme exceptionnelle en Bourgogne. Une petite population reproductrice a été découverte en 2012 par G. Bedrines, dans l'est de la Côte-d'Or. Depuis lors, des données ont été obtenues sur une vingtaine de communes, la quasi-totalité se trouvant au nord-est de Dijon.

Ces oiseaux appartiennent à la population franc-comtoise voisine, qui s'étend en plaine en Haute-Saône, et dans le Jura jusqu'à la frontière bourguignonne. Bien que non soumises au CHR, ces données sont pour la plupart bien documentées (photos et enregistrements) et montrent que les oiseaux bourguignons présentent une coloration similaire à celle des oiseaux du massif du Jura.

CORVIDAE

Grand Corbeau - *Corvus corax* (5/9) (4/7)

Cette espèce fréquente les montagnes, falaises et côtes rocheuses, en France, essentiellement sur le littoral atlantique et dans les massifs montagneux. L'espèce qui fréquente le Massif jurassien à proximité semble s'installer à présent en Bourgogne.

Tellecey (21) : 1 individu le 3 janvier 2012 (S.-P. Babski)

Baulme-la-Roche (21) : 2 individus du 30 mars au 11 avril 2012 (G. Bedrines)

Val Suzon (21) : 1 individu le 7 avril 2012 (P. Soufflot et al.)

Nanton (71) : 3 individus le 22 avril 2013 (A. Révillon, J. Devevey)

Espèce en expansion qui semble s'installer en Saône-et-Loire et sans doute prochainement en Côte-d'Or, si l'on se fie à la fréquence actuelle des observations dans ce département.

EMBERIZIDAE

Bruant des neiges - *Plectrophenax nivalis* (2/2) (2/3)

Cette espèce niche dans les montagnes du nord de l'Écosse, en Scandinavie et en Finlande septentrionale, dans le nord de la Russie et de la Sibérie et dans les îles de l'océan glacial Arctique.

Saint-Florentin (89) : 2 individus le 19 octobre 2008 (S. Rolland et al.)

Viviers (89) : 1 individu le 16 novembre 2010 (F. Bouzendorf, S. Mongeot)

Troisième et quatrième données homologuées depuis 2000. Cette espèce reste très occasionnelle dans la région. La période idéale pour la rechercher est la fin d'automne, fin octobre et en novembre.

Bruant fou - *Emberiza cia* (20/55) (6/27)

La forme nominale de ce bruant occupe le pourtour méditerranéen. En France, il préfère les milieux ensoleillés de moyenne montagne à végétation rase (Vosges, Alpes, Massif central Pyrénées et pourtour méditerranéen).

Nolay (21) : jusqu'à 5 individus dont au moins 1 de 2^e année entre le 17 janvier et le 18 février 2012 (A. Rougeron, B. Fontaine, D. Guizon et al.)

Joudes (71) : 8 individus le 28 janvier 2012 (S. Cœur)

Saint-Mard-de-Vaux (71) : 1 mâle le 31 janvier 2012 (P. Aghetti)

Culles-les-Roches (71) : 1 individu du 1 au 8 novembre 2012 (A. Révillon, S. Mezani)

Nolay (21) : 1 individu le 25 novembre 2012 (D. Guizon)

Culles-les-Roches (71) : 5 individus le 30 janvier 2013 (A. Révillon, P. Aghetti)

Saint-Mard-de-Vaux (71) : 7 individus dont au moins 1 mâle du 31 janvier au 8 février 2013 (P. Aghetti)

Des données hivernales classiques, sur le site traditionnel de Côte-d'Or et dans plusieurs localités de Saône-et-Loire. L'espèce n'est sans doute pas si rare dans cette partie de la Bourgogne en hiver. Des recherches en période de reproduction, autour des sites d'hivernage notamment, pourraient réserver des surprises. Rappelons que l'espèce a été contactée dans le sud de la Côte-d'Or en période de reproduction en 2011.



Données non homologuées par le CHR

2011

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* : Marzy (58) - 1 individu de 1^{re} année le 24 septembre 2011 (identification basée uniquement sur la combinaison classique de la longueur d'aile et du notch, toutefois insuffisante dans ce cas car la valeur obtenue est très proche de la zone de chevauchement avec l'effarvate; des mesures complémentaires et des photos auraient pu permettre de trancher)

2012

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* : Arc-sur-Tille (21) - 1 femelle le 17 décembre 2012 (description réduite et photo montrant une coloration des parties inférieures et des sous-caudales troublantes, l'éventualité d'un hybride n'a pas pu être exclue)

Macreuse noire *Melanitta nigra* : Rignysur-Arroux (71) - environ 40 individus le 9 juillet 2012 (la coloration notée oriente effectivement vers cette espèce, plus précisément vers des mâles adultes, mais le reste de la description n'apporte pas d'élément complémentaire solide; la date et l'effectif, exceptionnels pour la région, incitent également à la prudence)

Macreuse brune *Melanitta fusca* : Marnay (71) - 1 individu le 23 février 2012 (description qui va dans le bon sens mais malheureusement insuffisante pour écarter d'autres espèces de canards plongeurs de coloration sombre)

Faucon kobez *Falco vespertinus* : Santenay (21) - 1 mâle immature le 17 juin 2012 (description réduite ne comportant pas d'élément permettant d'exclure d'autres espèces de faucons)

Barge rousse *Limosa lapponica* : Saint-Fargeau (89) - 2 individus le 4 avril 2012 (la description ne permet pas d'exclure la Barge à queue noire)

Goéland pontique *Larus cachinnans* : Chalon-sur-Saône (71) - 1 individu de 2^e année du 13 au 14 février 2012 (certains critères ne correspondent pas bien à ce que l'on attendrait chez cette espèce, ne permettant pas d'exclure un éventuel hybride par exemple)

Goéland pontique *Larus cachinnans* : La Clayette (71) - 1 adulte le 9 décembre 2012 (l'identification du Goéland pontique adulte est particulièrement difficile, et toute donnée mérite une documentation fournie pour pouvoir être évaluée objectivement; ici, les critères observés vont dans le bon sens mais restent insuffisants pour conclure avec certitude)

Sizerin flammé boréal *Carduelis flammae flammae* : Toucy (89) - 2 individus du 10 au 27 février 2012 (à cette date, la sous-espèce flammae a une coloration nettement plus froide que celle décrite)

2013

Fuligule milouinan *Aythya marila* : Rouvres-en-Plaine (21) - 1 mâle le 16 novembre 2013 (description pas assez complète, un hybride ne peut être exclu)

Cigogne noire *Ciconia nigra* : Jaulges (89) - 1 individu le 13 janvier 2013 (observation très brève ne permettant malheureusement pas d'avoir une description suffisamment étoffée)

Aigle royal *Aquila chrysaetos* : Aisey-sur-Seine (21) - 1 individu le 18 février 2013 (il s'agit certainement d'un grand rapace appartenant à une espèce rare en Bourgogne, mais la description ne permet pas d'aller plus loin)

Busard pâle *Circus macrourus* : Saints (89) - 1 mâle adulte le 24 mai 2013 (pas d'éléments de jizz et parties inférieures non décrites, description du dessus pas assez précise voire contradictoire avec l'identification proposée)

Busard pâle *Circus macrourus* : Digoïn (71) - 1 mâle adulte le 28 août 2013 (description manquant de précision, la coloration blanche du dessus ne correspond pas : elle est gris pâle chez les mâles adultes)

Pluvier doré septentrional *Pluvialis apricaria albifrons* : Saunières (71) - 1 adulte le 25 juin 2013 (l'identification des sous-espèces du Pluvier doré n'est a priori pas envisageable sur le terrain étant donné la variabilité de coloration interindividuelle)

Goéland pontique *Larus cachinnans* : Saint-Marcel (71) - 1 individu de 2^e année du 23 janvier au 3 mars 2013 (certains critères ne correspondent pas bien à ce que l'on attendrait chez cette espèce, ne permettant pas d'exclure un éventuel hybride par exemple)



11^e rapport du CHR

Martinet pâle *Apus pallidus* : Chalon-sur-Saône (71) - 1 individu le 7 novembre 2013 (observation très brève ne permettant malheureusement pas d'avoir une description solide)

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* : Larrey (21) - 1 individu de 1^{re} année le 17 août 2013 (mesures de l'aile non discriminantes, pas d'autre critère pour supporter l'identification)

Grand Corbeau *Corvus corax* : La-Chapelle-sous-Brancion (71) - 4 individus le 3 avril 2013 (aucune description des oiseaux)

2014

Busard pâle *Circus macrourus* : Lays-sur-le-Doubs (71) - 1 individu de 1^{re} année le 19 sep-

tembre 2014 (le pattern de la tête qu'on aperçoit sur les photos va dans le bon sens, mais l'absence de description ne permet pas d'avoir d'élément d'identification complémentaire)

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : Tracy-sur-Loire (58) - 1 individu le 6 mars 2014 (oiseau seulement entendu et chant non décrit)

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* : Larrey (21) - 1 individu de 1^{re} année le 3 août 2014 (mesures de l'aile non discriminantes, pas d'autre critère pour supporter l'identification)

Pouillot véloce de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* : Taily (21) - 1 individu le 23 novembre 2014 (description manquant de précision pour un taxon d'identification très délicate)

SIMON ROLLAND & LE CHR.

Bibliographie

- BOUZENDORF F., DAGNAS P. & LE CHR - 2010 - Les oiseaux rares en Bourgogne : 8^e rapport du CHR. *Nature Nièvre* 18 : 13-23.
- BENMERGUI M., CHAZAL R., LENGAGNE T., GAUET G., CROUZIER P., CROUZIER M. - 2012. Un premier cas de reproduction réussie du Cygne chanteur *Cygnus cygnus* en France. *Ornithos* 20-6.
- BOUZENDORF F., GUILPAIN J.M. - 2015 - Capture d'une Lusciniole à moustaches *Acrocephalus melanopogon* dans l'Yonne, Bourgogne. *Ornithos* 22-4 : 224-226.
- CROSET F., THIOLLAY J.M. - 2007 - Nidification réussie du Grèbe jougris *Podiceps grisegena* au lac d'Orient, Aube. *Ornithos* 14 : 320-321.
- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. YÉSOU P. - 2008 *Nouvel Inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.*
- KAYSER Y., GAUTHIER-CLERC M., PAZ L., BALLESTEROS M., BAUDOUIN S., PETIT J. - 2006 - Nouveaux cas de nidification de l'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* en Camargue en 2006. *Ornithos* 13-5 : 322-325.
- HELANDER B. - 2003 - The international colour ringing programme – adult survival, homing and the expansion of the white-tailed sea eagle in Sweden. In: HELANDER B., MARQUISS M., BOWERMAN B. (Eds). *SEA EAGLE 2000. Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm*, pp. 145-154.
- TOSTAIN O., DU PLESSIX H., SIBLET J.P. - 1979 - Première nidification du Grèbe jougris en région parisienne. *Le Passer* 16 : 89-90.

Typographie et mise en pages :
MAURICE LARTIGUE,
membre bénévole de la LPO Yonne.

