



Les oiseaux rares en Région Centre en 2005

1^{er} rapport du Comité d'Homologation Régional Centre

NIDAL ISSA & le CHR Centre

Le Comité d'Homologation Régional a pour objet de récolter des données circonstanciées d'espèces rares et occasionnelles en Région Centre, afin de préciser leur statut à l'échelle régionale. Ces observations donnent lieu à la rédaction d'un rapport, mis à disposition de l'ensemble de la communauté ornithologique tant régionale que nationale. Le CHR Centre collecte, centralise et transmet également les observations régionales, d'espèces rares au plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Cela se matérialise chaque année par la publication d'un rapport annuel dans la revue d'ornithologie française *Ornithos*.

Ce premier rapport du Comité d'Homologation Régional pour la région Centre (CHR Centre) couvre l'année 2005. Le nombre de fiches examinées par le CHR pour l'année 2005 est de 154. Le taux d'acceptation atteint 98%, reflétant la qualité rédactionnelle des fiches qui nous sont parvenues au cours de cette année.

En 2006, le CHR Centre était composé des 9 membres suivants : Renaud Baeta, Jean-Yves Barnagaud, Pierre Cabard, Jean-Michel Chartendault, Nidal Issa (secrétaire), Alexandre Liger, Julien Présent, Julien Thurel et Tony Williams.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

Les données sont présentées comme suit :

1. La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique.
2. Noms français et scientifique.
3. Entre parenthèses, les chiffres représentent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus correspondant homologués en 2005.
4. Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
5. Commune, lieu-dit, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
6. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
7. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
8. Date(s) d'observation.
9. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 2003).
11. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Tichodrome échelette - un adulte à Bourges, Cher, du 12 décembre au 26 février 2006 (P. d'Orléans, F. Besson, P. Derrien, A. Liger & al., in Issa & al. 2006).

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (2/2)

Niche dans les fjords, les lacs et étangs des zones boréales et subarctiques jusqu'au 83° Nord. En Europe, la zone de reproduction s'étend de la Scandinavie à la Sibérie, en Islande et en Ecosse. Hivernent le long des côtes et estuaires de l'Europe occidentale et du sud, à l'est jusqu'à la mer Noire.

Indre-et-Loire - Saint-Avertin/Lac des Peupleraies, ad., 22 et 23 novembre (L. Le Gal., J. Présent, C. Rigoux).

Loiret - Darvoy/Sablrière, 1^{er} hiver, phot., 21 au 23 janvier (B. & P. Delahaie, P. Derland).

Les deux oiseaux ont été notés sur des étangs artificiels jouxtant des cours d'eau, sites que semblent affectionner les gaviidés lors de leurs haltes migratoires en Région Centre.

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica* (1/1)

Niche dans le Paléarctique occidental sur les lacs de la toundra et la taïga boréale, de la Scandinavie à la Sibérie, à l'est jusqu'au fleuve Lena. Hivernent le long des côtes de la mer Baltique jusqu'au Portugal, au sud dans l'Adriatique, sur la mer Noire et la mer Caspienne à l'est.

Loiret - Châteauneuf-sur-Loire/Loire, 1^{er} hiver, phot., 23 au 27 novembre (J. Thurel, V. De Wilde, J.-Y. Barnagaud & al.).

Une seule donnée à une date classique, reflétant la constante rareté de l'espèce.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (1/1)

Zone de répartition Néarctique. Dans le Paléarctique, niche uniquement en Islande et sur l'île de Bear. Hiverné le long des côtes du nord de la Scandinavie, de Grande-Bretagne, la mer du Nord, au sud jusqu'au Portugal.

Loiret - Châteauneuf-sur-Loire/Pont, 1^{er} hiver, phot., 18 décembre au 02 avril 2006 (G. Monchaux, J. Thurel, V. De Wilde).

La portion de Loire de Châteauneuf a accueilli durant l'automne deux espèces de plongeurs. L'hivernage complet de cet individu est tout à fait remarquable, l'espèce étant connue pour la brièveté de ses stationnements à l'intérieur des terres.



GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (1/1)

Dans le Paléarctique occidentale, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hiverné principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la mer Noire et de l'Adriatique.

Indre - Lingé/Le Gabriau, ad., 27 novembre (P. Cabard, S. Léman & al.)

Donnée conforme au pattern constaté ces dernières années (1 donnée en 2001, 0 en 2002) (Zucca & le CMR, 2005).

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (1/1)

Distribution holarctique. Niche en Islande, Ecosse, Fennoscandie, dans les pays Baltes et en Russie. Hiverné le long des côtes françaises de l'Atlantique, la mer du Nord et Baltique, l'Adriatique et jusqu'à la mer Noire.

Loir-et-Cher - Vernou-en-Sologne/Etang de la Vernotière, ad., 29 mars (A. Pollet).

Cette unique observation est conforme au statut et au pattern d'apparition de cet hivernant maritime.

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (3/3)

Espèce paléarctique nichant en roselière dans l'ensemble de l'Europe, où les bastions se situent essentiellement à l'est, en Pologne, Ukraine et Russie. Les populations d'Europe occidentale sont partiellement migratrices, celles d'Europe orientale et de Russie hivernent au Moyen-Orient, sur le bassin méditerranéen et en Afrique.

En dehors de l'Indre.

Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire/Ile Courtemanche, 05 mars (J. Présent).

Loiret - Ingrannes/Etang de Centimaison, 23 janvier (V. De Wilde) ; Vitry-aux-Loges/Etang de la Vallée, ad., 26 novembre au 25 décembre (G. Monchaux)

Trois données, c'est peu compte tenu la multitude de milieux favorables dans les différents départements.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (2/2)

Niche en Europe continentale au sud de 59° de latitude nord, à l'est jusqu'en Irak, en Iran, au Pakistan et au Bhoutan. Les populations européennes hivernent principalement en Afrique de l'est, au Soudan et en Ethiopie, à l'ouest jusqu'à la République Démocratique du Congo.

En dehors de l'Indre.

Loiret - Ingrannes, mâle ad., 20 et 21 juin (J. Thurel) ; Combreux, mâle ad., 30 juin au 06 juillet (J. Thurel).

Nicheur rare en France, deux oiseaux chanteurs sont détectés en période de nidification sur des étangs du Loiret, mais la reproduction n'a pu être mise en évidence. Affaire à suivre...

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (2/2)

Niche dans le bassin méditerranéen, sur le pourtour de la mer Noire et de la mer Caspienne, et en petit nombre en Afrique du Nord.

Indre - Rosnay/Etang du Blizon, ad., phot., 03 juillet (D. Laloi, N. Norden) ; Mézières-en-Brenne/Etang Piégu, 29 septembre (M. Prévost).

Les quelques couples nicheurs de la région se cantonnant à la Brenne, c'est tout naturellement à l'Indre que reviennent les deux seules mentions de l'année.



SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (5/10)

Dans le Paléarctique, niche au nord du 55° N, en France, Espagne, Pays-Bas, en Europe orientale, à l'est jusqu'à la mer Caspienne. Les populations européennes hivernent sur le pourtour méditerranéen et au nord de l'Afrique tropicale.

Indre - Mézières-en-Brenne/Etang de Saint-Georges, 2 ad., 12 avril (M. Prévost) ; Lingé/Etang de la Gabrière, 1 ad. et 1 juv., 26 octobre (M. Prévost) ; Lingé/Etang de la Gabrière, 2 ad., phot., 07 novembre (P. Cabard, J.-M. Thibault).

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 3 juv., phot., 30 septembre (S. Reverdiau).

Loiret - Saint-Benoît-sur-Loire/ Châteauneuf-sur-Loire/Darvoy/Saint-Agnan-le-Jaillard/Lion-en-Sullias, juv., 15 octobre au 29 décembre (G. Monchaux, J. Thurel, V. De Wilde).

Le séjour prolongé d'un immature dans le Loiret tranche avec la brièveté des stationnements des oiseaux de passage lors de leurs haltes migratoires.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis* (1/1)

Niche dans toute la zone boréale du Paléarctique, de la taïga et de la toundra, depuis le nord de la péninsule Scandinave à l'ouest jusqu'au golfe d'Anadyr, en Sibérie, à l'est. Hivernent en Asie orientale et en Europe du nord, centrale et occidentale, dans les zones humides et les terres agricoles.

En dehors d'Avord (Cher).

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, sous-espèce *rossicus/serrirostris*, 10 décembre (R. Baeta).

Hot spot pour les oies, Rillé accueille l'unique individu de l'année, dont le séjour fut très bref. Rappelons que 5 oiseaux avaient stationné sur le lac de novembre 2003 à janvier 2004 (Baeta & al., 2004). Sur le site d'Avord où plusieurs dizaines d'oiseaux hivernent régulièrement, un maximum de 68 oiseaux fut noté en février et encore 33 en mars (J.-M. Chartendault & A. Liger comm. pers.).

OIE RIEUSE *Anser albifrons* (8/17)

Niche dans la toundra arctique du nord de la Sibérie, à proximité de plans d'eau. En Europe, une partie de la population hiverne dans la zone de la mer Baltique, comprenant la Hollande, la Belgique, la Grande-Bretagne, à l'ouest jusqu'à la France ; la seconde hiverne dans la partie orientale : ex-Yougoslavie, Albanie, Grèce.

Cher - Avord, 4 ad., 23 janvier (J.-M. Chartendault, A. Liger) ; Avord, 1^{er} hiver, 26 février au 13 mars (J.-M. Chartendault, A. Liger) ; Preuilly/Sablère des Thureaux, ad., 16 novembre (P. Derrien).

Indre - Rosnay/Etang de la Mer Rouge, ad., 18 décembre (R. Bussière).

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 7 ad., 19 novembre (N. Issa).

Loiret - Bonnée/La Grande Viture, ad., 17 décembre (V. De Wilde, G. Monchaux, J. Thurel) ; Darvoy, ad., 30 décembre (J. Thurel).

Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de la Grande Corbois, 1^{er} hiver, 12 novembre (M. Mabileau).

Le passage automnal est ressenti dans l'ensemble des départements à la mi-novembre, puis en décembre. Les stationnements, courts dans leur grande majorité, n'excèdent pas la journée.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (1/1)

Niche à l'est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Il existe également des populations férales en forte augmentation sur quelques îles de la Baltique et aux Pays-Bas. L'aire d'hivernage s'étend de l'Irlande à l'Ecosse et de la Belgique au Danemark.

Cher - Avord, ad., 04 décembre 2004 au 24 janvier (J.-M. Chartendault, A. Liger).

Une seule donnée sur un site classique, accueillant assez régulièrement l'espèce en hivernage. On est toutefois bien loin des 14 individus ayant séjourné sur le site durant l'hiver 2003-2004 (J.-M. Chartendault & A. Liger comm. pers.).

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (2/3)

Se reproduit dans l'Arctique circumpolaire et hiverne le long des côtes maritimes des zones tempérées d'Eurasie et d'Amérique du Nord. Bernicla niche en Sibérie occidentale jusqu'à la péninsule de Taïmyr, hrota au Groenland, au Spitzberg et dans l'Arctique canadien, nigricans de l'île Victoria au Canada jusqu'au nord-est de la Sibérie.

Cher - Bourges/Lac d'Auron, 2 juv., sous-espèce *bernicla*, 02 et 03 décembre (F. Besson, J.-M. Chartendault).

Indre-et-Loire - Chinon, ad., sous-espèce *bernicla*, 09 avril (P. Cabard, L. Le Gal).

Année conforme à la moyenne pour cette oie hivernant sur le littoral et d'apparition rare à l'intérieur des terres.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (2/4)

Niche en Espagne, en France, en Europe centrale, en Anatolie, à l'est de la mer Noire et la mer Caspienne jusqu'en Asie centrale. Migrateur à migrateur partiel, hiverne essentiellement dans les régions du bassin méditerranéen.

En dehors de l'Indre.

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, 2 mâles et 1 fem. ad., 03 mai (J. Présent, C. Rigoux).

Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de Favelle, fem. ad., 13 au 19 février (M. Mabileau).

En dehors des étangs de la Brenne ou quelques dizaines de couples se reproduisent, l'espèce s'aventure peu dans les départements voisins où elle est souvent observée dans les troupes de fuligules milouins.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (8/9)

Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest.

Cher - Avord, mâle ad. et femelle 1^{er} hiver, 26 février (J.-M. Chartendault, A. Liger) ; Précy/Etang Communal, femelle adulte, phot., 13 mars (F. Besson, P. Derrien) ; Précy/Etang Communal, mâle adulte, phot., 12 octobre au 20 novembre (P. Derrien, F. Besson, Y. Dubois, S. Lebreton, J. Thurel).

Indre-et-Loire - Tours/Lac de la Bergeonnerie, femelle 1^{er} hiver, 01 janvier au 08 février (N. Issa, A. Liger, J. Présent, C. Rigoux & al.) ; Le Louroux/Etang, mâle adulte, 02 janvier au 08 mars (N. Issa, J. Présent, A. Liger & al.) ; La Riche/La Potetterie, femelle adulte, 06 mars (L. & D. Sallé) ; Le

Louroux/Etang, femelle adulte, 16 mars (J. Présent & al.) ; Parçay-sur-Vienne/Château de Prézault, mâle 1^{er} hiver, 10 décembre (P. Cabard, L. Le Gal, J. Présent).

Deux départements se partagent l'ensemble des observations en 2005. Les données sont conformes à la moyenne annuelle de ces dernières années (Zucca & al., 2005). Etrangement, aucune donnée ne nous est parvenue de la Brenne.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (4/7)

Dans le Paléarctique occidental, niche en Islande, en Scandinavie et dans le nord de la Russie, à l'est jusqu'au fleuve Lena. Hiverné le long des côtes d'Europe du Nord et occidentale, de l'Adriatique et de la mer Noire.

Cher - Belleville-sur-Loire/ Etang des Grèves, 2 mâle 1^{er} hiver, phot., du 29 janvier au 13 mars (P. Derrien).

Loir-et-Cher - Seigy/Lac des 3 Provinces, mâle et femelle 1^{er} hiver, phot., du 05 janvier au 18 février (A. Pollet, P. Bouineau, F. Pelsy) ; Seigy/Lac des 3 Provinces, mâle et femelle 1^{er} hiver, phot., du 20 novembre au 15 décembre (A. Pollet, P. Bouineau, J-M. Lett) ; Seigy/Lac des 3 Provinces, mâle 1^{er} hiver, phot., 25 novembre au 17 décembre (A. Pollet, P. Bouineau).

Le lac des 3 Provinces a accueilli la quasi-totalité des oiseaux, et ce, lors de deux hivers successifs. Le plumage détaillé de chaque individu a permis de déterminer le nombre exact d'individus ayant fréquenté le site en novembre-décembre.

EIDER A DUVET *Somateria mollissima* (1/1)

Niche sur les côtes du nord-ouest de l'Europe, de la Grande-Bretagne jusqu'à la mer Baltique et la Scandinavie, occasionnellement en France. Migrateur partiel, hiverné le long du littoral d'Europe du Nord et occidentale.

Cher - Belleville-sur-Loire/Etang des Grèves, fem. ad., phot., du 09 au 30 octobre (P. Derrien, F. Besson).

Surprenante et remarquable observation de ce canard marin peu commun en France et occasionnel rare en Région Centre.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (1/2)

Niche dans les régions boréales et arctique du nord de l'Europe, Ecosse, Irlande, Scandinavie et du nord de la Russie, à l'est jusqu'au fleuve Olenek. Hiverné le long des côtes atlantiques du nord de la Scandinavie à la Mauritanie.

Indre-et-Loire - Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Ténières, mâle imm. et fem., 21 mars (Y. Guenescheau, J. Présent).

Ce canard marin est logiquement découvert à la frontière occidentale de la région, sur un site ayant accueilli à plusieurs reprises des migrants atlantiques.

HARLE HUPPE *Mergus serrator* (1/1)

Niche dans les zones boréales et océaniques d'Europe du Nord, d'Islande, de Grande-Bretagne, de Scandinavie, à l'est jusqu'au nord de la Sibérie. Hiverné le long des côtes d'Europe atlantique, de Méditerranée orientale, de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne.

Indre-et-Loire - La-Chapelle-aux-Naux/Loire, fem./juv., 23 octobre (P. Cabard, L. Le Gal).

Cette espèce maritime demeure rare, bien qu'elle soit récemment d'apparition annuelle en Touraine.

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (1/1)

Répartition néarctique. Introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement. En France, niche notamment sur le Lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique et en Mayenne.

Indre - Lingé/Etang de Lérignon, mâle ad., 22 mai au 03 juillet (R. Bussière, D. Laloï, N. Norden).

Le mâle nuptial ayant stationné pendant plus d'un mois en Brenne durant période estivale ne s'est vraisemblablement pas reproduit.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (4/5)

Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu'aux régions boréales et à la toundra. Toujours lié à la proximité des milieux aquatiques.

Indre - Rosnay/Etang du Sault, 2 ind. de 2^{ème} année, 20 février (M. Prévost) ; Rosnay/Etang de Bignotoi, subad., 06 mars (R. Bussière) ; Nihérne/Etang des Loges, ad., 30 janvier au 07 février (E. Holthof, M. Prévost, R. Bussière & al.).

Loiret - Forêt Domaniale d'Orléans/Corcambon, fem. ad., phot., 01 décembre au 05 mars 2006 (A. Larousse, J. Thurel).

Le bastion brennou de l'espèce a vu la remarquable apparition d'au moins 4 individus durant l'hiver. L'individu revenant de la Forêt d'Orléans a pour sa part hiverné de nouveau dans ses quartiers habituels.

AIGLE DE BONELLI *Hieraetus pennatus* (1/1)

Dans le Paléarctique, niche en Afrique du Nord, en Europe méditerranéenne au Moyen-Orient, dans la péninsule indienne jusqu'aux contreforts de l'Himalaya, et dans le sud de la Chine. Sédentaire et erratique.

Loiret - Ouzouer-sur-Loire/Sablère de la Grande Visure, 1^{er} hiver, 06 novembre (S. Branchereau, P. & G. Chevrier, B. & P. Delahaie, P. Derland, C. Lartigau & al.).

L'observation de ce rapace représente sans conteste l'un des événements majeur de 2005, dans un département ayant déjà accueilli l'espèce !

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (1/1)

Niche dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes d'Eurasie. Hivernent en Afrique sub-saharienne.

Loiret - Ingrannes/Etang de la Binoche, août-septembre (J. Thurel, V. De Wilde).

Cette espèce fournit le strict minimum en terme de donnée. Aucun nicheur potentiel n'est signalé cette année.

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus* (4/4)

Niche le long des côtes d'Europe Occidentale et du Nord, en Russie à l'est jusqu'en Sibérie. Migrateur partiel, hivernent sur le littoral d'Europe de l'ouest, en Afrique du Nord, au sud jusqu'au Golfe de Guinée.

Indre-et-Loire - Savigny-en-Véron/Bertignolles, juv., 05 septembre (J. Présent) ; Saint-Pierre-des-Corps/Ile des Buteaux, juv., 06 septembre (J. Présent) ; Montlouis-sur-Loire/Les Fosses Bouteilles, juv., 24 août au 10 septembre (J. Présent & al.).

Loiret - Briare/Plage de Beauget, ad., 28 août (J.-L. Senotier, C. Gauberville, P. Legrand, R. Rosoux).

Le faible nombre d'observations reflète la relative rareté de ce limicole lors de ses passages migratoires à l'intérieur des terres.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (9/44)

Niche en Ecosse et dans les Pyrénées, puis de la Scandinavie au sud-est de la Russie, à la Mongolie et à la Sibérie orientale. Hivernent des contreforts de l'Atlas marocain à l'Iran en passant par tout le maghreb. Egalement noté en petit nombre en Andalousie, en Grèce, en Sicile et dans le sud de l'Italie, en Sardaigne, en Crète et à Chypre, parfois irrégulièrement.

Eure-et-Loir - La Bazoches en Dunois/Moulin, 4 ind. (1 mâle, 2 fem.), 01 mai (J.-Y. Barnagaud) ; Dammarie/Vouvelles, ad., 15 août (J.-Y. Barnagaud) ; Dammarie/Vouvelles, 3 ad., 29 août (J.-Y. Barnagaud, A. Mathurin, A. Vinot) ; Dammarie/Vouvelles, 25 ind., 17 septembre (T. Cense) ; Prudemanche, 1 ad. et 1 juv., phot., 17 septembre (J.-Y. Barnagaud) ; Dammarie/Vouvelles, 4 ind., 18 septembre (Y. Massin).

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, juv., 22 août (A. Liger, J. Présent).

Loiret - Patay/L'Amérique, 2 juv., phot., 17 septembre (S. Branchereau).

Loir-et-Cher - Villefrancoeur, 2 juv., phot., 18 septembre (A. Pollet, G. Vion).

Les secteurs de Beauce en Eure-et-Loir constituent l'apanage des observations avec 39 individus comptabilisés dont un groupe conséquent de 25 oiseaux (record régional) mi septembre. Le passage est par ailleurs nettement déséquilibré en faveur de la migration postnuptiale.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (7/14)

Niche dans toute la zone boréale et subarctique d'Eurasie, jusqu'au détroit de Béring à l'est de la Sibérie. La quasi-totalité des oiseaux européens rejoignent le sud du Sahara et hivernent du Sahel au golfe de Guinée et au Kenya.

Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, 2 ad., phot., 16 mai (P. Derrien).

Indre-et-Loire - La-Chapelle-sur-Loire/Loire, ad., 20 mai (A. Liger, J. Présent) ; Rillé/Lac, ad. et 3 juv., phot., 09 septembre (J.-M. Thibault, J. Présent) ; Montlouis-sur-Loire/Pont SNCF, juv., 10 septembre (J. Présent, J. Thurel).

Loiret - Pithiviers le Vieil/Bassin de décantation, 2 ad., du 30 avril au 02 mai (B. Delahaie, S. Verneau) ; Pithiviers le Vieil/Bassin de décantation, 2 ad., 05 et 06 mai (B. Delahaie, S. Verneau) ; Pithiviers le Vieil/Bassin de décantation, 2 ad., 16 septembre (B. Delahaie, S. Verneau).

Année conforme à la moyenne annuelle et au pattern d'apparition tant au niveau des dates et lieux d'observations que du nombre d'individus contactés.

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (5/7)

Niche dans les zones boréales et subarctiques de la Fennoscandie à la Sibérie orientale. Hivernent en Europe de l'ouest et du sud, en Afrique du Nord, au nord des zones afro tropicales, au Moyen-Orient, à l'est jusqu'au Vietnam.

En dehors de l'Indre-et-Loire.

Cher - Avord, 17 avril (J.-M. Chartendrault, A. Liger).

Eure-et-Loir - Mainvilliers, 16 avril (J.-Y. Barnagaud) ; Saumeray/Montemain, 24 septembre (J.-Y. Barnagaud, T. Cense).

Loiret – Darvoy, 11 octobre (V. De Wilde) ; Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, 3 ind., 06 novembre (B. Delahaie, S. Branchereau & al.).

Les recherches ciblées dans les milieux qu'elle affectionne permettront à terme de mieux préciser son statut réel à l'échelle régionale.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (4/19)

Niche dans les zones boréales, arctiques et subarctiques d'Islande, du nord des îles Britanniques, de la Scandinavie à l'ouest de la Sibérie, jusqu'à la vallée de l'Ienisseï et à Taïmyr. La sous-espèce type hiverne dans les régions afro tropicales et sur les côtes de l'ouest de l'Océan Indien et occasionnellement en Europe.

Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 16 ind., 14 avril (J. Présent) ; Montlouis-sur-Loire/Bondésir, ad., 15 avril (J. Présent) ; Luzillé/Bassin sud, ad., 24 avril (J. Présent) ; Le Louroux/Etang, 05 octobre (L. Le Gal, J. Présent).

L'observation d'un groupe de 16 oiseaux en Région Centre mérite d'être soulignée.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (1/1)

Niche des zones steppiques aux régions boréales de la Biélorussie à l'Asie centrale et hiverne au sud du Sahara, dans le sous-continent indien et en Asie du sud-est.

Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, adulte, phot., 10 avril (M. Mabileau).

Non annuel en Région Centre, 2005 fournit une mention sur un site ayant accueilli plusieurs espèces peu communes au cours d'un suivi régulier ces deux dernières années. La précédente observation datait du 22 avril 2004 en Brenne (R. Baeta, N. Issa & J. présent comm. pers.)

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius* (1/1)

Niche dans l'Arctique au-delà de 70° de latitude Nord. Quelques dizaines de couples nichent en Islande. Migre quasi exclusivement en pleine mer. Hiverne également en mer, dans l'Atlantique, principalement dans les zones d'upwelling d'Afrique de l'Ouest, au sud du tropique du Cancer et à l'ouest de l'Amérique du Sud.

Indre - Mézières-en-Brenne/Etang Neuf de la Biénaise, 1^{er} hiver, phot., 06 et 07 novembre (P. Cabard, M. Prévost & al.).

Ce limicole peu farouche permet lors de ses stationnements de belles séquences d'observation. La dernière mention en Région Centre remontait à juillet 2003 en Touraine (Issa, 2004).



GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (4/4)

Niche de la mer Noire à l'est du Kazakhstan et en petit nombre dans la région de Moscou en Russie, ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hiverne dans le golfe Persique, en mer rouge et en effectif moindre dans le centre, le nord et l'ouest de l'Europe.

Indre-et-Loire - Sonzay, 1^{er} hiver, 24 janvier (N. Issa, J. Présent) ; Sonzay, adulte, phot., du 05 au 07 décembre (R. Baeta, N. Issa, A. Liger, J. Présent) ; Sonzay, 1^{er} hiver, phot., du 07 au 14 décembre (N. Issa, J. Présent) ; Rillé/Lac, 1^{er} hiver, 17 décembre (R. Baeta, N. Issa, D. Laloi, A. Liger).

La Touraine, à l'origine des deux premières mentions pour la Région Centre en 2004 (Issa, 2005), récidive, en fournissant 4 nouvelles mentions, dont la première concernant un oiseau adulte. Noter la concomitance des dates des 3 individus apparus en début d'hiver.



GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (1/1)

Espèce polytypique niche dans le nord-ouest de l'Europe, de l'Islande à la mer Blanche, au sud jusqu'à l'ouest de la France et au Pays basque espagnol. Argentatus se reproduit dans la partie, en Scandinavie et au sud de la Baltique et argenteus de l'Europe occidentale à l'Islande.

En dehors de l'Indre-et-Loire.

Loiret - Orléans/Pont Thinat, ad., sous-espèce *argenteus*, 04 octobre (J.-Y. Barnagaud).

Les dizaines d'oiseaux stationnant sur la décharge de Sonzay en Indre-et-Loire ne semblent pas faire halte lors de leurs déplacements dans les départements voisins ...

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (1/1)

Niche sur les falaises escarpées, dans l'hémisphère nord, avec une large répartition circumpolaire, des côtes des océans Atlantiques, Pacifique et Arctique. En hiver, se disperse dans l'Atlantique Nord.

Loir-et-Cher - Chémery/Etang de l'Arche, adulte, 05 décembre (A. Pollet, P. Bouineau).

Ce laridé apparaît essentiellement dans les départements occidentaux, le plus souvent à la faveur de coups de vent atlantiques. Signalons que la veille, un individu avait également été noté au lac de Maine à Angers, dans le Maine-et-Loire (Le coin des branchés angevins, LPO Anjou)

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (1/6)

Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie orientale (région de l'Amour). Hivernent principalement en Afrique tropicale.

Loiret - Sandillon, 6 ad., 06 mai (V. De Wilde).

Une seule donnée mais remarquable de par l'effectif noté.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (4/4)

En Europe, niche dans les régions de moyennes et hautes latitudes des zones tempérées, boréales, arctiques, continentales et océaniques. Migrateur à migrateur partiel, les populations du nord de l'Europe et de Russie hivernent en Europe occidentale et orientale, au sud jusqu'en Afrique du Nord et au Proche-Orient.

Eure-et-Loir - Ecrosnes/Le Buisson Pouilleux, 28 octobre (L. Chevalier) ; Ecrosnes/Le Buisson Pouilleux, 06 novembre (L. Chevalier).

Loiret - Forêt Domaniale d'Orléans/Massif de Lorris, 08 novembre (J. Thurel).

Loir-et-Cher - Pontijou, 11 décembre (J.-L. Saint-Marc).

Nicheur occasionnel en Région Centre, ces observations concernent exclusivement des oiseaux migrateurs ou hivernants. Le nombre de données est faible compte tenu des potentialités d'accueil de nombreux sites en période hivernale.

PIC CENDRE *Picus canus* (5/5)

Niche en moyennes latitudes, dans les forêts des zones tempérées et boréales d'Europe et de Russie, à l'est jusqu'aux monts de l'Altai et au fleuve Baïkal.

Cher - Saint-Lunaise/Forêt Domaniale des Abbayes-Soudrain, mâle, 23 mars (P. Derrien).

Indre - Rosnay/Etang de Montiacre, mâle, 20 février (M. Prévost)

Loiret - Saint-Denis-de-l'Hôtel, mâle, phot., 20 avril (J. Thurel) ; Ingrannes/Massif d'Ingrannes, mâle, 13 juin et 02 juillet (J. Thurel).

Loir-et-Cher - Chaumont-sur-Tharonne, mâle, 30 janvier (V. Marsaudon).



ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (3/4)

Niche en milieu sec, dans les basses et moyennes latitudes des zones tempérées, steppiques et méditerranéennes du sud de l'Europe, d'Afrique du Nord, du Proche-Orient et de la Russie au nord de la mer Noire. Hiverné en Afrique au sud du Sahara.

Eure-et-Loir - La Bazoches en Dunois/Dothin, 2 ad., 01 mai (J.-Y. Barnagaud) ; Neuvy en Dunois, ad., 01 mai (J.-Y. Barnagaud) ; Mainvilliers, 08 août (J.-Y. Barnagaud).

Les trois observations sont réalisées dans le seul département de la région où l'espèce se reproduit, sans toutefois fournir d'indices de nidification pour 2005.

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris* (2/3)

Niche dans le Paléarctique occidental, au niveau des basses et moyennes latitudes, dans les zones tempérées, steppiques et méditerranéennes. La sous-espèce nominale hiverné dans les zones du Sahel au sud du Sahara.

Eure-et-Loir - Dammarie, 2 ad., 02 septembre (J.-Y. Barnagaud).

Indre-et-Loire - Bléré/Les Carrières, ad., 24 avril (J. Présent).

L'oiseau de Bléré se rapporte à un migrateur, bien que l'espèce ait déjà niché sur le site.

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus* (6/179)

La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou d'afflux liés à la fructification des arbres à baies dans le nord de l'Europe, l'espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux et l'ensemble de l'Europe centrale.

Cher - Bourges/Marais, 14 ind., phot., 01 et 02 mars (F. Besson, P. Derrien) ; Vornay, 4 ind., phot., 01 au 14 mars (F. Besson, J.-M. Chartendault).

Indre - Châteauroux, mâle, 05 mars (P. Biaunier).

Indre-et-Loire - Tours/Club Aviron, 3 ind., phot., 08 au 13 avril (D. Clarys, G. Delcroix & al.) ; Montlouis-sur-Loire/La Tuilerie, 23 mars au 01 avril (D. Clarys, E. Beaugendre, E. Carreau).

Loiret - Saint-Jean-de-la-Ruelle/Ingré, maximum de 156 ind., phot., 10 février au 04 mars (S. Branchereau, B. Liégeois, M. Prévost).

L'afflux mémorable de jaseurs qui s'est produit en France durant l'hiver 2004-2005 atteint la Région Centre à partir de février et se prolonge en mars, période pendant laquelle les effectifs ont culminé au niveau national.



GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (3/3)

Niche sur une large zone du Paléarctique d'étendant de l'Ouest de l'Europe à la Sibérie orientale et de l'Asie Centrale à la Turquie pour sa limite Sud. Hiverné en Afrique sub-saharienne, en Afrique du Nord, dans la Péninsule ibérique et au Moyen-Orient.

Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, mâle 1^{er} hiver, sous-espèce *cyanecula*, capt., phot., 20 août (A. Liger, J.-P. Peirera, J. Thurel & al.) ; Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, mâle 1^{er} hiver, 03 septembre (R. Baeta, N. Issa, A. Liger, L. Sallé, J. Thurel & al.) ; Le Louroux/Etang, mâle, 08 septembre (J. Présent).

Comme à l'accoutumée, la Touraine est aux premières loges concernant le passage de la gorgebleue, dont le statut a fortement évolué depuis quelques années, passant d'occasionnelle à annuelle régulière suite à des prospections ciblées (Issa, 2006). L'oiseau capturé fournit la première mention subsppécifique certifiée du taxon *cyanecula*.



MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus* (5/5)

*La sous-espèce nominale niche en Scandinavie, en Grande-Bretagne et en Irlande et la sous-espèce *alpestris* dans les montagnes du centre et du sud de l'Europe. Hiverné le long du bassin méditerranéen, dans la péninsule ibérique et en Afrique du Nord, à l'est jusqu'au Moyen-Orient.*

Eure-et-Loir - Lucé/Poiffonds, mâle adulte, sous-espèce *torquatus*, 16 avril (J.-Y. Barnagaud) ; Fontaine la Guyon, adulte, 17 avril (J.-Y. Barnagaud) ; Saumeray/Ballastières, adulte, 23 avril (J.-Y. Barnagaud).

Indre-et-Loire - Semblançay/Les Landes, 10 octobre (J. Présent).

Loiret - Saint-Denis-en-Val, mâle adulte, sous-espèce *torquatus*, 16 au 18 avril (J. Thurel).

Régulier en migration dans l'ensemble des départements lors des passages pré et postnuptiaux, le nombre de données apparaît toutefois comme très faible.

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE *Locustella luscinioides* (1/1)

La sous-espèce type niche au nord-ouest de l'Afrique, en Europe, à l'est jusqu'à la mer d'Azov en Russie. Migrateur transsaharien hivernant dans les régions subsahariennes du Sénégal à l'Erythrée.

En dehors de l'Indre.

Cher - Avord, mâle adulte, 17 avril (J.-M. Chartendraul, A. Liger).

La seule observation se réfère à un migrateur pré-nuptial. Difficile à déceler en halte migratoire, elle est sous-estimée en migration. Aucun nicheur n'est signalé en dehors de la Brenne.

ROUSSEROLLE TURDOÏDE *Acrocephalus arundinaceus* (1/1)

Niche depuis les rives de la mer Méditerranée (Afrique du Nord et l'Europe méridionale) jusqu'aux mers du Nord et Baltique, atteint le sud de la Scandinavie, et s'étend à l'est jusqu'à Ienisseï en Russie.

Indre - Pruniers/Etang de Pruniers, 15 mai au 11 juillet (M. Prévost).

Cette unique observation reflète l'état de régression continu et alarmant de cette fauvette paludicole depuis plusieurs années.

GOBEMOUCHE A COLLIER *Ficedula albicollis* (1/1)

Niche dans la zone s'étendant du centre de l'Europe jusqu'à l'Oural aux environs du 55° parallèle est, et de manière plus discontinue au sud de l'Italie, en Suisse, en Allemagne et au nord-est de la France. Les quartiers d'hivernage se situent en Afrique tropicale.

Cher - Bourges/Marais, femelle adulte, 28 août (A. Liger).

Occasionnel rare lors du passage automnal dans l'Hexagone (Gonin & Zucca 2005), l'espèce avait précédemment été notée en Région Centre en 2004 (Présent, 2005). Les marais de Bourges, très attractifs pour les passereaux migrateurs, avaient déjà accueilli un Gobemouche à collier en août 2004 (A. Liger comm. pers.)

MESANGE BOREALE *Parus montanus* (10/13)

Large distribution s'étendant de la moitié est de la France, comprenant une grande partie de l'Europe centrale et du Nord, l'Angleterre, la Fennoscandie, à l'est jusqu'à la Sibérie.

Loiret - Seichebrières/Etang du Four, 29 mai (A. Larousse) ; Saint-Benoît-sur-Loire/Les Mahis, 07 septembre (J. Thurel) ; Saint-Benoît-sur-Loire/Les Mahis, 3 ind., 01 novembre (J. Thurel) ; Ingrannes/Etang de la Binoche, 08 novembre (J. Thurel) ; Saint-Benoît-sur-Loire/Les Mahis, 2 ind., 23 novembre (J. Thurel) ; Châteauneuf-sur-Loire/Rive sud, 24 novembre (J. Thurel) ; Saint-Benoît-sur-Loire/Les Mahis, 27 novembre (J. Thurel) ; Forêt Domaniale d'Orléans/Etang de Corcambon, 27 novembre (J. Thurel) ; Melleroy/La Boule d'Or, 01 décembre (L. Lorpin).

Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault/Etang de Meuné, 07 décembre (F. Pelsy).

Hormis le Loiret, l'apparente absence de données dans les autres départements témoigne de la régression subie par cette espèce à l'échelle régionale.

TICHODROME ECHELETTE *Tichodroma muriara* (1/1)

Dans le Paléarctique occidental, niche sur les falaises rocheuses de moyenne et haute montagne. Hiverné à plus basse altitude, parfois en plaine, sur les façades verticales d'anciens monuments (cathédrales, châteaux, ponts...) en milieu urbain ou sur les falaises côtières.

Cher - Bourges/Centre Ville, ad., 12 décembre au 26 février 2006 (P. d'Orléans, F. Besson, P. Derrien, A. Liger & al.).

Le stationnement hivernal de cet individu se transforma rapidement en partie de cache-cache avec les ornithos locaux, l'oiseau effectuant régulièrement la navette entre les différents monuments historiques du Centre Ville, laissant un goût d'inachevé au plus malchanceux...

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* (5/5)

Espèce polytypique dont la sous-espèce nominale niche sur un large front du centre de la France, au nord de la Russie, à l'est jusqu'au fleuve Yenisey.

Loiret - Forêt Domaniale d'Orléans/Carrefour du Renard, ad., 04 janvier (J. Thurel, R. Wahl) ; Chatenoy, ad., 08 novembre au 01 décembre (J. Thurel) ; Chatenoy, ad., 18 novembre (J. Thurel) ; Fay-aux-Loges/Le Charmoi, ad., phot., 10 décembre (G. Monchaux) ; Forêt Domaniale d'Orléans/Massif de Lorris, ad., 17 décembre (J. Thurel).

La Forêt Domaniale d'Orléans, et notamment les massifs en régénération constituent vraisemblablement une zone privilégiée pour l'hivernage de l'espèce en Région Centre.

LINOTTE A BEC JAUNE *Carduelis flavirostris* (1/1)

Niche dans le nord-ouest de l'Europe, des îles Britanniques à la péninsule de Kola, et des montagnes du Caucase à l'Asie orientale. Les populations européennes hivernent le long des côtes d'Europe du Nord et en Europe orientale jusqu'en Hongrie.

Cher - Jalognes/Les Feux Vilains, mâle adulte, 23 décembre (P. Derrien).

La prospection des passereaux dans les champs en hiver peut s'avérer payante. Bravo à cet observateur qui découvre la seconde mention régionale pour l'espèce, 8 ans après celle du 26 novembre 1997 à Saint Père sur Loire (Chavigny, 2000).

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea* (6/51)

En Europe, niche des zones boréales et de la toundra arctique aux zones tempérées. Cabaret se reproduit au sud de la Suède, en Grande-Bretagne, en Suisse et dans les Alpes françaises, flammea niche dans le reste de la Scandinavie et dans le nord de la Russie. Hivernent sur l'ensemble du territoire européen excepté la péninsule ibérique.

Cher - Rians/Vilaine, 2 fem./juv., 20 novembre (P. Derrien).

Indre - Diors/Fourches, 4 ind., 26 décembre (M. Prévost).

Indre-et-Loire - Chambray-lès-Tours/Zone Industrielle, 10 ind., 26 novembre (A. Liger).

Loiret - Combroux/Etang de la Vallée, 7 ad., sous-espèce *cabaret*, phot., 16 janvier (B. & P. Delahaie, M. & J.-P. Papion) ; Ouzouer-sur-Trézée/Etang de la Grand'Rue, 20 ind., 16 novembre (C. Lorpin) ; Ingrannes, 8 ind. (2 mâles), sous-espèce *cabaret*, 01 décembre (J. Thurel, A. Larousse).

L'afflux ayant touché toute la Région Centre lors de l'hiver 2005-2006 débute dès le mois de novembre et semble concerner des oiseaux de race *cabaret*. Toutefois, dans de nombreux cas, la sous-espèce n'a pu être déterminée, les populations de *flammea* du sud de la Scandinavie étant très proches phénotypiquement de *cabaret*.

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (1/1)

Nicheur arctique se reproduisant sur les plateaux rocheux de la toundra à proximité de zones enneigées et sur les côtes et falaises rocailleuses du littoral. Hivernent le long des côtes d'Europe occidentales du Danemark à la façade atlantique française et en Grande Bretagne, ainsi qu'en Europe orientale, dans les plaines de Hongrie et de Roumanie.

Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire/La Tuilerie, 27 novembre (N. Issa, A. Liger).

Inféodée aux zones côtières lors de son hivernage en France, cette espèce est notée pour la seconde année consécutive et à la même période dans le même département (Baeta & al., 2005) !

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (1/1)

Niche des zones boréales aux zones tempérées, du bassin Méditerranéen aux milieux steppiques et montagneux jusqu'à 2500 dans l'aire sud de répartition. Hivernent en Afrique sub-saharienne.

Loiret - Baule, mâle ad., phot., du 29 mai au 26 juin (S. Branchereau).

Emberizidé en net déclin, les données de reproduction sont devenues rares. Le cantonnement de ce mâle chanteur durant tout le mois de juin ne semble malheureusement pas avoir abouti à la nidification de l'espèce.

ANNEXE 1 – LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* - Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault/Etang de Verrière, m. & fem., 23 novembre (*description ne permettant pas d'exclure des hybrides Fuligule nyroca x Fuligule sp.*)

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* - Eure-et-Loir - Terminiers, 04 juin (*absence complète de description*).

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* - Indre-et-Loire - Savonnières/Le Haut Bray, m., 27 février (*description évoquant un fringillidé leucistique*)

REMERCIEMENTS

Le CHR Centre tient à remercier chaleureusement ceux qui au cours de l'année 2005, ont contribué à son bon fonctionnement :

- Nature Centre pour le soutien logistique et de communication qu'elle apporte au secrétariat du Comité.
- L.P.O Nationale et la revue *Ornithos* pour la diffusion des informations relatives au Comité.
- Organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : SEPANT, LPO Brenne, LPO Touraine, LPO 45, SNE, Perche Nature, SAMNEL, Nature 18, Naturalistes Orléanais, Loir-et-Cher Nature, Indre Nature, Eure-et-Loir Nature, CPIE Touraine Val de Loire, APSL.

- Boris Delahaie, Alain Fossé, Julien Présent, Michel Prévost, qui nous ont apporté leur aide et/ou des informations complémentaires.
- l'ensemble des ornithologues, naturalistes, dessinateurs et photographes sans qui le CHR Centre ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

- BAETA R., ISSA N., PRESENT J. (2004). Synthèse des observations pour l'année 2003 en Indre-et-Loire. *Le P'tit Grav'*, Volume 2 : 4 - 57.
- BAETA R., ISSA N., PRESENT J. (2005). Synthèse des observations pour l'année 2004 en Indre-et-Loire. *Le P'tit Grav'*, Volume 3 : 3 - 55.
- CHAVIGNY D. (2000). *Un jour, un oiseau*. Delachaux & Niestlé.
- GONIN J. & ZUCCA M. (2005). Afflux de Gobemouches à collier *Ficedula albicollis* dans le sud-est de la France au printemps 2004. *Ornithos* 12 (2) : 94 - 101.
- ISSA N. (2004). Observation d'un Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* en juillet 2003 en Indre-et-Loire. *Le P'tit Grav'*, Volume 2 : 79 - 80.
- ISSA N. (2005). Occurrence du Goéland pontique *Larus cachinnans* en Touraine. *Le P'tit Grav'*, Volume 3 : 62 - 65.
- ISSA N. (2006). La Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* en Touraine : statut, migration, biotope. *Le P'tit Grav'*, Volume 4. *A paraître*.
- PAUL J.-P. & OLIOSO G. (2006). Afflux mémorable de Jaseurs boréaux *Bombycilla garrulus* en France dans l'hiver 2004-2005. *Ornithos* 13 (1) : 2 - 11.
- PRESENT J. (2005). Notes sur l'observation d'un Gobemouche à collier *Ficedula albicollis* en Indre-et-Loire. *Le P'tit Grav'*, Volume 3 : 69 - 70.
- ZUCCA M. & le CMR (2005). Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 2^{ème} rapport du CMR (jan. 2001 - déc. 2002). *Ornithos* 12 (5) : 233 - 260.