

# La Gorgebleue 2.0

Les articles et notes de  
[www.faune-vendee.org](http://www.faune-vendee.org)

Référence : 010-FV2015

## LES OISEAUX RARES EN LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE EN 2012

Troisième rapport du comité d'homologation interdépartemental  
de Loire-Atlantique et Vendée

Frédéric LE GALLO, Willy RAITIÈRE et le CH44-85

Citation : LE GALLO F., RAITIÈRE W. et le CH44-85, 2015. Les oiseaux rares en Loire-Atlantique et en Vendée en 2012. *La Gorgebleue 2.0*, 010-FV2015, 13 p., [www.faune-vendee.org](http://www.faune-vendee.org).

Voici le troisième rapport des données homologuées par le comité inter-départemental de Loire-Atlantique et Vendée. Celui-ci concerne les données de l'année 2012. Ce comité, né de la fusion du CHD44 et du CHD85, a pris ses fonctions le 1<sup>er</sup> janvier 2010 et rassemble donc des ornithologues de Loire-Atlantique et de Vendée, chargés d'examiner les fiches issues des deux départements.

Trois associations sont partenaires et soutiennent le CH44-85 : les LPO Loire-Atlantique et Vendée ainsi que le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA).

En 2012, ce comité était composé des membres suivants :

- Eugène Archer (44)
- Mathieu Faveyrial (85)
- Bertrand Isaac (85)
- Frédéric Le Gallo (85)
- Willy Maillard (44)
- Julien Mérot (44)
- Frédéric Portier (85) - Secrétaire du comité pour la Vendée
- Willy Raitière (44) - Secrétaire du comité pour la Loire-Atlantique.

Le comité a examiné 112 fiches, dont 98 ont été validées, soit un taux d'acceptation de 87,5 %.

Nous rappelons que seules les données homologuées sont présentées dans les rapports du CH44-85 et du CMR et invitons les observateurs qui ne l'auraient pas encore fait à transmettre leurs fiches à l'adresse suivante : [ch44\\_85@yahoo.fr](mailto:ch44_85@yahoo.fr), même si les données sont antérieures à 2012.

### FAITS MARQUANTS

Depuis la création du CH44-85 en 2010, 5 espèces font leur apparition dans le décompte : le Goéland d'Audouin, la Macareux moine, l'Hirondelle rousseline, la Fauvette à lunettes et le Gobemouche nain. L'observation de ce mâle cantonné de Fauvette à lunettes constitue par ailleurs la première donnée de cette espèce en Vendée. Aucune observation de l'espèce n'a été réalisée en Loire-Atlantique à ce jour.

Au chapitre des oiseaux nicheurs remarquables, on peut noter la première



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
VENDEE

La LPO Vendée fait partie du réseau VisioNature.

Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune.



reproduction du Coucou geai et de l'Élanion blanc en Loire-Atlantique. 2012 aura été par ailleurs une excellente année pour l'Élanion blanc puisque l'espèce a été notée en Mayenne, en Maine-et-Loire, dans les Deux-Sèvres...

En Vendée, des indices d'une reproduction possible de l'Aigle botté ont été de nouveau notés en 2012, ce qui devrait encourager les observateurs de ce département à fournir un effort particulier afin de prouver la reproduction de l'espèce.

En ce qui concerne les espèces traitées par le Comité d'Homologation National, notons la première mention française du Gravelot semipalmé réalisée sur le lac de Grand-Lieu (44), ainsi que les observations vendéennes remarquables de la Bernache à cou roux, du Bécasseau minuscule, du Tarier oriental, de la Grive dorée et du Bruant mélanocéphale.

## LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données homologuées depuis la création du CH44-85 (soit 0/0 pour cette première année) et celui des individus correspondant, à l'exception de l'année 2012. Les deux suivants représentent, par département et pour l'année 2012, le nombre de données homologuées et le nombre d'individus correspondant.
3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation (département, effectif, localité et date). Concernant le(s) nom(s) de (ou des) l'observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique), la mention et al. indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CH est celui de la personne ayant découvert l'oiseau et rédigé une fiche et/ou fourni une photo.

4. Distribution générale de l'espèce (entre parenthèses) et statut dans les départements, puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste des oiseaux du Paléarctique occidental de la Commission de l'Avifaune Française (CAF 2011). Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la sous-espèce concernée.

Les données présentées sont la propriété entière de (ou des) l'observateur(s). Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : **Cygne de Bewick** - 1 individu le 26/02/2010, Saint-Joachim, Loire-Atlantique (J.L. Dourin *et al.*, in Portier *et al.* 2015).

\* Espèce soumise au CH44-85 hors de certaines zones géographiques.

\*\* Espèce soumise au CH44-85 pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

### **CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus***

(3/4) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

**Loire-Atlantique** : 1 ad. le 26/01 dans le marais de Grée / Ancenis (M. Sinoir, G. Foilleret, F. Jacob).

(Se reproduit en Sibérie arctique à l'est de la péninsule de Kola ; hiverne dans les îles Britanniques, du Nord de la France au Nord-Est de l'Allemagne, et ponctuellement plus au sud). Donnée classique pour la Loire-Atlantique concernant cet hivernant rare dans ce département. Rappelons qu'en Vendée, l'espèce est très rare et irrégulière.

### **CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus***

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 ad. du 22/12/12 au 02/01/2013 dans le marais des Aises / Saint-Hilaire-de-Riez (G. Besseau *et al.*).

(Se reproduit de l'Islande et la Scandinavie jusqu'au Nord-Est de la Sibérie, également en Mongolie). Cette espèce reste d'occurrence rare dans les deux départements. L'oiseau vendéen était visible en alternance dans le marais des Aises et sur le plan d'eau des Vallées, deux sites ayant déjà accueilli cette espèce par le passé.

### OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

(5/7) (44: 0/0 ; 85 : 0/0)

**2011 Vendée** : 1 ind. le 27/11 sur le communal de Lairoux (faune-vendee.org).

(Scandinavie, Sibérie). Migratrice et hivernante rare, surtout en Vendée. À rechercher l'hiver dans le sud de ce département.

### BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *hrota*, appelée Bernache à ventre pâle.

(10/11) (44 : 2/2 ; 85 : 3/4)

**Loire-Atlantique** : 1 ad. le 04/02 à la pointe Saint-Gildas / Préfailles (D. Cléva) ; 1 ind. le 02/09 dans le Traict de Rostu / Mesquer (J.-M. Vailhen).

**Vendée** : 1 ind. puis 2 ad. du 22/11/11 au 17/03/12 plage du Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard (F. Salmon *et al.*); 1 ad. du 24/03 au 01/04 au polder de Sébastopol / Barbâtre (D. Robard *et al.*); 1 ad. le 28/12 au Gois / Barbâtre (G. Besseau).

**2011 Loire-Atlantique** : 1 ind. le 16/10 dans le Petit Traict / Guérande (O. Vanucci) .

**2011 Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 22/11 plage du Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard (faune-vendee.org).

**2009 Vendée** : 6 ad. le 28/08 aux Tchinettes / L'Île d'Yeu (X. Hindermeier).

(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-Joseph). Ce taxon est observé très régulièrement dans les deux départements. L'observation de 6 individus sur l'île d'Yeu constitue une première, qui plus est à une date très précoce puisque, selon le NIOF (Dubois *et al.* 2008), il s'agirait de l'observation la plus précoce réalisée en France.

### BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *nigricans*, appelée Bernache du Pacifique.

(3/2) (44 : 1/0 ; 85 : 0/0)

**Loire-Atlantique** : 1 ad. le 24/12 au Trou du Gros Banc / Guérande (H. Touzé)

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais très régulier dans les deux départements. L'oiseau de Guérande est probablement le même que celui fréquentant le secteur depuis plusieurs hivers.

### FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris*

(4/3) (44 : 2/2 ; 85 : 1/1)

**Loire-Atlantique** : 1 mâle du 01 au 21/03 au Mortier Noir puis au Mortier de Paquillès / Petit-Mars (F. Le Gal, D. Martineau, J.-L. Gasnier, D. Ménard, P. Lenrume *et al.*) ; 1 mâle ad. du 27/03 au 29/03 aux Prées Neuves / Saint-Mars-de-Coutais (R. Batard, S. Reeber, A. Doucet).

**Vendée** : 1 mâle ad. le 16/03 sur les bassins de lagunage de La Barre-de-Monts (P. Dulac).

(Amérique du Nord. S'égare régulièrement en Europe de l'Ouest, principalement dans les îles Britanniques). Hivernant rare et irrégulier dans les deux départements. L'oiseau découvert dans le marais de Petit-Mars et celui de Grand-Lieu ont été comptabilisés comme deux oiseaux différents, cependant, il est possible qu'il s'agisse du même individu ayant changé de site.

### FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 1/2)

**Vendée** : 2 mâles ad. le 11/03 sur la RNN de Saint-Denis-du-Payré (L. Chaillot *et al.*).

(Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest). Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée, sans doute plus régulier en Loire-Atlantique, notamment sur le lac de Grand-Lieu.



*Fuligules nyrocas* *Aythya nyroca*,  
Saint-Denis-du-Payré, mars 2012

Photo © J.-C. Croisé

### ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* \*

(19/54) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

**Vendée** : 20 ind. comptés du 01/01 au 31/12 à l'étang des Boucheries / Les Landes-Génusson (L. Chaillot).

**2011 Vendée** : 10 ind. comptés du 01/01 au 31/12 à l'étang des Boucheries / Les Landes-Génusson (L. Chaillot).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne depuis 1960). Espèce notée de la fin d'été à l'hiver dans les deux départements, sur les plans d'eau et lagunes de l'intérieur des terres. Plus rare sur le littoral.

Note du comité : en premier lieu, l'étang des Boucheries étant un lieu d'observation régulier, l'espèce n'y est plus soumise à homologation (le suivi par des observateurs avertis est gage de crédibilité). D'autre part, nous attirons l'attention des observateurs de cette espèce sur la qualité de rédaction des fiches. En effet, de nombreuses fiches sont insuffisamment renseignées et ne permettent pas d'exclure l'Érismature à tête blanche.

### **GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena***

(9/11) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée**: 1 ad. le 29/01 à la plage des Iliaux / L'Île d'Yeu (X. Hindermeyer).

(Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hivernent principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la mer Noire et de l'Adriatique). Migrateur et hivernant rare et irrégulier dans les deux départements. Nouvelle donnée pour l'île d'Yeu pour cette espèce qui reste d'occurrence peu commune dans les eaux de l'île.

### **PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis***

(6/10) (44 : 2/2 ; 85 : 4/4)

**Loire-Atlantique** : 1 ind. le 04/08 mort sur la plage de la Croix des Anses / La Turballe (O. Plisson *et al.*) ; 1 ind. le 15/08 au Port Val / Le Croisic (P. Bellion).

**Vendée** : 1 ind. le 13/07 lors de la traversée Yeu / Fromentine (M.-P. Hindermeyer) ; 1 ind. le 04/08 à la pointe des Corbeaux / L'Île d'Yeu (E. Ouvrard) ; 1 ind. le 29/08 à la pointe des Corbeaux / L'Île d'Yeu le 29/08 (M.-P. et X. Hindermeyer) ; 1 ind. le 03/10 à la pointe du But / L'Île d'Yeu (B. Isaac).

(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough). Migrateur très rare et très irrégulier, observé le plus souvent au large de nos côtes. La Vendée voit passer cette espèce plus régulièrement, notamment au niveau de l'île d'Yeu ou du phare de l'Armandèche. Les données en

Loire-Atlantique sont remarquables et illustrent un afflux marqué sur le littoral atlantique en 2012.

### **IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*\***

(18/30) (44 : 6/11 ; 85 : 1/3)

**Loire-Atlantique** : de 1 à 3 ind. du 08/01 au 25/03 au Rosay / Mesquer et alentours (J.-M. Vaillhen *et al.*) ; 1 ind. le 28/01 aux Guihos / Assérac (A. Gergaud) ; 1 ind. du 05/02 au 12/02 à Lyarne / Les-Moutiers-en-Retz (J-Y Frémont, M. Gaudin) ; 4 ind., dont 1 bagué à Doñana en Espagne, le 05/04 au Clairvaux / Saint-Joachim (V. Tanqueray) ; 1 ad. le 21/06 au Grand Marais / Bourgneuf-en-Retz (A. Doucet) ; 1 ind. du 27/11 au 20/03/13 en dortoir à Malor / Guérande et dans divers endroits des marais salants.

**Vendée** : 3 ind. le 29/06 au Village Rocher / Bois-de-Céné (G. Perruchas).

(Se reproduit, en Europe, essentiellement dans l'est et le sud du continent. La plupart des oiseaux européens hivernent en Afrique tropicale ou à l'est de la Méditerranée. En France, l'espèce niche depuis 2006 en Camargue). L'espèce devient de plus en plus régulière en Loire-Atlantique notamment, où l'espèce s'est reproduite sur le lac de Grand-Lieu en 2011 (Reeber, 2011). Demeure rare et irrégulière en Vendée, hormis dans le Marais breton, fréquenté de plus en plus régulièrement.

Note du comité : l'espèce n'est plus soumise à homologation en Loire-Atlantique, et notamment dans le Pays de Retz, site d'hivernage important pour l'espèce. D'autre part, la qualité des fiches reçues concernant cette espèce étant régulièrement insuffisante pour exclure les autres espèces d'ibis de "type falcinelle" (Ibis de



*Ibis falcinelles Plegadis falcinellus,*  
*Bois-de-Céné, juin 2012*  
*Photo © G. Perruchas*

la Puna *Plegadis ridgwayi* et Ibis à face blanche (*Plegadis chihî*) pouvant être échappés de captivité, le CH44-85 rappelle qu'un document reprenant les critères d'identification a été diffusé à destination des observateurs. Ce document est consultable à l'adresse suivante : [http://files.bioloVISION.net/www.faune-vendee.org/pdf/files/news/ID\\_ibis\\_falcinelle-2667.pdf](http://files.bioloVISION.net/www.faune-vendee.org/pdf/files/news/ID_ibis_falcinelle-2667.pdf)

### ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus*

(1/1) (44 : 3/7 ; 85 : 0/0)

**Loire-Atlantique** : 2 ad. et 1 juv. du 03/08 au 13/01/2013 au Pré de la Bosse / Corcoué-sur-Logne (D. Cléva et C. Naud) ; 3 juv. le 03/10 aux Magnées / Saint-Hilaire-de-Clisson (P. Bellion et al.) ; 1 ad. du 20/11 au 01/12 à Lincuire / Saint-Colomban (F. Gossmann, P. Bourdin, F. Latraube et al.).

(Europe, Afrique du Nord, Asie Mineure). Espèce en forte expansion en France vers le nord. L'année 2012 est marquée par la nidification certaine de l'espèce dans le sud de la Loire-Atlantique (Cléva & Naud 2014) et par l'observation d'une fratrie de 3 juvéniles nés probablement localement. Les données d'oiseaux erratiques augmentent et laissent présager une présence durable de l'espèce dans notre territoire.

### VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus*

(3/6) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

**Loire-Atlantique** : 1 subad. à la Védiais / Treffieux le 07/09 (Y. Brilland).

**Vendée** : 1 ind. le 04/05 en vol au-dessus de Saint-Denis-du-Payré (H. Des Touches).

(Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, ouest de l'Asie). Migrateur très rare mais de plus en plus régulier ces dernières années dans nos départements.



Vautour fauve *Gyps fulvus*,  
Treffieux, septembre 2012  
Photo © Y. Brilland

### AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata*

(9/10) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

**Loire-Atlantique** : 1 ind. le 22/05 dans le Marais de Petit-Mars (E. Archer et A. Oates)

**Vendée** : 1 ind. le 02/06 à Sainte-Foy (J.-D. Vrignault).

**2011 Vendée** : 2 ind. le 12/05 dans les environs de la forêt de Mervent (B. Perrotin) ; 2 ind. le 19/05 à Saint-Juire-Champgillon (B. Perrotin).

(Europe, Afrique du nord, Asie centrale). Migrateur rare dans les deux départements mais nettement plus régulier en Vendée. La nidification, non prouvée à l'heure actuelle dans ce département, est fort probable étant données les dates d'observations et les comportements relevés ; il faut noter que cette espèce est très discrète en période de nidification.

### OUTARDE CANEPETIÈRE *Tetrax tetrax*

(1/1) (44 : 1/2 ; 85 : 0/0)

**Loire-Atlantique** : 2 ind. du 12/10 au 14/10 sur la prairie de Tenue / Frossay (G. Cochard et al.).

(Se reproduit du Maroc et de l'Europe de l'Ouest à travers l'Asie centrale jusqu'au nord-ouest de la Chine). L'espèce ne niche plus en Vendée et a aussi disparu de Loire-Atlantique. Cette donnée concerne des individus en halte migratoire.

### BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos*

(17/20) (44 : 5/5 ; 85 : 2/3)

**Loire-Atlantique** : plusieurs oiseaux observés sur le lac de Grand-Lieu : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 30/08, 1 ad. le 07/09, 1 ind. de 1<sup>re</sup> année du 12 au 14/09 et 1 ind. de 1<sup>re</sup> année du 21 au 25/09 (S. Reeber) ; 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 25/09 aux Rochers de Bourg / Les-Moutiers-en-Retz (V. Bretille).

**Vendée** : 2 ind. de 1<sup>re</sup> année du 19/09 au 23/09 puis 1 ind. de 1<sup>re</sup> année du 25/09 au 26/09 sur le lac de Maché- Apremont / Maché (F. Portier).

**2011 Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année les 22 et 23/08 sur la RNN de Saint-Denis-du-Payré (faune-vendee.org).

(Niche dans l'Arctique nord-américain, de l'ouest de la baie d'Hudson à l'Alaska et en Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Hiverné en Amérique du Sud, dans le sud-est de l'Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande). Rare et irrégulier aux deux passages, particulièrement au printemps ; plus régulier à l'automne. L'année 2012 est de nouveau un bon cru pour l'espèce, à des dates et sur des lieux classiques.

**PHALAROPE À BEC ÉTROIT *Phalaropus lobatus***

(2/2) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

**Loire-Atlantique** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 03/11 à l'étier de Bécassier/ Guérande (J.-P. Tilly).

**2011 Vendée** : 1 mâle ad. le 01/07 aux Combes / Jard-sur-Mer (faune-vendee.org).

(Se reproduit tout autour du Grand Nord, y compris en Islande et dans le nord de l'Europe, surtout au-delà de 60°N, au sud jusqu'en Écosse). Espèce rare dans les deux départements. Observé principalement en fin d'été et à l'automne.



*Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus,  
Guérande, novembre 2012  
Photo © J.-P. Tilly*

**LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus***

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

**Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année du 23 au 29/08 sur l'étang des Boucheries / Les Landes-Génusson (S. Mérand *et al.*) ; 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 25/08 à la pointe des Corbeaux / L'Île d'Yeu (X. Hindermeier).

(La sous-espèce nominale se reproduit des Scandinavie et Russie arctiques et subarctiques jusqu'au delta de la Léna,



*Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus,  
Les Landes-Génusson, août 2012  
Photo © H. Touzé*

en Sibérie). Espèce très rare dans les deux départements. La donnée à l'intérieur des terres est remarquable.

**GOÉLAND RAILLEUR *Chroicocephalus genei***

(3/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/0)

**Vendée** : 1 ad. séjournant annuellement sur l'île de Noirmoutier depuis 2003.

(Se reproduit du Sénégal à la mer Méditerranée et jusqu'au Moyen-Orient, au Kazakhstan et au Pakistan). Il s'agit de l'individu découvert en 2003 et qui ne quitte désormais plus l'île.

**GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii***

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 ad. le 07/06 à la plage de la Grande Côte / La Barre-de-Monts (C. Dupé).

(Pourtour méditerranéen, en nette progression démographique depuis quelques années). Migrateur très rare dans les deux départements, d'occurrence surtout printanière. Cette donnée est remarquable et suit celle du printemps 2009 sur le littoral vendéen.

**GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis***

(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 2/0)

**Vendée**: 1 ad. du 28/01 au 17/03 à la STEP de Bourgenay / Talmont-Saint-Hilaire (L. Chaillot *et al.*) ; 1 ad. du 22/11 au 06/03/12 sur la RNN des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île (D. Desmots *et al.*).

(Niche dans le centre, le sud-ouest et l'est de l'Amérique du Nord. Hivernant et migrateur néarctique rare fréquentant surtout les zones côtières. Très occasionnel dans les terres). Hivernant et migrateur rare et irrégulier dans les deux départements. Certains secteurs vendéens comme l'île de Noirmoutier accueillent tout de même l'espèce annuellement. Les sites d'observation en 2012 sont classiques et les oiseaux probablement des habitués (et donc non comptabilisés).

**GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus***

(6/6) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 ind. de 3<sup>e</sup> année du 25/02 au 29/02 aux environs de la jetée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (G. Besseau, A. & G. Reboul *et al.*).

(Niche au Groenland et en Islande puis de l'île Jan Mayern et du Spitzberg jusqu'en Sibérie. Hivernent surtout dans le nord de l'Atlantique jusqu'en Grande-Bretagne ; effectifs

réduits plus au sud, présence occasionnelle en Suisse, en mer Caspienne et en Méditerranée). Hivernant rare et irrégulier en Loire-Atlantique, assez régulier en Vendée. Le suivi plus assidu des centres d'enfouissement de Loire-Atlantique laisse espérer des observations plus fréquentes de goélands néarctiques. La donnée est classique.

### **STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica***

(5/6) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

**2011 Vendée** : 1 ad. les 22 et 28/07 sur la RNN de Saint-Denis-du-Payré (faune-vendee.org).

(Du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent Indien et au nord-est de la Chine ; également en petit nombre en Allemagne et au Danemark). Migratrice rare et irrégulière dans les deux départements. La réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré avait déjà accueilli l'espèce par le passé.

### **STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii***

(4/6) (44 : 0/0 ; 85 : 1/3)

**Vendée** : de 1 à 3 ad. du 23/06 au 01/07 sur le polder de Sébastopol / Barbâtre (D. Robard).

(Des côtes est de l'Amérique du Nord et des Antilles au nord du Venezuela, aux Açores et dans le nord-ouest de l'Europe). Migrateur occasionnel dans les deux départements. La colonie de sternes du polder de Sébastopol attire régulièrement cette espèce.

### **GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus***

(22/34) (44 : 5/12 ; 85 : 1/1)

**Loire-Atlantique** : plusieurs individus sur le lac de Grand-Lieu : 8 ad. le 14/05, encore 6 le



*Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus,*  
lac de Grand-Lieu, août 2012

Photo © S. Reeber

16/05, 1 ad. le 22/08, 1 ind. de 1<sup>re</sup> année du 28/08 au 03/09, 1 ind. de 1<sup>re</sup> année avec le précédent du 01 au 03/09 (S. Reeber) ; 1 ind. de 1<sup>re</sup> année du 19 au 20/08 dans la plaine de Mazerolles / Sucé-sur-Erdre (O. Poisson).

**Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 09/09 à la station de lagunage / Luçon (M. Bibard).

(Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie orientale (région de l'Amour). Hivernent principalement en Afrique tropicale). En Loire-Atlantique, aucune tentative de nidification n'a été constatée en 2012 contrairement à 2011. L'espèce reste rare et irrégulière en Vendée aux deux passages.

### **MERGULE NAIN *Alle alle***

(3/3) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 2 ad. le 01/11 à la pointe du But / L'Île d'Yeu (F. Portier).

**2004 Vendée** : 1 ind. le 14/11 à la plage du Pont du Jaunay / Bretignolle-sur-Mer (G. Besseau).

(Niche depuis le haut Arctique canadien et le nord du Groenland jusqu'au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble). Occasionnel en hiver dans les deux départements.

### **MACAREUX MOINE *Fatercula arctica***

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 ind. mort le 03/01 sur la plage du Veillon / Talmont-Saint-Hilaire (L. Chaillot).

(La sous-espèce nominale niche en Grande-Bretagne, Irlande, îles Féroé, sud de la Norvège, îles Anglo-Normandes et Bretagne). Malheureusement, la plupart des données de ce petit alcidé concerne des individus retrouvés morts sur les plages.

### **COUCOU GEAI *Clamator glandarius***

(8/7) (44 : 2/4 ; 85 : 2/1)

**Loire-Atlantique** : 1 ind de 2<sup>e</sup> année du 04/04 au 07/05 à Guérande - Saline Donne, le Marsilly, Kerignon (J. Gauvin, J.-P. Tilly, S. Umhang) ; 3 ind. de 1<sup>re</sup> année du 04/08 au 18/08 avenue de la Sarcelle / La Baule-Escoublac (P. Bellion).

**Vendée** : 1 ind. du 29/03 au 07/04 aux Ransins / Noirmoutier-en-l'Île (B. Thibeaud) ; 1 ad. du 12/04 au 14/04 aux Mauviollières / L'Épine (D. Robard).

(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du Nord). Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps. L'espèce s'est reproduite en 2012 à La Baule-Escoublac (Bellion 2013), ce qui constitue une première pour la Loire-



*Coucou-geai Clamator glandarius,*  
*La Baule-Escoublac, août 2012*  
 Photo © H. Touzé

Atlantique. Plusieurs nidifications ont été suspectées ces dernières années et semblent témoigner d'une installation progressive de l'espèce dans notre territoire.

### **PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* \***

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 mâle chanteur le 23/06 (aux Tranches / Notre-Dame-de-Monts (O. Legros).

(La sous-espèce nominale se reproduit de la France à la Volga, au nord des Pyrénées, de la Grèce et de la Turquie). Hormis la population noirmoutrine, aucune population établie n'est connue dans les deux départements. Les données concernent le plus souvent des chanteurs isolés, probablement de passage.

### **HIRONDELLE ROUSSELIN *Cecropis daurica***

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 2/2)

**Loire-Atlantique** : 1 ind. le 02/05 à la Tenue de Mareil / Les-Moutiers-en-Retz (O. Penard).

**Vendée** : 1 ind. en vol le 05/05 au marais de la Guerche / L'Île d'Yeu (X. Hindermeyer) ; 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 30/10 en migration au-dessus de la dune de la Grande Conche / L'Île d'Yeu (F. Portier).

(Pourtour méditerranéen, Afrique du Nord, Asie Mineure). Migrateur rare, noté surtout au printemps sur le littoral vendéen, plus occasionnel en Loire-Atlantique. Les données de 2012 sont les premières pour cette espèce sur l'île d'Yeu.

### **PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi***

(2/7) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)

**Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année du 30/10 au 04/11 plage et dune de la Tourette / L'Île d'Yeu (X.

Hindermeyer *et al.*) ; 1 ind. le 13/11 à la jetée des Îlots / L'Épine (D. Desmots) ; 1 ind. le 12/12 à la RNN des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île (D. Desmots).

(La sous-espèce type niche de la Sibérie occidentale à la Mongolie et hiverne principalement au Pakistan, en Inde, Chine et Asie du Sud-Est, mais aussi assez régulièrement très à l'ouest de ses quartiers habituels (Espagne, Afrique du Nord...)). Migrateur et hivernant rare et irrégulier dans les deux départements. En 2012, des individus sont observés en passage automnal mais aucun hivernage complet n'a été noté.

### **JASEUR BORÉAL *Bombycilla garrulus***

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 fem. ad. le 06/11 dans le marais du Jaunay / Givrand (G. Besseau).

(La sous-espèce type niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou d'invasions, l'espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux ou l'ensemble de l'Europe centrale). Hivernant très rare dans les deux départements. Les observations de Jaseur boréal dépendent de phénomènes invasifs, réguliers chez cette espèce. Cependant, l'ouest de la France est rarement concerné par ce type d'évènement. Cette donnée vendéenne est d'autant plus remarquable qu'elle se situe en dehors de tout mouvement invasif noté dans le reste du pays.

### **PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola***

(5/5) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Rappel : espèce soumise à homologation uniquement en dehors des opérations de baguage.

**Loire-Atlantique** : 1 ind. le 20/08 dans le marais de Pompas / Herbignac (A. Gergaud *et al.*).

**Vendée** : 1 ind. le 20/08 dans le marais salant de la Guittière / Talmont-Saint-Hilaire (L. Chaillot).

(Niche dans les états Baltes, en Biélorussie et en Russie, ainsi qu'en Pologne, en Hongrie et en Allemagne. Hiverne en Afrique de l'Ouest, au moins dans le delta du Sénégal). Seules les données d'oiseaux non capturés sont traitées dans ce rapport. Les opérations de baguage menées dans les deux départements montrent que l'espèce est de passage régulier durant le mois d'août dans les principales zones humides.

### **HYPOLAÏS ICTÉRINE *Hippolais icterina***

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 08/09 sur la dune de la Grande Conche / L'Île d'Yeu (X. Hindermeyer).

(Nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural). Très rare dans les deux départements.

### **FAUVETTE À LUNETTES *Sylvia conspicillata***

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 mâle ad. du 28/05 au 18/06 à la pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer (F. Portier *et al.*).

(Pourtour méditerranéen et Afrique du Nord, espèce essentiellement littorale). Extrêmement rare sur la façade Atlantique, cette donnée est une première pour la Vendée. L'habitat dans lequel elle a été observée est typique.



*Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata,*

*L'Aiguillon-sur-Mer, juin 2012*

*Photo © G. Besseau*

### **FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca***

(3/3) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

**Vendée** : 1 ind. le 02/09 aux Broches / L'Île d'Yeu (E. Ouvrard) ; 1 ind. du 04/10 au 05/10 dans la dépression de la Grande Conche / L'Île d'Yeu (J.-M. Guilpain *et al.*).

(Nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural). Très rare dans les deux départements. L'espèce est cependant régulièrement observée sur l'île d'Yeu à l'automne.

### **POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus***

(20/20) (44 : 1/1 ; 85 : 16/18)

**Loire-Atlantique** : 1 ind. le 26/10 sur le remblai de Donges-Est / Donges (E. Archer).

**Vendée** : 1 ind. du 29/09 au 05/10 dans le Vallon des Sabias / L'Île d'Yeu (B. Isaac *et al.*) ;

1 ind. le 05/10 dans le Vallon des Sabias / L'Île d'Yeu (F. Portier) ; 1 ind. le 14/10 dans le Marais de la Croix / L'Île d'Yeu (F. Portier) ; 1 ind. le 14/10 aux Agaures / Les Sables-d'Olonne (D. Desmots) ; 1 ind. du 15 au 17/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche / L'Île d'Yeu (F. Portier) ; 1 autre ind. le 16/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche / L'Île d'Yeu (F. Portier) ; 1 ind. le 17/10 à la pointe des Corbeaux / L'Île d'Yeu (F. Portier) ; 1 ind. le 18/10 dans la saulaie des Poupounes / L'Île d'Yeu (F. Portier) ; 1 ind. les 19 et 20/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche / L'Île d'Yeu (F. Portier) ; 3 ind. du 20/10 au 21/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche / L'Île d'Yeu (X. Hindermeyer) ; 1 ind. le 21/10 à Ker Châlon / L'Île d'Yeu (X. Hindermeyer) ; 1 ind. le 24/10 au Fort Larron / Noirmoutier-en-l'Île (D. Desmots) ; 1 ind. du 24 au 25/10 dans le bourg / Givrand (G. Besseau) ; 1 ind. du 25/10 au 03/11 à la Roullière / Noirmoutier-en-l'Île (D. Robard) ; 1 ind. du 30/10 au 01/11 au Petit Bouillac / Saint-Vincent-sur-Jard (M. Pirio et J.-D. Vrignaud) ; 1 ind. du 19/12 au 21/12 sur la RNN des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île (D. Desmots).  
**2011 Vendée** : 1 ind. le 03/10 à la pointe des Corbeaux / L'Île d'Yeu (faune-vendee.org).

(Niche dans le nord de la Russie, de la Petchora et de l'Oural à l'ouest, jusqu'à l'Anadyr et la mer d'Orkhotsk à l'est, au sud jusqu'à la Mongolie et au nord-est de la Chine. Hiverné dans le sud-est de l'Asie). Espèce emblématique rare mais régulière chaque automne en Vendée, curieusement plus exceptionnelle en Loire-Atlantique. L'année 2012 est encore une très bonne année pour cette espèce en Vendée et quasi "vide" pour la Loire-Atlantique. Comme souvent, l'île d'Yeu rassemble la majorité des données.

### **POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli***

(5/6) (44 : 1/1 ; 85 : 1/2)

**Loire-Atlantique** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année capturé et bagué le 10/09 à Lyanne / Les-Moutiers-en-Retz (F. Latraube *et al.*).

**Vendée** : 2 mâles chanteurs le 01/05 à la Fouinière / Bretignolles-sur-Mer (F. Portier).

(Nord-ouest de l'Afrique, nord et centre de l'Europe). Migrateur rare au printemps. Les données concernent principalement des oiseaux en migration pré-nuptiale.



*Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli,*  
*Les Moutiers-en-Retz, septembre 2012*  
 Photo © F. Latraube

**GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva***

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 ind. du 21 au 22/10 au golf de Port-Bourgenay / Talmont-Saint-Hilaire (L. Chaillot *et al.*)

(Europe centrale et de l'Est, jusqu'à l'Oural ; hiverne au Moyen-Orient). Occasionnel très rare à l'automne, cette donnée est la 4<sup>e</sup> pour la Vendée.

**PIE-GRIÈCHE A TÊTE ROUSSE *Lanius senator***

(16/18) (44 : 1/1 ; 85 : 3/3)

**Loire-Atlantique** : 1 fem. ad. de la ssp. *senator* le 02/05 à Kerignon / Guérande (J.-P. Tilly).

**Vendée** : 1 fem. ad. le 05/05 de la ssp. *senator* aux Mauvelières / L'Épine (D. Robard) ; 1 mâle ad. le 12/05 au Grand Phare / L'Île d'Yeu (F. Portier) ; 1 mâle ad. le 01/08 au Petit Chaud / Bouin (J.-Y. Frémont).

**2011 Vendée** : 1 jeune de l'année de la ssp. *senator* le 19/08 aux Communaux / Longeville-sur-Mer (faune-vendee.org).



*Pie-grièche à tête rousse Lanius senator senator,*  
*L'Épine, mai 2012*  
 Photo © D. Robard

(Europe de l'Ouest et îles de la Méditerranée). Migrateur rare aux deux passages, régulier en Vendée. Les îles d'Yeu et de Noirmoutier demeurent les sites vendéens les plus attractifs pour contacter cette espèce.

**GRAND CORBEAU *Corvus corax***

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

**Vendée** : 1 ind. le 12/02 (à la Matte à Rambeau / Beauvoir-sur-Mer (F. Portier).

(Présent en France dans les zones montagneuses et les falaises littorales de la Manche). L'espèce est présente en Bretagne et Normandie. Cette donnée est remarquable en ce qui concerne la date, car, pour cette espèce réputée sédentaire, les mouvements de jeunes sont notés en mars/avril et septembre/octobre. La localisation est également inédite.

**BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana***

(8/8) (44 : 3/3 ; 85 : 4/10)

**Loire-Atlantique** : 1 ind. de type ♀ le 30/08 sur les Prairies / Varades (P. Bellion) ; 1 ad. le 10/09 à la Dumanchère / Rougé (D. Grandière) ; 1 ind. de 1<sup>re</sup> année capturé et bagué le 16/09 sur le lac de Grand-Lieu (O. Poisson et S. Reeber).

**Vendée** : 2 ind. de 1<sup>re</sup> année le 19/08 puis 5 ind. dont 1 ad. et 2 ind. de 1<sup>re</sup> année le 08/09 au Marais Salé / L'Île d'Yeu (M.-P. et X. Hindermeyer) ; 4 ind. dont au moins 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 07/09 dans les marais salants de la Guittière / Talmont-Saint-Hilaire le 07/09 (J.-D. Vrignault) ; 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 09/09 sur le lagunage de La Tranche-sur-Mer (F. Portier).

(De l'Europe de l'Ouest à la Turquie). Migrateur peu commun dans les deux départements. Localisations et dates classiques. Les effectifs notés en Vendée restent toutefois remarquables.

**LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES**

**Bernache cravant du Pacifique *Branta bernicla nigricans***

**Vendée** : 1 ad. le 09/04 depuis l'observatoire du Chenal Vieux / Saint-Michel-en-l'Herm (description jugée insuffisante).

**Erismature rousse *Oxyura jamaicensis***

**Loire-Atlantique** : 2 ad. le 08/01 à l'étang de Beaumont / Issé (description insuffisante ne

permettant pas d'exclure de façon certaine une Érismature à tête blanche).

### **Puffin yelkouan *Puffinus yelkouan***

**Loire-Atlantique** : 1 ind. le 16/09 en mer entre La Turballe et Hoëdic (description et clichés ne permettant pas d'exclure un puffin des Anglais).

### **Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus***

**Loire-Atlantique** : 1 ind. le 12/02 à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (description jugée insuffisante pour exclure un ibis allochtone échappé).

1 ind. le 13/02 à la Saline de la Torte / Assérac (description jugée insuffisante pour exclure un ibis allochtone échappé).

1 ind. le 16/08 à la Butte à Bézier / Saint-Joachim (description jugée insuffisante pour exclure un Ibis de Ridgeway échappé. Une nouvelle fois, les critères attendus pour l'Ibis falcinelle (couleur du manteau ...) ne sont pas mentionnés).

1 ind. le 24/10 au Chaussin Riou / Saint-Julien-de-Concelles (description jugée insuffisante pour exclure un ibis allochtone échappé).

### **Oie des moissons *Anser fabalis***

**Loire-Atlantique** : 1 ind. le 13/02 sur l'île de la Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (description et photos ne permettant pas de valider cette espèce. Il s'agirait plutôt d'une oie à bec court. Le CHN a été saisi de cette donnée).

### **Pluvier guignard *Charadrius morinellus***

**2010 Vendée** : 1 ind. en vol le 07/10 dans le secteur de l'aérodrome / L'Île d'Yeu (oiseau non vu, uniquement entendu).

### **Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus***

**Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année le 01/09 à la pointe du But / L'Île d'Yeu (description laissant plutôt suggérer un labbe parasite. Plusieurs critères ne correspondent à l'espèce proposée (description des primaires, des sous-caudales...)).

### **Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis***

**Vendée** : 1 ind. de 2<sup>e</sup> année le 13/02 sur le lagunage de Jard-sur-Mer (photos montrant un goéland argenté immature).

### **Goéland pontique *Larus cachinnans***

**Loire-Atlantique** : 1 ad. le 28/12 à Mésanger (description ne présentant pas tous les critères diagnostics pour statuer positivement sur cette espèce).

**2009 Vendée** : 1 ind. de 3<sup>e</sup> année du 01/02 au 16/02/09 sur la plage de la Tourette / L'Île d'Yeu (il s'agit très probablement de cette espèce, mais en l'absence d'éléments photographiques, il est impossible d'exclure un éventuel hybride).

### **Martinet pâle *Apus pallidus***

**2011 Vendée** : 1 ind. le 14/11 à la Boursinière / Noirmoutier-en-l'Île (si la date plaide en faveur de cette espèce, il manque de nombreux critères pour valider l'identification proposée).

### **Pipit rousseline *Anthus campestris***

**2011 Loire-Atlantique** : 1 ind. le 25/06 à la Grand Falaise / La Turballe (description jugée insuffisante pour conclure).

### **Bergeronnette printanière d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla***

**2011 Vendée** : 1 mâle ad. le 18/05 à la pointe des Corbeaux / L'Île d'Yeu (sur la base de l'article de P. J. Dubois dans Ornithos 19-2 (2012), les caractéristiques décrites laissent présumer une bergeronnette d'Italie non pure).

### **Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus***

**Vendée** : 1 ind. entendu le 22/10 dans la vallée de l'Écourt / Brem-sur-Mer (oiseau non vu (cf. conditions d'acceptation des fiches auditives)).

### **Grimpereau des bois *Certhia familiaris***

**2009 Vendée** : 1 ind. capturé le 17/01 à la Fignouzière / Poiroux (précédemment accepté par le CHD 85 mais à présent rejeté en raison d'un haplotype et d'un phénotype correspondant au Grimpereau des jardins (source F. Jiguet, MNHN)).

### **Pie-grièche grise *Lanius excubitor***

**2010 Loire-Atlantique** : 1 ind. le 26/10 aux Brosses / Haute-Goulaine (description insuffisante, ne permettant pas de trancher entre les différentes espèces de pie-grièches grises).

### **Étourneau unicolore *Sturnus unicolor***

**Vendée** : 1 ind. le 02/06 à La Chaize-le-Vicomte (donnée originale en raison notamment de sa localisation géographique. Description insuffisante, ne permettant pas d'exclure de façon certaine un étourneau sansonnet en plumage nuptial).

### **Bruant ortolan *Emberiza hortulana***

**2010 Vendée** : 1 ind. le 03/10 au Vigneux / Bouin (description trop succincte).

## **LISTE DES DONNÉES HOMOLOGUÉES PAR LE COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2012**

Les données ci-dessous sont issues du rapport 2012 du comité d'homologation national (Kayser *et al.* 2014) et concernent les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

### **OIE DE TAÏGA *Anser fabalis fabalis***

**Vendée** : 1 ad. à la Réserve de Saint-Denis-du-Payré le 26/02 (P. Trotignon *et al.*).

### **OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus***

**Vendée** : 1 ad. à la Réserve de Saint-Denis-du-Payré du 11/02 au 20/02 (P. Trotignon *et al.*).

### **BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis***

**Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année à la Réserve de Saint-Denis-du-Payré du 15/12 au 01/03/13 (F. Portier *et al.*).

### **SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis***

**Vendée** : 1 mâle ad. sur le communal de Lairoux du 03/03 au 11/03 (G. Welch *et al.*).

### **MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata***

**Vendée** : 1 mâle de 2<sup>e</sup> année du 23/03 au 14/04 et 1 fem. ad. du 27/11 au 24/03/13 à la Terrière / La Tranche-sur-Mer (P. Trotignon *et al.*).

### **BUSARD PÂLE *Circus macrourus***

**Vendée** : 1 mâle ad. à Benet le 22/08 (F. Caquineau).

### **BUSE FÉROCE *Buteo rufinus***

**Vendée** : 1 ind. à la Bouhère / Triaize du 16/07 au 26/10 (J. Gonin *et al.*).

### **BUSE PATTUE *Buteo lagopus***

**Vendée** : 1 ind. de 2<sup>e</sup> année au Chail / Saint-Pierre-le-Vieux le 21/03 (M. Faucher).

### **MARQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla***

**Loire-Atlantique** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le 19/08 (S. Reeber, O. Poisson).

### **GRAVELOT SEMIPALMÉ *Charadrius semipalmatus***

**Loire-Atlantique** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le 7/10 (S. Reeber).

### **PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica***

**Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année à la réserve des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île du 10/10 au 11/10 (D. Desmots *et al.*).

### **VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius***

**Vendée**: 1 ad. au Marais Neuf / Beauvoir-sur-Mer du 29/03 au 2/04 (E. Gas *et al.*) ; 1 ind. à Champagné-les-Marais du 22/10 au 23/10 (L. Gourraud *et al.*).

### **BÉCASSEAU MINUSCULE *Calidris minutilla***

**Vendée** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année sur le Luzan / Noirmoutier-en-l'Île le 10/10 (D. Desmots) puis 1 ind. de 1<sup>re</sup> année à L'Épine du 12/12 au 24/01/13 (D. Robard *et al.*).

### **BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis***

**Loire-Atlantique** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu du 6/09 au 10/09 puis 1 ad. du 10/09 au 12/10 (S. Reeber).

### **STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans***

**Vendée** : 1 ad. au polder de Sébastopol / Barbâtre du 9/04 au 5/07 (www.ornitho.fr).

### **TARIER ORIENTAL *Saxicola maurus***

**Vendée** : 1 fem. à l'aérodrome / L'Île d'Yeu le 20/10 (X. Hindermeyer et F. Portier).

### **GRIVE DORÉE *Zoothera dauma***

**Vendée** : 1 ind. tué contre une baie vitrée à la Domangère / Nesmy le 31/10 (O. Bossu *vide* F. Portier).

### **ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola***

**Loire-Atlantique** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année capturé à Donges le 28/08 (J. Foucher).

### **ÉTOURNEAU ROSELIN *Pastor roseus***

**Vendée** : 1 juv. à Noirmoutier-en-l'Île le 26/08 (D. Robard) ; 1 juv. sur la plage des Bossilles / L'Île d'Yeu du 15 au 21/09 (X. Hindermeyer et F. Portier).

### **BRUANT MELANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala***

**Vendée** : 1 mâle dans la dune de la Grande Conche / L'Île d'Yeu le 25/05 (S. Desmarest *et al.*).

### **BIBLIOGRAPHIE**

Bellion P., 2013. Reproduction du Coucou geai *Clamator glandarius* en Loire-Atlantique. *Ornithos* 20(1) : 64-65.

CAF, 2011. Liste des oiseaux du Paléarctique occidental. *Ornithos* 18(3) : I-XXVIII.

Cléva D. & Naud C., 2014. Suivi d'un couple reproducteur d'Elanion blanc *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789) en Loire-Atlantique. *Chronique naturaliste du GNLA - années 2012 et 2013* : 9-18.

Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Oliosio G. & Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, 560 p.

Kayser Y., Paepegaey B. & le CHN, 2014. Les oiseaux rares en France en 2012. *Ornithos* 21(2) : 65-107.

Reeber, S. , 2011. Premier cas de reproduction de l'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* au lac de Grand-Lieu. *Ornithos*, 18(6) : 390-392.

Frédéric LE GALLO  
106 la Porcelière  
85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE  
(flegallo@gmail.com)

Willy RAITIÈRE  
62, Rougerand  
44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES  
(wild\_wild\_will\_2000@yahoo.fr)

– Décembre 2014 –

### Remerciements :

Le comité remercie l'ensemble des observateurs qui ont adressé leurs fiches et invite les autres à le faire même si ces dernières datent un peu.

Merci à André Barzic, Xavier Hindermeyer et Frédéric Portier pour leur relecture attentive et les compléments apportés à ce rapport.