

LES OISEAUX RARES EN LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDEE EN 2011

Frédéric LE GALLO, Willy RAITIERE et le CH44-85

Deuxième rapport du comité d'homologation interdépartemental de Loire-Atlantique et Vendée

Voici le deuxième rapport des données homologuées en 2011 par le comité interdépartemental de Loire-Atlantique et Vendée. Ce comité, né de la fusion du CHD44 et du CHD85, a pris ses fonctions au 1^{er} janvier 2010 et rassemble donc des ornithologues de Vendée et de Loire-Atlantique, chargés d'examiner les fiches concernant ces deux départements.

Trois associations sont partenaires et soutiennent le CH44-85: les LPO Loire-Atlantique et Vendée ainsi que le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA).

Pour l'année 2011, ce comité, composé des membres suivants : Bertrand Isaac, Willy Maillard, Julien Mérot, Frédéric Le Gallo, Frédéric Portier et Willy Raitière (respectivement secrétaire pour la Vendée et secrétaire pour la Loire-Atlantique), a examiné 139 fiches, parmi lesquelles 128 ont été validées et 11 ont été rejetées, donnant un taux d'acceptation d'environ 92,1 %.

Nous rappelons que seules les données homologuées sont présentées dans les rapports du CH44-85, du CMR et toutes autres publications. Nous invitons les observateurs qui ne l'auraient pas encore fait à transmettre leurs fiches à l'adresse suivante : ch44_85@yahoo.fr, même si les données sont antérieures à 2011.

FAITS MARQUANTS :

L'année 2011 a été placée sous le signe des limicoles rares. En effet, elle apporte la première mention du Bécasseau à longs doigts pour la Loire-Atlantique mais aussi pour la France. Le Bécasseau à queue pointue fait son apparition dans la liste des espèces observées en Loire-Atlantique et un afflux de limicoles néarctiques a été noté sur les deux départements (Bécasseau tacheté, semipalmé, de Baird et rousset). La sous-espèce orientale *phoenicuroides* du Rougequeue noir est notée pour la première fois en Vendée, ce qui constitue une première française.

Notons aussi 2 observations d'Accenteurs alpins en Vendée (premières mentions pour ce département), dans le cadre d'un afflux ayant touché le quart nord-ouest de la France.

Une nouvelle espèce nicheuse a été notée en Loire-Atlantique en 2011 : l'Ibis falcinelle.

L'Hypolaïs ictérine fournit sa deuxième mention en Loire-Atlantique alors que la Corneille mantelée est notée dans ce même département après plusieurs dizaines d'année d'absence.

La Rousserolle isabelle est notée pour la première fois sur l'Ile d'Yeu, ce qui constitue la seconde mention vendéenne.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.

2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données homologués depuis la création du CH44-85 et celui des individus correspondants, à l'exception de l'année 2011. Les deux suivants représentent le nombre de données homologuées et le nombre d'individus correspondant pour 2011 par département.

3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation (département, effectif, localité et date). Concernant le(s) nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique), la mention *et al* indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CH est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo).

4. Distribution générale de l'espèce (entre parenthèses) et statut dans les départements, puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste du Comité de l'Avifaune Française (CAF, 2007).

Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la sous-espèce concernée.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : **Cygne de Bewick** - 1 individu le 26/02/2010, Saint-Joachim, Loire-Atlantique (J.L. Dourin *et al*, in LE GALLO ET RAITIERE 2013).

* Espèce soumise au CH44-85 hors de certaines zones géographiques.

** Espèce soumise au CH44-85 pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

CYGNÉ DE BEWICK *Cygnus columbianus*

(1/1) (44: 2/3 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ad du 15 au 16/01 à la Louisiane / Dréfféac (Didier Montfort) et 2 ad du 13 au 27/03 sur le plat de Rozé / Saint Joachim (Jean-Luc Dourin & Alain Troffigué).

(Se reproduit en Sibérie arctique à l'est de la péninsule de Kola ; hiverne dans les îles Britanniques, du nord de la France au nord-est de l'Allemagne, et ponctuellement plus au sud). Données classiques pour la Loire-Atlantique concernant cet hivernant rare dans ce département. Rappelons qu'en Vendée, l'espèce est très rare et irrégulière.

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*

(0/0) (44: 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ad du 15 au 16/01 à la Louisiane / Dréfféac (Didier Montfort).

(Se reproduit de l'Islande et la Scandinavie jusqu'au nord-est de la Sibérie, également en Mongolie). Cet oiseau était accompagné d'un Cygne de Bewick, association inhabituelle de ces deux espèces de cygnes blancs.



Cygne chanteur *Cygnus cygnus* et de Bewick *Cygnus columbianus*, Dréfféac, janvier 2011
(D. Montfort).

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

(4/6) (44: 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 sur l'île de Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire le 06/02 (François Roche).

(Scandinavie, Sibérie). Migratrice et hivernante rare, surtout en Vendée. A rechercher l'hiver dans le sud de ce département. La description fournie n'a pas permis de déterminer la sous-espèce de cet individu.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce "hrota", appelée Bernache à ventre pâle.

(5/5) (44 : 3/4 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 à la Pointe de la Pierre / La Plaine-sur-mer le 12/02 (Steve Gantier & Didier Dehais) ; 1 ad dans la baie de Pen Bé / Assérac du 30/10 au 12/11 (David Hamon & Anne-Cécile Jouaud) et 2 1^{er} hiver dans le Traict de Rostu / Mesquer et le Petit Traict de Guérande du 11 au 27/11 (François & Benoit Duchenne).

Vendée : 1 ad du 07 au 18/11 sur la vasière du Luzan / Noirmoutier-en-l'Île (Didier Desmots).

2010 Vendée : 1 ad le 28/11 à la « maison de Clémenceau » / Saint-Vincent-sur-Jard (Luc Chaillot) ; 1 ind le 01/01 à la La Phelippière / Saint-Vincent-sur-Jard (Maxime & Michel Pirio *et al.*).

(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-Joseph). Ce taxon est observé très régulièrement dans les deux départements. La donnée de la Plaine-sur-mer est inhabituelle, ce taxon étant le plus souvent observé dans le secteur des marais salants de Guérande et du Mès.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce "nigricans", appelée Bernache du Pacifique.

(3/3) (44 : 3/0 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle probable ad dans les Traicts du Croisic / Guérande du 10/11 au 25/12 (Arnaud Le Nevé, Antoine Reboul & Willy Maillard).

2009 Vendée : 1 ad au Goulet et à la Phelippière / Saint-Vincent-sur-Jard du 12/12 au 29/01/10 (Maxime Pirio *et al.*).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais très régulier sur les deux départements. L'oiseau des traicts du Croisic est probablement le mâle hivernant chaque année dans le secteur. Par conséquent, il n'a pas été comptabilisé comme nouvel oiseau.



Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*, Guérande, décembre 2011 (H. Touzé).

FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris*

(3/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 1^{er} hiver du 01 au 19/11 aux Métairies et sur la station de lagunage de Givrand (Luc Chaillot & Gérard Besseau).

2006 Vendée : 1 mâle ad sur la carrière de Luzay / Noirmoutier-en-l'Île du 20 au 29/05 et non du 20 au 25/05 (Emmanuel Gas, Didier Desmots, Matthieu Vaslin & Luc Chaillot).

(Amérique du nord. S'égaré régulièrement en Europe de l'Ouest, principalement dans les îles Britanniques). Hivernant rare et irrégulier sur les deux départements.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(5/5) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle le 05/02 au Grand Pâtis / Saint-Mars-du-Désert (Françoise Le Gal) et 1 mâle adulte le 19/03 à La Ville / Haute-Goulaine (Laurent Bauza & Patrice Ouvrard).

(Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest). Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée ; sans doute plus régulier en Loire-Atlantique, notamment sur le Lac de Grand-Lieu.

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* *

(12/42) (44 : 4/6 ; 85 : 3/6)

Loire-Atlantique : en dehors du lac de Grand-Lieu, 1 mâle aux Brosses / Haute-Goulaine le 09/03 (Jacques Lemore) ; 1 mâle et 2 ind de type femelle le 12/08 à la station de lagunage du Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Willy Maillard) puis 1 mâle du 14/09 au 12/10 sur ce même site (Laurence Gourdel, Chantal Guichaoua, Steve Gantier, François Halligon et Willy Maillard).

Vendée : 2 ind de type femelle le 19/08 à la Braconière / La Barre-de-Monts (Perrine Dulac) ; 3 ind du 05 au 13/11 sur la station de lagunage de la Salaisière / Noirmoutier-en-l'Île (Dominique Robard, Bernard Thibeaud, Xavier Hindermeyer, Jean-Claude Croisé) puis 1 mâle ad le 22/11 sur ce même site (Frédéric Portier).

2006 Loire-Atlantique : 1 femelle ad le 15/04 sur la station de lagunage du Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Jean-Luc Ferrière).

2007 Loire-Atlantique : 1 ind de type femelle le 11/11 sur la station de lagunage du Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Willy Maillard).

(Amérique du nord, introduite en Grande-Bretagne depuis 1960). Espèce notée de la fin d'été à l'hiver sur les deux départements, sur les plans d'eau et lagunes de l'intérieur des terres. Plus rare sur le littoral. L'année 2011 est plus classique en ce qui concerne le nombre d'oiseaux observés.

*Note du comité : la qualité des fiches reçues concernant cette espèce étant régulièrement insuffisante pour exclure l'Erismature à tête blanche *Oxyura leucocephala*, le CH44-85 diffusera prochainement un document d'aide à l'identification, à destination des observateurs.*



Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*, Les Moutiers-en-Retz, septembre 2011 (F. Halligon).

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

(7/9) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ad du 28/04 au 03/05 au lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 ind le 07/03 pointe de Gilberge / L'Ile-d'Yeu (Xavier, Marie-Paule & Alix Hindermeier).

(Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hivernent principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la mer Noire et de l'Adriatique). Migrateur et hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. Les données de 2011 concernent des sites et des dates classiques.

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis*

(1/1) (44 : 2/2 ; 85 : 3/7)

Loire-Atlantique : 1 ind le 14/07 depuis la pointe du Croisic / Le Croisic (Gabriel Couroussé, Catherine Gentric & Lionel Loistron) et 1 ind le 15/09 depuis le même site d'observation (Gabriel Couroussé, Catherine Gentric & Claudine Spiotti).

Vendée : 4 ind le 23/08 depuis le Phare de l'Armandèche / Les Sables d'Olonne (Frédéric Le Gallo) ; 2 ind le 26/08 depuis la pointe des Corbeaux / L'Ile-d'Yeu (Xavier & Marie-Paule Hindermeier) et 1 cadavre le 08/09 au Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard (Jean-Do Vrignault & Luc Chaillot).

(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough). Migrateur très rare et très irrégulier, observé le plus souvent au large de nos côtes. Le département de la Vendée voit passer cette espèce régulièrement aux larges de ses côtes, notamment au niveau de l'île d'Yeu ou du phare de l'Armandèche. Les données de Loire-Atlantique sont plus inhabituelles, résultant d'une forte pression d'observation appliquée depuis la pointe du Croisic en 2011 dans le cadre du programme FAME (futur de l'environnement marin atlantique). Un afflux particulier concernant cette espèce a été noté en 2011.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* *

(14/21) (44 : 4/9 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 4 ad du 28/03 au 07/06 donnant 3 jeunes à l'envol sur le lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber & André Robert) ; 1 ad le 14/09 à La Prée des Barons / Saint-Mars-de-Coutais (André Robert) et 1 ind le 22/11 sur le lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber).

(Se reproduit, en Europe, essentiellement dans l'est et le sud du continent. La plupart des oiseaux européens hivernent en Afrique tropicale ou à l'est de la Méditerranée. En France, l'espèce niche depuis 2006 en Camargue). L'espèce devient de plus en plus régulière en Loire-Atlantique notamment où l'espèce s'est reproduite sur le lac de Grand-Lieu en 2011 (Reeber, 2011). Demeure rare et irrégulière en Vendée.

Note du comité : La qualité des fiches reçues concernant cette espèce étant régulièrement insuffisante pour exclure les autres espèces d'ibis de type « falcinelle » (Ibis de la Puna Plegadis ridgwayi et Ibis à face blanche Plegadis chihi) pouvant être échappés de captivité, le CH44-85 rappelle qu'un document reprenant les critères d'identification a été diffusé à destination des observateurs. Il est disponible ici : http://files.biolo vision.net/www.faune-vendee.org/pdf/files/news/ID_Ibis_falcinelle-2667.pdf

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus*

(2/5) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind le 13/11 au Brethomé / Brétignolles-sur-mer (Ronan Arhuro).

2006 Vendée : 1 imm au Boupère le 14/06 (Luc Chaillot, Stéphane & Yohan Rapin).

(Europe, Afrique du nord, Moyen-Orient, ouest de l'Asie). Migrateur très rare, mais de plus en plus régulier ces dernières années en juin sur nos départements. La donnée de novembre 2011 est quant à elle encore plus inhabituelle.



Vautour fauve *Gyps fulvus* et Buse variable *Buteo buteo*, Brétignolles-sur-mer, novembre 2011
(R. Arhuro).

AIGLE BOTTE *Aquila pennata*

(5/6) (44 : 0/0 ; 85 : 4/4)

Vendée : 1 individu du 17 au 24/04 puis 1 couple du 29/05 au 10/09 dans le bocage vendéen (localité tenue secrète ; Michel Bibard) ; 1 ad le 29/08 aux Violettes / L'Ile-d'Yeu (Arnaud Sournia) et 1 ind dans le bourg de Noirmoutier-en-l'île le 31/08 (Dominique Robard).

2010 Vendée : 1 ind le 28/08 à la Taillée / Saint-Hilaire-des-Loges (Gérard Besseau).

(Europe, Afrique du nord, Asie centrale). Migrateur rare sur les deux départements mais nettement plus régulier en Vendée. La nidification n'a toujours pas été prouvée dans ce département même si elle semble probable compte-tenu de la régularité des observations sur certains secteurs en période de reproduction.

FAUCON D'ELENORE *Falco eleonora*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ad au-dessus de la dune de la Fosse / Barbâtre le 27/04 (Jean-Charles Delattre) et 1 oiseau de 2^{ème} année le 03/07 au Phare des Corbeaux / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier).

(Se reproduit essentiellement de la Hongrie jusqu'au fleuve Léna en Russie. Hiverné en Afrique australe). Migrateur occasionnel très rare dans les deux départements, plus régulier en Vendée. . Un soupçon d'augmentation des données est à confirmer, notamment pour le département de la Vendée.

OUTARDE CANEPETIERE *Tetrax tetrax*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind le 17/04 sur la dune de la Gachère / Brétignolles-sur-mer (Frédéric Portier).

(Se reproduit du Maroc et de l'Europe de l'Ouest à travers l'Asie centrale jusqu'au nord-ouest de la Chine). Espèce anciennement nicheuse en Vendée, disparue en Loire-Atlantique. Cette donnée concerne un individu en halte migratoire.

GLAREOLE A COLLIER *Glareola pratincola*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ad le 17/04 dans le marais de la Guittière / Talmont-Saint-Hilaire (Maxime Pirio).

(Niche sporadiquement du sud de l'Europe et du Maghreb jusqu'au Kazakhstan, Iran et Pakistan, ainsi qu'à travers l'Afrique, au sud du Sahara). Migrateur rare et irrégulier sur les deux départements aux deux passages. A rechercher au printemps dans les zones humides.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*

(9/9) (44 : 6/9 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 juv du 31/08 au 02/09 sur la saline Donne / Guérande (Dominique Tavenon & Philippe Archambeau) ; 2 juv le 05/09 sur la vasière à Montloup au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber) ; 2 juv le 26/09 sur la vasière à Montloup au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber) ; 1 juv du 26 au 30/09 sur la vasière à Montloup au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber) ; 1 juv le 04/10 au nord de Ruby au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber) et 2 ind le 29/10 à la Gautière / Bourgneuf-en-Retz (Raymond Clavier).

Vendée : 1 juv le 01 et 02/10 sur le lac de Maché-Apremont / Maché (Frédéric Portier).

(Niche dans l'Arctique nord-américain, de l'ouest de la baie d'Hudson à l'Alaska et en Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Hiverné en Amérique du sud, dans le sud-est de l'Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande). Rare et irrégulier aux deux passages, particulièrement au printemps ; plus régulier à l'automne. Avec 9 oiseaux pour la Loire-Atlantique et 1 pour la Vendée, 2011 est de nouveau une bonne année pour l'espèce. Le Lac de Grand-Lieu et celui de Maché-Apremont sont des sites classiques pour voir ce bécasseau néarctique entre août et septembre.



Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Lac de Maché / Apremont, septembre 2011 (Frédéric Portier)

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 juv du 29/07 au 01/08 dans le marais de la Guittière / Talmont-Saint-Hilaire (Luc Chaillot).

(Se reproduit dans le centre de l'Eurasie, de l'est de la Biélorussie à l'est du lac Baïkal). Migrateur rare dans les deux départements mais plus régulier en Vendée, notamment en fin d'été.

PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 juv le 18/09 plage des Bossilles / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeier).

2007 Loire-Atlantique : 1 femelle ad le 26/05 à Sissable / Guérande (David Grandière).

(Se reproduit tout autour du Grand Nord, y compris en Islande et dans le nord de l'Europe, surtout au-delà de 60°N, au sud jusqu'en Écosse). Espèce rare dans les deux départements. Observé principalement en fin d'été. A noter la première donnée confirmée pour l'Île d'Yeu.

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

2008 Loire-Atlantique : 1 ind le 10/09 sur la station de lagunage du Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Julien Mérot & Willy Maillard).

Cette espèce n'est plus soumise à homologation depuis le 1^{er} janvier 2010.

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 juv le 11 et 12/10 sur le Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber & Willy Maillard).

(La sous-espèce nominale se reproduit de la Scandinavie et Russie arctiques et subarctiques jusqu'au delta de la Léna, en Sibérie). Espèce très rare dans les deux départements. Cette donnée fournit la deuxième observation de l'espèce sur le lac de Grand-Lieu après la capture d'un oiseau en 1954.



Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, 1^{re} année, lac de Grand-Lieu, octobre 2011 (S. Reeber).

GOELAND RAILLEUR *Chroicocephalus genei*

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 2/0)

Vendée : 1 mâle ad sur divers sites de l'île de Noirmoutier tout au long de l'année (Dominique Robard, Didier Desmots et al.).

2010 Vendée : 1 mâle ad sur divers sites de l'île de Noirmoutier tout au long de l'année (Dominique Robard et al.).

(Se reproduit du Sénégal à la mer Méditerranée et jusqu'au Moyen-Orient, Kazakhstan et Pakistan). Il s'agit toujours de l'individu découvert en 2003 et qui ne quitte désormais plus l'île de Noirmoutier.

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis*

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 5/5)

Vendée : 1 ad sur la station de lagunage de Jard-sur-mer le 26/02 (Frédéric Portier) ; 1 ad du 12 au 27/03 sur la station de lagunage de Bourgenay / Talmont-Saint-Hilaire (Jean-Claude Croisé & Luc Chaillot) ; 1 ad du 22 au 27/03 sur la station de lagunage de la Salaisière puis le 28/03 sur le marais Doridon / Noirmoutier-en-l'île (Patrick et Marie-Claude Derrien & Dominique Robard) ; 1 ad sur le polder Sébastopol / Barbâtre du 17/07 au 11/08 (Dominique Robard & Jean-Charles Delattre) ; 1 ad du 22/11 au 06/03/12 sur la RNN des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'île (Didier Desmots & Jean-Max Porteau).

(Niche dans le centre, le sud-ouest et l'est de l'Amérique du Nord. Hivernant et migrateur néarctique rare fréquentant surtout les zones côtières. Très occasionnel dans les terres). Hivernant et migrateur rare et irrégulier sur les deux départements. Certains secteurs vendéens comme l'île de Noirmoutier accueillent tout de même l'espèce annuellement. Les sites d'observation en 2011 sont classiques.



Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, adulte, Barbâtre, juillet 2011 (D. Robard).

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(2/2) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de 1^{ère} année le 01/11 à Port-Val / Le Croisic (Willy Raitière).

(Niche de la mer Noire jusqu'au Kazakhstan. S'est installé récemment près de Moscou ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hiverné dans le golfe Persique, en mer Rouge et en effectif moindre dans le centre, le nord et l'ouest de l'Europe). Très rare sur les deux départements, bien que probablement sous-détecté. A rechercher en automne et en hiver dans les bandes de laridés sur le littoral ou sur les décharges des deux départements.

Note du comité : les connaissances croissantes concernant l'identification de cette espèce laissent espérer de plus nombreuses observations dans le futur. Attention cependant, certains plumages sont assez difficiles à identifier et la présence d'oiseaux hybrides n'est pas à sous-estimer, même si les oiseaux sont bagués. Aussi des photos sont nécessaires pour aider à l'homologation de cette espèce délicate.

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*

(3/3) (44 : 2/2 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de 2^e année le 24/01 sur le centre d'enfouissement technique de la Coutume / Mésanger (Yann Brilland) ; 1 oiseau de 1^{ère} année le 16/12 au Closio / Piriac-sur-mer (Gérard Bertiau).

Vendée : 1 oiseau de 1^{re} année du 26/12 au 01/01/12 dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Gérard Besseau, James Pelloquin & Nathalie Barré).

2007 Loire-Atlantique : 1 oiseau de 2^e année du 18 au 28/03 dans le marais de Grée / St-Herblon (Willy Maillard, Yves Trévoux et Fabien Branger).

(Niche au Groenland et en Islande puis de l'île Jan Mayen et du Spitzberg jusqu'en Sibérie. Hivernent surtout dans le nord de l'Atlantique jusqu'en Grande-Bretagne ; effectifs réduits plus au sud, présence occasionnelle en Suisse, en mer Caspienne et en Méditerranée). Hivernant rare et irrégulier en Loire-Atlantique, assez régulier en Vendée. Le suivi plus assidu des centres d'enfouissement de Loire-Atlantique laisse espérer des observations plus fréquentes de goélands néarctiques. La donnée vendéenne est classique.



Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*, 1^{re} année, St Gilles Croix-de-Vie, décembre 2011 (J. Pelloquin)

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*

(1/2) (44 : 2/2 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ad le 29/08 en Grande Brière / Saint-Joachim (Alain & Jacques Troffigué) et 1 ad le 03/09 sur la vasière de Méan / Saint-Nazaire (Didier Montfort).

Vendée: 1 ad le 25/07 sur le polder de Saint-Cérans / Bouin (Hugo Touzé & Jean-Yves Frémont).

(Du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-est de la Chine; également en petit nombre en Allemagne et au Danemark). Migratrice rare et irrégulière sur les deux départements. Avec 3 oiseaux différents sur les deux départements, 2011 est une bonne année pour cette espèce.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

(3/5) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 adulte le 22/08 à la pointe de St-Gildas / Préfailles (Hugo Touzé).

2010 Loire-Atlantique : 1 ad le 04/09 sur l'étier de Lavau / Lavau-sur-Loire (Willy Maillard).

(Des côtes est de l'Amérique du nord et des Antilles au nord du Venezuela, aux Açores et dans le nord-ouest de l'Europe). Migrateur occasionnel sur les deux départements. La pointe de St-Gildas à Préfailles semble être le meilleur site pour contacter l'espèce en Loire-Atlantique. La donnée de Lavau-sur-Loire est plus inhabituelle pour cette espèce observée le plus souvent sur le littoral.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*

(12/24) (44 : 9/9 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : toutes les données proviennent du Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber) : 1 ind du 20 au 27/04 ; 1 adulte du 16 au 24/05 puis 1 couple sur son nid avec 3 œufs du 24/05 au 28/07 (nichée détruite par le vent le 04/07) ; 1 juv du 20 au 23/08 ; 1 juv du 23 au 25/08 (en compagnie du précédent le 23/08) ; 2 juv du 12 au 14/09 ; 1 juv les 21 et 22/09 ; 1 juv le 7/10.

Vendée : 1 adulte le 29/05 sur la station de lagunage de Notre-Dame-de-Riez (Gérard Besseau).

(Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie orientale (région de l'Amour). Hivernent principalement en Afrique tropicale). En Loire-Atlantique, l'espèce a de nouveau tenté de se reproduire, après sa première reproduction réussie en Brière en 2009 (Dourin, Montfort, Reeber, & Troffigué, 2008). En revanche l'espèce reste rare et irrégulière en Vendée aux deux passages.



Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*, adulte, lac de Grand-Lieu, juin 2011 (S. Reeber).

MERGULE NAIN *Alle alle*

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 devant diverses plage de l'Île d'Yeu (pointe de Gilberge, plage des Sapins, plage de Ker Châlon, plage de la Tourette) du 09/01 au 23/04 (Frédéric Portier, Xavier & Marie-Paule Hindermeyer).

2004 Vendée : 1 devant la plage du Pont Jaunay / Brétignolles-sur-mer (Gérard, Lyliane, Julie et Rémi Besseau).

(Niche depuis le haut Arctique canadien et le nord du Groenland jusqu'au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble). Occasionnel en hiver sur les deux départements. La longueur du stationnement de l'oiseau de l'île d'Yeu est remarquable.

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

2008 Vendée : 1 cadavre le 23/01 sur la plage au niveau du Havre du Payré / Talmont-Saint-Hilaire (Luc Chaillot).

(La sous-espèce nominale niche en Grande-Bretagne, Irlande, îles Féroé, sud de la Norvège, îles Anglo-Normandes et Bretagne). Malheureusement, la plupart des données de ce petit alcidé concerne des individus retrouvés morts sur les plages.

COUCOU-GEAI *Clamator glandarius*

(5/5) (44 : 2/1; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ad du 26/03 au 03/04 dans le secteur de Drézeux / Guérande (Catherine Gentric, Pascal Coignard, Philippe Della Valle).

Vendée : 1 ad le 17/04 aux Roussières / Brem-sur-Mer (Frédéric Portier).

2009 Loire-Atlantique : 1 ind le 14/04 au-dessus du canal de Rozé / Saint-Joachim (Antoine Lanrivain).

(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du nord). Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps. Observation de l'espèce de plus en plus fréquente en Vendée, y a niché avec succès en 2009.

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* *

(0/0) (44 : 0/0; 85 : 2/2)

Vendée : 1 chanteur dans le bourg de Thiré le 30/04 (Bruno Buggia) et 1 chanteur du 10 au 12/05 à La Sénardière / Boufféré (Sébastien Batard).

2008 Loire-Atlantique : 1 mâle ad chanteur dans le bourg de Frossay du 21/05 au 14/06 (Franck Latraube).

2005 Vendée : 1 mâle ad chanteur le 21/04 au Moulin de Xanton / Xanton-Chassenon (Etienne Ouvrard).

(La sous-espèce nominale se reproduit de la France à la Volga, au nord des Pyrénées, de la Grèce et de la Turquie). Hormis la population noirmoutine, aucune population établie n'est connue dans les deux départements. Les données concernent le plus souvent des chanteurs isolés probablement de passage. La donnée de Frossay concerne un oiseau de retour sur ce même site pour la troisième année consécutive.

MARTINET A VENTRE BLANC *Apus melba*

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1/2)

Vendée : 2 ind le 19 et 1 ind le 30/07 à la Cité des Oiseaux / Les Landes-Génusson (Amandine Diot & Florent Fressard).

(Sud de l'Europe, Asie mineure et Afrique du nord). Migrateur rare sur les deux départements. L'observation de 2 individus ensemble est exceptionnelle.

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla* **

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind le 12/11 au Chemin du Pré Joys / Les Moutiers-en-Retz (Didier Cléva).


(Europe, Scandinavie, Sibérie, Mongolie, Chine, Japon et nord de l'Algérie et de la Tunisie). Cette donnée est très tardive, la majorité des oiseaux observés en migration postnuptiale étant notés entre fin-août et fin-septembre.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* *

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : espèce non soumise à homologation)

Loire-Atlantique : 1 ind le 27/08 sur la dune de Pen Bron / La Turballe (Hugo Touzé).

(Europe centrale et du sud, Asie centrale et Maghreb). Espèce très rare en migration en Loire-Atlantique, plus régulière en Vendée qui accueille encore une petite population nicheuse dans le sud du département.



Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla*, La Turballe, août 2011 (H. Touzé).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*

(1/6) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ad le 25/03 à la station de lagunage de Notre-Dame-de-Riez (Gérard Besseau).

(La sous-espèce type niche de la Sibérie occidentale à la Mongolie et hiverne principalement au Pakistan, en Inde, Chine et Asie du Sud-Est, mais aussi assez régulièrement très à l'ouest de ces quartiers habituels (Espagne, Afrique du Nord...)). Migrateur et hivernant rare et irrégulier sur les deux départements. 1 seul individu contacté en 2011, voilà qui contraste avec l'hivernage complet observé en 2010 en Vendée.

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* *

(2/3) (44 : 3/9 ; 85 : espèce non soumise à homologation)

Loire-Atlantique : 1 ind le 21/04 sur le remblai de Donges-est / Donges (Anthony Oates & Eugene Archer) ; 2 ad dont un chanteur à la Grande Falaise / La Turballe du 17 au 20/05 (Catherine et Alain Gentric) ; 6 ind dont 3 juv le 17 et 18/09 à la Tour aux Moutons / Donges (Eugene Archer).

(De l'Europe de l'ouest à l'Iran, la Sibérie et le nord-ouest du Kazakhstan). Encore des données recueillies sur le site désormais classique de la dune de Pen Bron à la Turballe. Le remblai sableux de Donges-est est un site à surveiller car il est très favorable à l'espèce en période de reproduction.

A compter du 1^{er} janvier 2012, l'espèce n'est plus soumise à homologation en Loire-Atlantique.



Pipit rousseline *Anthus campestris*, Donges, septembre 2011 (E. Archer).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce "thunbergi", appelée Bergeronnette printanière nordique.

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 mâle du 05 au 15/10 sur le Lac de Maché-Apremont / Maché (Frédéric Portier, Gérard Besseau & Bertrand Isaac).

(de la Norvège au nord de la Sibérie). Migrateur rare et irrégulier sur les deux départements. Enfin une donnée confirmée de ce taxon pour le département de la Vendée.

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus*

(1/1) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind le 05/01 rue de la Tonnelle à Olonne-sur-Mer (André Barzic).

(La sous-espèce type niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou d'invasions, l'espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux ou l'ensemble de l'Europe centrale). Migrateur et hivernant très rare dans les deux départements. Les observations de Jaseur boréal dépendent de phénomènes invasifs réguliers chez cette espèce cependant, l'ouest de la France est rarement concerné par ce type d'évènement. L'observateur a été particulièrement chanceux d'observer cette espèce dans son jardin.

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ind le 27/10 à l'Abbaye de Maillezais (Martine Hergibo) et 1 ind le 29/10 à la Dive / Saint-Michel-en-l'Herm (Christian Pacteau & Michel Terrasse).

2007 Loire-Atlantique : 1 ind le 06/04 à la pointe du Castelli / Piriac-sur-Mer (Jean-Paul Tilly).

(La sous-espèce type niche des montagnes de l'Afrique du Nord aux Carpates et à l'Italie, en passant par l'Espagne et la France). Un afflux particulier a été noté en 2011 pour cette espèce habituellement cantonnée aux régions de montagnes (Issa & Rebeyrat, 2012). Il s'agit des deux premières mentions vendéennes homologuées.



Accenteur alpin *Prunella collaris*, Maillezais, octobre 2011 (M. Hergibo).

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 mâle de 2^{me} année de la sous-espèce *hispanica* le 25/04 sur la dune de la Parée Préneau / Saint-Hilaire-de-Riez (Denis Matthey) ; 1 mâle ad le 31/08 sur la station de lagunage de La Tranche-sur-Mer (Frédéric Portier).

(Europe méditerranéenne, Maghreb, Israël, Iran). Migrateur très rare dans les deux départements. L'année 2011 apporte les deuxième et troisième mentions de cette espèce pour le département de la Vendée, ce qui est exceptionnel.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*

(3/3) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Rappel : espèce soumise à homologation uniquement en dehors des opérations de baguage.

Loire-Atlantique : 1 ind de 1^{ère} année a été observée le 13/08 sur le remblai de Donges-est / Donges (Clément Giacomo & Etienne Giraudot).

Vendée : 1 ind de 1^{ère} année a été observée le 28/08 sur la dune de la Grande Conche / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeier).

(Niche dans les états Baltes, en Biélorussie et en Russie, ainsi qu'en Pologne, en Hongrie et en Allemagne. Hiverné en Afrique de l'Ouest, au moins dans le delta du Sénégal). Seules les données d'oiseaux non capturés sont traitées dans ce rapport. Les opérations de baguage menées dans les deux départements montrent que l'espèce est de passage très fréquent durant le mois d'août dans les principales zones humides. En 2011, le nombre de captures est exceptionnellement élevé avec 464 individus capturés en Loire-Atlantique et 84 en Vendée sur les différents camps de baguage (Le Nevé com. pers.). A noter la première mention de l'espèce pour l'Ile d'Yeu.

HYPOLAÏS ICTERINE *Hippolais icterina*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 ad le 28/08 sur la dune de la Grande Conche / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeier) ; 1 ind de 1^{ère} année le 02/09 dans le vallon des Broches / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier).

2009 Loire-Atlantique : 1 ind de 1^{ère} année capturé et bagué sur la réserve du Massereau / Frossay le 27/08 (Franck Latraube, Guillaume Cochard & Benoit Fontaine).

(Nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural). Très rare sur les deux départements. La donnée de Loire-Atlantique constitue la deuxième mention de l'espèce pour ce département, après la capture d'un individu en août 1982 en estuaire de la Loire (Recorbet, 1992). A noter les deuxième et troisième mentions de cette espèce pour l'Ile d'Yeu.



Hypolaïs icterine *Hippolais icterina*, Frossay, août 2009 (G. Cochard).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*

(5/5) (44 : 3/3 ; 85 : 11/11)

Loire-Atlantique : 1 ind à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz du 25 au 29/10 (Olivier Penard & Hugo Touzé) ; 1 ind probablement de 1^{ère} année le 31/10 au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber) ; 1 ind le 31/12 à Port Launay / Couëron (Denis Turmel).

Vendée : 1 ind le 02/10 à La Cheinaie / Givrand (Gérard Besseau) ; 1 ind le 08/10 à La Mine / Talmont-Saint-Hilaire (Luc Chaillot & Johan Gardon) ; 1 ind le 14/10 sur la RNN des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île (Didier Desmots) ; 1 ind le 16/10 au marais de la Guerche / L'Ile-d'Yeu (Valérie Auriaux & Xavier Hindermeyer) ; 1 ind le 16/10 à La Citadelle / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 ind le 17/10 à Ker Pierre Borny / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer & le Groupe Ouigre) ; 1 le 18/10 à Ker Châlon (jardin) / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 ind du 18 au 22/10 à Ker Châlon (saulaie) / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer & le Groupe Ouigre) ; 1 ind le 19/10 à la station de lagunage / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer & le Groupe Ouigre) ; 1 ind le 26/10 à Ker Châlon (saulaie) / L'Ile-d'Yeu (Xavier & Marie-Paule Hindermeyer) ; 1 ind le 10/11 sur la RNN des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île (Didier Desmots).

2010 Vendée : 1 ind le 09/10 à la station de lagunage de Givrand (Gérard Besseau).

2008 Loire-Atlantique : 1 ind le 28/09 au Mont Lénigo / Le Croisic (Olivier Vannucci, Marek Banasiak & Emeline Langlet †).

(Niche dans le nord de la Russie, de la Petchora et de l'Oural à l'ouest, jusqu'à l'Anadyr et la mer d'Orkhotsk à l'est et au sud jusqu'à la Mongolie et au nord-est de la Chine. Hiverné dans le sud-est de l'Asie). Espèce emblématique rare mais régulière chaque automne en Vendée, plus exceptionnelle curieusement en Loire-Atlantique (manque de prospection ?). L'année 2011 est une très bonne année pour cette espèce. Comme souvent, le département de la Vendée rassemble la majorité des données mais notons tout de même cette observation inhabituelle d'un oiseau à Couëron (44) le 31/12.

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

(4/5) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 mâle le 15/04 à la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer (Mickaël Faucher).

(Nord-ouest de l'Afrique, nord et centre de l'Europe). Migrateur rare au printemps. Les données concernent principalement des oiseaux en migration prénuptiale.

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

Individus présentant les caractéristiques du groupe "abietinus / 'fluvescens' / tristis ", appelé Pouillot vélocé de type sibérien

(1/1) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 du 09 au 12/02 dans les marais salants du Mès / Mesquer (Denis Chavigny).

(Scandinavie, Sibérie). Migrateur et hivernant rare bien que régulier dans les deux départements.

A compter du 1^{er} janvier 2012, les oiseaux de ce type ne sont plus pris en compte par le comité. En effet, le plus souvent, les connaissances liées à ces taxons ne permettent pas de trancher en faveur de l'un ou l'autre.

TICHODROME ECHELETTE *Tichodroma muraria*

(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 le 18/11 sur le château de Pornic (Isabelle Levy) et 1 du 19 au 21/11 sur la cathédrale Saint-Pierre de Nantes (Olivier Poisson, Marie-Paule Hindermeier & Eugene Archer).

2009 Loire-Atlantique : 1 mâle du 29/12 au 31/03/10 sur l'église de Pornic (Mathieu Denis et al.).

(La sous-espèce nominale se reproduit dans les montagnes du sud de l'Europe, du nord de l'Espagne à la Bulgarie, ainsi que dans le nord et l'ouest de l'Iran). L'espèce semble plus rare en Vendée qu'en Loire-Atlantique. Notons que Pornic accueille l'espèce pour la seconde fois après le séjour d'un oiseau durant l'hiver 2009-2010.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

(1/1) (44 : 1/1 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : 1 du 07 au 17/01 dans le secteur de l'Etier de la Musse / Couëron (Willy Raitière & Julien Mérot).

Vendée : 1 ind le 15/10 sur la dune de la Grande Conche / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer, Jean-Claude Croisé, Maxime Pirio & Aurélien Pineau) ; 1 ind du 02 au 29/12 aux Ringerdières / Rosnay (Luc Chaillot & Gérard Besseau).

(Europe de l'ouest à l'ouest de la Sibérie). Migrateur rare et hivernant occasionnel sur les deux départements. A noter la première mention de l'espèce pour l'Ile d'Yeu.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*

(7/8) (44 : 1/1 ; 85 : 7/8)

Loire-Atlantique : 1 ind de 1^{ère} année de la sous-espèce nominale du 17 au 27/08 à Lancastria / Les Moutiers-en-Retz (Hugo Touzé et al.).

Vendée : 1 femelle adulte de la sous-espèce nominale le 13/04 entre la Croix et les Tchinettes / L'Ile-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 1 mâle ad aux Petits Fradets / L'Ile-d'Yeu (Clément Braud) ; 1 mâle et 1 femelle ad de la sous-espèce nominale le 15 et 16/05 à Perdrette / L'Ile-d'Yeu (Xavier Hindermeyer & Sandrine Desmarest) ; 1 oiseau de 1^{re} année le 14 et 15/08 à la Bosse / Barbâtre (Dominique Robard & Emmanuel Gas) ; 1 oiseau de 1^{re} année du 16 au 20/08 à La Gatelière / L'Aiguillon-sur-Vie (Gérard Besseau & Clément Caiveau) ; 1 oiseau de 1^{re} année le 30/08 dans le marais du Jaunay / Givrand (Gérard Besseau) ; 1 oiseau de 1^{re} année le 03/09 à la Casie / Barbâtre (Dominique Robard).

2002 Loire-Atlantique : 1 ad de la sous-espèce *badius* le 05/05 à la pointe Saint-Gildas / Préfailles (Willy Maillard & Benjamin Même-Lafond).

2005 Vendée : 1 oiseau de 1^{re} année de la sous-espèce nominale le 19/08 aux Doités / L'Aiguillon-sur-Vie (Gérard Besseau).

2008 Vendée : 1 ad de la sous-espèce nominale le 02/05 sur la dune du Jaunay / Brétignolles-sur-mer (Gérard Besseau).

2009 Vendée : 1 oiseau de 1^{re} année de la sous-espèce nominale le 02/10 dans le marais du Jaunay / Givrand (Gérard Besseau).

(Europe de l'ouest et îles de la Méditerranée). Migrateur rare aux deux passages, régulier en Vendée. Les îles d'Yeu et de Noirmoutier demeurent les sites vendéens les plus attractifs pour contacter cette espèce. L'observation d'un individu de la sous-espèce *badius* en 2004 en Loire-Atlantique constitue la première mention circonstanciée de ce taxon dans ce département.



Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator senator*, Île d'Yeu, avril 2011 (F. Portier).

CORNEILLE MANTELEE *Corvus cornix*

(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind dans le bourg de Pornic le 30/10 (Françoise Marais) et 1 ind à La Cherpraie / Couffé le 30/10 (Vincent Tanqueray).

(Europe du nord et centrale jusqu'au Kazakstan et au sud jusqu'en Sardaigne, Turquie, Irak, Iran et Egypte). Migrateur très rare dans les deux départements. Cette arrivée simultanée de deux oiseaux en deux points assez distants de la Loire-Atlantique est remarquable. Difficile de se prononcer sur l'origine de ces oiseaux mais une arrivée sur un bateau est possible.



Corneille mantelée *Corvus cornix*, Pornic, octobre 2011 (F. Marais).

ETOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)

Vendée : 1 ind en divers points de l'île de Noirmoutier du 25/09 au 25/01/12 (Dominique Robard et al.) ; 1 ind dans le port du Morin / L'Epine du 12/12 au 27/01/12 (Frédéric Portier, Luc Chaillot & Gérard Besseau) ; 1 ind à Port-Joinville / L'Île-d'Yeu du 18 au 26/10 (Xavier Hindermeyer & le Groupe Ouigre).

(Niche dans le Maghreb, en Espagne, Sicile, Sardaigne, Corse et dans le sud de la France). L'espèce semble de plus en plus régulière en Vendée, notamment sur l'île de Noirmoutier. Demeure rarissime en Loire-Atlantique.



Etourneau unicolore, port du Morin / L'Epine, décembre 2011 (Frédéric Portier)

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(16/16) (44 :1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 à Portmain / Pornic le 30/09 (Françoise Marais & Aymeric Mousseau).

(La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la Sibérie, jusqu'à la Kolyma, et hiverne en Europe de l'Ouest et en Asie centrale. La sous-espèce *subcalcaratus*, qui niche au Groenland et au Canada, est d'apparition possible en France). Migrateur automnal rare et irrégulier sur le littoral et les îles. 1 seule donnée en 2011 (aucune en Vendée), ce qui contraste avec l'afflux noté en 2010.

BRUANT FOU *Emberiza cia*

(1/1) (44 :1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ind sur les côteaux de Mauves / Mauves-sur-Loire le 19/11 (Julien Mérot).

(Maghreb, sud et centre de l'Europe). Migrateur et hivernant occasionnel sur les deux départements, plus particulièrement en Vendée. Localisation et date classiques pour cette donnée.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 ind de 1^{ère} année aux îles Mathurin / Barbâtre le 16/09 (Frédéric Portier).

(Europe de l'ouest à la Turquie). Migrateur peu commun sur les deux départements. Localisation et date classiques.

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*

Loire-Atlantique : 1 le 17 janvier à Clégreuc / Vay (l'absence de description du bec ne permet pas d'exclure l'Érismature à tête blanche ou un éventuel hybride entre les deux Érismatures).

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*

Loire-Atlantique : 1 du 09 janvier au 26 février à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (description trop sommaire, ne permettant pas d'exclure une autre espèce d'ibis exotique).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (donnée soumise à homologation car atypique en termes de localisation et de date)

Loire-Atlantique : 1 le 10 octobre au-dessus du pont de Cheviré / Nantes (description peu convaincante et conditions d'observations difficiles).

Faucon kobez *Falco vespertinus*

Loire-Atlantique : 1 le 24 mai à l'île Jacquette / Trignac (description incomplète).

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Vendée : 1 ad le 15 et 16 janvier plage de la Tourette / L'Ile-d'Yeu (il s'agit probablement de cette espèce mais en l'absence d'éléments photographiques, il est impossible d'exclure un éventuel hybride) ;
1 ad le 09 novembre au Tanchet / Les Sables-d'Olonne (il s'agit probablement de cette espèce mais en l'absence d'éléments photographiques, il est impossible d'exclure un éventuel hybride).

Cochevis huppé *Galerida cristata* (donnée soumise à homologation car atypique en terme de localisation)

Loire-Atlantique : 1 ind le 03 avril à la Pageaudière / Oudon (aucun élément discriminant permettant d'orienter l'identification vers l'espèce proposée. L'Alouette des champs notamment ne peut être exclue).

Pipit rousseline *Anthus campestris*

Loire-Atlantique : 1 ad le 25 juin à la Grande Falaise / La Turballe (site classique sur lequel l'espèce s'est déjà reproduit mais sans description, impossible de trancher)

Hypolaïs icterine *Hippolais icterina*

Vendée : 1 le 07 septembre à La Casse de la Belle-Henriette / La Tranche-sur-Mer (description trop sommaire pour une observation trop brève).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*

Loire-Atlantique : 1 ind de 1^{ère} année le 22 août dans le marais des Tiers Desséchés / Saint-Etienne-de-Montluc (description trop sommaire).

LISTE DES DONNEES HOMOLOGUEES PAR LE COMITE D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2011

Les données ci-dessous sont issues du rapport 2011 du comité d'homologation national (Reeber & CHN, 2012) et concernent les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

OIE DE TAÏGA *Anser fabalis fabalis*

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, ad., phot., du 22 au 30 novembre (P. Trotignon, J.-C. Croisé).

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, 28 et 29 novembre (P. Trotignon).

MACREUSE A FRONT BLANC *Melanitta perspicillata*

Vendée : La Tranche-sur-Mer : plage de la Terrière, mâle 1^{er} hiver, 9 avril (P. Trotignon *et al.*), mâle ad., du 24 au 29 décembre (P. Trotignon *et al.*), fem., du 24 décembre au 8 janvier 2012 (P. Trotignon *et al.*) ; L'Epine : Pointe du Devin et L'Herbaudière : Pointe de l'Herbaudière, fem. juv./1^{er} hiver, phot., 9 novembre (P. Trotignon *et al.*).

ERISMATURE A TETE BLANCHE *Oxyura leucocephala*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, mâle ad., phot., 15 septembre, 12 octobre puis du 22 décembre au 20 février (S. Reeber *et al.*).

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius*

Vendée : Noirmoutier-en-l'Île : Île de Noirmoutier, la Salaisière, phot., 26 et 27 mars (J.-C. Croisé *et al.*).

BÉCASSEAU SEMIPLAMÉ *Calidris pusilla*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, juv., phot., du 20 au 30 septembre (S. Reeber *et al.*), juv., du 28 au 30 septembre (S. Reeber *et al.*).

BÉCASSEAU A LONGS DOIGTS *Calidris subminuta*

Loire-Atlantique : La Turballe : saline Gau, juv., phot., du 1^{er} novembre au 26 janvier 2012 (O. Vanucci, W. Raitière, J. Mérot, A. Mousseau, A. Joris *et al.*).

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii*

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, ad., 22 et 23 août (P. Trotignon).

BÉCASSEAU A QUEUE POINTUE *Calidris acuminata*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., phot., du 22 au 27 septembre (S. Reeber *et al.*).

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola facinellus*

Vendée : Bouin : Lagune du Dain, ad., 17 mai (J.-C. Delattre).

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis*

Loire-Atlantique : Saint-Joachim : Grande Brière, phot., 22 mai (J.-L. Dourin, A. Troffigué).

Vendée : Ile d'Yeu : plage de la Grande Conche, phot., 5 septembre (S. Desmarest) ; Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, 14 et 15 septembre (J. Gonin *et al.*).

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 28 avril (S. Reeber).

BÉCASSIN A LONG BEC *Limnodromus scolopaceus*

Vendée : Noirmoutier-en-l'Île : Île de Noirmoutier, phot., 1^{er} mai (D. Robard).

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 1^{er} hiver, phot., 22 décembre (S. Reeber).

STERNE ELEGANTE *Sterna elegans*

Individus présentant les caractéristiques de la Sterne élégante

Vendée : Barbâtre : Ile de Noirmoutier, polder de Sébastopol, ad., phot., du 11 avril au 25 mai. (photos sur www.ornitho.fr)

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola*

Vendée : Ile d'Yeu : Pointe de la Gournaise, 1^{er} hiver, 28 août (X. et M.-P. Hindermeyer).

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *phoenicuroides*.

Vendée : Ile d'Yeu : la Bergerie, mâle, phot., 12 novembre (B. Isaac, O. Penard, J.-M. Guilpain).

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola*

Vendée : Ile d'Yeu : dune de la Grande Conche, 1^{er} hiver, 16 et 17 octobre (X. Hindermeyer, C. Rideau *et al.*).

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*

Vendée : Ile d'Yeu : plage des Bossilles et de la Borgne, juv./1^{er} hiver, 25 août (X. et M.-P. Hindermeyer), Plage du Cours du Moulin et impasse de la Borgne, 2 juv./1^{er} hiver, phot., du 30 septembre au 2 octobre (F. Portier *et al.*), Plage de la Tourette et Cours du Moulin, 2 juv./1^{er} hiver, phot., du 18 au 21 octobre (X. Hindermeyer *et al.*), considérés comme les mêmes que les précédents ; Barbâtre, Île de Noirmoutier, la Borderie, juv./1^{er} hiver, 16 septembre (F. Portier) ; Noirmoutier-en-l'Île, réserve naturelle des marais de Müllembourg, juv./1^{er} hiver, 19 septembre (D. Desmots) ; Sainte-Hilaire-de-Riez : Pointe de la Grosse Terre, juv./1^{er} hiver, phot., phot., du 28 au 30 octobre (G. Besseau *et al.*).

BIBLIOGRAPHIE

- CAF. 2007. Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos*, 14(4): 234-246.
- Dourin, J.-L., Montfort, D., Reeber, S., & Troffigué, A. 2008. Premier cas de nidification de la Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* en France. *Ornithos*, 15(6): 394-399.
- Issa, N., & Rebeyrat, X. 2012. Afflux d'Accenteurs alpins *Prunella collaris* dans l'ouest de la France à l'automne 2011. *Ornithos*, 19(5): 326-332.
- Recorbet, B., (Coord.). 1992. *Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIX^{me} siècle à nos jours*. Nantes: Groupe Ornithologique de Loire-Atlantique.
- Reeber, S., & CHN. 2012. Les oiseaux rares en France en 2011. *Ornithos*, 19(6): 353-395.

Frédéric LE GALLO 106 –La Porcelière 85250 SAINT-ANDRÉ GOULE D'OIE
(flegallo@gmail.com)

Willy RAITIERE Rougerand 44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES
(wild_wild_will_2000@yahoo.fr)

Merci à Frédéric Portier et André Barzic pour la relecture de ce rapport.