

## ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

de Juillet 1993 à juin 1994

Christian GONIN et Lucien GRILLET

N.B : entre parenthèses et vis-à-vis du nom de chaque espèce, le nombre de données reçues au fichier pour la période considérée.

### **PLONGEON CATMARIN, *Gavia stellata* (33)**

Hivernant commun du littoral de Noirmoutier et du continent, de St-Gilles à la Tranche-s-Mer.

Le premier oiseau est signalé au lac du Jaunay le 14/09/93 (M.T). Une observation tardive d'un individu à l'île d'Yeu le 03/05/94 (X.H et M-P.V). Toutes les données concernent généralement de 1 à 4 oiseaux.

### **PLONGEON ARCTIQUE, *Gavia arctica* (15)**

Oiseau hivernant à l'île d'Yeu et tout le long du littoral de la mi-octobre 93 au début mars 94 en nombre variant de 1 à 4 individus à chaque fois.

Les 4 premiers ont été signalés à la pointe du Grouin du Cou le 20/10/93 (A.T) et le dernier à la pointe du Payré le 16/04/94 (ADEV).

### **PLONGEON IMBRIN, *Gavia immer* (18)**

Signalé du 23/10/93 au 07/03/94 à l'île d'Yeu et de Sion-sur-l'Océan à la pointe du Grouin du Cou. Toutes les données concernent un seul individu sauf le 21/11/93, avec 3 ind. aux Sables-d'Olonne (C.B).

### **PLONGEON INDETERMINE, *Gavia sp.* (14)**

11 données du littoral de la Tranche-s-Mer (ADEV) et 3 autres de Noirmoutier et des Sables-d'Olonne (A.B et C.B) du 24/10/93 au 16/04/94.

### **GREBE CASTAGNEUX, *Tachybaptus ruficollis* (76)**

Observé en toutes saisons dans tout le département ; la majorité des données proviennent des étangs du bocage et de la Belle Henriette.

Quelques observations avec un maximum d'oiseaux : 25 ind. à l'étang des Mattes (Bouin) le 17/07/93 (C.G et J.G), 83 à l'étang des Boucheries le 10/09/93 (H.B) et 24 dans les marais de la Vie le 20/01/94 (G.B).

Quelques indices de reproduction.

### **GREBE HUPPE, *Podiceps cristatus* (104)**

Régulièrement observé sur les étangs du bocage, où il se reproduit, et hivernant commun sur les lacs et tout le littoral du département.

Quelques concentrations assez importantes de fin d'été : 20 ind. à l'étang du Parc Soubise le 20/09/93 (T.Y) et 15 à l'étang des Boucheries le 08/10/93 (H.B).

### **GREBE JOUGRIS, *Podiceps griseigena* (2)**

Un individu fin septembre 93, en baie de Bourgneuf, et un autre à l'étang des Boucheries, le 24/11/93 (H.B).

- GREBE ESCLAVON**, *Podiceps auritus* (2)  
Un individu à la plage de la Terrière le 31/01/94 (ADEV) et un autre à Noirmoutier le 09/04/94 (A.B).
- GREBE A COU NOIR**, *Podiceps nigricollis* (56)  
Présent de juillet au début d'octobre 93 et de mars à juin 94 à l'étang des Boucheries où il ne se reproduit pas encore. Souvent observé à la station d'épuration de la Tranche et sur la côte voisine d'août 93 au début d'avril 94 (ADEV), il a été également noté de façon sporadique à Noirmoutier, Sion-sur-l'Océan, sur les plans d'eau de Maché, de Luçon, et dans les marais Montportreau.  
Les maximums : 8 ind. à l'étang du Vide (Noirmoutier) le 24/10/93 (S.C) et 7 à la station d'épuration de Noirmoutier le 22/01/94 (P.R).
- ALBATROS INDETERMINE**, *Diomedea sp* (1)  
1ère mention pour la Vendée et 2ème mention pour la France. 1 individu (certainement à sourcils noirs *Diomedea melanophris*) dans le marais d'Olonne le 13/09/93 (O.G).  
Originaire des mers de l'hémisphère du sud, il a été déporté par la forte tempête des 12 et 13 septembre qui a amené tant de mouettes de Sabine sur les côtes atlantiques.
- FULMAR BOREAL**, *Fulmarus glacialis* (10)  
6 données de fin juillet au début d'octobre 93, concernant 1 individu à chaque fois, à l'île d'Yeu et sur la côte, aux Sables et à Sion-sur-l'Océan. 1 donnée d'intérieur à St-Julien-des-Landes (suite à une forte tempête) le 13/09/93 (ONC).  
2 observations de 2 et 11 ind. les 10 et 24/04/94 à la pointe du Payré (ADEV) et le dernier oiseau à l'île d'Yeu le 01/05/94 (X.H et M-P.V).
- PUFFIN CENDRE**, *Calonectris diomedea* (2)  
Un individu à Sion-sur-l'Océan le 19/07/93 (G.B) et à la pointe des Corbeaux (île d'Yeu) le 21/07/93 (ADEV).
- PUFFIN MAJEUR**, *Puffinus gravis* (2)  
3 ind. au large des Sables (sortie Kifanlo) le 21/08/93 (G.B) et 1 adulte trouvé mort sur la plage de la Grière le 11/11/93 (J.V).
- PUFFIN FULIGINEUX**, *Puffinus griseus* (3)  
1 au large des Sables (sortie Kifanlo) le 21/08/93 (G.B), 1 à la Faute-s-Mer le 07/10/93 (A.P) et 2 autres à la pointe du But (île d'Yeu) le 13/11/93 (X.H et M-P.V).
- PUFFIN DES ANGLAIS**, *Puffinus puffinus* (6)  
3 données d'un individu à Sion-sur-l'Océan du 1er au 06/10/93 (G.B); 2 observations à l'île d'Yeu : 1 ind. le 15/07/93 (ADEV) et 2 le 03/05/94 (X.H et M-P.H); un autre ind. à la pointe du Payré le 08/05/94 (ADEV).
- PUFFIN DE MEDITERRANEE**, *Puffinus yelkouan* (19)  
Essentiellement observé à Sion-sur-l'Océan de juillet à la fin octobre 93 (maximums enregistrés : 4 à 5000 le 27/08 et + 2000 le 03/09. Une donnée de mai 94 (G.B) au même endroit. Les autres sites sont les îles d'Yeu, de Noirmoutier et les Sables-d'Olonne.
- PUFFIN INDETERMINE**, *Puffinus sp.* (1)  
15 individus en une heure à l'île d'Yeu le 19/07/93 (ADEV).
- OCEANITE TEMPETE**, *Hydrobates pelagicus* (14)  
Observé surtout au port de St-Gilles-Croix-de-Vie, à Sion-sur-l'Océan et au large des Sables (sortie Kifanlo) du 28/07 au 06/10/93. Quelques maxis notés : + de 12 au large des Sables (Kifanlo) le

- 28/07 (F.P et D.B), 10 à 15 au port de St-Gilles le 13/09 (G.B et M.T), 20 au port de St-Gilles le 15/09 (G.B) et + de 30 au phare et au port de la Chaume le 06/10/93 (F.P).  
Une observation d'un individu dans les marais de la Vie le 13/09/93 (G.B et M.T).
- OCEANITE CULBLANC**, *Oceanodroma leucorhoa* (10)  
7 données de 1 à 7 ind. du 13 au 21/09/93 proviennent de St-Gilles et de Sion-sur-l'Océan (G.B et M.T) : 2 ind. au marais d'Olonne le 13/09/93 (ONC), 2 au phare et au port de la Chaume le 15/09/93 (F.P) et 1 ind. au Puits d'Enfer (les Sables) le 01/03/94 (C.B).
- FOU DE BASSAN**, *Sula bassana* (53)  
Présent en toutes saisons dans les îles et sur le littoral du département, avec essentiellement des adultes non reproducteurs et des immatures en avril et en mai.  
Quelques maximums notés : env. 70 à Sion-sur-l'Océan le 07/09 et 29/10/93 (G.B), 70 sur le littoral de la Tranche le 24/10/93 (ADEV), et 107 à la pointe du Payré le 08/05/94 (ADEV).  
Un individu trouvé mort (humérus aile gauche fracturé) à la Belle Henriette le 18/11/93 (J.V) avait été bague à l'estuaire de Clyde (ouest de Glasgow) en 1990.
- GRAND CORMORAN**, *Phalacrocorax carbo* (194)  
Présent en toutes saisons dans les îles et le littoral du département aussi bien que sur les étangs du bocage, les lacs, les Marais Breton et Poitevin.  
L'hivernage des migrateurs débute en septembre et se termine dans les premiers jours de mars.  
Quelques maximums notés aux dortoirs : 439 dans les marais d'Olonne le 02/11/93 (ONC), env. 100 dans le marais de Jard-s-Mer le 14/11/93 (A.G), 268 à l'étang des Boucheries le 18/11/93 (H.B), 397 à l'étang des Boucheries le 10/02/94 (L.G), + de 80 dans les marais de la Vie le 12/02/94 (G.B).
- CORMORAN HUPPE**, *Phalacrocorax aristotelis* (8)  
Observé localement aux îles d'Yeu et de Noirmoutier en juillet, octobre, décembre, janvier, avril et mai.  
Ces observations concernent souvent un seul individu à l'exception de 3 immatures le 01/05/94 à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V)
- BUTOR ETOILE**, *Botaurus stellaris* (4)  
1 ind. au lac de Maché le 05/09/93 (J.R), 1 à Orouet le 02/11/93 (G.B), 1 à Angles le 21/01/94 (ADEV) et un autre à Port-la-Roche (fidèle au site depuis quelques années) le 25/06/94 (P.G).  
Pas d'indice de reproduction.
- BLONGIOS NAIN**, *Ixobrychus minutus* (4)  
Les seules données du département proviennent du marais d'Orouet (depuis 5 ans dans le même site qui est malheureusement menacé par un futur tracé d'autoroute) (G.B).
- BIHOREAU GRIS**, *Nycticorax nycticorax* (11)  
Observé régulièrement sur les bords du communal du Poiré-s-Velluire de mai à juillet 94 (C.G et J.G). Deux observations d'un immature dans les marais de Champagné-les-Marais le 19/08/93 (A.G) et de la Vie le 31/08/93 (G.B). Un individu a été vu volant de la digue des Prises vers la baie de l'Aiguillon le 25/06/94 (ADEV).  
85 cplés nicheurs en 1994 (117 en 93) à Chaillé-les-Marais (PNR)
- HERON GARDEBOEUF**, *Bubulcus ibis* (35)  
Présent toute l'année dans le Marais Poitevin avec 34 données et facilement repérable, en bandes de 3 à 20 ou plus, parmi des bovins. Une seule donnée de 5 ind. à la Gaultière (Bouin) le 17/09/93 (F.P).  
Reproduction probable de 7 cplés dont 2 certains en 1994 à Chaillé-les-Marais (PNR et P.R).

**AIGRETTE GARZETTE, *Egretta garzetta*** (165)

Observée en toutes saisons dans tout le département, le plus souvent dans les Marais Breton et Poitevin. Il serait souhaitable de les comptabiliser à l'occasion du prochain dénombrement des oiseaux d'eau « BIROE », pour connaître l'effectif approximatif hivernant en Vendée. Une concentration de fin d'été a été notée dans les marais de la Vie avec 329 ind. le 05/08/93 (G.B). Une « grise » a été observée à Bouin du 30/07 au 17/08/93 (F.P et LPO).

Reproduction en 94 : 915 nids répartis sur 11 colonies en Vendée (PNR).

**GRANDE AIGRETTE, *Egretta alba*** (11)

La première a été observée le 19/08/93 en baie de l'Aiguillon (A.G), les autres d'octobre 93 à début mars 94 concernant un individu à chaque fois ont été notées sur l'étang des Boucheries (H.B), à St-Denis-du-Payré (A.T), à la Pointe de l'Aiguillon (C.G et J.G), à Jard-s-Mer (F.S), dans les communaux de Lairoux (A.T, et S.V), de St-Benoist (ADEV), du Poiré-s-Velluire (PNR) et une donnée de 4 individus dans le marais de la Guittière le 07/11/93 (H.J).

**HERON CENDRE, *Ardea cinerea*** (309)

Très commun en toutes saisons, avec 1992 couples répartis sur les 29 colonies du département.

**HERON POURPRE, *Ardea purpurea*** (28)

La majorité des observations de juillet à fin août 93 et de fin mai à juin 94 provient du Marais Poitevin et elle concerne le plus souvent un seul individu. D'autres données viennent : des marais d'Olonne le 29/07/93 (ONC), d'Orouet le 31/07/93 (G.B), de Tallud Ste-Gemme le 10/08/93 (B.P), de la Belle Henriette le 29/04/94 (C.L) et de Sion-sur-l'Océan le 12/05/94 (G.B).

Reproduction en 1994 : 91 couples répartis sur les 5 colonies du département (uniquement en Marais Poitevin).

**CIGOGNE NOIRE, *Ciconia nigra*** (15)

15 données en Vendée, c'est remarquable, cette espèce connaît un nouvel essor de reproduction en France depuis quelques années.

Elle a été souvent notée dans le Marais Poitevin au passage postnuptial : 7 ind. le 17/08 à Chas-nais (O.G), 6 le 22/08 dans le communal de Triaize (O.P et L.B) et 7 en vol le 27/08/93 au plan d'eau des Guifettes à Luçon (F.P). 2 observations de printemps : 1 ind. le 20/03/94 aux Moutiers-sur-Lay (S.V) et un autre le 05/06/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV).

**CIGOGNE BLANCHE, *Ciconia ciconia*** (57)

7 couples se sont reproduits en 1994 sur les plates-formes du département (5 couples en Marais Poitevin et 2 couples en Marais Breton).

16 données d'un individu de juillet à octobre 93 dans le Marais Poitevin. 2 oiseaux ont passé l'hiver à St-Denis-du-Payré, à Morigy et au communal de Curzon. Les autres données de mars à juin 94 concernant souvent un seul individu ou un couple avec des jeunes proviennent du Marais Poitevin.

**IBIS FALCINELLE, *Plegadis falcinellus*** (1)

1 individu dans le marais d'Olonne le 28/10/93 (ONC)

**IBIS SACRE, *Treskiornis aethiopicus*** (1)

Un vol de 129 oiseaux a été noté à Noirmoutier le 02/02/94 (? - info de l'Oiseau Magazine n°35).

**SPATULE BLANCHE, *Platalea leucorodia*** (39)

Passage postnuptial du 18/08 au 13/10/93 dans les marais d'Olonne, avec un maximum de 23 ind. le 14/09/93 (ONC); 7 ind. à la pointe de l'Aiguillon le 18/09/93 (C.G et J.G) et un vol de 10 ind. à Sion-sur-l'Océan le 09/10/93 (G.B); 9 autres données de passage d'automne concernant à 1 ou 2 ind.

proviennent de St-Denis-du-Payré (ADEV), du lac de Maché (G.B et M.T), de la Belle Henriette (A.T), et du marais de Jard-sur-Mer (A.G).

2 individus ont hiverné dans les marais d'Olonne à partir du 22/12/93 (ONC).

Passage pré-nuptial du 15/02 au 09/05/94 dans les marais d'Olonne, avec un maximum de 22 ind. le 24/03/94 (ONC); 1 du 18 au 22/03/94 et 2 ind. le 20/04/94 à l'étang des Boucheries (H.B, L.G et T.Y), 1 à 9 à la réserve de St-Denis-du-Payré du 21/03 au 26/04/94 (ADEV). Les autres données concernant 1 ou 2 ind. proviennent des marais de Jard-s-Mer (F.S), de la Guittière (C.B) et de Beauvoir-sur-Mer (A.B).

**FLAMANT DU CHILI, *Phoenicopterus chilensis*** (1)

Un individu a séjourné du 28/02 au 22/04/94 dans la vallée de l'Auzance (ONC).

**CYGNE TUBERCULE, *Cygnus olor*** (122)

Très commun en toutes saisons et reproducteur dans le Marais Poitevin et les stations d'épuration du littoral.

Quelques rassemblements moins importants que par le passé sont notés : 33 ind. le 30/09/93 à la Belle Henriette (S.D), 23 le 16/11/93 au communal de Lairoux (A.T) et 28 le 13/04/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré.

**CYGNE NOIR, *Cygnus atratus*** (4)

Espèce échappée de captivité : 1 ind. du 03/09 au 30/09/93 à la Belle Henriette (S.D et ONC) et probablement le même au communal de Lairoux le 28/10/93 (F.S).

**OIE DES MOISSONS, *Anser fabalis*** (7)

5 ind. le 11/12/93 à Sion-sur-l'Océan (G.B). 4 à 8 ind. ont hiverné du 13/12/93 au 04/02/94 dans la baie de l'Aiguillon (ONC).

**OIE A BEC COURT, *Anser brachyrhynchus*** (9)

2 individus ont séjourné du 01/01 au 23/02/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV et . . . de nombreux cocheurs).

**OIE RIEUSE, *Anser albifrons*** (29)

L'hivernage semble se consolider dans notre département (réserve de St-Denis-du-Payré en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay) : 2 à 12 du 04/10/93 au 04/03/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV) et 8 à 27 du 10/11/93 au 11/02/94 dans la baie de l'Aiguillon (ONC).

28 ind. dont 5 juv. du 18 au 20/11/93 au communal du Poiré-s-Velluire (C.G, J.G et P.R).

**OIE CENDREE, *Anser anser*** (98)

Reproductrice présente toute l'année à la réserve naturelle de St-Denis. En 1994, 5 couples pour 25 oisons (ADEV).

Au passage postnuptial, première observation d'un ind. le 26/08/93 au marais de Guilloteau (F.S), nombreux vols de migrateurs de 20 à +de 100 du 08/10 au 12/11/93 à la pointe de l'Aiguillon, à l'occasion du suivi de la migration des passereaux (GOV); d'autres passages d'automne sont signalés un peu partout dans le département. Plus de 300 individus ont hiverné dans la baie de l'Aiguillon avec un maximum de plus de 450 le 28/12/93 (C.G et J.G).

La remontée s'amorce dès la mi-janvier et atteint son maximum en février : 388 ind. le 03/02/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV), 475 le 16/02/94 au communal du Poiré-s-Velluire (C.G et J.G).

**OIE A TETE BARREE, *Anser indicus*** (5)

2 individus ont séjourné du 26/11/93 au 29/01/94 en baie de l'Aiguillon et à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV, A.T, C.G, J.G, X.H et M-P.V).

**BERNACHE NONNETTE, *Branta leucopsis*** (7)

3 ind. le 26/11 (A.T), 6 du 02/12/93 au 09/01/94 (ADEV et ONC), 9 le 11/02/94 (ONC) en baie de l'Aiguillon et 1 ind. le 18/04/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV).

**BERNACHE CRAVANT, *Branta bernicla*** (35)

Présente d'octobre à début mai dans tout le littoral. Le 07/05/94, 1 individu visite des terriers de lapins en compagnie des Tadornes de Belon dans les dunes du Jaunay.

Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : 7 393 en baie de Bourgneuf / Noirmoutier, 4 110 en baie de l'Aiguillon et à la pointe d'Arçay soit 11 503 ind. (env. 10,5% de la population française hivernante en janvier 94).

Quelques maximums notés à l'île de Noirmoutier : 4000 le 29/11/93 à Barbâtre (GOV), 5000 le 06/12/93 à la jetée de Jacobsen (A.B).

**OUETTE D'EGYPTE, *Alopochen aegyptiacus*** (1)

Espèce introduite en Europe ou échappée de captivité ; une observation d'un individu le 08/08/93 au lac des Vallées (le Fenouiller) (M.T).

**TADORNE CASARCA, *Tadorna ferruginea*** (6)

3 ind. du 29/09 au 02/10/93 sur les lacs des Vallées et de Maché-Apremont.

Sinon, régulièrement observé chaque hiver, depuis 1989, en baie de l'Aiguillon : 1 à 2 ind. du 13/12/93 au 16/03/94 (baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay).

**TADORNE DE BELON, *Tadorna tadorna*** (107)

Observé en toutes saisons dans les marais côtiers, les stations d'épuration et sur tout le littoral du département avec les deux sites classiques d'hivernage pour la Vendée : les baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf.

Comptage BIROE à la mi-janvier 94 : 6 825 (R) en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay, 1 728 en baie de Bourgneuf / Noirmoutier soit 8 553 ind. (18% de la population française).

Reproduction surtout notée dans les stations d'épuration du littoral et les marais littoraux.

**AIX CAROLIN, *Aix sponsa*** (1)

Espèce échappée de captivité; 1 mâle le 07/10/93 au lac du Jaunay (G.B).

**CANARD SIFFLEUR, *Anas penelope*** (91)

Observé du 03/09/93 au 21/05/94 sur les étangs du bocage et le littoral vendéen, avec une majorité de données (53) obtenue dans les marais communaux inondés du Marais Poitevin, de janvier à mars 94.

Quelques maximums notés en hiver: 1250 ind. le 29/12/93 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV), 2866 ind. en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay au comptage BIROE de janvier (ONC). De nombreuses données de la période pré-nuptiale (février à mars 94) à la réserve de St-Denis-du-Payré avec un maximum de 1070 le 11/02 (ADEV) et au communal du Poiré-sur-Velluire avec un maximum de 361 le 15/02 (C.G et J.G).

**CANARD CHIPEAU, *Anas strepera*** (51)

Régulièrement observé du 18/07/93 au 22/05/94 sur l'étang des Boucheries (maxi. 12 individus). Une bonne fréquentation de ce canard avec 2 à 18 ind. a été notée de décembre 93 à mars 94 dans les marais communaux du Marais Poitevin inondés (réserve de St-Denis-du-Payré et communal du Poiré-sur-Velluire).

D'autres observations ont été faites dans les stations d'épuration de Noirmoutier et de la Tranche, le littoral allant de la pointe du Payré à la pointe d'Arçay, sur les étangs du Parc Soubise et de la Tuilerie et au marais de la Vie.

Pas d'indices de reproduction en 94.

**SARCELLE D'HIVER, *Anas crecca*** (110)

Principaux sites d'hivernage : la baie de Bourgneuf, la baie de l'Aiguillon et la réserve de St-Denis-du-Payré.

Présence remarquable à la réserve de St-Denis-du-Payré du 06/09/93 au 16/06/94 avec maximums de 1100 ind. le 06/09 et le 29/10, 1400 le 10/11, 2150 le 29/12/93, 1515 le 28/01, 1843 le 03/02. Régulièrement notée également sur l'étang des Boucheries, avec un effectif variable de 10 à 70 ind. du 23/07/93 au 08/04/94

Comptage du BIROE en janvier 94 : 6 531 ind. dont 4 820 pour la baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay.

Un seul indice de reproduction : le couple observé le 08/04/94 s'est reproduit sur un étang voisin des Boucheries, c'est probablement la femelle de ce couple accompagnée de huit jeunes qui a été vue aux Boucheries le 20/08/94 (L.G).

**CANARD COLVERT, *Anas platyrhynchos*** (214)

Concentration importante de 860 à 1500 du 30/07/93 au 15/01/94 avec un maximum de 2 068 le 18/11/93 sur l'étang des Boucheries (H.B et L.G).

Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : 11 031 ind. dont 5 715 en baie de Bourgneuf et de Noirmoutier, 2 895 en baie de l'Aiguillon et à la pointe d'Arçay, et 2 421 pour le reste du département (total France : 170 533).

Les indices de reproduction sont souvent découverts en avril et en mai, et il serait très intéressant de noter l'âge approximatif des jeunes (volants ou non) en juillet car la chasse au gibier d'eau est ouverte dès juillet dans les deux départements limitrophes de la Vendée (Loire-Atlantique pour le Marais Breton et Charente Maritime pour le Marais Poitevin). En juillet, bon nombre de jeunes ne seraient pas encore volants.

**CANARD PILET, *Anas acuta*** (81)

Les premiers piletts sont notés dès septembre sur l'étang des Boucheries ; la migration postnuptiale avec un petit effectif (pas plus de 30 ind.) se poursuit sur l'étang des Boucheries, dans les marais d'Olonne et à la réserve de St-Denis-du-Payré. Hivernage en petits effectifs (moins de 60 ind.) dans les réserves de St-Denis-du-Payré et des Boucheries, sur le communal du Poiré-sur-Velluire et le littoral, de la Tranche et de St-Jean-de-Monts.

Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 :

Baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay	2 815 (R) 1er site français
Réserve de Chanteloup	387
Reste de la Vendée	232
Total Vendée	3 434 (± 28,7 % de la population française)

Les maximums notés : 940 le 18/02/94 à Chanteloup (ONC) et 285 le 25/02/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV). La majorité des données du passage pré-nuptial proviennent du Marais Poitevin.

Pas de reproduction signalée malgré la présence d'oiseaux en mai et en juin.

**SARCELLE D'ETE, *Anas querquedula*** (40)

La dernière Sarcelle d'été est notée le 26/08/93 dans le marais de Jard-sur-Mer (F.S) et le premier mâle le 26/02/94 au communal du Poiré-sur-Velluire (C.G et J.G).

Elle a été observée dans les marais de la Vie, d'Orouet et d'Olonne, sur les étangs des Boucheries, de la Tuilerie et dans les prés communaux du Marais Poitevin : le Poiré-sur-Velluire, St-Denis-du-Payré (avec un maximum de 48 le 28/03/94 (ADEV)), Nouailles et Triaize.

Indices de reproduction dans le marais de la Vie (G.B), au communal du Poiré (C.G).

Pas de reproduction à l'étang des Boucheries ni à la réserve de St-Denis-du-Payré.

**CANARD SOUCHET, *Anas clypeata***

(134)

La majorité des données provient de l'étang des Boucheries, de la réserve de St-Denis-du-Payré, du communal du Poiré-sur-Velluire et du littoral de la Tranche. Canard noté aussi ailleurs sur les marais, les étangs, et les communaux inondés du Marais Poitevin.

Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : un seul critère « Ramsar » a été obtenu pour la réserve de Chanteloup avec 454 souchets. Il est constaté une baisse de l'effectif total vendéen d'environ la moitié par rapport à 93 (1154 en 94 contre 2036).

Les mouvements migratoires en mars et en avril donnent lieu à des rassemblements de plus de 150 ind. surtout dans les communaux du Marais Poitevin : 166 le 03/03 au communal du Poiré-sur-Velluire (C.G et J.G) et 383 le 16/03/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV). Plus de 250 ont été observés le 25/02/94 sur la Grande Plage de St-Gilles (G.B) et 115 le 25/03/94 à l'étang des Boucheries (H.B).

Un seul indice de nidification possible dans les marais de la Vie (G.B).

**NETTE ROUSSE, *Netta rufina***

(11)

10 données de juillet à fin octobre 93 concernant 1 mâle et 1 femelle sur l'étang des Boucheries (H.B et L.G), et une donnée au lac du Jaunay en janvier 94.

**FULIGULE MILOUIN, *Aythya ferina***

(50)

Présence régulière toute l'année à l'étang des Boucheries (33 données) dont les maximums : 162 ind. le 20/10, 179 le 29/10, 170 le 04/11/93 et 152 le 18/02/94.

D'autres sites à petits effectifs sont signalés à la pointe du Grouin du Cou du 17/10 au 12/12/93 (ADEV), à la station d'épuration de Noirmoutier et à l'étang du Parc Soubise.

48 individus étaient observés le 5 juin 94 à l'étang des Boucheries mais seulement 4 couples s'y sont reproduits avec succès.

1 individu a été signalé le 24/06/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré.

**FULIGULE NYROCA, *Aythya nyroca***

(3)

2 individus les 15 et 21/01/94 à l'étang des Boucheries (H.B, C.G et J.G) et un autre le 24/06/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV).

**FULIGULE MORILLON, *Aythya fuligula***

(42)

Une femelle avec 7 jeunes a été observée à l'étang des Boucheries du 18/07 au 06/08/93. Une grande partie des données (35) concernant 2 à 18 ind. provient de l'étang des Boucheries sur toute l'année. 2 ou 3 oiseaux y ont été vus plusieurs fois au printemps 94, mais aucune reproduction n'a été constatée (L.G).

Les autres lieux d'hivernage sont : la pointe du Grouin du Cou, la station d'épuration de Noirmoutier, la côte de Sion-sur-l'Océan.

**FULIGULE MILOUINAN, *Aythya marila***

(6)

2 femelles le 28/11/93 à la station d'épuration de Noirmoutier, 1 femelle du 05/12 au 17/12/93 à la pointe du Grouin du Cou (C.B et A.T) et 8 mâles avec 10 femelles en baie de l'Aiguillon le 19/02/94 (X.H et M-P.V).

**EIDER A DUVET, *Somateria mollissima***

(44)

Il a été essentiellement noté du 29/08/93 au 26/03/93 sur le littoral du sud Vendée (de la pointe du Rocher à la pointe du Grouin du Cou) avec 33 données concernant de 2 à 40 ind. (G-L.C, G.B, C.B et ADEV). D'autres lieux d'observation : le long des côtes de St-Jean-de-Monts, de l'île de Noirmoutier ainsi qu'à Port Olonna aux Sables-d'Olonne.

257 ind. (dont 95 pour la baie de Bourgneuf/Noirmoutier) ont été dénombrés sur le littoral du département au cours du comptage BIROE, mi-janvier 94.

**HARELDE BOREALE, *Clangula hyemalis***

(24)

Espèce exclusivement observée entre la Chaume et la pointe du Grouin du Cou, du 15/11/93 au 04/04/94. Le plus souvent un seul individu, mais également 5 observations de 2 à 6 ind. pendant la période concernée.

**MACREUSE NOIRE, *Melanitta nigra***

(66)

Les 43 données du 29/08/93 au 26/03/94 proviennent du littoral du sud de la Vendée (de la pointe du Rocher à la pointe de l'Aiguillon) avec quelques grands rassemblements de 1100 à 1550 en novembre et en décembre 93 et de 1500 à 3600 en février 94.

Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : 5 971 ind. sur le littoral du département.

Dernières Macreuses noires observées : 20 le 08/04/94 sur la côte des Marines (Orouet) (G.B).

**MACREUSE A LUNETTES, *Melanitta perspicillata***

(18)

Remarquable observation d'un mâle du 27/12/93 au 27/02/94 entre la pointe du Grouin du Cou et la Terrière (merci les nombreux gentils chasseurs... de cochons).

**MACREUSE BRUNE, *Melanitta fusca***

(18)

Notée du 20/10/93 au 27/02/94 de la pointe du Grouin du Cou à la Terrière avec 3 à 6 oiseaux à chaque fois.

D'autres observations ont été faites : 3 ind. le 12/11 à la Meule de l'île d'Yeu (X.H et M-P.V), 6 le 24/11 à la plage des Dunes (F.P), 3 le 12/12/93 et 2 le 01/03/94 à la Chaume (C.B).

**GARROT A OEIL D'OR, *Bucephala clangula***

(4)

3 données en décembre 93 : 3 le 11/12 (A.T) et 1 mâle immature le 27/12 au plan d'eau de l'Aiguillon; 1 femelle le 23/12/93 à l'étang des Boucheries (L.G) et encore une le 25/02/94 au même endroit (H.B).

**HARLE PIETTE, *Mergus albellus***

(12)

Une femelle a été observée du 03/12/93 au 11/03/94 à l'étang des Boucheries.

**HARLE HUPPE, *Mergus serrator***

(36)

Observé en hivernage sur tout le littoral du département. Les 3 premiers ont été observés le 18/10/93 à la pointe du Payré (A.T) et le dernier le 04/05/94 sur la côte de Sion-sur-l'Océan (G.B).

Quelques maximums : 9 le 06/12 à l'Herbaudière (A.B), 10 le 08/10, 14 le 18/12/93 et 11 le 08/01/94 à la pointe du Grouin du Cou (ADEV).

**HARLE BIEVRE, *Mergus merganser***

(5)

1 femelle le 28/11 et le 19/12/93 à l'étang du Parc Soubise (T.Y), 1 femelle le 19/12/93 à l'étang des Boucheries (L.G), 1 femelle à la pointe de l'Aiguillon le 27/12/93 (G-L.C) et encore une femelle/immature le 12/01/94 à la réserve de Chanteloup (ONC). Ces données concernent-elles une seule et même femelle ?

**ERISMATURE ROUSSE, *Oxyura jamaicensis***

(7)

Séjour d'un mâle du 11/07/93 au 21/05/94 sur l'étang des Boucheries.

**BONDREE APIVORE, *Pernis apivorus***

(17)

13 données en fin d'été (du 18/08 au 03/09/93) concernant 1 à 2 ind. en migration sur la côte, et 4 données d'avril à mai d'un ind. dans le bocage.

Pas d'indice de nidification !...

**MILAN NOIR, *Milvus migrans***

(104)

Une donnée tardive d'un ind. le 30/11/93 à Mareuil-sur-Lay (L.G). Premier milan de la saison 94 noté le 26/02 à Chuchillon (P.M). Nicheur régulier dans l'ensemble du département avec une forte densité dans les zones côtières.

- MILAN ROYAL, *Milvus milvus*** (22)  
Observation régulière dans le Marais Poitevin entre le 26/10/93 et le 04/05/94 avec l'hivernage d'un individu au moins à St-Denis-du-Payré, aux Moutiers-sur-Lay et à Champ-Saint-Père.  
Passage postnuptial à la pointe de l'Aiguillon : 18 ind. le 27/10 et 12 le 30/10/93. Seulement 4 données d'automne hors Marais Poitevin.
- PYGARGUE A QUEUE BLANCHE, *Haliaeetus albicilla*** (3)  
Rare, mais régulièrement présent (chaque année ?) dans notre département. Un individu a été observé du 23 juin au 8 juillet 93 dans les marais d'Olonne (ONC) et le 26 juillet 93 dans les marais de la Guittière (G.Bu).
- CIRCAETE JEAN-LE-BLANC, *Circaetus gallicus*** (13)  
Noté du 18/08 au 19/09/93 ainsi que le 27/06/94 en Marais Poitevin (maximum de deux individus). Pas d'indice de nidification signalé au fichier.
- BUSARD DES ROSEAUX, *Circus aeruginosus*** (207)  
Observé toute l'année dans tout le département et nicheur commun dans les zones palustres et aux abords des étangs bocagers. Quelques passages notés à la pointe de l'Aiguillon à l'occasion du suivi de la migration postnuptiale. Pas de grosses concentrations signalées à part le dortoir d'hiver en baie de l'Aiguillon.
- BUSARD SAINT-MARTIN, *Circus cyaneus*** (63)  
Observé toute l'année dans les massifs forestiers et les bois bocagers. 48 données, pour la période du 27/08/93 au 13/05/94, concernant des individus isolés mais aussi quelques couples proviennent du Marais Poitevin. Pas de rassemblements ou de dortoirs d'hiver signalés. Une seule donnée possible de reproduction au Poiré-s-Velluire.
- BUSARD PALE, *Circus macrourus*** (3)  
Une donnée d'un mâle, non homologuée par le CHN (à cause de la description trop succincte), le 28/08/93 à St-Denis-du-Payré (auteur ?). 2 autres données d'un ind. les 12 et 30/06/94 au polder de Champagné-les-Marais (C.Pa et O.B). Pas de suite d'homologation pour ces dernières.
- BUSARD CENDRE, *Circus pygargus*** (47)  
La grande majorité des données (39) provient du Marais Poitevin, les autres sont du Marais Breton. Dates extrêmes : 18/09/93 pour le passage postnuptial, 26/04/94 pour la première observation de printemps.  
Reproduction : 50-70 couples minimum dans le Marais Poitevin, 40 couples estimés dans la plaine céréalière de Luçon à Benet (C.G) et 35-40 couples dans le Marais Breton.
- AUTOUR DES PALOMBES, *Accipiter gentilis*** (7)  
Une femelle et un jeune dans le massif forestier de Mervent-Vouvant en juillet 93 (D.B); jusqu'à deux en mars 94 dans la forêt de Longeville; à nouveau une femelle le 05/04/94 dans le massif forestier de Mervent-Vouvant (D.B). Enfin un adulte avec des jeunes le 05/05/94 dans la forêt du Parc Soubise (T.Y).
- EPERVIER D'EUROPE, *Accipiter nisus*** (82)  
Présent toute l'année dans tout le département et nicheur commun (?) dans les petits ou grands boisements. Passage du 29/09 au 04/11/93 à la pointe de l'Aiguillon. Fort bien contacté de juillet à février avec 65 données mais, curieusement, très peu de données en période de reproduction (seulement 2 indices certains).

- BUSE VARIABLE, *Buteo buteo*** (234)  
Très présente et nicheuse commune. Un individu en phase claire observé le 03/03/94 au communal du Poiré-sur-Velluire (C.G). Quelques groupes de 5 à 10 oiseaux en migration d'automne et de printemps observés au Jaunay, à Lairoux., à Marcuil-sur-Lay, et au Langon.
- AIGLE BOTTE, *Hieraetus pennatus*** (3)  
1 couple les 12 et 15/05/94 et 1 individu différent du couple le 21/05/94.  
Indice de reproduction possible à certain. ( cf article de PH. ROUILLIER et O. POUVREAU dans ce même numéro de *La Gorgebleue...*)
- BALBUZARD PECHEUR, *Pandion haliaetus*** (32)  
Il est régulièrement observé au passage postnuptial : ainsi 29 données du 18/08 au 07/11/93 concernant jusqu'à 3 ind. ensemble dans les marais d'Olonne et de la Guittière, au lac du Jaunay et en baie de l'Aiguillon.  
Au passage pré-nuptial, mention d'un ind. isolé dans les marais de Jard-sur-Mer et de la Guittière.
- FAUCON CRECERELLE, *Falco tinnunculus*** (341)  
Très commun et nicheur partout. Deux groupes de 10 ind. ont été vus l'un le 21/08 au communal de Lairoux (A.T), l'autre le 13/10 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV). Un autre groupe de 22 ind. le 01/09/93 au communal de Lairoux (A.T).  
Passage noté à l'occasion du suivi de la migration à la pointe de l'Aiguillon.  
Reproduction constatée dès avril avec 25 indices certains.
- FAUCON KOBEZ, *Falco vespertinus*** (22)  
Un couple présent dans le Marais Poitevin de juillet à mi-septembre 93 et un indice certain de reproduction avec 3 jeunes (voir *Gorgebleue* n°13, article de F.Portier et *Ornithos* n°1-vol 1 (1994)).  
1 mâle le 15/11/93 à la réserve de Chanteloup (ONC) et 5 données d'un mâle en mai et juin 94 dans le Marais Poitevin, sans indice de reproduction.
- FAUCON EMERILLON, *Falco columbarius*** (19)  
Le 1er a été observé le 20/09/93 à Sion-sur-l'Océan. Du 25/09 au 20/10/93, 1 ou 2 ind. viennent chaque jour chasser les passereaux à la pointe de l'Aiguillon pendant le suivi de la migration. 1 fem/imm. du 14/11/93 au 22/01/94 à Noirmoutier (A.B), 1 femelle le 01/11/93 et 1 mâle le 19/02/94 à Bretet (G.B), 1 (probablement femelle) à France (J-C.L) et le dernier le 16/04/94 à Champagné-les-Marais (C.G).
- FAUCON HOBEBEAU, *Falco subbuteo*** (57)  
En 93, mentionné au fichier jusqu'au 28/10. Passage du 22/09 au 05/10 à la pointe de l'Aiguillon. Retour de migration : le premier a été noté le 11/04 à Grucs (ADEV).  
Peu d'indices de reproduction quoique cet oiseau se reproduise un peu partout avec une nette préférence pour les forêts côtières.
- FAUCON PELERIN, *Falco peregrinus*** (19)  
La plupart des données pour la période allant du 06/09/93 au 25/03/94 proviennent, traditionnellement, du sud de la Vendée et ne concernent qu'un seul oiseau à chaque fois. Oiseau présent régulièrement tout l'hiver en baie de l'Aiguillon et au communal du Poiré-sur-Velluire.  
Une seule donnée de l'intérieur, d'un mâle immature le 31/10/93 à l'étang des Boucheries (C.B).
- PERDRIX ROUGE, *Alectoris rufa*** (56)  
Gibier de chasse introduit partout.

- PERDRIX GRISE**, *Perdix perdix* (17)  
Moins notée que la précédente, mais observée toute l'année un peu partout.
- CAILLE DES BLES**, *Coturnix coturnix* (6)  
Notée en juillet 93 à Longeville, en juillet 93 et en juin 94 dans les plaines du sud de la Vendée. 5 ou 6 mâles chanteurs le 12/06/94 à Bretet (G.B).
- FAISAN DE COLCHIDE**, *Phasianus colchicus* (9)  
Relativement peu noté à cause de son statut d'espèce-gibier, il est largement présent dans tout le département y compris à l'île d'Yeu.
- RALE D'EAU**, *Rallus aquaticus* (22)  
Observé à peu près toute l'année dans les zones palustres avec roselières plus ou moins denses : 2-3 chanteurs le 03/07 à Orouet (G.B), 2 adultes avec 2 poussins le 18/07 à Grues (J.R), 3 dont 1 juvénile le 29/08 à la Belle Henriette (G-L.C), 2 juvéniles le 10/09/93 à Braud (J.R) et 2 à 4 ind. du 16/09 au 13/10/93 aux Agaures (F.P et A.G).  
En période de reproduction : 3 individus le 01/05/94 au marais de la Guerche (Ilc d'Yeu) (X.H et M-P.V) et 1 nid avec coquilles le 28/05/94 dans les marais de la Vie (G.B).
- MARQUETTE PONCTUEE**, *Porzana porzana* (1)  
1 individu le 28/05/94 dans le marais de la Vie (G.B).
- GALLINULE POULE D'EAU**, *Gallinula chloropus* (189)  
Très commune, nicheuse et sédentaire partout, y compris à l'île d'Yeu.
- FOULQUE MACROULE**, *Fulica atra* (77)  
Surtout notée sur les étangs bocagers, plus particulièrement à l'étang des Boucheries avec un maximum de 2000 ind. le 27/08/93, et à l'étang des Mattes avec un maximum de plus de 550 adultes et juvéniles le 17/07/93 (F.P).  
Reproduction sur la plupart des grands étangs du bocage ainsi que sur celui des Mattes, entre autres.
- GRUE CENDREE**, *Grus grus* (30)  
Migration postnuptiale : un seul passage, d'une vingtaine d'ind., signalé le 19/10/93 à la Chaize-le-Vicomte (J.V).  
En hivernage : 15 à 63 ind. (dont 6 immatures) ont séjourné du 04/11/93 au 15/02/94 en baie de l'Aiguillon et à sa périphérie : 2 ind. le 22/11/93 à la Guittière (A.G), passage de 4 le 12/01 à Mouzeuil (J-C.L), 1 le 10/02 à St Benoît-sur-Mer (ADEV).  
Passage pré-nuptial : 20 le 02/03 à Mervent (J.D) et encore 7 le 04/04/94 à Olonne (D.B).
- OUTARDE CANEPETIERE**, *Tetrax tetrax* (3)  
Espèce en forte régression en Vendée et en France.  
Pas de rassemblement postnuptial en 1993 au communal du Poiré-s-Velluire. Les 3 données proviennent du Poiré-sur-Velluire et de Bretet (mai-juin 94) et concernent 1 puis 4 mâles (PNR, C.G, J.G et G.B).
- HUITRIER-PIE**, *Haematopus ostralegus* (33)  
De petits groupes (1 à 50 ind.) sont notés un peu partout sur le littoral de juillet à mars. Exception : env. 500 le 03/04/94 à la jetée de Jacobsen (X.H et M-P.V).  
Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : 2569 ind. dont 2100 en baie de Bourgneuf pour un total français de 43 800 hivernants.

- ECHASSE BLANCHE**, *Himantopus himantopus* (73)  
Seulement 14 données de juillet à début septembre 1993 : 3-5 couples avec des pullis le 17/07 à l'étang des Mattes (C.G), 20 ad et imm. le 31/07 dans les marais de la Vie et les 3 dernières données le 06/09/93 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV).  
Très bon suivi de nidification en 94 avec 231-244 couples en Vendée dont 93 cples en Marais Breton, 52 cples dans les marais de Noirmoutier, 19-25 cples à St Hilaire de Riez, 20 cples dans les marais d'Olonne, 5 cples à Talmont et 42-49 cples en Marais Poitevin; soit 31,5% de l'effectif nicheur du centre ouest (Morbihan 90 cples, Loire-Atlantique 157/164 cples, Charente Maritime 253/268 cples) (ROBREAU et DELAPORTE 1996).  
62 poussins ont été marqués dans notre département, avec une combinaison de bagues colorées.
- AVOCETTE ELEGANTE**, *Recurvirostra avosetta* (51)  
Elle est présente de juillet à fin octobre, puis de janvier à juin sur le littoral et dans les marais côtiers; seule la baie de l'Aiguillon l'abrite tout l'hiver avec un maximum de plus de 3000 le 14/11/93 (C.G et J.G). Une donnée intérieure de 8 ind. le 21/04/94 à l'étang des Boucheries (H.B).  
Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : 7185 ind. dont 1123 ind. en baie de Bourgneuf et Noirmoutier, 6031 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay et 31 pour le reste du département soit env. 42% de la population française (17 200).  
Si le fichier a des indices de reproduction, il n'en est pas de même pour le nombre de couples nicheurs en 1994.
- EDICNEME CRIARD**, *Burhinus oedienemus* (18)  
Régulièrement observé en juillet 93 et d'avril à juin 94 dans la plaine céréalière de Luçon à Oulmes et dans la vallée de la Vendée (de Chaix à Velluire). 3 données de la région bocagère en période de reproduction : un couple le 20/03 à Chavagnes-les-Redoux (B.P), 1 chanteur le 29/04/94 à Chantonay (G-L.C) et 1 le 17/06 aux Moutiers-sur-Lay (S.V).  
Pas de données de rassemblement automnal.  
Nicheur commun dans la plaine céréalière de Luçon à Oulmes, quant au nombre de couples nicheurs dans notre département, il serait de l'ordre de 100 à 500 cples (Enquête Oedienème 1993 - F.MALVAUD 1995).
- PETIT GRAVELOT**, *Charadrius dubius* (24)  
Observé de juillet à fin octobre 93 dans les marais de la Vie, au lac de Maché et l'étang des Boucheries avec un nombre ne dépassant pas 5 à chaque fois. Le premier a été signalé le 01/03/94 dans les marais de la Vie (G.B). 1 ind. le 19/03 au plan d'eau de Luçon (ADEV), 3 le 04/04 dans les marais d'Olonne (X.H et M-P.V) et 1 le 15/06/94 à l'étang des Boucheries (H.B).  
Reproduction certaine de 2 cples et probable de 6 autres, dans les marais de la Vie (G.B).
- GRAND GRAVELOT**, *Charadrius hiaticula* (68)  
Passage postnuptial en petits effectifs ne dépassant pas 50 ind. dès juillet dans les marais de la Vie, au lac de Maché, sur le littoral de Sion-sur-l'Océan au Jaunay, à la réserve de St-Denis-du-Payré et à l'étang du Parc Soubise.  
Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : 790 ind. dont 660 en baie de Bourgneuf, 40 en baie de l'Aiguillon et 90 pour le reste du département (total France : 11 700).  
7 données en avril et mai dans le Marais Poitevin, dans les baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf et dans les marais de la Vie.

**GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU, *Charadrius alexandrinus*** (15)

Noté en juillet et en septembre 93 à la pointe de l'Aiguillon avec un maximum de 25 le 21/08 (L.G), au lac de Vallées, au Gois, et de fin mars à juin 94 à la pointe de l'Aiguillon, en baie de Bourgneuf, dans les marais d'Olonne.

1 ou 2 couples se sont reproduits à la pointe de l'Aiguillon (C.G). Pas d'indice de reproduction à la Belle Henriette ni au pays d'Olonne.

**PLUVIER DORE, *Pluvialis apricaria*** (41)

Essentiellement observé en hiver à l'intérieur de la Vendée, surtout dans les prés communaux du Marais Poitevin. Le 1er est noté le 09/09/93 à la Belle Henriette (A.T) et le dernier le 14/05/95 (date tardive) dans le marais de la Guittière (G.Bu).

Il n'y a pas de très gros effectifs pour l'hiver 93-94. Quelques maximums notés : 350 le 03/12 et le 11/02 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV), 600 le 13/01 à Champagné-les-Marais (C.G), 685 le 22/01 en baie de Bourgneuf (GOV) et 1200 le 16/02/94 au communal du Poiré-sur-Velluire (C.G et J.G).

**PLUVIER ARGENTE, *Pluvialis squatarola*** (53)

Noté de juillet à mai sur le littoral et les marais littoraux, il semble être absent en juin.

Comptage du BIROE, mi-janvier 94 : 3836 dont 1720 en baie de Bourgneuf et à Noirmoutier, 2075 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay et 41 pour le reste du département (total en France : 22 500).

**VANNEAU HUPPE, *Vanellus vanellus*** (228)

Essentiellement noté en hivernage avec de gros effectifs dans le Marais Poitevin et en effectifs de moyenne densité un peu partout. Le nombre des hivernants dans le Marais Poitevin pourrait être estimé à 50 / 70 000.

Les maximums de l'hivernage : 1500 à 7000 du 04/12/93 au 25/02/94 au communal du Poiré-sur-Velluire (C.G et J.G), 750 à 5000 du 13/12/93 au 25/02/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV), 2500 le 13/01/94 à Champagné-les-Marais (C.G), 2000 le 28/01/94 à l'étang des Boucheries (L.G).

Les indices de reproduction sont surtout notés dans les Marais Breton et Poitevin, les marais littoraux et les îles.

**BECASSEAU MAUBECHE, *Calidris canutus*** (17)

11 données en passage postnuptial dans les marais d'Olonne, à l'estuaire du Lay, à la pointe et la baie de l'Aiguillon; 3 données en avril et mai dans les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon et dans les marais de la Guittière.

Comptage du BIROE, mi-janvier 94 : 9 810 (env. 25,8 % de l'effectif hivernant français pour un total de 37 900) dont 310 en baie de Bourgneuf et 9 500 en baie de l'Aiguillon et à la pointe d'Arçay.

**BECASSEAU SANDERLING, *Calidris alba*** (28)

Passage postnuptial : 7 ind. le 19/09/93 à Givrand (G.B), 77 le 22/09 à l'Épine (P.G) et de 8 à 30 du 23/09 au 05/10/93 à la pointe de l'Aiguillon (C.G et L.G). Puis de novembre 93 au début de mai 94 de Sion-sur-l'Océan à St-Jean-de-Monts, de la Tranche à Longeville-s-Mer ainsi qu'à l'Île de Noirmoutier, avec quelques maximums : 55 le 13/01/94 à St-Jean-de-Monts (G.B), 80-90 le 01/03/94 à la Terrière (F.S) et 95 le 06/03/94 à la pointe du Grouin du Cou (G-L.C).

Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : 495 ind. dont 308 en baie de Bourgneuf et 187 de Sion-sur-l'Océan à la Faute-s-Mer (total France : 6150).

**BECASSEAU MINUTE, *Calidris minuta*** (29)

Noté jusqu'au 07/11/93 dans les marais de la Vie (4 données avec un maximum de 25 le 07/09) à la Guittière, aux lacs de Maché (8 données avec un maximum de 30 le 27/09), des Vallées (avec un

maximum de 52 le 18/09) et du Jaunay. A la réserve de St-Denis-du-Payré, maximum de 27 le 06/09/93, puis noté en petit nombre à chaque fois ( 1 à 3 ind. ) du 01/03 au 16/03/94. Première donnée de migration postnuptiale pour 94 (= le 24/06), toujours à la réserve de St-Denis-du-Payré.

Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : 0 pour la Vendée (total France 1 500).

**BECASSEAU DE TEMMINCK, *Calidris temmincki*** (4)

En passage postnuptial, 1 le 21/08 à la pointe de l'Aiguillon (L.G), 1 le 18/09 au lac des Vallées (M.T), 1 le 23/09/93 à Talmont (X.H et M-P.V) et, pour 94, 2 ind. le 13/05/94 à la Guittière (G.Bu).

**BECASSEAU TACHETE, *Calidris melanotos*** (3)

3 données d'un ind. (juv.) du 04 au 11/10/93 dans le marais Montportreau (les Sables) (D.D et F.P).

**BECASSEAU COCORLI, *Calidris ferruginea*** (32)

Très présent au les passage postnuptial de juillet à début octobre 93 : 14 le 26/08 et 3 le 15/09 dans le marais Montportreau (F.P et A.B), 1 le 31/07 en baie de l'Aiguillon (D.B), 25 le 29/08 à la réserve de St-Denis-du-Payré(G-L.C), 3 à 6 du 04 au 08/09 au lac du Jaunay (H.J et G.B), 4 à 6 du 01/09 au 02/10 au lac de Maché (G.B, A.G et O.P) et 3 à plus de 6 du 13 au 18/09 au lac des Vallées (M.T).

**BECASSEAU VIOLET, *Calidris maritima*** (23)

Régulièrement observé de novembre 93 à mi-mai 94 sur les côtes rocheuses de la Chaume et de Sion-s-l'Océan : 10 à 75 ind. sur chaque site (C.B, F.P et G.B). Une donnée à l'île d'Yeu (pointe du But) d'un ind. le 13/11/93 (X.H et M-P.V).

**BECASSEAU VARIABLE, *Calidris alpina*** (89)

Passage très marqué d'août à septembre 93 sur le lac d'Apremont-Maché avec un nombre variable de 10 à 30 ind.. Hivernage souvent signalé sur tout le littoral, les marais littoraux et dans les îles.

Passage de printemps signalé dans les communaux du Marais Poitevin et les marais de la Vie. Le dernier a été vu à mi-mai 94.

Comptage du BIROE, mi-janvier 94 : 37 143 ind. dont 18 000 en baie de Bourgneuf / Noirmoutier, 18 855 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay, 288 pour le reste de la Vendée (Total France 297 500).

**COMBATTANT VARIE, *Philomachus pugnax*** (34)

Passage de juillet au début de novembre 93 par petits groupes de 1 à 15 ind. noté dans les marais de la Vie, les étangs des Mattes, des Boucheries, du Parc Soubise, les lacs des Vallées et de Maché et la réserve de St-Denis-du-Payré (maxi : 25 le 29/08 pour cette dernière (G-L.C)).

Deux données d'hiver de 3 ind. au communal du Poiré-s-Velluire le 04/12/93 (C.G et J.G.) et d'un ind. le 29/12/93 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV). Absent aux comptages BIROE.

Au passage pré-nuptial (de février à avril 94) de petits groupes de taille variable (5 à 65) sont souvent notés dans les communaux du Poiré-s-Velluire, dans les marais de la Vie et à la réserve de St-Denis-du-Payré. D'autres observations isolées sont signalées à Longeville, à la station d'épuration de Nalliers, à la Guittière.

Les maximums du passage de printemps 94 : 59 le 23/02 au communal du Poiré-s-Velluire (C.G et J.G), 272 le 28/03 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV), 250 à 300 le 11/04 à Longeville (ADEV), 282 le 02/05 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV) et plus de 100 le 02/05 dans les marais de la Vie (G.B).

Deux données en période de reproduction : 1 femelle avec comportement nicheur le 31/05/94 dans les marais de la Vie (G.B) et 2 le 27/06/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV).

**BECASSINE SOURDE, *Lymnocyptes minimus*** (1)

1 le 04/02/94 à l'étang des Boucheries (H.B).



**BECASSINE DES MARAIS, *Gallinago gallinago***

(84)

Notée d'août à novembre 93 au cours du passage postnuptial sur les étangs des Boucheries et du Parc Soubise, dans les marais Montportreau, de la Vie, les lacs des Vallées et de Maché, sur les communaux de Lairoux / Curzon, du Poiré-s-Velluire et à la réserve de St-Denis-du-Payré (maximum pour cette dernière de 87 ind. le 13/10/93 (ADEV).

99 ind. sont notés au cours des passages d'octobre à novembre 93 à l'occasion du suivi de la migration à la pointe de l'Aiguillon.

Les hivernants et les migrateurs de printemps, avec un nombre variable de 2 à 35 pour chaque site, ont été signalés sur les étangs du bocage, les communaux du Marais Poitevin et à la réserve de St-Denis-du-Payré.

Absence d'indice de reproduction en 1994.

**BECASSE DES BOIS, *Scolopax rusticola***

(2)

3 le 03/10/93 à St Cyr des Gâts (H.J et 1 le 23/11/93 à la forêt de Longeville (A.T).

**BARGE A QUEUE NOIRE, *Limosa limosa***

(70)

Le passage postnuptial de juillet à octobre 93, par petits groupes, est noté dans les marais d'Olonne, à la réserve de St-Denis-du-Payré, à la Belle Henriette, en baie de l'Aiguillon et à la pointe du même nom. Un maximum : 400 le 29/08/93 à l'estuaire du Lay (G-L.C).

Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : la baie de l'Aiguillon est, avec la pointe d'Arçay, un site d'hivernage d'importance nationale et internationale pour cette espèce, puisqu'elle accueille 78 % de la population hivernante française avec 3 500 ind. (pour un total de 4 500).

Le passage pré-nuptial (février à mars 94) est noté, avec une bonne fréquence, dans les marais de la Vie, du Marais Breton, du Marais Poitevin (en particulier les communaux) et à la réserve de St-Denis-du-Payré. A noter un remarquable stationnement de 12 200 oiseaux le 25/02/94 au communal du Poiré-s-Velluire (C.G).

Des oiseaux reproducteurs ont été signalés dans les communaux du Marais Poitevin, à la réserve de St-Denis-du-Payré et dans le Marais Breton.

**BARGE ROUSSE, *Limosa lapponica***

(21)

Notée d'août à octobre 93 à l'étang des Boucheries, dans le marais Montportreau, au lac de la Vie, à Sion-sur-l'Océan et à l'estuaire du Lay en petit nombre ne dépassant pas 3 ind. En janvier, dans les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon et de la fin avril à la mi-mai 94 dans les marais d'Olonne, à la Guittière, à la station d'épuration de Nalliers et à l'Île d'Yeu.

Comptage du BIROE à la mi-janvier 94 : 553 ind. dont 410 en baie de Bourgneuf/Noirmoutier et 143 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay (total France 4 300)

**COURLIS CORLIEU, *Numenius phaeopus***

(36)

Au passage postnuptial, de juillet à mi-septembre 93, sont notés de petits groupes de 1 à 10 ind. dans les marais de la Vie, d'Olonne et en baie de l'Aiguillon, tandis que le passage pré-nuptial, du 10 avril au début mai 94, concerne les communaux et les prés des Marais Poitevin et Breton, les marais de la Vie, d'Olonne, avec un maximum de 7600 le 28/04/94 (ONC) à la Guittière et à l'Île d'Yeu.

1 donnée d'hiver de 2 ind. le 11/01/94 à la Coupelasse (baie de Bourgneuf) (J-C.B et D.F).

Dernier noté, une nouvelle fois : dans les marais de la Vie le 20/06/94 (pour mémoire : 1 le 27/06/93 au même endroit (G.B)).

**COURLIS CENDRE, *Numenius arquata***

(23)

Noté en juillet 93 à Sion-sur-l'Océan, en septembre à la Chaume et de novembre 93 à fin avril 94 au communal du Poiré-s-Velluire, à la réserve de St-Denis-du-Payré, à l'étang du Parc Soubise et dans les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon. Le dernier est noté le 15/6/94 à l'étang des Boucheries (H.B).

Comptage du BIROE, mi-janvier 94 : 2 726 ind. dont 1 782 en baie de Bourgneuf, 831 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay et 112 pour le reste de la Vendée (total France : 18 800).

**CHEVALIER ARLEQUIN, *Tringa erythropus***

(24)

Retour noté le 21/07/93 à Bouin (12 oiseaux) (C.G) et de septembre au début d'octobre 93 à la réserve de St-Denis-du-Payré, dans les marais de la Vie, au lac de Maché, et le 30/11/93 en baie de l'Aiguillon (A.T).

Comptage du BIROE, mi-janvier 94 : 30 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay et 1 en baie de Bourgneuf (ONC) (total France : 120).

Puis d'avril à la mi-mai 94 à l'étang des Boucheries, dans les marais de la Vie et de la Guittière, de Bouin, à la station d'épuration de Nalliers et à la réserve de St-Denis-du-Payré, par petits groupes de 1 à 9 ind.. Enfin 5 ind. notés le 16/06 et 4 le 27/06/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV).

**CHEVALIER GAMBETTE, *Tringa totanus***

(105)

Noté de juillet à octobre 93 dans les marais Montportreau, d'Olonne et de la Vie, au lac du Jaunay et dans les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon, par petits groupes de 1 à 30. En janvier 94, ils se concentrent dans les baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf. De février à fin juin 94, migrateurs de printemps et reproducteurs sont notés dans les communaux et les prés du Marais Poitevin, à la réserve de St-Denis-du-Payré, dans les marais de la Vie et en Marais Breton. D'autres passages de printemps 94 sont notés à l'étang des Boucheries et à l'Île d'Yeu.

Comptage du BIROE, mi-janvier 94 : 86 en baie de Bourgneuf / Noirmoutier et 375 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay (total France : 3 900)

**CHEVALIER STAGNATILE, *Tringa stagnatilis***

(0)

Pas d'observation en 93-94.

**CHEVALIER ABOYEUR, *Tringa nebularia***

(46)

Passage postnuptial de juillet à septembre 93 avec quelques retardataires en octobre et novembre, surtout sur la frange littorale (baies, marais côtiers et lacs) par petits groupes de 1 à 10. Deux données de 2 ind. du 20 au 30/08/93 à l'étang des Boucheries (L.G et H.B).

Les maximums du passage pré-nuptial (1er oiseau pointé le 13/04/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV)) : 12 le 27/04/94 à la station d'épuration de Nalliers (G.N et S.V) et 45 le 29/04/94 dans les marais de la Vie (G.B).

**CHEVALIER CULBLANC, *Tringa ochropus***

(54)

Observé presque toute l'année un peu partout dans le département (lacs, étangs, marais côtiers, stations d'épuration et marais doux), mais surtout noté au cours des passages d'automne (juillet à octobre) et de printemps (mars à juin) par petits groupes de 1 à 15.

**CHEVALIER SYLVAIN, *Tringa glareola***

(15)

1 du 08 au 22/07/93 au polder du Dain (C.G), 1 à 8 le 24/07 et du 06 au 11/09/93 dans les marais de la Vie (G.B), 2 le 16/08/93 au lac des Vallées (M.T), 1 le 19/08/93 au communal de Triaize (A.G) et 3 le 30/08/93 à l'étang des Boucheries (H.B).

1ère observation d'hiver d'un ind. au comptage BIROE à la mi-janvier 94, en baie de Bourgneuf. Cet oiseau ne figure pas dans l'Atlas des oiseaux de France en hiver, il est donc hivernant rare voire exceptionnel en France. Chez nos voisins de Loire-Atlantique, 2 ind. ont été également observés le 08/01/94 (comptage BIROE) dans les marais salants de Batz-sur-Mer (D.RABOIN 1996).

Le passage pré-nuptial, d'avril à mai, est noté à Bouin et dans les marais de la Vie avec un maximum de 9 ind. le 01/05/94 (G.B).

**CHEVALIER GUIGNETTE, *Actitis hypoleucos*** (74)

Observé presque toute l'année, avec un maximum de données de juillet à octobre 93, puis d'avril à mai 94, sur les étangs, les lacs, les stations d'épuration et les marais côtiers.

La plupart des groupes importants d'oiseaux sont observés dans les marais de la Vie : plus de 30 ind. les 31/07 et 04/08/93 et plus de 15 le 06/05/94 (G.B).

**TOURNEPIERRE A COLLIER, *Arenaria interpres*** (23)

Noté de juillet à fin novembre 93 (19 données), en janvier (1 donnée), et de fin avril à mai 94 (3 données) sur le littoral, dans quelques marais côtiers et dans les îles, souvent par petits groupes de 1 à 10.

Comptage BIROE à la mi-janvier 94 : seulement 3 ind. en baie de Bourgneuf (total France 5700)

**PHALAROPE A BEC ETROIT, *Phalaropus lobatus*** (2)

1 ind. les 15 et 16/09/93 à l'étang des Boucheries (H.B) (observation sous réserve, pourrait être un Phalarope à bec large) (note de C.G).

**PHALAROPE A BEC LARGE, *Phalaropus fulicarius*** (23)

La queue du cyclone « Floyd », venant des Antilles et traversant le golfe de Gascogne, a provoqué des vents violents dans la nuit du 12 et 13 septembre 93, ces vents violents ont poussé de nombreux oiseaux pélagiques (phalaropes, labbes et surtout Mouettes de Sabine) sur tout le littoral du département.

Après l'accalmie, 23 données du 13 au 26 septembre 93 : 1 à 7 oiseaux les 13 et 18/09 aux marais d'Olonne (ONC), 2 à 25 du 13 au 17/09 au port de St-Gilles (G.B), 3 à 7 le 15/09 au port des Sables, 5 le 15/09 à la Guittière (ONC) et d'autres observations d'un ou 2 ind. à la station d'épuration de la Tranche, à la Belle Henriette, à la Gachère, à la pointe de l'Aiguillon et sur l'île de Noirmoutier.

**LABBE POMARIN, *Stercorarius pomarinus*** (6)

1 juv. le 11/08/93 au large des Sables (sortie Kifanlo), 1 juv. le 03/09/93 à la Paracou (F.P) et 4 autres observations dues à la tempête du 13 au 15/09/93 : 1 à St-Gilles, 4 aux marais d'Olonne et 1 aux Sables.

**LABBE PARASITE, *Stercorarius parasiticus*** (43)

Observation régulière d'un à 6 ind. de juillet à mi-novembre 93 à la corniche de Sion-sur-l'Océan, à la pointe du Grouin du Cou et à la pointe de l'Aiguillon. D'autres observations en septembre concernant 1 à 16 ind. signalés aux marais d'Olonne, de la Vie, de Montporteau, à la Chaume, à la Tranche et à l'île d'Yeu.

**LABBE A LONGUE QUEUE, *Stercorarius longicaudus*** (3)

Labbes repoussés par la tempête du 13/09/93 sur le littoral : 1 immature le 13/09 à St-Gilles (G.B et M.T), 1 le 19/09 à la pointe de l'Aiguillon (C.G et sortie GOV) et 1 le 23/09 au centre de soins de C.Pacteau à St-Denis-du-Payré (C.G et C.P).

**GRAND LABBE, *Stercorarius skua*** (17)

Essentiellement observé de juillet à novembre 93 à la pointe de l'Aiguillon, à la pointe du Grouin du Cou, à St-Gilles, sur les îles avec 1 à 3 ind. à chaque fois, puis de la fin mars à avril 94 : un ind. à l'île de Noirmoutier, à la corniche de Sion-sur-l'Océan et à la pointe du Payré.

**LABBE INDETERMINE, *Stercorarius sp.*** (4)

1 ind. le 01/08/93 à Sion-sur-l'Océan, 1 le 17/10/93 à la pointe du Grouin du Cou, 1 le 09/04/94 à l'Herbaudière et 1 le 10/04/94 à la pointe du Payré.

**MOUETTE MELANOCEPHALE, *Larus melanocephalus*** (26)

Peu notée en fin d'été 93 (6 données) : 1 à 2 ind. du 01/08 au 31/08 à la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B), 18 le 26/09 et 30 le 03/10 au Gois (A.B).

La première est notée le 05/01/94 à Sion-sur-l'Océan (G.B). La majorité des observations provient des marais d'Olonne avec un maximum de 234 le 14/04/94 (ONC). D'autres observations concernant un à 30 oiseaux sont signalées à Sion-sur-l'Océan, au Girouard, à la pointe du Payré, à la Chaize-Giraud, à Angles et à l'Herbaudière.

4 données en juin 94; 1 subadulte à Noirmoutier, 1 couple et un isolé à Chanteloup et 3-4 ind. à Sion-sur-l'Océan.

Pas d'indice de reproduction signalé au fichier.

**MOUETTE ATRICILLE, *Larus atricilla*** (1)

Originaire d'Amérique du Nord un oiseau en plumage de 1er hiver, du 29/08 au 01/09/93 au Port-du-Bec (Beauvoir-sur-Mer) (M.Duquet, J-Y.Frémont et D.Tavenon)

**MOUETTE PYGMEE, *Larus minutus*** (65)

Notée de fin septembre 93 au début de mai 94 surtout sur le littoral de St-Gilles, à la pointe du Grouin du Cou et dans les stations d'épuration de Longeville et de la Tranche. Elle est aussi signalée sur les îles d'Yeu et de Noirmoutier, dans les marais d'Olonne, de Montporteau et de la Vie, à la Belle Henriette, à la station d'épuration de Barbâtre.

Les stations d'épuration du littoral ont constitué les sites les plus attractifs lors du passage de printemps 94 : 260 ind. le 03/03 à Longeville, 1000 à 2050 du 21/03 au 01/04 à la Tranche (ADEV), 330 le 09/04 à Noirmoutier.

**MOUETTE DE SABINE, *Larus sabini*** (52)

52 données, un record pour le fichier !... cela est dû aux vents violents provoqués par la queue du cyclone « Floyd » du 12-13 septembre 93. La majorité des observations sont comprises entre le 13 et le 24/09/93, mais quelques Mouettes de Sabine sont encore vues en octobre, et même en novembre (dernière donnée = le 06/11).

En Vendée, pas moins de 1600 oiseaux ont été dénombrés dans l'après-midi du 13/09 (D.DESMOTS et P.YESOU 1994) dont 550 le 13/09 dans le port de St-Gilles (G.B) et env. 800 le 13/09 dans le port des Sables (ONC).

+ de 200 le 14/09, 200 le 15/09, 150 le 16/09, 15 le 17/09 dans le port de St-Gilles (G.B). Une seule donnée de l'intérieur : 2 ind. au lac d'Apremont le 13/09.

Un adulte a été vu le 01/04/94 à la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B).

**MOUETTE RIEUSE, *Larus ridibundus*** (257)

Observée toute l'année partout avec un maximum en hiver (surtout à l'intérieur).

7500 le 11/11/93 au communal de Lairoux / Curzon (A.T), 750 le 29/11/93 et 1500 le 16/02/94 au communal du Poiré-s-Velluire.

Pas d'indice de nidification reçu au fichier.

**GOELAND CENDRE, *Larus canus*** (21)

Noté de fin septembre à avril sur le littoral, à l'île d'Yeu, aux marais d'Olonne et dans les prairies et communaux du Marais Poitevin. Il semble être absent en juillet 93 et de mai à juin 94 et ne se reproduit pas dans le département.

Env. 250 le 03/03/94 à la Brochelière (C.B), 50 le 14/04/94 à Sion-sur-l'Océan (G.B) et présence assez régulière de 2 à 4 ind. de février à mars 94 au communal du Poiré-sur-Velluire (PNR et C.G).

**GOELAND BRUN, *Larus fuscus*** (140)

Observé toute l'année sur le littoral et en hiver dans l'intérieur.

2 indices certains de nidification de quelques couples à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V) et sur les terrasses des immeubles des Sables-d'Olonne.

- GOELAND ARGENTE**, *Larus argentatus* (194)  
 Observé toute l'année sur le littoral et en hiver dans l'intérieur. Pas de données concernant les dortoirs ou reposoirs.  
 3 indices certains de nidification : 10 couples avec 26 jeunes à Sion-sur-l'Océan (G.B), plusieurs dizaines de couples à l'île d'Yeu (X.H et M.P.V) et sur les terrasses des immeubles des Sables-d'Olonne.
- GOELAND LEUCOPHEE**, *Larus cachinnans* (57)  
 Observé toute l'année sur le littoral avec un seul indice probable de nidification d'un couple dans les marais d'Olonne (D.B).
- GOELAND BOURGMESTRE**, *Larus hyperboreus* (15)  
 13 données de St-Gilles et de Sion-sur-l'Océan : 1 immature de 1ère année du 04/01 au 02/02/94 et 1 imm. de 3ème année du 05/01 au 23/01/94 (mort à ce jour) (G.B), 1 imm. de 2ème année et 2 imm. du 01 au 28/04 (G.B, X.H, M.P.V et P.C).  
 Un « 1er hiver » le 25/03/94 à la Terrière (ADEV).  
 2 données à l'île d'Yeu : 1 imm. de 2ème été du 30/04 au 02/05/94 à Ker Châlon (X.H et M.P.V).
- GOELAND MARIN**, *Larus marinus* (68)  
 Observé toute l'année le plus souvent sur le littoral du nord de la Vendée.  
 1 seul indice certain de nidification d'un couple à l'île d'Yeu (X.H et M.P.V).
- MOUETTE TRIDACTYLE**, *Rissa tridactyla* (29)  
 Présente toute l'année sur le littoral allant de Sion-sur-l'Océan aux Sables-d'Olonne et dans les îles (26 données). Seulement 3 données dans le sud de la Vendée de janvier à février (la Terrière).  
 41 le 14/11/93 à l'Herbaudière (A.B), env. 200 le 14/11/93 au phare de l'Armandèche (C.B), + de 50 le 23/12/93 aux Sables (C.B), env. 50 le 01/03/94 à la Paracou (C.B) et 28 en vol par petits groupes lors d'un sea-watching le 03/05/94 au nord de l'île d'Yeu (X.H et M.P.V).  
 Pas d'indice de reproduction. Le site traditionnel de nidification au phare des Barges est-il toujours occupé ?
- STERNE CASPIENNE**, *Sterna caspia* (18)  
 Passage ou estivage très régulier à la pointe de l'Aiguillon et à l'estuaire du Lay avec quelques incursions à l'intérieur (communal de Lairoux) du 20/07 au 28/09/93 concernant 1 à 4 oiseaux chaque fois. 2 données de 3 ind. en septembre 93 et 2 autres de 2 ind. en avril 94 dans les marais d'Olonne (ONC).
- STERNE CAUGEK**, *Sterna sandvicensis* (60)  
 Notée de juillet à fin novembre puis de mars à juin sur le littoral. Présence régulière de 1 à 6 oiseaux du 10/10 93 au 26/03/94 sur le littoral de la pointe du Grouin du Cou à Longeville (ADEV).  
 100 à plus de 250 individus du 01/08 au 06/09 à la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B) et 65 le 16/04/94 à la pointe du Payré (ADEV).  
 Pas d'indice de reproduction.
- STERNE DE DOUGALL**, *Sterna dougallii* (1)  
 1 juvénile le 15/09/93 à la Tranche-s-Mer (M.Fo).
- STERNE PIERREGARIN**, *Sterna hirundo* (42)  
 22 données au passage postnuptial sur le littoral, les marais côtiers, au lac de Maché et à l'étang des Boucheries concernant le plus souvent 1 à 10 oiseaux chaque fois, sauf pour la corniche de Sion-sur-l'Océan avec env. 50 le 24/08 et + de 40 le 14/09 (G.B).

- La première est notée le 01/04/94 aux marais d'Olonne (ONC). Les passages de printemps ont lieu d'avril à mai par groupes de 10 à 30 sur la corniche de Sion-sur-l'Océan, les marais d'Olonne, de la Guittière et de Morigy, à la jetée Jacobsen et à la pointe du Payré.  
 Reproduction certaine sur l'île de Noirmoutier, probable de 2-3 cplés à la Guittière (C.G) et dans les marais d'Olonne.
- STERNE ARCTIQUE**, *Sterna paradisaea* (7)  
 6 données en migration postnuptiale : 1 le 21/08/93 à la pointe de l'Aiguillon (A.T), 1 du 13/09 au 08/10 à St-Gilles et à Sion-sur-l'Océan (G.B) et 2 données en migration pré-nuptiale : 1 le 16 et 2 le 30/04/94 à la pointe du Payré (ADEV).
- STERNE FULIGINEUSE OU BRIDEE**, *Sterna fuscata* ou *anaethetus* (1)  
 1 adulte le 23/09/93 à la pointe de l'Aiguillon (C.G) (donnée homologuée par le CHN).
- STERNE NAINE**, *Sterna albifrons* (21)  
 13 données du passage postnuptial, du 01/08 au 26/09/93, à Sion-sur-l'Océan, à la pointe de l'Aiguillon, à la Belle Henriette et dans les marais d'Olonne et de Montportreau, par petits groupes de 1 à 30 ind.  
 8 données d'avril à mi-juin à la pointe du Payré, à Sion-sur-l'Océan et à l'île de Noirmoutier par petits groupes n'excédant pas 12 ind.; reproduction certaine d'un couple sur l'île de Noirmoutier (A.B).
- GUIFETTE MOUSTAC**, *Chlidonias hybridus* (3)  
 1 le 30/05 dans les marais de la Vie (G.B), 2 le 15/06 à l'étang des Boucheries (H.B) et 1 le 16/06/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV).
- GUIFETTE NOIRE**, *Chlidonias niger* (58)  
 6-10 adultes avec 9 jeunes le 17/07/93 à l'étang des Mattes (C.G et J.G).  
 34 données lors du passage postnuptial (de juillet à début novembre). Bon suivi du 23/08 au 09/11 à la station d'épuration de la Tranche-sur-Mer concernant le plus souvent un seul oiseau, sauf le 10/09 avec 27 individus et le 14/09 avec environ 30 oiseaux (A.T). D'autres observations ont été signalées à Sion-sur-l'Océan, aux lacs du Jaunay, de Sigournais et de Maché, à la Belle Henriette, dans les marais de Montportreau, à la pointe de l'Aiguillon et à l'étang des Boucheries.  
 Première notée le 01/04/94 à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV), des passages de 2 à 15 ind. d'avril à mai dans les stations d'épuration de Luçon et de la Tranche, à l'étang des Boucheries, à la réserve de St-Denis-du-Payré et dans les marais de la Vie.  
 Peu de succès de reproduction constaté en Marais Poitevin en 1994 : à Champagné-les-Marais 12-14 cplés (0 jeune; cause de l'échec de la reproduction = l'assèchement du plan d'eau) (C.G et J.S), à Angles 18 cplés (seulement 3 jeunes à cause de l'abandon des nids par dérangement), et à la réserve de St-Denis-du-Payré (ADEV) 18 cplés (avec seulement 3 jeunes, les nids ayant été abandonnés à cause du frai des carpes).
- GUIFETTE LEUCOPTERE**, *Chlidonias leucopterus* (2)  
 1 le 14/09/93 et le 26/05/94 à la réserve de Chanteloup (ONC)
- GUILLEMOT DE TROIL**, *Uria aalge* (12)  
 Noté de la mi-novembre au début de février le plus souvent à l'île d'Yeu (6 données). D'autres sur le littoral de Sion-sur-l'Océan à la Terrière concernant de 1 à 3 oiseaux.
- PINGOUIN TORDA**, *Alca torda* (31)  
 Noté de juillet à mi-décembre sur le littoral de l'île d'Yeu, de Sion-sur-l'Océan aux Sables et de Longeville à la pointe du Grouin par petits groupes en nombre variable ( maximum noté le 24/10/93

avec 15 ind. à la pointe du Grouin (ADEV)), puis de janvier à la fin mai 94 aux Sables-d'Olonne et à l'île d'Yeu.

150 à 300 du 01 au 03/05/94 à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V).

- MERGULE NAIN**, *Alle alle* (1)  
1 « vivant » le 18/12/93 à la Terrière (A.T)
- MACAREUX MOINE**, *Fratricula artica* (1)  
1 cadavre le 08/01/94 à la Chaume (ADEV).
- PIGEON COLOMBIN**, *Columba oenas* (22)  
22 données dont 6 en période nuptiale dans les marais côtiers. Une donnée de 12 oiseaux en hivernage, le 27/11/93, dans le Marais Breton (G.B)
- PIGEON RAMIER**, *Columba palumbus* (243)  
Abondant en toutes saisons.
- TOURTERELLE TURQUE**, *Streptopelia decaocto* (192)  
Très abondante en toutes saisons. Dernier indice de nidification en décembre le 27/12 à Rocheservière (L.G); les premiers indices sont observés début mars.
- TOURTERELLE DES BOIS**, *Streptopelia turtur* (87)  
La dernière tourterelle est observée le 3/10/93 (J-C.B), la première le 23/04/94 (H.B). Le plus grand nombre d'observations a été effectué dans le Marais Poitevin (F.P et C.G). L'espèce est en déclin dans le bocage remembré.
- COUCOU GRIS**, *Cuculus canorus* (58)  
4 données de fin été, la dernière le 24/08/93 (F.S) et 54 du 04/04 (X.H) à fin juin 94. Seulement 4 phases rousses notées en tout.
- EFFRAYE DES CLOCHERS**, *Tyto alba* (105)  
Présente en toutes saisons.
- PETIT-DUC SCOPS**, *Otus scops* (1)  
Une seule donnée le 12/06 de 2 ind. dans le bois de la Chaize à Noirmoutier (A.B).
- CHOUETTE CHEVECHE**, *Athene noctua* (19)  
Sur les 19 données, 2 viennent du bocage (le Poiré-s-Vie (A.G)), les autres des Marais Breton ou Poitevin.
- CHOUETTE HULOTTE**, *Strix aluco* (19)  
7 données viennent de la forêt de Mervent-Vouvant, les autres d' Orouet, de Rocheservière, d'Aizenay, de Cugand, de Dompierre-s-Yon et de St-Laurent-sur-Sèvre.
- HIBOU MOYEN-DUC**, *Asio otus* (46)  
Les 46 données proviennent de toute la Vendée. Seulement 2 indices certains de nidification !... (cartes : 1026.1 (Ile d'Yeu) et 1126.3 (Marais de la Vie)).
- HIBOU DES MARAIS**, *Asio flammeus* (11)  
Une seule observation dans le bocage à la Bernadière (S.M), les 10 autres ont lieu dans les Marais Breton et Poitevin. Un indice certain de nidification dans le marais de Bouin (P.R, C.G et G.B).
- ENGOULEVENT D'EUROPE**, *Caprimulgus europaeus* (7)  
5 données de juillet 93 et 2 données d'avril et de mai 94 proviennent de la forêt de Mervent-Vouvant. Une dizaine de chanteurs le 15/07/93 et 6 le 13/05/94 (D.B).

- MARTINET NOIR**, *Apus apus* (70)  
Dernière observation de 6 ind. le 20/09 à la pte de l'Aiguillon (C.G et L.G) et observé dans tout le département à partir du 15/04 (1ère (H.B)). La plupart des martinets quittent la Vendée entre le 26 et 29/07 (L.G).
- MARTIN PECHEUR D'EUROPE**, *Alcedo atthis* (104)  
104 données proviennent de tout le département en toutes saisons. 2 indices de nidification probable ou possible (cartes 1126.3 (Soullans) et 1527.5 (St Hilaire des Loges)).
- GUEPIER D'EUROPE**, *Merops apiaster* (2)  
12 oiseaux en vol au Poiré-s-Velluire le 15/04 (PNR) et un oiseau à Longeville-s-Mer le 07/06 (ADEV). Les dernières données en Vendée remontaient à 1988.
- HUPPE FASCIEE**, *Upupa epops* (65)  
Les 65 données proviennent d'un peu partout en Vendée.  
Les dernières observations ont lieu en septembre; cependant en 1993, une donnée particulièrement tardive, à Beaufou, est datée du 6 novembre (J-P.P)  
43 données de fin mars à juin, la 1ère observation à St-Réverend le 24/03 (M.C).  
Seulement 4 indices de nidification certains signalés au fichier.
- TORCOL FOURMILIER**, *Jynx torquilla* (8)  
7 données concernant la migration d'automne du 23 août au 24 septembre (Marais Breton et Marais Poitevin). Une seule donnée estivale à la pointe d'Arçay le 22/06 (S.D).
- PIC VERT**, *Picus viridis* (121)  
Présent en toutes saisons dans l'ensemble du département.
- PIC NOIR**, *Dryocopus martius* (6)  
5 données dans la forêt de Vouvant (G.B) et une à St-Mars-la-Réorthe (B.P). Toujours pas de preuve de nidification.
- PIC EPEICHE**, *Dendrocopos major* (93)  
Présent en toutes saisons dans l'ensemble du département.
- PIC EPEICHETTE**, *Dendrocopos minor* (20)  
20 données pour ce petit pic relativement discret en Vendée proviennent du Jaunay, du marais de la Vie, de Rocheservière, de St-Juire et surtout de la forêt de Mervent-Vouvant.  
Cris et tambourinages au printemps, silence ensuite.
- ALOUETTE CALANDRELLE**, *Calandrella brachydactyla* (6)  
4 données du 21/08 au 03/09, 2 chanteurs le 01/05 à la pointe de l'Aiguillon (C.G, L.G, G.B et G-L.C) et une donnée provenant de l'île d'Yeu en date du 30/04 (X.H et M-P.V).
- COCHEVIS HUPPE**, *Galerida cristata* (67)  
Les cochevis sont fréquemment observés en toutes saisons sur la côte et dans la plaine calcaire au sud du département, isolés ou en couples. Quelques rares données du bocage.
- ALOUETTE LULU**, *Lullula arborea* (40)  
Oiseau relativement rare, observé en toutes saisons, isolé ou en couples surtout dans les secteurs où l'on cultive de la vigne.  
Seulement 11 données en hiver. Un seul indice certain de nidification (dunes du Jaunay - G.B).
- ALOUETTE DES CHAMPS**, *Alauda arvensis* (134)  
Observée en toutes saisons dans l'ensemble du département, moins fréquente dans le bocage.

- ALOUETTE HAUSSECOL**, *Eremophila alpestris* (2)  
2 observations d'un oiseau à la pointe de l'Aiguillon (C.G, A.T et L.G) à la migration d'automne, les 20 et 21/10/93.
- HIRONDELLE DE RIVAGE**, *Riparia riparia* (28)  
Observée uniquement en migration à l'automne (22 données) et au printemps (6 données). La dernière signalée le 15/10 à la pte de l'Aiguillon et la première le 03/03 à la Terrière (ADEV).
- HIRONDELLE RUSTIQUE**, *Hirundo rustica* (160)  
Signalée dans tout le département. Dans les bourgs du bocage, une forte proportion niche dans les conduits de cheminée.  
La dernière est observée le 19/11/93 à la Belle Henriette (A.T) et les premières à l'étang des Boucheries (G.P) et aux Conches (ADEV) le 27/02/94.
- HIRONDELLE DE FENETRE**, *Delichon urbica* (65)  
Oiseau observé un peu partout de juillet à fin octobre et de fin mars à juin. Un seul indice certain de reproduction (carte 1225.3) au fichier I. L'Hirondelle de fenêtre fréquente surtout les bourgs de l'intérieur et les villes de la côte, on la trouve rarement dans les fermes isolées.  
Les dernières Hirondelles de fenêtre ont été observées à la pointe de l'Aiguillon le 25/10 (C.G), la première dans le marais d'Olonne le 15/04/94 (ONC Chanteloup).
- PIPIT ROUSSELIN**, *Anthus campestris* (17)  
Toutes les observations sont faites dans la région côtière où l'espèce niche dans les dunes.  
La dernière observation de l'année date du 20/09/93 aux Agaures (F.P) et la première du 30/04/94 à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V).
- PIPIT DES ARBRES**, *Anthus trivialis* (32)  
La dernière observation de l'année, le 01/11/93 (C.B) et 2 observations d'un comportement nicheur en forêt de Mervent, les 03/04 et 26/05/94 (D.B).  
Les dates de migration sont sensiblement les mêmes que celles du Pipit rousselin.
- PIPIT FARLOUSE**, *Anthus pratensis* (103)  
Très nombreux en hivernage dans les prairies de tout le département. L'on peut observer des concentrations d'une centaine d'individus qui se déplacent en ordre très dispersé.  
Les couples nicheurs ne sont signalés que sur la côte, de la pointe de l'Aiguillon à St-Gilles-Croix-de-Vie et dans les îles. Un mâle chanteur est observé à la Roche-sur-Yon le 09/03/94 (S.C)
- PIPIT MARITIME**, *Anthus petrosus* (17)  
Hivernant sur la côte.  
Signalé nicheur dans les rochers côtiers de l'île d'Yeu le 30/04/94 (X.H et M-P.V).
- PIPIT SPIONCELLE**, *Anthus spinoletta* (24)  
Hiverné dans les marais côtiers et autour des étangs du bocage (les Boucheries).
- BERGERONNETTE PRINTANIERE**, *Motacilla flava* (68)  
Commune et nicheuse dans les marais côtiers et les cultures de la plaine calcaire. Les dernières sont observées le 17/10/93 (C.G et L.G), les premières le 03/04/94 à Noirmoutier (X.H et M-P.V).  
Deux ind. de type ibérique (*Motacilla flava iberiae*) le 16/04/94 dans les marais de la Vie (G.B).
- BERGERONNETTE FLAVEOLE**, *Motacilla flavissima* (14)  
7 données en provenance des marais de la Vie, 5 du Jaunay, une de St-Hilaire-des-Loges (G.B) et une de St-Denis-du-Payré (ADEV).

- Environ 50 dans les dunes du Jaunay le 19/09/93 (G.B). Même nombre à la réserve de St-Denis-du-Payré le 22/04/94 (ADEV).
- BERGERONNETTE DES RUISSEAUX**, *Motacilla cinerea* (60)  
Signalées isolées ou en couples sur les côtes, les îles, le Marais Poitevin et autour des étangs du bocage.  
Plusieurs indices de nidification.
- BERGERONNETTE GRISE**, *Motacilla alba* (133)  
Observée toute l'année. Fréquente un peu partout en période de nidification. Niche sous les toitures et dans les cavités des murs, les fermes.
- BERGERONNETTE DE YARRELL**, *Motacilla alba yarrelli* (50)  
Fréquente en hivernage en particulier sur la place Napoléon à la Roche-sur-Yon. Se groupe en dortoirs dans les villes. La première est observée le 27/09/93 à Sion-sur-l'Océan et les dernières dans les marais de la Vie (G.B).
- TROGLODYTE MIGNON**, *Troglodytes troglodytes* (140)  
Très commun en toutes saisons dans tout le département.
- ACCENTEUR MOUCHET**, *Prunella modularis* (140)  
Commun en toutes saisons dans tout le département.
- ROUGEGERGE FAMILIER**, *Erithacus rubecula* (235)  
Présent en toutes saisons dans l'ensemble du département. Très discret en août.
- ROSSIGNOL PHILOMELE**, *Luscinia megarhynchos* (46)  
Très fréquent dans le Marais Poitevin, les massifs forestiers et le bocage. Le premier chant est signalé le 27/03/94 à St-Gilles-Croix-de-Vic (G.B).  
Les derniers oiseaux partent discrètement en septembre.
- GORGEBLEUE A MIROIR BLANC**, *Luscinia svecica* (35)  
33 données montrent que l'espèce est répandue autour de la baie de l'Aiguillon, dans les marais de la Vie, le Marais Breton et les marais salants de Noirmoutier.  
Les premiers chants sont signalés à la pointe de l'Aiguillon le 08/03/94 (G-L.C). 2 données de l'intérieur, en période de reproduction au Poiré-s-Velluire (C.G et J.G).
- ROUGEQUEUE NOIR**, *Phoenicurus ochruros* (77)  
Fréquente les agglomérations en période de nidification. Observé en hivernage sur les côtes rocheuses.
- ROUGEQUEUE A FRONT BLANC**, *Phoenicurus phoenicurus* (29)  
Un seul indice certain de nidification en forêt de Mervent le 28/05/94 (D.B). 2 observations printanières, l'une à l'île d'Yeu le 02/05/94 (X.H et M-P.V), l'autre à la Dive le 17/06/94 (C.G).  
Toutes les autres données concernent des oiseaux en migration postnuptiale et en plumage d'hiver, à partir de la mi-août.
- TARIER DES PRES**, *Saxicola rubetra* (17)  
Aucun indice de nidification reçu au fichier. 14 données concernent des oiseaux en migration postnuptiale d'août à octobre, en Marais Poitevin, Marais Breton et à Noirmoutier. 2 observations dans le bocage, à St-Juire et au lac de Rochereau début septembre (G.N) et 4 données de printemps en Marais Poitevin.

- TARIER PATRE**, *Saxicola torquata* (142)  
Signalé un peu partout et en toutes saisons dans le département, mais en petit nombre sauf dans le marais de la Vie où 13 couples sont recensés (G.B). L'espèce commence péniblement à reconstruire ses effectifs décimés par les hivers rigoureux de 1985 à 1987.
- TRAQUET MOTTEUX**, *Oenanthe oenanthe* (67)  
Les seuls indices de nidification proviennent de l'île d'Yeu (X.H, et M-P.V) : observation d'un couple avec 2 jeunes le 15/06/94 (P.G). L'espèce est observée sur les côtes continentales et les marais de la fin juillet à octobre et de mars à début mai.  
Une observation tardive le 06/11/93 dans les dunes du Jaunay (G.B).
- MERLE A PLASTRON**, *Turdus torquatus* (3)  
Les 3 observations se rapportent à la migration postnuptiale : 1 le 19/09 à la pointe d'Arçay (O.P), 1 le 10/10 à Longeville (A.T) et 1 le 13/10/93 aux Agaures (F.P).
- MERLE NOIR**, *Turdus merula* (254)  
Commun dans tout le département. Une observation de plus de 15 individus aux Agaures le 19/08/93 (F.P).
- GRIVE LITORNE**, *Turdus pilaris* (25)  
Les premières sont signalées le 25/10/93 dans le bocage (L.G), les dernières en migration vers le nord, le 03/04/94, en forêt de Mervent (D.B).
- GRIVE MUSICIENNE**, *Turdus philomelos* (104)  
Les populations de Grives musicales ont considérablement diminué en Vendée depuis 10 ans tant en hivernage qu'en période de reproduction. Il n'y a qu'à l'île d'Yeu que l'espèce est dite commune au printemps (X.H et M-P.V). Les migratrices viennent augmenter les populations locales d'automne à mars.
- GRIVE MAUVIS**, *Turdus iliacus* (36)  
Les nombreux hivernants qui se nourrissent dans les prairies et les haies chargées de baies, se déplacent en bandes de 10 à 200 individus. Les premières Grives mauvis sont signalées à partir d'octobre, les dernières partent en mars.
- GRIVE DRAINE**, *Turdus viscivorus* (95)  
Commune en toutes saisons dans tout le département. Premier indice de nidification début mars à Noirmoutier. Des migratrices sont observées en petits groupes à la pointe de l'Aiguillon en octobre en même temps que les autres grives.
- BOUSCARLE DE CETTI**, *Cettia cettia* (40)  
Entendue en toutes saisons dans les marais côtiers, autour des étangs du bocage. Elle est commune à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V).
- CISTICOLE DES JONCS**, *Cisticola juncidis* (28)  
Nombreuses observations en toutes saisons dans les marais côtiers, les dunes et à Noirmoutier.
- LOCUSTELLE LUSCINOÏDE**, *Locustella luscinioides* (1)  
Une donnée du 21/04/94 à Longeville (ADEV).
- PHRAGMITE AQUATIQUE**, *Acrocephalus paludicola* (1)  
Une donnée (probable) à la Belle Henriette le 02/09/93 (S.D).
- PHRAGMITE DES JONCS**, *Acrocephalus schoenobaenus* (3)  
Signalé au marais Montportreau le 16/09/93 (F.P), en juin 94 à Orouet (G.B).

- ROUSSEROLLE VERDEROLLE**, *Acrocephalus palustris* (1)  
Une observation très probable d'un jeune dans une troupe de Pouillots fitis le 03/09/93 à Givrand (P.R).
- ROUSSEROLLE EFFARVATTE**, *Acrocephalus scirpaceus* (31)  
Très commune dans les roselières. Observée au Poiré-s-Velluire (D.B, C.G et J.G), aux Agaures (F.P), au Portereau-du-Braud (S.D) et à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V) de juillet à la mi-octobre et d'avril à juin. Une observation tardive, le 13/10/93 aux Agaures (F.P).
- ROUSSEROLLE TURDOÏDE**, *Acrocephalus arundinaceus* (7)  
Signalée à Orouet (G.B), au Braud (S.D et ADEV) et à Port-la-Roche (A.B) en juillet 93, et de mai à juin 94.
- HYPOLAIS ICTERINE**, *Hippolais icterina* (4)  
3 observations en août et en septembre à la pointe de l'Aiguillon (A.T et E.C - CORIF.) et une autre aux Sables-d'Olonne le 20/08/93.
- HYPOLAIS POLYGLOTTE**, *Hippolais polyglotta* (46)  
Commune dans le bocage, le Marais Poitevin et en bordure des massifs forestiers. Le dernier oiseau est observé le 03/09/93 à la pointe de l'Aiguillon (E.C - CORIF). Le premier chant est signalé le 01/05/94 à la Faute-s-mer (S.D).
- FAUVETTE PITCHOU**, *Sylvia undata* (7)  
Les 7 données proviennent de l'île d'Yeu où l'espèce est commune (Y.T, X.H, M-P.V, P.G). Elle est rare dans le reste du département.
- FAUVETTE GRISETTE**, *Sylvia communis* (55)  
Signalée surtout dans les marais côtiers et à l'île d'Yeu. Pourtant l'espèce est relativement commune dans les buissons du bocage. Le dernier oiseau est observé à la fin septembre en migration (G.B) et le premier fin mars, dans les marais de la Vie (G.B).
- FAUVETTE DES JARDINS**, *Sylvia borin* (33)  
Assez commune un peu partout dans le département où on l'entend plus facilement qu'on ne la voit. La première est signalée le 20/03/94 aux Moutiers-sur-Lay (S.V).
- FAUVETTE A TÊTE NOIRE**, *Sylvia atricapilla* (105)  
Très commune dans tout le département. Quelques oiseaux sont observés en hivernage, ils se nourrissent alors surtout de baies de gui et de lierre.
- POUILLOT DE BONELLI**, *Phylloscopus bonelli* (9)  
Rare dans le département. Deux données en juillet 93 et cinq d'avril à mai 94 viennent du massif forestier de Mervent (D.B). Deux autres données, en mai 94, proviennent de la forêt de Longeville (ADEV).
- POUILLOT SIFFLEUR**, *Phylloscopus sibilatrix* (3)  
Rare dans le département. Une donnée du 18/09/93 à la Pte de Grosse Terre (G.B) et 2 données, en mai 94, concernant le massif forestier de Mervent (D.B).
- POUILLOT VELOCE**, *Phylloscopus collybita* (147)  
Très commun dans le département et assez fréquent en hivernage.
- POUILLOT FITIS**, *Phylloscopus trochilus* (28)  
Observé uniquement aux migrations postnuptiale (25 données) et pré-nuptiale (3). Le dernier oiseau est signalé fin novembre 93 en baie de l'Aiguillon, et le premier le 05/04/94 au Poiré-s-Velluire (D.B).

- ROITELET HUPPE**, *Regulus regulus* (49)  
Relativement commune en hivernage, l'espèce n'est pas signalée en période de nidification.
- ROITELET TRIPLE-BANDEAU**, *Regulus ignicapillus* (46)  
Un peu moins commun en hivernage que le Roitelet huppé. Les 8 données le mentionnent en période de nidification.
- GOBEMOUCHE GRIS**, *Muscicapa striata* (36)  
Observé un peu partout dans le département avec plusieurs indices de nidification. Le dernier oiseau est signalé à la mi-octobre 93 à Sion-sur-l'Océan (G.B) et le premier, le 30/04/94 dans le bocage (L.G).
- GOBEMOUCHE NOIR**, *Fidicula hypoleuca* (30)  
Toutes les données concernent des oiseaux en migration postnuptiale, du 1er août à la mi-octobre 93. Les observations d'oiseaux en migration pré-nuptiale sont rares en Vendée.
- PANURE A MOUSTACHES**, *Panurus biarmicus* (6)  
Signalé en octobre aux Agaures (A.G, F.S), en novembre à la Belle Henriette (A.T) et en janvier-février à Longeville (ADEV).
- MESANGE A LONGUE QUEUE**, *Aegithalos caudatus* (84)  
Relativement commune en toutes saisons dans le département.
- MESANGE NONNETTE**, *Parus palustris* (21)  
Quelques oiseaux sont signalés en toutes saisons surtout dans le bocage. Plus nombreux en hivernage.  
Pas d'indice de nidification.
- MESANGE HUPPEE**, *Parus cristatus* (18)  
Signalée en toutes saisons dans la forêt côtière et dans les conifères des massifs forestiers de l'intérieur. Pas fréquente ailleurs.
- MESANGE NOIRE**, *Parus ater* (24)  
Très commune en hivernage du 03/10/93 au début mars 1994. Une donnée du 17/07/93 et deux des 14 et 21 mai 94 en forêt de Mervent (D.B). Pas d'indice de nidification.
- MESANGE BLEUE**, *Parus caeruleus* (198)  
Abondante en toutes saisons surtout en hiver où les migratrices viennent renforcer les populations locales.
- MESANGE CHARBONNIERE**, *Parus major* (244)  
Abondante en toutes saisons, mêmes constatations hivernales que pour la Mésange bleue.
- SITTELE TORCHEPOT**, *Sitta europaea* (40)  
Observée toute l'année. N'est fréquente que dans les massifs forestiers. Un seul indice de nidification à Chassenon-le-Bourg (G.B). Elle est beaucoup plus discrète au printemps qu'en hiver. Probablement comme pour les mésanges, les populations locales sont-elles augmentées des migratrices en hiver ?
- GRIMPEREAU DES JARDINS**, *Certhia brachydactyla* (86)  
Assez commun dans tout le département et en toutes saisons.
- REMIZ PENDULINE**, *Remiz pendulinus* (3)  
Observée en hivernage : le 13/10/93 aux Agaures (F.P), le 29/10/93 dans les marais d'Olonne (F.S) et le 27/12/93 à la Belle Henriette (P.R).

- LORIOT D'EUROPE**, *Oriolus oriolus* (47)  
Des chanteurs ont signalés un peu partout dans le département. Le dernier oiseau de l'année est observé le 21/08/93 à Lairoux (A.T) et le premier le 15/04/94 à Fontenay-le-Comte (C.G). Un seul indice de nidification : au Poiré-s-Velluire (C.G et J.G).
- PIE-GRIECHE ECORCHEUR**, *Lanius collurio* (21)  
Toutes les observations sont faites dans la moitié sud du département et à l'île d'Yeu. Le dernier oiseau est signalé le 21/08/93 à Curzon (A.T) et le premier, le 1er mai 94 à St-Juire (G.N).
- PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE**, *Lanius senator* (10)  
3 données d'adultes en période de nidification les 2 et 4/05/94 à St-Juire (G.N), le 15/07/93 à Longeville (F.P), mais pas d'indices de reproduction. Les autres données concernent des immatures en migration en août et en septembre.
- GEAI DES CHENES**, *Garrulus glandarius* (118)  
Commun en toutes saisons dans tout le département.
- PIE BAVARDE**, *Pica pica* (315)  
Commune dans tout le département. Un individu albinos le 17/02/94 à Maillezais (PNR).
- CHOUCAS DES TOURS**, *Corvus monedula* (179)  
Très commun dans tout le département. Une donnée de 200 individus le 07/03/94 à l'abbaye de Maillezais (G-L.C)
- CORBEAU FREUX**, *Corvus frugilegus* (150)  
Surtout fréquent dans la plaine. Néanmoins quelques colonies à St-Hilaire-de-Loulay, aux Landes-Génusson (40 nids) (L.G), à Bazoges-en-Pailliers (60 nids) (T.Y), dans les marais de la Vie (40 cpl) (G.B), au Poiré-s-Velluire (45 cpl) (C.G), à Mouzeuil-St-Martin (60 cpl) (C.G).
- CORNEILLE NOIRE**, *Corvus corone corone* (297)  
Commune dans tout le département.
- CORNEILLE MANTELEE**, *Corvus corone cornix* (1)  
1 individu a été signalé le 29/01/94 à la Guyonnière (S.M).
- ETOURNEAU SANSONNET**, *Sturnus vulgaris* (319)  
Commun en toutes saisons dans tout le département. Des rassemblements très importants en hivernage : 10 920 le 15/10/93 à Lairoux (A.T), 3000 le 11/11/93 à Lairoux (A.T).
- MOINEAU DOMESTIQUE**, *Passer domesticus* (267)  
Commun dans tout le département.
- MOINEAU FRIQUET**, *Passer montanus* (57)  
Quelques colonies signalées à St-Gilles (G.B, P.C), à Mouilleron-le-Captif (O.P), au Poiré-sur-Velluire (C.G) et aux Boucheries (Landes-Génusson) où ils se mélangent aux moineaux domestiques.
- MOINEAU SOULCIE**, *Passer petronia* (2)  
2 données du sud de la Vendée : le 01/11/93 à St-Hilaire-des-Loges (G.B) et le 19/06/94 à Nalliers (C.G).
- ASTRILD ONDULE**, *Estrilda astrild* (1)  
Oiseau échappé de captivité observé le 18/09/93 à Sion-sur-l'Océan (G.B).

- PINSON DES ARBRES**, *Fringilla coelebs* (313)  
Très commun en toutes saisons. En hiver les populations vendéennes sont augmentées des migrateurs hivernants. Dans les champs de tournesol après la récolte, leurs grandes bandes sont rejointes par des verdiers, des linottes et des chardonnerets.
- PINSON DU NORD**, *Fringilla montifringilla* (38)  
A part un dortoir de 30 oiseaux dans la forêt de la Tranche le 08/01/94 (ADEV), toutes les autres données concernent 1 ou 2 individus en hivernage. En migration, ils sont mélangés à des Pinsons des arbres.  
Le premier de l'année est signalé le 13/10/93 à la pointe d'Arçay, le dernier le 20/04/94 à Sigourmais (B.P).
- SERIN CINI**, *Serinus serinus* (76)  
Plusieurs données d'hivernage sur la côte et à St-Hilaire-des-Loges le 16/01/94 (G.B). Localement commun d'avril à septembre.
- VERDIER D'EUROPE**, *Carduelis chloris* (135)  
Commun en toutes saisons.
- CHARDONNERET ELEGANT**, *Carduelis carduelis* (244)  
Localement commun. De nombreuses données d'hivernage.
- TARIN DES AULNES**, *Carduelis spinus* (42)  
Commun en hivernage, parfois en bandes importantes se nourrissant dans les aulnes : plus de 100 le 16/10/93 à Sion-sur-l'Océan (G.B), plus de 250 le 12/03/94 dans les dunes du Jaunay (G.B).  
Les premiers hivernants sont notés le même jour, le 07/10/93, à Sion-sur-l'Océan (G.B) et à Rocheservière (L.G) et les derniers le 12/03/94 à Givrand (G.B).
- LINOTTE MELODIEUSE**, *Carduelis cannabina* (134)  
Commune localement en particulier à l'île d'Yeu et sur la côte. Migration postnuptiale très importante à la pointe de l'Aiguillon où 132 300 linottes migratrices ont été dénombrées entre le 20/09 et 10/11/93. 70% de l'effectif est passé entre le 7 et 16 octobre (GOV).
- BECCROISE DES SAPINS**, *Loxia curvirostra* (7)  
Les quelques données concernent des oiseaux en migration ou en hivernage. Les premiers de la saison sont signalés le même jour, le 26/08/93, à Givrand (G.B) et à Rocheservière (L.G) et les derniers (15 environ) le 27/03/94 en forêt de Longeville (A.T).
- ROSELIN CRAMOISI**, *Carpodacus erythrinus* (1)  
1 observation du 01/06/94 à la pointe du Devin (M.T)
- BOUVREUIL PIVOINE**, *Pyrrhula pyrrhula* (6)  
Devenu très rare en Vendée sauf à l'île d'Yeu où il niche probablement : 1 couple le 04/05/94 (X.H et M-P.V).
- GROSBEC CASSENOYAUX**, *Coccothraustes coccothraustes* (5)  
Une donnée d'été le 17/07/93 en forêt de Mervent (D.B). Les 4 autres données concernent des oiseaux en hivernage : le 06/12/93 à l'étang de la Jarrie (A.G), le 20/02 et le 27/02/94 à Montaigu (D.Br), le 21/02/94 à Moulin Papon (S.C).
- BRUANT LAPON**, *Calcarius lapponicus* (3)  
Les 3 données concernant des oiseaux en hivernage proviennent du même endroit, la digue des Wagons à St-Michel-en-l'Herm : les 01/12/93 (A.T), 02/01/94 (C.B) et 07/01/94 (ADEV).

- BRUANT JAUNE**, *Emberiza citrinella* (37)  
Plus commun localement dans le sud du département que dans le bocage.
- BRUANT ZIZI**, *Emberiza cirrus* (90)  
Présent en toutes saisons. A l'inverse du Bruant jaune, il semble plus commun dans le bocage.
- BRUANT ORTOLAN**, *Emberiza hortulana* (2)  
Devenu très rare : une observation le 03/09/93 près du lac du Jaunay (G.B) et une autre, de 3 individus, le 04/05/94 à l'île d'Yeu (X.H et M-P.V). Il n'y a plus d'indice de nidification.
- BRUANT DES ROSEAUX**, *Emberiza schoeniclus* (65)  
Présent en toutes saisons sur la côte mais aussi autour des étangs du bocage. Plusieurs indices de nidification.
- BRUANT PROYER**, *Miliaria calandra* (61)  
En période de nidification, il est commun dans la plaine calcaire et le Marais Poitevin. Une donnée à Chantonay le 30/04/94 (G-L.C). Plusieurs observations en hivernage dans la plaine calcaire et le Marais Poitevin (C.G et G.B), à la digue des Wagons le 04/11/93 (F.P).

Liste des observateurs de juillet 93 à juin 94 :

Barricault O. .... O.B	Gallot P. .... P.G	Portier F. .... F.P
Beaudouin J-C. .... J-C.B	Gérard A. .... A.G	Pouvreau O. .... O.P
Belier H. .... H.B	Girard O. .... O.G	Resses B et J. .... B et J.R
Besseau G. .... G.B	Gonin C. .... C.G	Robin A. .... A.R
Briand D. .... D.Br	Gonin J. .... J.G	Rocher M. .... M.R
Brochard C. .... C.B	Grillet L. .... L.G	Rouillier P. .... P.R
Brodie A. .... A.B	Hindermeyer X. .... X.H	Roy F-X. .... F-X.R
Brossard D. .... D.B	Joslain H. .... H.J	Salmon F. .... F.S
Bulidon G. .... G.Bu	Laumont D. .... D.L	Tessier M. .... M.T
Cabard P. .... P.C	Luez J-C. .... J-C.L	Tesson J-L. .... J-L.T
Casseron D. .... D.C	Moreau S. .... S.M	Thomas A. .... A.T
Chapoulie E. .... E.C	Moteau P. .... P.M	Vignault P-P. .... M-P.V
Charrier S. .... S.C	Nauché G. .... G.N	Vimpère J. .... J.V
Choquene G-L. .... G-L.C	Pacteau C. .... C.P	Vrignaud S. .... S.V
Durand S. .... S.D	Paillat J-P. .... J-P.P	You T. .... T.Y
Farges D. .... D.F	Perrotin B. .... B.P	
Fonteneau M. .... M.F	Persuys A. .... A.P	Equipe de l'ADEV .... ADEV
Fouquet M. .... M.Fo	Piveteau G. .... G.P	Equipe de l'ONC. .... ONC
		Equipe du PNR. .... PNR