

Actualités ornithologiques en Vendée :

septembre 1998 à août 2000

Coordination et commentaires introductifs : Perrine DULAC

Rédacteurs : Didier DESMOTS, Christophe DRAPEAU, Perrine DULAC, Christian et Julien GONIN, Lucien GRILLET, Jocelyne GUEYDAN, Xavier HINDERMEYER, Emmanuel JOYEUX, Frédéric PORTIER, Bernard ROUSSEAU, Matthieu VASLIN, Sylvain VRIGNAUD, Théophile YOU

Gestion de la base de données, extraction des données, cartographie : Christian GONIN

Dans ce numéro comme dans le précédent, la synthèse des observations a été réalisée sur deux ans et les années ont été séparées pour faciliter la lecture.

NOMBRE DE DONNÉES ET RÉPARTITION

Entre septembre 1998 et août 1999, 136 observateurs (personnes physiques ou morales) ont fait parvenir leurs données au fichier de la LPO Vendée. L'année suivante, ce nombre est de 142.

Sont ainsi parvenues au fichier :

- au moins² 20 765 observations de septembre 1998 à août 1999,
- au moins 18 320 observations de septembre 1999 à août 2000.

Certains carrés, notamment près du littoral, jouissent d'un grand succès auprès des observateurs et fournissent donc de très nombreuses observations (voir aussi carte 1 page suivante). En revanche, certains secteurs ne sont que très peu prospectés, certaines cartes étant même complètement vides de données pour les deux années. Il s'agit des cadrans de carte IGN suivants (les cadrans portant des astérisques ne comportent qu'une petite partie de territoire en Vendée) :

- 1224.7*, 1224.8 : Saint-Philbert-de-Bouaine
- 1225.1 : nord de Froidfond
- 1225.5, 1225.6, 1225.7, 1225.8 : entre Saint-Christophe-du-Ligneron et Les Lucs-sur-Boulogne
- 1226.1 : Apremont
- 1226.6 : Saint-Julien-des-Landes / Martinet

- 1324.5* : Saint-Hilaire-de-Loulay
- 1324.8 : Tiffauges
- 1325.7 : ouest de Saint-Fulgent
- 1326.2 : La Merlatière / La Ferrière
- 1424.7* : est de Mortagne-sur-Sèvre
- 1425.4* : est de Treize-Vents
- 1426.7 : Mouilleron-en-Pareds
- 1428.5* : sud de Sainte-Radégonde-des-Noyers
- 1428.8 : Maillé / Damvix
- 1526.5 : Breuil-Barret / Saint-Pierre-du-Chemin
- 1528.6* : sud-ouest de Benet

NOMBRE D'ESPÈCES

Ont été observées :

- 301 espèces en 1998-1999
- 306 espèces en 1999-2000.


De la même façon que pour le nombre de données, le nombre d'espèces observées par carte est en partie lié à la pression de prospection. Hormis les cartes sans donnée, certaines cartes contiennent moins de 10 espèces (*cf.* carte 2) !

FAITS MARQUANTS


La période septembre 1998 à août 2000 fait apparaître une nouvelle espèce pour la Vendée. Il s'agit du Chevalier semipalmé (*Catoptrophorus semipalmatus*), dont un individu a été observé en sud Vendée en septembre 1998. Cette donnée correspond non seulement à une première vendéenne mais également à la deuxième mention pour la France (la première observation ayant eu lieu dans la Somme en 1867³) !

² Les données sont envoyées soit par "indice de présence" par décade, soit avec des dates précises. En raison de systèmes de saisie différents, il nous est difficile de connaître exactement le nombre de données parvenues au fichier. Le nombre de données indiqué dans la synthèse correspond en fait à un minimum.

³ DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. – 2000 – *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan/HER, Paris, 400 pages



Carte 1 – Nombre minimum d'observations par cadran de carte IGN.
Le nombre du haut correspond à la période 1998-1999, celui du bas à la période 1999-2000.



Carte 2 – Nombre d'espèces observées par cadran de carte IGN.
Le nombre du haut correspond à la période 1998-1999, celui du bas à la période 1999-2000.

Signalons également, pour la période allant de septembre 1998 à août 2000, la première mention de Cormoran huppé nicheur sur l'île du Pilier en 1999 ainsi que la première mention de Fauvette babillarde et de Pouillot à grands sourcils sur l'île d'Yeu.

Cette période apporte aussi les deuxièmes mentions vendéennes de Bécasseau d'Alaska et de Glaréole à collier.

En 1999 et 2000, la prospection a été marquée par l'enquête nationale sur les rapaces diurnes et le recensement des mâles chanteurs de Chevêche d'Athéna en marais Breton (voir SIGNORET F. – 2002 – La Chouette chevêche *Athene noctua* en marais Breton Vendéen : inventaire 1999-2000. *La Gorgebleue*, 17-18 : 25-30). Une synthèse des résultats vendéens de l'enquête rapace sera publiée dans un prochain numéro de la Gorgebleue.

L'hiver 1999-2000 et une partie du printemps ont malheureusement été marqués par la marée noire qui a suivi le naufrage du pétrolier Erika le 12 décembre 1999. Un "bilan national des échouages et mortalités d'oiseaux" a été coordonné par la SEPBN - Bretagne Vivante. En Vendée, le bilan a été effectué par la LPO en collaboration avec l'ADEV⁴ et l'ONC⁵.

Le tableau 1 présente les résultats d'échouages et de mortalité, synthétisés à partir des différentes sources : bénévoles ayant participé à la collecte, permanents des différentes structures participantes, centres de transit, centres de soins... La collecte a commencé le 16 décembre 1999 et s'est terminée le 19 juillet 2000.

Les effectifs apparaissant dans le tableau ne correspondent qu'à un minimum : malgré les efforts de coordination et de récupération des données pendant et après la marée noire, il est probable que beaucoup d'oiseaux n'ont jamais été comptabilisés.

Parmi les oiseaux morts, 6 095 n'ont pas été identifiés (oiseaux trop mazoutés, oiseaux ramassés par des personnes ne sachant pas les identifier, ou encore oiseaux "mélangés" et comptés toutes espèces confondues). Il apparaissent dans la ligne "espèce indéterminée".

Tableau 1 – Nombre d'oiseaux collectés sur le littoral vendéen suite au naufrage du pétrolier Erika le 12 décembre 1999

Espèce	Nombre d'oiseaux vivants	Nombre d'oiseaux morts	TOTAL
Plongeon catmarin	26	28	54
Plongeon arctique	0	1	1
Plongeon imbrin	1	2	3
Plongeon indéterminé	5	1	6
Grèbe castagneux	3	0	3
Grèbe huppé	3	21	24
Grèbe esclavon	1	3	4
Grèbe à cou noir	2	1	3
Grèbe indéterminé	0	4	4
Fulmar boréal	0	6	6
Océanite indéterminé	0	1	1
Fou de Bassan	28	405	433
Grand cormoran	2	13	15
Cormoran huppé	1	5	6
Cormoran indéterminé	1	2	3
Aigrette garzette	1	0	1
Héron cendré	1	1	2
Oie cendrée	0	1	1
Bernache cravant	8	10	18
Tadorne de Belon	2	4	6
Canard pilet	0	1	1
Canard souchet	0	1	1
Fuligule morillon	1	0	1
Fuligule milouinan	3	4	7
Fuligule indéterminé	1	1	2
Eider à duvet	33	24	57
Macreuse noire	458	347	805
Macreuse brune	7	4	11
Macreuse indéterminée	177	215	392
Harle huppé	13	7	20
Harle indéterminé	0	2	2
Anatidé indéterminé	5	12	17
Faucon crécerelle	2	1	3
Perdrix grise	0	1	1
Gallinule poule d'eau	0	1	1
Foulque macroule	0	1	1
Huîtrier pie	0	2	2
Avocette élégante	0	1	1
Pluvier indéterminé	0	1	1
Bécasseau sanderling	3	1	4
Bécasseau variable	2	1	3
Bécasseau indéterminé	0	9	9
Labbe pomarin	2	2	4
Grand labbe	5	6	11
Mouette pygmée	1	0	1


⁴ Association de Défense de l'Environnement en Vendée

⁵ Office National de la Chasse (devenu Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage depuis)

Espèce	Nombre d'oiseaux vivants	Nombre d'oiseaux morts	TOTAL
Mouette rieuse	6	51	57
Goéland cendré	0	4	4
Goéland brun	0	11	11
Goéland argenté	2	30	32
Goéland leucophée	0	1	1
Goéland marin	1	8	9
Mouette tridactyle	15	82	97
Mouette indéterminée	2	20	22
Goéland indéterminé	3	28	31
Guillemot de Troïl	2427	8835	11262
Pingouin torda	202	297	499
Mergule nain	0	2	2
Macareux moine	0	107	107
Alcidé indéterminé	0	56	56
Pigeon ramier	0	1	1
Pigeon indéterminé	1	0	1
Martin pêcheur	1	0	1
Merle noir	0	1	1
Pie bavarde	1	0	1
Etourneau sansonnet	0	1	1
Espèces indéterminées	0	6095	6095
TOTAL	3459	16784	20243

Comme l'indique le graphique 1, la majorité des oiseaux collectés sont des guillemots de Troïl *Uria aalge* (56%).

Par ailleurs, la LPO a réalisé une étude sur l'impact de la marée noire sur les oiseaux d'eau hivernant sur la côte Atlantique (DECEUNINCK B., BOILEAU N., CORRE F. – 2003 – *Impact de la marée noire de l'ERIKA sur les oiseaux d'eau et les milieux fréquentés. Rapport final.* Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 43 pages). Ce rapport est disponible à la LPO Vendée.



Graphique 1 – Répartition des espèces d'oiseaux échoués pendant la marée noire (décembre 1999 – juillet 2000).

A PROPOS DES ESPÈCES SOUMISES A HOMOLOGATION

Les observations soumises à homologation nationale n'ont été indiquées que si elles ont été homologuées par le Comité d'Homologation National (CHN). Les données non soumises ou non homologuées sont conservées dans la base de données en vue d'un éventuel (ré)examen.

Le Comité d'Homologation Départemental n'ayant été créé qu'en 2001, il n'a pu statuer sur les observations de la période 1998-2000. Le comité de lecture de la Gorgebleue a pris la décision d'intégrer ces données dans la présente synthèse. Contacter les observateurs en cas de doute.

POUR FACILITER LA LECTURE

Les données homologuées renvoient aux numéros d'*Ornithos* dans lesquels sont parus les rapports du CHN. Les références bibliographiques sont les suivantes :

FREMONT J.-Y. & le CHN – 1999 – Les oiseaux rares en France en 1998. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 6-4 : 145-172.

FREMONT J.-Y. & le CHN – 2000 – Les oiseaux rares en France en 1999. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 7-4 : 146-173.

FREMONT J.-Y. & le CHN – 2002 – Les oiseaux rares en France en 2000. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 9-1 : 2-33.

FREMONT J.-Y. & le CHN – 2003 – Les oiseaux rares en France en 2001. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 10-2 : 49-83.

FREMONT J.-Y. & le CHN – 2004 – Les oiseaux rares en France en 2002. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 11-2 : 49-85.

L'ordre des espèces et les noms scientifiques utilisés sont ceux de la *Liste des oiseaux du Paléarctique Occidental*, publiée par la LPO, version 2003. Cette liste est disponible sur le site Internet de la LPO (<http://www.lpo.fr>).

Les nombres indiqués en face des espèces correspondent aux nombres d'observations et de données. Par exemple, pour le Grèbe jougris : 3/2 signifie que sur la période, 3 observations ont été effectuées mais elles correspondent seulement à 2 données (des observateurs différents ont observé le(s) même(s) oiseau(x) plusieurs fois).

LISTE DES OBSERVATEURS ET CODES UTILISES DANS LA SYNTHÈSE

Nom	Code utilisé
ACEDEM	ACEDEM
John et Pamela ADAMS	J. & P.Ada
ADEV Sud Vendée	ADEV
Olivier ALLENOU	O.All
Jean-Marie ARTAUD	J-M.Art
Aurélien AUDEVARD	A.Aud
Stéphane BALLINYA	S.Bal
Stéphane BARBIER	S.Bar
Anthony BAROUIN	A.Bar
Jean-Claude BEAUDOUIN	J-C.Bea
Hervé BELIER	H.Bel
David BERNARD	D.Ber
Jacques BERTEAU	J.Ber
Gérard BESSEAU	G.Bes
Michel BIBARD	M.Bib
Julien BIRARD	J.Bir
Gilbert BLAISING	G.Bla
Sylvain BONIFAIT	S.Bon
Sandra BOTTO	S.Bot
Christophe BROCHARD	C.Bro
Didier BROSSARD	D.Bro
Didier et Marie-Thérèse BROSSARD	D. & M-T.Bro

Nom	Code utilisé
Georges BULIDON	G.Bul
Michel CAUPENNE	M.Cau
Matthieu CHAMBOULEYRON	M.Cha
Stéphane CHARRIER	S.Cha
Jean CHEVALLIER	J.Che
Bruna CHIAPELLO	B.Chi
Guy-Luc CHOQUENE	G-L.Cho
Jean CLOUTOUR	J.Clo
Coin des Branchés de l'Oiseau Magazine	Ois Mag
Club Connaître et Protéger la Nature "La Linotte" de Beaulieu-sous-la-Roche	CPN Linotte
Club Connaître et Protéger la Nature de Saint-Hilaire-de-Loulay	CPN Lolayo
Matthieu COSSON	M.Cos
Christian et Sylvie COUARTOU	C. & S.Cou
Sébastien DALLOYAU	S.Dal
Jean-François DARRAS	J-F.Dar
Jean-Pierre DELAPRE	J-P.Del
Didier DESMOTS	D.Des
F.DEVAGE	F.Dev
Laurent DEVAUD	L.Dev

Nom	Code utilisé
Antoine DORÉ	A.Dor
Christophe DRAPEAU	C.Dra
Perrine DULAC	P.Dul
Équipe du camp de migration de la pointe de l'Aiguillon	Eq.Pointe
Christian et Elisabeth ERRATH	C. & E.Err
Yannick FAURE	Y.Fau
Michel FOUQUET	M.Fou
Julien FRADET	J.Fra
Sylvie FRADET	S.Fra
André FRANÇOIS	A.Fra
Jean-Yves FRÉMONT	J-Y.Fré
Emmanuel GAS	E.Gas
Yves GAUGRIS	Y.Gau
Alain GÉRARD	A.Gér
Julien GERNIGON	J.Grn
Alain & Julien GERNIGON	A. & J.Grn
Olivier GIRARD	O.Gir
Christophe GIRAUD	C.Gir
Didier GODREAU	D.God
Christian GONIN	C.Gon
Julien GONIN	J.Gon
Christian et Julien GONIN	C. & J.Gon
M. et Mme GRANDJEAN	M.Gra
Lucien GRILLET	L.Gri
Groupe Jeunes LPO Vendée	GpJeunes
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres	GODS
Jean-Pierre GUÉRET	J-P.Gué
Sylvain HÉNAFF	S.Hén
Marie-Paule HINDERMEYER	M-P.Hin
Xavier et Marie-Paule HINDERMEYER	X. & M-P.Hin
Emmanuel JOYEUX	E.Joy
Yves KAYSER	Y.Kay
Jean-Michel KOPP	J-M.Kop
Alban LAROUSSE	A.Lar
Christiane LAUNAY	C.Lau
Pierre LE MARÉCHAL	P.LeM
Jean-Christophe LEMESLE	J-C.Lem
Christian et Jeanine LERAY	C. & J.Ler
Emmanuel LE ROY	E.LeR
LPO (participation collective LPO Marais Breton, LPO Noirmoutier et LPO Vendée)	LPO
LPO Charente Maritime	LPO 17
LPO Cher	LPO 18
LPO Noirmoutier (équipe de la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg)	LPO Noi
LPO Vendée	LPO 85
LPO Vienne	LPO 86

Nom	Code utilisé
Jean-Claude LUEZ	J-C.Lue
Willy MAILLARD	W.Mai
François MAILLAT	F.Mai
Fred MAILLOT	F.Mlt
Sébastien MAILLIER	S.Mai
J.MILLAR	J.Mil
Dominique MARIEAU	D.Mar
E. MARTIN	E.Mar
Erwan MÉNARD	E.Mén
Jérôme MENETREY	J.Men
Sylvie MÉRAND	S.Mér
C.MERCIER	C.Mer
Christian MÉTAIS	C.Mét
Benoît MORAZÉ	B.Mor
Jean-Paul NATALIS	J-P.Nat
Franck NOEL	F.Noé
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage	ONCFS
Etienne OUVRARD	E.Ouv
Christian PACTEAU	C.Pac
Jean-Paul PAILLAT	J-P.Pai
François PAPIN	F.Pap
Olivier PENARD	O.Pen
Sébastien PERES	S.Per
Thomas PERRIER	T.Per
Didier PERROCHEAU	D.Per
Benoît PERROTIN	B.Per
Loïc PETIT	L.Pet
Christophe PINEAU	C.Pin
Benoît POIRAUDEAU	B.Poi
Cyril POISSONNET	C.Poi
Frédéric PORTIER	F.Por
F.POUZERGUES	F.Pou
Nyls de PRACONTAL	N.Pra
Fabien RAMBAUD	F.Ram
Stéphane RAPIN	S.Rap
Franck RENAUDEAU	F.Ren
Informations transmises sur le répondeur LPO Nationale	RépNat
Pascal RÉTIVEAU	P.Rét
Aurélien RIVALLIN	A.Riv
Philippe ROUILLIER	P.Rou
Bernard ROUSSEAU	B.Rou
Jean-Baptiste ROUX	J-B.Rou
François-Xavier ROY	F-X.Roy
Franck SALMON	F.Sal
Frédéric SÉMAVOINE	F.Sem
Jean SÉRIOT	J.Sér
Jean-Philippe SIBLET	J-P.Sib
Frédéric SIGNORET	F.Sig
Laurent SPANNEUT	L.Spa

Nom	Code utilisé
Julien SOUFFLOT	J.Sou
Renan TAPIN	R.Tap
Erwan TAQUET	E.Taq
Bernadette TESSIER	B.Tes
Pierre TESSIER	P.Tes
Alain TEXIER	A.Text
Alain THOMAS	A.Tho

Nom	Code utilisé
Yves TRÉVOUX	Y.Tré
Paul TROTIGNON	P.Tro
Matthieu VASLIN	M.Vas
Jean VIMPERE	J.Vim
Sylvain VRIGNAUD	S.Vri
Pierre YÉSOU	P.Yés
Théophile YOU	T.You

OU TROUVER LES ESPÈCES ?

Des Plongeurs aux Cormorans (Xavier HINDERMEYER)	74
Du Butor étoilé à la Spatule blanche (Perrine DULAC)	80
Canards de surface (Christian et Julien GONIN)	84
Canards plongeurs (Lucien GRILLET)	90
Rapaces diurnes (Sylvain VRIGNAUD)	94
Des Perdrix à l'Outarde canepetière (Christophe DRAPEAU)	99
De l'Huîtrier pie aux Bécasseaux (Perrine DULAC)	101
Du Combattant varié aux Phalaropes (Emmanuel JOYEUX)	110
Des Labbes à la Mouette tridactyle (Matthieu VASLIN)	115
Des Sternes aux Alcidés (Frédéric PORTIER & Perrine DULAC)	118
Des Pigeons au Coucou gris (Jocelyne GUEYDAN)	123
Rapaces nocturnes (Sylvain VRIGNAUD)	124
De l'Engoulevent d'Europe aux pics (Jocelyne GUEYDAN)	126
Des Alouettes aux Bergeronnettes (Lucien GRILLET)	128
Du Troglodyte mignon aux Turdidés (Bernard ROUSSEAU)	133
De la Bouscarle de Cetti aux Mésanges (Didier DESMOTS)	136
De la Sittelle torchepot aux Bruants (Théophile YOU)	142

DES PLONGEONS AUX CORMORANS (Xavier HINDERMEYER)

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*)

1998-1999 : 19

1999-2000 : 20

Migrateur et hivernant régulier sur tout le littoral vendéen et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Les observations ne concernent le plus souvent qu'un ou deux individus, rarement plus. Un groupe bien plus important a toutefois été noté avec plus de 38 oiseaux, le 30/12/99, sur la côte Nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

Cette dernière observation, après celle de plus de 40 individus en 1997, semble confirmer la présence de l'espèce en nombre important fin décembre entre l'île d'Yeu et le continent.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	18/11, la Noue Fromagette, Beauvoir-sur-Mer (LPO)	16/03, Noirmoutier (LPO)
Hiver 1999-2000	27/11, corniche de Sion-sur-l'Océan, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	13/04, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)

L'espèce a souffert de la marée noire qui a suivi le naufrage de l'Erika en décembre 1999 (voir récapitulatif en introduction).

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*)

1998-1999 : 22

1999-2000 : 6

Migrateur et hivernant assez peu commun sur tout le littoral vendéen et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Il semble toutefois que le nombre d'observations et les effectifs soient très variables d'une année sur l'autre (cf. le nombre d'observations ci-dessus), l'espèce pouvant être bien présente certaines années (comme ce fut le cas lors de l'hiver 1998-1999).

Presque toutes les observations ne concernent qu'un ou deux individus sauf à l'île d'Yeu ou des groupes plus importants sont notés : 5 individus le 28/12/98, 7 le 31/12/98 et surtout 14 le 01/01/99 sur la côte Nord de l'île (X. & M-P.Hin).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	23/11, base de voile, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq. Pointe)	30/01, base de voile, L'Aiguillon-sur-Mer (C. & J.Gon)
Hiver 1999-2000	04/12, base de voile, La Tranche-sur-Mer (C. & J.Gon)	10/01, île d'Yeu (Y.Kay & C.Pin)

Un individu a hiverné du 23/11/98 au 30/01/99 sur la base de voile de l'Aiguillon-sur-Mer. Les deux années, aucune observation n'a été faite après le mois de janvier.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*)

1998-1999 : 27

1999-2000 : 16

Migrateur et hivernant régulier en petit nombre sur tout le littoral vendéen et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Les observations ne concernent à chaque fois qu'un à trois individus, notamment 3 le 28/11/98 pointe de l'Herbaudière à Noirmoutier (J.Gon) et 3 les 25/12/98 et 30/12/99 sur la côte Nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	03/11, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (A.Aud)	02/03, port des Sables-d'Olonne (M.Bib)
Hiver 1999-2000	20/12, Barbâtre (LPO 17)	05/05, plage de la Gachère, Brétignolles-sur-Mer (D.Mar)

L'observation de 2 oiseaux en en plumage nuptial le 05/05/00 est, comme en 1998, la date la plus tardive connue à ce jour pour la Vendée.

Les oiseaux récoltés suite au naufrage de l'Erika en décembre 1999 provenaient de La Barre-de-Monts, l'île d'Yeu et L'Aiguillon-sur-Mer.



Plongeon imbrin (Gavia immer). Dessin © Benoît PERROTIN

PLONGEON SP. (*Gavia sp.*)

1998-1999 : 4

1999-2000 : 1

Quelques observations de un à cinq individus entre le 28/11/98 et le 27/01/99 et une observation d'un individu "probablement arctique" le 23/01/00 à la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.Bes).

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*)

1998-1999 : 147

1999-2000 : 121

Nicheur, migrateur et hivernant, largement répandu sur tout le département sauf à l'île d'Yeu.

Quelques indices de reproduction proviennent des étangs du bocage (étangs des Boucheries, des Jaubretières, des Rochettes, la Bargonière), du lac de Maché-Apremont et des marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez.

Les maxima sont notés en août et septembre (rassemblements post nuptiaux) avec par exemple 208 individus le 03/09/98 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér) et plus de 80 individus le 10/08/00 sur la lagune de la Belle Henriette à la Faute-sur-Mer (F.Por).

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*)

1998-1999 : 221

1999-2000 : 176

Nicheur, migrateur et hivernant, commun dans tout le département, y compris à l'île d'Yeu où l'espèce n'est toutefois présente que de fin octobre à début avril.

Plusieurs indices de reproduction sur les lacs et étangs du bocage (lac de Maché-Apremont, étangs des Rochettes, des Boucheries, de la Tesserie, de la Blotière...).

Des rassemblements postnuptiaux sont notés en août et septembre avec notamment 136 individus le 27/08/99 et 112 le 03/09/99 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér). L'espèce hiverne à l'intérieur des terres mais également sur tout le littoral vendéen. A noter deux observations inhabituelles : plus de 50 individus le 04/12/99 depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan (rassemblement exceptionnel pour ce site) (G.Bes) et une 1^{ère} donnée pour le communal du Poiré-sur-Velluire avec 1 individu le 29/12/99 (C.Gon).

L'espèce a été touchée par la marée noire qui a suivi le naufrage de l'Erika en décembre 1999 (24 oiseaux collectés, voir aussi commentaires en introduction).

GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps grisegena*)

1998-1999 : 3/2

1999-2000 : 2/2

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur et hivernant rare, noté surtout sur le littoral et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Un individu est observé les 28 et 30/12/98 plage des Sapins à l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin) et deux autres le 19/01/99 à Noirmoutier-en-l'Île (ONCFS).

Un oiseau est noté le 17/10/99 dans le parc ostréicole de la pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) et un autre le 31/12/99 plage de la Terrière à La Tranche-sur-Mer (C. & J.Gon).

GRÈBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*)

1998-1999 : 12/7

1999-2000 : 4/3

Migrateur et hivernant assez peu commun, observé en certains points du littoral vendéen mais surtout autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Les observations ne concernent à chaque fois qu'un individu, sauf 2 oiseaux le 28/11/98 pointe du Devin à Noirmoutier (J.Gon).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	16/09, station dépurative, La Tranche-sur-Mer (J.Gon)	14/02, pointe du Devin, L'Épine (LPO)
Hiver 1999-2000	01/09, station dépurative, La Tranche-sur-Mer (J.Gon <i>et al.</i>)	28/12, plage de Ker Châlon, Ile d'Yeu (X. & M-P.Hin)

La station d'épuration de La Tranche-sur-Mer semble régulièrement fréquentée par l'espèce en septembre lors de son passage post-nuptial.

Très peu d'observation en 1999-2000 et une seule en hiver : l'espèce a probablement été touchée par la marée noire qui a suivi le naufrage de l'Erika en décembre 1999 (quelques oiseaux collectés entre Les Sables-d'Olonne et La Tranche-sur-Mer, voir introduction).

GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)

1998-1999 : 71

1999-2000 : 63

Migrateur et hivernant régulier.

Bien que l'espèce soit présente toute l'année dans le département, il n'y a toujours aucune preuve formelle de reproduction de celle-ci en Vendée.

Les observations ne concernent que très rarement plus de 10 individus, maximum 13 individus le 23/09/99 sur le marais des Loirs à Olonne-sur-Mer (M.Bib).

Ce grèbe fréquente principalement l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson, qui cumule à lui seul près de 50% des observations, mais des oiseaux sont également notés sur les stations d'épuration de La Tranche-sur-Mer, de Luçon et de Noirmoutier, dans les marais d'Olonne et de la Vie, sur la lagune de la Belle Henriette et en hiver sur le littoral notamment autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

FULMAR BORÉAL (*Fulmarus glacialis*)

1998-1999 : 7/5

1999-2000 : 12

Migrateur peu commun sur le littoral vendéen.

Les observations ne concernent le plus souvent qu'un ou deux oiseaux, excepté 3 individus le 17/04/00 au passage, pointe des Corbeaux à l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

L'espèce est observée lors du passage prénuptial en avril, avec par exemple 1 individu les 22/04/99 et 12/04/00 au phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (M.Bib).

Des observations sont également faites depuis la côte en juin et même en juillet avec 1 individu le 26/07/00 à la Paracou (M.Bib).

Lors du passage postnuptial les observations sont groupées au mois d'août et sont effectuées depuis l'île d'Yeu, le phare de l'Armandèche ou au large des Sables-d'Olonne (sortie Kifanlo).

Aucune observation hivernale.

Quelques oiseaux fréquentent toujours assidûment, au printemps, les falaises de l'île d'Yeu mais l'espèce ne s'y reproduit toujours pas.

PUFFIN CENDRÉ (*Calonectris diomedea*)

1998-1999 : 18

1999-2000 : 16

Espèce soumise à homologation départementale.

La sous-espèce *borealis* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries, aux Açores et à Berlenga au large du Portugal. Migrateur peu commun mais régulier sur le littoral vendéen.

Les observations concernent presque toujours moins d'une dizaine d'individus, sauf 20-25 individus observés le 05/09/98 depuis le phare de l'Armandèche (LPO 18), 50 individus le 04/06/99 depuis la Chaume aux Sables-d'Olonne (M.Fou) et 23 individus le 14/08/99 depuis la côte Nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

Afflux très importants d'oiseaux en 1999 avec 175 individus observés le 14/08/99 depuis le phare de l'Armandèche et surtout plus de 350 individus en seulement 1h30 de "sea-watching" le 16/09/99 depuis la pointe des Corbeaux de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

L'espèce est présente d'avril à fin août dans les eaux vendéennes. A noter toutefois l'observation très précoce d'un individu le 03/03/99 depuis le port des Sables-d'Olonne (probablement la sous-espèce *borealis*) (M.Bib).

PUFFIN MAJEUR (*Puffinus gravis*)**1998-1999 : 5/5****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud (Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough). Migrateur très rare, observé seulement au large des côtes vendéennes.

Quatre cadavres sont découverts le 23/10/98 sur la plage des Dunes à Brétignolles-sur-Mer (J.Vim). L'origine de la mort n'est pas connue.

Plus classiquement quelques oiseaux (1 à 5 individus) sont observés au large des Sables-d'Olonne (sorties Kifanlo) du 10 au 21/08/99 (J.Gon, A.Lar, D.Des, F.Por *et al.*).

Ensuite aucune observation d'août 1999 à août 2000.

PUFFIN FULIGINEUX (*Puffinus griseus*)**1998-1999 : 4/2****1999-2000 : 2/2**

Espèce soumise à homologation départementale.

Niche sur quelques îles au large de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes.

Les observations ne concernent à chaque fois qu'un à deux individus.

Toutes les données sont du mois d'août et la grande majorité des observations est effectuée au large des Sables-d'Olonne (sorties Kifanlo). Une observation précoce (la plus précoce du fichier) d'un individu le 04/07/00 depuis le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (M.Bib). Une seule autre observation depuis la côte : un oiseau le 17/08/99 depuis la Paracou (F.Por).

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*)**1998-1999 : 8****1999-2000 : 5**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes.

Les observations ne concernent à chaque fois qu'un ou deux individus, sauf 6 oiseaux le 15/04/00 à la pointe des Corbeaux de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin) et 10 oiseaux les 26/04/99 (M.Bib) et 23/08/00 (S.Bal) depuis le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		02/11, phare de l'Armandèche, les Sables-d'Olonne (A.Aud)
Migr. pré-nuptiale 1999	16/04, phare de l'Armandèche, les Sables-d'Olonne (M.Bib)	06/06, traversée entre Fromentine et Yeu (S.Vri & S.Bot)
Migr. postnuptiale 1999		21/08, en mer au large des Sables-d'Olonne (D.Des & F.Por)
Migr. pré-nuptiale 2000	11/04, phare de l'Armandèche, les Sables-d'Olonne (J.Gon, J.Grn & M.Bib)	15/04, corniche de Sion (G.Bes)
Migr. postnuptiale 1998		23/08/00, phare de l'Armandèche, les Sables-d'Olonne (S.Bal)

La donnée du 04/07/00 depuis le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (M.Bib) peut correspondre à des oiseaux reproducteurs français (bretons) ou britanniques à la recherche de nourriture.

PUFFIN DES BALÉARES (*Puffinus mauretanicus*)**1998-1999 : 22****1999-2000 : 31**Autrefois regroupé, avec la sous-espèce *yelkouan*, sous le nom de Puffin de Méditerranée, il s'agit désormais de deux espèces distinctes, le Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) et le Puffin yelkouan (*Puffinus yelkouan*).

Migrateur présent en grand nombre le long des côtes vendéennes de juillet à septembre.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		02/11, phare de l'Armandèche, les Sables-d'Olonne (A.Aud)
Saison 1999	25/04, depuis les dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)	21/09, les Sables-d'Olonne (M.Bib)
Saison 2000	25/05, phare de l'Armandèche, les Sables-d'Olonne (M.Bib)	

Les rassemblements les plus importants concernent plusieurs milliers d'oiseaux en septembre 1999, notamment environ 4 000 individus le 02/09, observés depuis la dune du Jaunay à Brétignolles-sur-Mer (G.Bes). La quinzaine d'observations de Puffin de Méditerranée se rapporte certainement à cette espèce.

PUFFIN DE MÉDITERRANÉE

1998-1999 : 5

1999-2000 : 11

Espèce qui a été sub-divisée en deux nouvelles espèces : le Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) et le Puffin Yelkouan (*Puffinus yelkouan*).

Toutes les observations de Puffins de Méditerranée se rapportent à *Puffinus mauritanicus* notamment les observations de septembre et octobre 1999 à l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

PUFFIN SP. (*Puffinus sp.*)

1998-1999 : 6

1999-2000 : 0/0

Les observations de plusieurs oiseaux en octobre 1998 dans les eaux de l'île d'Yeu (GpJeunes) concernent très probablement le Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*).

OCÉANITE DE WILSON (*Oceanites oceanicus*)

1998-1999 : 0/0

1999-2000 : 1/1

Espèce soumise à homologation nationale.

Niche dans l'hémisphère Sud (Antarctique, îles subantarctiques) mais en période internuptiale peut fréquenter tous les océans, y compris l'Atlantique. Migrateur occasionnel.

Un autre individu est observé dans d'excellentes conditions le 26/08/00 au large des Sables-d'Olonne (D.Des *et al.*). Cette donnée est la quatrième réalisée depuis le chalutier "Kifanlo".

Observations acceptées par le CHN (Ornithos 9-1).

OCÉANITE TEMPÊTE (*Hydrobates pelagicus*)

1998-1999 : 21

1999-2000 : 20

Migrateur et estivant régulier au large des côtes vendéennes.

Les observations ne concernent que rarement plus d'une vingtaine d'individus ensemble, excepté en août et début septembre, avec respectivement plus de 60 et plus de 40 oiseaux au large des Sables-d'Olonne (sortie Kifanlo) les 21/08/99 et 26/08/00 (F.Por).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		31/12, côte Nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin)
Saison 1999	14/04, phare de l'Armandèche (M.Bib)	27/12, port des Sables-d'Olonne (M.Bib)
Saison 2000	30/05, phare de l'Armandèche (M.Bib) et corniche de Sion-sur-l'Océan (G.Bes)	

Les données printanières deviennent très régulières (avril et surtout mai). L'espèce peut désormais être observée de manière presque continue d'avril à décembre sur le littoral vendéen (pas d'observations en juin et novembre sur la période). Les données hivernales sont également régulières, notamment en décembre, correspondant très probablement à des migrateurs tardifs.

OCÉANITE CULBLANC (*Oceanodroma leucorhoa*)**1998-1999 : 4****1999-2000 : 9**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur et hivernant rare au large des côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de vent.

Toutes les observations sont effectuées en septembre et octobre à des dates classiques. Elles ne concernent à chaque fois qu'un à trois oiseaux sauf le 02/10/99 où au moins 5 individus sont notés depuis la Corniche de Sion-sur-l'Océan (G.Bes & P.Rou) et 9 individus en deux heures depuis le phare de l'Armandèche (M.Bib).



Océanite culblanc (*Oceanodroma leucorhoa*). Dessin © Benoît PERROTIN

FOU DE BASSAN (*Morus bassanus*)**1998-1999 : 86****1999-2000 : 76**

Migrateur et hivernant commun, observé toute l'année devant et au large des côtes vendéennes.

Des observations sont effectuées tout au long de l'année mais elles sont plus nombreuses de juillet à octobre (passage postnuptial) et de mars à mai (passage prénuptial). Quelques maxima sont notés à ces périodes : passage important de plus de 100 individus par heure devant la côte Nord de l'île d'Yeu le 24/10/98 (F.Noë), 160-180 individus au passage entre la pointe de l'Herbaudière à Noirmoutier et l'île du Pilier le 22/03/99 (E.Gas) ou encore 300 individus le 23/08/00 depuis le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (S.Bal).

L'espèce a souffert de la marée noire qui a suivi le naufrage de l'Erika en décembre 1999, avec de nombreux oiseaux mazoutés (voir commentaires introductifs). Plusieurs des oiseaux collectés étaient bagués : deux oiseaux bagués en 1997 sur la colonie de Great Saltee Island en Irlande, deux oiseaux bagués sur l'île de Unst aux Shetland, un oiseau bagué sur l'île d'Alderney à Jersey (M.Vaslin comm.pers.).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)**1998-1999 : 243****1999-2000 : 187**

Migrateur et hivernant, présent en Vendée tout au long de l'année.

Les effectifs augmentent régulièrement à partir du mois d'août et surtout de septembre. Les maxima sont notés en octobre, novembre, décembre et janvier sur les dortoirs avec notamment 259 individus le 05/11/98 et 279 le 03/12/99 au dortoir de l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér) mais aussi 270 le 15/11/98 et 240 le 16/02/99 à Morteveille, La Bretonnière (S.Vri) ou encore 290 à la pointe de l'Aiguillon (parc ostréicole) les 9 et 11/10/99 (Eq. Pointe).

Les effectifs diminuent nettement à partir de la fin du mois de février et en mars. Enfin, quelques dizaines d'oiseaux restent d'avril à juillet.

Un indice de reproduction avec la construction de 2 nids le 15/03/00 au lac de Maché-Apremont (A.Gér) mais toujours pas de preuve formelle.

CORMORAN HUPPÉ (*Phalacrocorax aristotelis*)

1998-1999 : 7/3

1999-2000 : 13/10

Espèce soumise à homologation départementale (en dehors des îles d'Yeu et de Noirmoutier).

Migrateur et hivernant rare, excepté autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier où il est régulier.

Les observations concernent rarement plus de quatre individus, excepté 5 immatures le 17/04/00, pointe de la Tranche à l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin). Aucune observation durant la période en dehors des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Premier cas de reproduction en Vendée en 1999 : un couple (dont un couveur sur son nid) est observé sur l'île du Pilier (ONCFS comm.pers.). Le devenir de cette ponte n'est toutefois pas connu.

En 2000, 4 individus sont de nouveau notés le 23/04 sur l'île du Pilier (LPO Noi) mais pas de reproduction cette année.

DU BUTOR ETOILE À LA SPATULE BLANCHE (Perrine DULAC)

BUTOR ETOILÉ (*Botaurus stellaris*)

1998-1999 : 1/1

1999-2000 : 6/6

Migrateur partiel, nicheur possible.

Signalé le plus souvent dans les marais côtiers (marais Breton et marais Poitevin), quelques fois aussi sur les étangs du bocage. Pas de données de nidification sur ces deux années.

Une seule donnée en 1998-1999 : le 13/01 sur le communal de Curzon (J. & P.Ada).

Un peu plus de données l'année suivante :

- 1 ind. le 10/10, les Tonnelles, Saint-Jean-de-Monts (F.Sig)
- 1 ind. le 26/11/99 (S.Mér) puis 1 autre le 01/02/00 (A.Riv) à l'étang des Boucheries, Les Landes-Génusson
- 1 ind. le 19/12/99 aux Sables-d'Olonne (S.Bar & E.Ouv)
- 1 trouvé mort sur la route entre Triaize et Luçon (C.Pac)
- 1 le 02/07/00 à Bouin (M.Vas)

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*)

1998-1999 : 4/2

1999-2000 : 4/2

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheur rare, migrateur.

Une donnée de nidification possible au Perrier en juin 2000.

En 1999 :

- 1 mâle chanteur le 10/06, mare des Agaures, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
- présence de l'espèce pendant tout le mois de juin 1999 à la Grande Herse, Le Perrier (G.Bes)

En 2000 :

- 2 mâles chanteurs les 01 et 08/06 à la Grande Herse, Le Perrier, puis 1 ind. le 30/06 au même endroit (G.Bes)
- 1 femelle le 03/08, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (A.Riv)

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*)

1998-1999 : 41

1999-2000 : 25

Nicheur peu commun (localisé dans le marais Poitevin), migrateur.

La héronnière du Pain-Béni, à Chaillé-les-Marais, abrite la totalité des couples signalés :

- 80 couples en 1999 (ACEDEM *et al.*)
- 112 couples en 2000 (ACEDEM *et al.*)

A signaler : jusqu'à 80 individus (juvéniles et adultes) observés fin août 2000 aux Grainetières, Champagné-les-Marais (J-P.Gué, C.Gon, J.Gon).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		1 ^{ère} décade de novembre, St-Hilaire-de-Riez
Saison 1999	1 ^{ère} décade de mars, Chaillé-les-Marais	10/11, Les Moutiers-sur-le-Lay (S.Vri)
Saison 2000	25/03, Le Mazeau (C. & E.Err)	

La date du 10/11 est à l'époque la plus tardive du fichier LPO.

CRABIER CHEVELU (*Ardeola ralloides*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 3/2**

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheur rare en France (localisé en Camargue principalement, quelques couples en Dombes, sur la façade atlantique et en Midi-Pyrénées) et migrateur transsaharien. En Vendée, de passage occasionnel.

Pas de donnée vendéenne en 1998-1999.

En 2000 :

- 1 ind. le 08/05 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (H.Bel & S.Rap)
- 1 ind. les 10 et 12/08 sur la station d'épuration de Luçon (C.Dra, M.Bib)

HÉRON GARDE-BŒUFS (*Bubulcus ibis*)**1998-1999 : 110****1999-2000 : 94**

Nicheur, migrateur et hivernant.

Nicheur à Saint-Hilaire-de-Riez et à Chaillé-les-Marais. En hiver, la majorité des observations proviennent de la côte et des marais, mais l'espèce est aussi présente dans l'intérieur des terres.

Effectifs nicheurs (non exhaustifs) :

- 1999 : 49 couples nicheurs dans la héronnière du Pain-Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM *et al.*), une dizaine de couples dans les héronnières de Saint-Hilaire-de-Riez (F.Sig, G.Bes)

- 2000 : 68 couples nicheurs dans la héronnière du Pain-Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM *et al.*), 25 couples à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

L'enquête nationale coordonnée par l'ADEV et le Muséum d'Histoire Naturelle a permis de recenser environ 137 couples sur l'ensemble du département.

Quelques rassemblements et dortoirs :

- env. 40 ind. le 23/02/99 sur la station d'épuration de Luçon (S.Vri)
- 85 ind. le 21/03/99 à Triaize (J. & P.Ada)
- 92 ind. le 05/09/99 sur le communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon)

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*)**1998-1999 : 225****1999-2000 : 205**

Nicheuse et hivernante.

Nicheuse essentiellement dans les héronnières de la côte et du marais Poitevin, en hiver elle est présente à peu près partout dans le département.

Comptages non exhaustifs des héronnières :

- 1999 : env. 100 couples dans les 2 héronnières de Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) ; 269 couples dans la héronnière du Pain-Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM *et al.*).

- 2000 : env. 140 couples dans les 2 héronnières de Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) ; 402 couples dans la héronnière du Pain-Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM *et al.*). L'enquête nationale coordonnée par l'ADEV et le Muséum d'Histoire Naturelle a permis de recenser environ 1 200 couples sur l'ensemble du département.

1 200 ind. dénombrés le 22/07/98 lors du comptage des dortoirs de l'île de Noirmoutier (LPO Noi).

Une aigrette grise observée dans les marais de la Vie le 07/07/99 (G.Bes).

GRANDE AIGRETTE (*Ardea alba*)**1998-1999 : 22****1999-2000 : 49**

Hivernante et estivante rare.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	7 ind., 01/10, lac de Maché-Apremont (J.Grn). 1 ind. avait déjà été observé en juillet, cf. Gorgebleue 18-19	11/03, la Guittière, Talmont-St-Hilaire (M.Bib)
Hiver 1999-2000	07/07, marais d'Olonne, Ile-d'Olonne (ONCFS)	<i>Estivage*</i>
Hiver 2000-2001	<i>Estivage*</i>	

* Des données tout le long de la saison de reproduction en 2000 :

- 1 ind. dans les marais de la Vie jusqu'au 30/04 (G.Bes)
- 1 ind. en mai, marais des Loirs, Olonne-sur-Mer (D.Mar)
- 1 ind. début juillet à Bouin (M.Vas)

Espèce en expansion.

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*)**1998-1999 : 401****1999-2000 : 352**

Nicheur, migrateur partiel, hivernant.

Observé partout dans le département, y compris à l'île d'Yeu. Nicheur en de nombreux endroits (Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Barre-de-Monts, Longeville-sur-Mer, Bazoges-en-Pailleurs, La Pommeraie-sur-Sèvre, Luçon, Nalliers, Chaillé-les-Marais, Vix...), 24 sites recensés en tout.

Rappel : en 1997, un comptage de 24 sites de Vendée (avec l'ADEV sud-Vendée, l'ACEDEM, l'ONCFS et la Fédération Départementale des Chasseurs) avait permis d'estimer le nombre de couples de hérons nicheurs à 1 991.

Pour la période 1998-2000, les comptages non exhaustifs des héronnières ont permis de recenser :

- 1999 : au moins 68 couples à l'étang de la Tesserie, La Pommeraie-sur-Sèvre (S.Bar) ; env. 200 couples dans les héronnières de Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) ; 185 couples dans la héronnière du Pain-Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM et al.). Premiers cantonnements le 07/02 à l'étang de la Tesserie (S.Bar). Premier poussin (déjà grand) observé à La Barre-de-Monts le 26/04 (F.Sig).

- 2000 : 115 couples à l'étang de la Tesserie, La Pommeraie-sur-Sèvre (S.Bar) ; 200 à 220 couples dans les héronnières de Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) ; 25 couples à Saint-Pierre-le-Vieux (C.Gon & J-P.Gué) ; 151 couples dans la héronnière du Pain-Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM et al.). Premiers cantonnements le 21/02 à l'étang de la Tesserie (S.Bar).

L'enquête nationale coordonnée par l'ADEV et le Muséum d'Histoire Naturelle a permis de recenser environ 1 250 couples sur l'ensemble du département.

Un cas de prédation sur une belette le 26/08/99 à Noirmoutier sur le Luzan (LPO Noi).

HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*)**1998-1999 : 40****1999-2000 : 48**

Nicheur localisé, migrateur. En période de nidification, présent essentiellement en marais Poitevin, mais aussi dans le sud du marais Breton

En 1999, 67 couples nicheurs à la héronnière du Pain Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM et al.). Nicheur probable à la Grande Herse, Saint-Jean-de-Monts (G.Bes).

En 2000, 61 couples nicheurs à la héronnière du Pain Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM et al.), 16 couples à Doix (C.Gon & J-P.Gué). Nicheur probable à la Grande Herse, Saint-Jean-de-Monts (G.Bes).

L'enquête nationale coordonnée par l'ADEV et le Muséum d'Histoire Naturelle a permis de recenser environ 200 couples sur l'ensemble du département.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		17/09, marais d'Angles (Eq. Pointe)
Saison 1999	1 ^{ère} décade de mai, Nieul-le-Dolent, Chaillé-les-Marais, Brétignolles-sur-Mer	1 blessé ?, 28/09, les Clairais, Triaize (J. & P.Ada)
Saison 2000	1 ^{ère} décade de mai, héronnière du Pain-Béni, Chaillé-les-Marais (L.Gri)	

Premières observations sur les nids en 2000 comme en 1999 dans la 1^{ère} décade de mai à Chaillé-les-Marais.

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)**1998-1999 : 14****1999-2000 : 38**

Migratrice, observée essentiellement en migration postnuptiale.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		4 ind., 19/10, près de la Saligottière, Longeville-sur-Mer (J.Gon, S.Vri & D.Ber)*
Migr. pré-nuptiale 1999	1 ind., 01/05, bourg d'Aizenay (CPN Linotte)	
Migr. postnuptiale 1999	1 ind., 06/07, marais de Luçon (C.Pac), puis passages plus nombreux à partir du 03/08	3 ind., 23/09, St-Cyr-en-Talmondais (ONCFS)
Migr. pré-nuptiale 2000	<i>Pas de données</i>	
Migr. postnuptiale 2000	02/07, route de Machecoul, Bouin (M.Vas)	

* donnée la plus tardive du fichier LPO

1 jeune trouvée décapitée le 14/08/00 au Poiré-sur-Velluire (C.Gon). 1 ind. équipé d'une balise à Saint-Aubin-la-Plaine le 18/08/00 (C.Gon & J.Sér).

Espèce en expansion en France (et nombre d'observations qui augmente en Vendée).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*)**1998-1999 : 87****1999-2000 : 95**

Nicheuse, migratrice, hivernante rare.

Observée ponctuellement du nord au sud du département. Les couples nicheurs sont surtout localisés dans les marais Poitevin et Breton. Quelques couples épars dans le bocage (Les Herbiers et très récemment La Roche-sur-Yon).

Effectifs nicheurs communiqués au fichier LPO pour la période :

- 1999 : 8 couples en marais Poitevin, 4 couples en marais Breton, 1 couple aux Herbiers
- 2000 : 10 couples en marais Poitevin, 10 couples et 23 jeunes à l'envol en marais Breton.

Les premiers indices de nidification ont été relevés :

- en 1999 le 30/01 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (C. & J.Gon)
- en 2000 le 01/03 sur le communal des Magnils-Régnières (J-P.Gué)

L'hivernage devient de plus en plus régulier en Vendée.

En 2000, un couple a donné naissance à 5 poussins en marais Breton.

IBIS SACRÉ (*Threskiornis aethiopicus*)**1998-1999 : 30****1999-2000 : 57**

Espèce sédentaire échappée de captivité (Morbihan) en 1976. Il existe désormais une population férale en expansion, nicheuse sur le lac de Grand-Lieu et en Grande Brière (44).

Pour l'instant, l'espèce est principalement observée en marais Breton (entre Bouin et Saint-Hilaire-de-Riez, Noirmoutier compris) : 22 observations sur 30 en 1998-1999, 52 observations sur 57 en 1999-2000.

Une donnée d'un individu aux Landes-Génusson le 02/07/00 (A.Riv). Autres observations effectuées à Luçon, Saint-Denis-du-Payré, Ile-d'Olonne, Olonne-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer, L'Aiguillon-sur-Mer.

Un maximum de 33 individus observés le 13/02/00 dans le marais de Bouin (C.Gir).



Spatules blanches (Platalea leucorodia). Photo © Matthieu VASLIN

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*)**1998-1999 : 88****1999-2000 : 108**

Migratrice, de passage en période de reproduction, hivernante rare.

Présente essentiellement dans les marais et sur le littoral mais quelques données dans l'intérieur des terres. Pas de données de l'île d'Yeu.

Les effectifs les plus conséquents sont observés au moment de la migration postnuptiale (septembre – octobre).

Quelques effectifs importants :

- 40 ind. en migration le 20/09/99 aux Sables-d'Olonne (F.Mai)
- 54 ind. le 24/08/00 au phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (S.Bal)

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		04/11, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Saison 1999	11/02, marais d'Olonne, Ile-d'Olonne (ONCFS)	09/11, digue des Prises, Champagné-les-Marais (Eq. Pointe)
Saison 2000	09/02, communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon)	

Quelques observations d'individus hivernants :

- en décembre 1999 en marais Breton (4 ind. au port du Collet le 07/12, F.Sig)
- début janvier 2000 à Olonne-sur-Mer
- en décembre 2000 à Bouin

CANARDS DE SURFACE (Christian et Julien GONIN)

CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*)

1998-1999 : 146

1999-2000 : 132

Espèce commune, sédentaire.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 169 dont 96 sur les communaux du marais Poitevin
- janvier 2000 : 316 dont 236 sur les communaux du marais Poitevin

Comme d'habitude, la majorité des observations provient de la zone littorale et des marais Breton et Poitevin. Quelques concentrations de plus de 50 ind. en fin d'été sur la lagune de la Belle Henriette (La Faute-sur-Mer), à la station d'épuration de la Tranche-sur-Mer et dans les marais d'Olonne.

CYGNE NOIR (*Cygnus atratus*)

1998-1999 : 11/2 ou 3

1999-2000 : 11/2

Espèce australienne, échappé de captivité.

1998-1999 : 1 ind. sur la lagune de la Belle Henriette (La Faute-sur-Mer) du 09/09 au 16/11/99, 1 ind. sur l'étang des Mattes (Saint-Gervais) du 26/09 au 20/10/99 puis au port du Collet (Bouin) le 18/10/99.

1999-2000 : 1 ind. a séjourné du 28/09/99 au 18/01/00 dans les marais d'Olonne et un autre a été observé sur la réserve de Saint-Denis-du-Payré le 12/03/00.

OIE DES MOISSONS (*Anser fabalis*)

1998-1999 : 0/0

1999-2000 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.

Oie scandinave et sibérienne, la sous-espèce *fabalis* niche dans la taïga et la sous-espèce *rossicus* niche quant à elle dans la toundra.

Une seule donnée de 5 ind. le 06/02/00 sur l'étang de Bel-Air à la Ricotière (commune de Fougeré, M.Bib).

OIE À BEC COURT (*Anser brachyrhynchus*)

1998-1999 : 1/1

1999-2000 : 0/0

Espèce soumise à homologation nationale.

Espèce nichant au Groenland, en Islande, au Spitzberg. Hivernent principalement en Grande-Bretagne et en Belgique.

1 ad. du 19/11 le 04/12/98 sur la réserve de Saint-Denis-du-Payré (A.Tho).

Donnée acceptée par le CHN (Ornithos 11-2).

OIE RIEUSE (*Anser albifrons*)

1998-1999 : 26

1999-2000 : 9/4

Oie sibérienne.

Espèce régulière en migration et hivernage dans le sud de la Vendée, toujours en faible effectif.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 18 dont 20 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré
- janvier 2000 : 10 dont 6 en baie de l'Aiguillon et 4 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré

1998-1999 : 25 observations de 8 à 17 ind. du 04/12/98 au 16/03/99 en marais Poitevin (communal du Poiré-sur-Velluire, Réserves Naturelles de Saint-Denis-du-Payré et de la baie de l'Aiguillon) et une donnée de 3 ind. au port du Collet à Bouin le 18/11/98.

1999-2000 : 9 observations du 23/10/99 au 05/02/00 en baie de l'Aiguillon et sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, avec un maximum de 111 ind. le 05/02/00 en baie de l'Aiguillon (M.Cau). et 1 ind. dans les marais d'Olonne les 23 et 25/05/00 (ONCFS).

OIE CENDRÉE (*Anser anser*)

1998-1999 : 61

1999-2000 : 72

La seule oie nicheuse en France, migratrice et hivernante la plus abondante.

Un couple nicheur au lieu-dit Beaumont à Champagné-les-Marais (J-P.Gué) en 2000.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	12 ind. le 17/09, station d'épuration de la Tranche-sur-Mer (S.Mai, F.Mlt & J.Men), puis plusieurs passages le 02/11	1 ind. le 27/04, communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon).
Hiver 1999-2000	Plusieurs observations le 17/10 : 19 ind. en vol, station d'épuration de La Tranche-sur-Mer ; 23 ind. posés, baie de l'Aiguillon ; 54 ind. en vol, pointe de l'Aiguillon (GODS) ; enfin 36 ind. en vol, marais de la Vie (G.Bes).	7 ind. en vol le 11/04, marais des Loirs, Olonne-sur-Mer (J.Grñ & J.Gon).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 854 dont 565 en baie de l'Aiguillon et 270 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré

- janvier 2000 : 1 902 dont 1 650 en baie de l'Aiguillon et 248 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré

Autres chiffres maximaux en hivernage : env. 600 en 1998 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (A.Tho – ADEV) et env. 600 ind. en 1998 et 900 en 1999 en baie de l'Aiguillon (ONCFS, C. & J.Gon).

BERNACHE DU CANADA (*Branta canadensis*)

1998-1999 : 6/3

1999-2000 : 2/2

Espèce introduite en Europe, originaire d'Amérique du Nord, nicheuse dans le nord de la France et sur le Val d'Allier.

2 ind. le 03/02/99 sur la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer (A.Aud), 1 à 4 ind. du 03/03 au 30/04/99 dans les marais d'Olonne (ONCFS) et 1 ind. le 01/05/99 dans les marais de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire (J.Clo).

10 ind. posés le 29/09/99 à la pointe de l'Herbaudière à Noirmoutier (F.Por) et 1 ind. en vol le 03/10/99 à la pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe).

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*)

1998-1999 : 8/3

1999-2000 : 11/4

Nicheuse en Nouvelle Zemble, au Spitzberg, au Groenland et plus récemment en Scandinavie.

Très peu d'observations pour ces deux années (rappel : 1996-1997 : 22/16 et 1997-1998 : 47/4).

1998-1999 : 1 ind. les 04 et 06/12/98 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, 6 et 5 ind. les 12 et 13/12/98 sur le polder de Saint-Cérons à Bouin (J-Y.Fré, A & J.Grñ) et 2 et 1 ind. les 18 et 30/01/99 en baie de l'Aiguillon (ONCFS, C. & J.Gon).

1999-2000 : 8 ind. en vol le 01/10 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier (J-C.Lem), 3 ind. le 12/10 à la pointe d'Arçay (ONCFS), 1 ind. le 21/11 à la Noue Fromagette à Beauvoir-sur-Mer (P.Rét), 1 ind. le 05/12 sur la lagune de Bouin (F.Sig) et 2 ind. le 05/02 en baie de l'Aiguillon (M.Cau & ONCFS).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	1 ind. le 11/11, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (A.Tho <i>et al.</i>)	1 ind. le 30/01, digue du Maroc, St-Michel-en-l'Herm (C. & J.Gon)
Hiver 1999-2000	8 ind. en vol le 01/10, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier (J-C.Lem)	2 ind. le 05/02, baie de l'Aiguillon (M.Cau & ONCFS)

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla bernicla*)**1998-1999 : 99****1999-2000 : 106**

Espèce nicheuse dans l'ouest de la Sibérie.

Hivernante et migratrice commune sur l'ensemble de la côte vendéenne avec 2 grands pôles que sont l'ensemble baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et l'ensemble baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 8 367 dont 6 625 en baie de Bourgneuf et 1 126 en baie de l'Aiguillon

- janvier 2000 : 8 473 dont 4 026 en baie de Bourgneuf et 3 574 en baie de l'Aiguillon

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	80 ind. le 21/09, baie de Bourgneuf (LPO)	3 ind. le 24/05, lagune de Bouin (A. & J.Grn)
Hiver 1999-2000	24/09, La Paracou, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)	Env. 150 ind. le 19/03, baie de l'Aiguillon (J. & P.Ada)

1 ou 2 ind. présents sur tout l'été sur l'île de Noirmoutier (LPO Noi).

BERNACHE À VENTRE CLAIR (*Branta bernicla hrota*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 3/1**

Sous-espèce de la Bernache cravant nichant au Groenland et au Spitzberg, soumise à homologation départementale.

7 ind. du 18 au 23/09/99 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (G.Bes).

OUETTE D'ÉGYPTE (*Alopochen aegyptiacus*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 1/1**

Espèce nicheuse en Turquie, dans la péninsule arabique et au Maroc. Population férale en Europe (Pays-Bas, Grande-Bretagne...)

1 ind. le 12/03/00 dans les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

TADORNE CASARCA (*Tadorna ferruginea*)**1998-1999 : 24/9****1999-2000 : 4/2**

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheur en Afrique subsaharienne (Haute-Egypte), introduit en Europe occidentale. Populations férales bien établies en Grande-Bretagne, Belgique, aux Pays-Bas et en France.

Les observations françaises concernent très certainement des oiseaux échappés de captivité ou issus de populations férales.

- 3 ind. le 03/09/98 sur la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer (A.Tho *et al.*),- 2 ind. du 04/12/98 au 30/01/99 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (A.Tho *et al.*),

- 1 juv. le 04/09/98 sur la station d'épuration de Saint-Michel-en-l'Herm (J.Gon et D.Bro),

- 1 à 2 ind. du 09/02/99 au 01/06/99 puis du 10 au 24/08/99 sur les marais d'Olonne (ONCFS, M.Bib, D.Des *et al.*).

- 2 ind. le 16/03/98 en baie de l'Aiguillon (ONCFS),

- 1 ind. le 06/04/99 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier (LPO Noi),

- 2 ind. les 21 et 27/08/99 et le 03/09/99 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (A.Riv, L.Gri & S.Mér).

A la suite de l'ouverture de la chasse (?), seul 1 ind. blessé sera observé le 05/09/99.

- 1 ind. les 06 et 13/09/99 sur la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer (S.Vri, ONCFS).

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)**1998-1999 : 157****1999-2000 : 163**

Nicheur de la côte landaise à la Scandinavie, localisé en Méditerranée et plus répandu autour de la Mer Noire et plus à l'Est. Sur la façade atlantique, les populations nordiques effectuent de petites migrations. Zone d'hivernage jusqu'en Afrique du Nord.

En Vendée, nicheur localisé sur l'ensemble de la côte.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 11 195 dont 7 810 en baie de l'Aiguillon (1^{er} site français) et 2 592 en baie de Bourgneuf

- janvier 2000 : 4 512 dont 3 200 en baie de l'Aiguillon et 774 en baie de Bourgneuf.

CANARD CAROLIN (*Aix sponsa*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 2/1**

Espèce originaire d'Amérique du Nord. Tentatives d'établissement de populations férales peu réussies en Grande-Bretagne et en Allemagne. Souvent des oiseaux échappés de captivité.

1 mâle les 23/09 et 11/10/99 dans les marais d'Olonne (ONCFS).

CANARD MANDARIN (*Aix galericulata*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce originaire d'Asie orientale. Population férale bien établie en Grande-Bretagne (sud de l'Angleterre) et souvent échappés de captivité.

1 couple le 13/12/1998 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)**1998-1999 : 80****1999-2000 : 81**

Canard nichant principalement en Scandinavie, en Sibérie occidentale, en Angleterre et en Islande. Hiverné dans toute l'Europe et en Afrique du Nord.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	1 fem. le 17/08, marais de la Cochetière, Olonne-sur-Mer (D.Des)	1 couple le 14/04, station d'épuration de Noirmoutier (LPO Noi).
Hiver 1999-2000	2 ind. le 25/08, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (J.Gon <i>et al.</i>)	1 mâle le 01/05, marais Montportreau, Les Sables-d'Olonne (M.Bib).

Observé un peu partout en hiver et noté surtout en migration pré-nuptiale sur toutes les zones humides vendéennes en groupes allant en moyenne de 1 à 70 ind. Un maxi a été noté le 04/03/00 avec 215 ind. à Beauvoir-sur-Mer (F.Fig).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 1 704 dont 837 en baie de l'Aiguillon

- janvier 2000 : 3 156 dont 1 800 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (1^{er} site français) et 1 145 en baie de l'Aiguillon

CANARD À FRONT BLANC (*Anas americana*)**1998-1999 : 10/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation nationale.

Niche en Amérique du Nord et hiverné en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

9 observations d'un mâle de 1^{ère} année du 02 au 16/04/1999 dans le marais des Loirs à Olonne-sur-Mer (D.Des, P.Yés). Donnée homologuée par le CHN (Ornithos 10-2).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)**1998-1999 : 45****1999-2000 : 69**

Nicheur localisé en Europe de l'Ouest, plus abondant en Europe de l'Est et en Russie du Sud ouest.

Deux nichées ont été vues le 01/06/00 sur la station d'épuration de Noirmoutier (LPO Noi).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	1 le 15/08, étang des Mattes, St-Gervais (S.Bot & S.Vri)	3 ind. le 14/04, terrains LPO, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)
Hiver 1999-2000	5/08 : 1 ind., station d'épuration de La Tranche-sur-Mer (J.Gon) et 1 ind., étang des Rochettes, Rocheservière (L.Gri)	4 ind. le 30/06, étang des Rochettes, Rocheservière (L.Gri)

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 40 dont 28 en baie de l'Aiguillon

- janvier 2000 : 191 dont 137 sur les communaux du marais Poitevin

Le maximum concerne la présence de 119 ind. en baie de Bourgneuf le 18/11/98 (comptage mensuel, LPO).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)**1998-1999 : 118****1999-2000 : 111**

Nicheuse dans tout le nord de l'Europe et la Russie.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 4 204 dont 2 133 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré et 837 en baie de l'Aiguillon

- janvier 2000 : 11 629 dont 10 800 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (2^e site français). Il est possible que cet effectif soit lié à un report d'individus d'autres sites vers la Réserve, suite à la marée noire de l'Erika**SARCELLE À AILES VERTES (*Anas carolinensis*)****1998-1999 : 3/1****1999-2000 : 2/2**

Espèce nord américaine (anciennement sous-espèce de la Sarcelle d'hiver) soumise à homologation nationale.

Presque toutes les données proviennent de la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré :

- 2 ad. au moins du 01/01/99 au 25/01/99 (J-Y.Fré, A.Lar, A.Tho *et al.*, D.Des & F.Por).

- 1 mâle ad. le 16/02/00 (J.Gon)

1 ad. le 19/11/99 dans le marais de Champclou à L'Ile-d'Olonne (M.Fou, O.Gir & P.Tro).

Observations homologuées par le CHN (Ornithos 7-4, Ornithos 9-1)

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*)**1998-1999 : 313****1999-2000 : 266**

Nicheur, migrateur, hivernant.

Le plus commun des anatidés, l'espèce est présente et se reproduit sur l'ensemble du département.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 13 102 dont 5 510 en baie de l'Aiguillon et 5 175 en baie de Bourgneuf

- janvier 2000 : 9 652 dont 5 250 en baie de l'Aiguillon et 2 115 en baie de Bourgneuf

CANARD PILET (*Anas acuta*)**1998-1999 : 56****1999-2000 : 89**

Nicheur en Grande Bretagne, nord de la France, pays du Nord de l'Europe, en Scandinavie, Islande et Russie.

Hivernant et migrateur régulier sur l'ensemble du département, en petits groupes de 1 à 20 ind. en moyenne.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	2 mâles le 20/08, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (J.Gon)	1 mâle le 16/05, communal de Triaize (J. & P.Ada)
Hiver 1999-2000	12 ind. le 03/09, réserve de Chanteloup, L'Ile-d'Olonne (E.LeR)	1 couple le 16/04, communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon)

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 5 600 dont 5 115 en baie de l'Aiguillon (1^{er} site français)- janvier 2000 : 1 856 dont 1 115 en baie de l'Aiguillon (2^e site français), 340 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré et 325 dans les marais d'Olonne

Autres maxis : 304 ind. le 09/03/99 au Grand Mothais à Champagné-les-Marais (J-P.Gué & C.Gon), 227 le 01/03/00 sur le communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon).

Pas d'indice de nidification en 1999 et 2000 malgré la présence de quelques couples.

CANARD PILET DES BAHAMAS (*Anas bahamensis*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce originaire des Antilles, des Galapagos, de l'Amérique du Sud.

Echappé de captivité. 1 ind. le 24/08/99 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (F.Sem & S.Vri).

SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*)**1998-1999 : 45****1999-2000 : 45**

Espèce migratrice, nicheuse sur l'ensemble de l'Europe et de la Russie, hivernante en Afrique tropicale.

Nicheuse localisée dans les marais Breton et Poitevin en nombre restreint :

1999 : 2 à 4 couples dans les marais de la Vie (G.Bes), 1 couple au communal de Triaize (J & P.Ada) et 1 famille à la station d'épuration de Beauvoir-sur-Mer (F.Sig).

2000 : 6 couples dans les marais de la Vie (G.Bes) ; 3 couples à Beaumont, Champagné-les-Marais (J-P.Gué) ; une famille au Perrier (G.Bes) et 1 couple près du communal de Triaize (J & P.Ada).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1999	1 m. et 3 fem. le 14/02, lac de Maché-Apremont (A.Gér)	1 le 13/10, marais d'Olonne (ONCFS)
Saison 2000	25/02 : 2 m. et 2 fem., île de Charrouin, Vix (C.Gon) et 5 m. et 2 fem., communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon).	1 ind. le 23/09, marais de la Vie (G.Bes)

SARCELLE À AILES BLEUES (*Anas discors*)

1998-1999 : 11/1

1999-2000 : 0/0

Niche en Amérique du Nord et hiverne en Amérique centrale et du Sud.

1 mâle adulte du 03/03 au 16/03/99 sur le communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon, M.Cau *et al.*). Donnée acceptée par le CHN (Ornithos 7-4).

SARCELLE CANNELLE (*Anas cyanoptera*)

1998-1999 : 0/0

1999-2000 : 1/1

Espèce originaire d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et du Sud.

1 mâle adulte le 16/02/00 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.Gon).

Cette espèce n'entre pas dans la liste française des espèces soumises à homologation, ni dans la catégorie D (espèces dont l'origine sauvage n'est pas établie) mais le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace au cas où des éléments nouveaux concernant leur statut apparaîtraient.



Canard souchet (Anas clypeata). Photo © Frédéric SIGNORET / LPO

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)

1998-1999 : 154

1999-2000 : 167

Commun sur les étendues d'eau de plaine, les prairies marécageuses ou inondées de l'ensemble de l'Europe et de la Russie.

En Vendée, le Canard souchet est nicheur, migrateur et hivernant.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 378 dont 143 en baie de l'Aiguillon

- janvier 2000 : 1 094 dont 740 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré

Autres maxis : 200 ind. le 22/02/99 sur l'étang des Mattes à Saint-Gervais (F.Sig), 250 le 18/03/99 en baie de Bourgneuf/ Noirmoutier (comptage mensuel, LPO), 311 sur la lagune de la Belle Henriette à La Faute-sur-Mer (J.Gon).

Des couples reproducteurs sont notés dans les marais de la Vie (G.B), sur les terrains LPO à Champagné-les-Marais (J-P.Gué), dans les marais de Bouin et de Beauvoir-sur-Mer (F.Sig), à la station d'épuration de Noirmoutier (LPO Noi).

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*)

1998-1999 : 2/2

1999-2000 : 5/1

Nicheur méditerranéen, en vallée du Rhône, dans les pays d'Europe de l'Est et dans le sud-ouest de la Russie.

1998-1999 : 1 femelle le 19/07/99 dans les marais de la Vie (G.Bes) et 1 femelle le 13/08/99 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (A.Riv).

1999-2000 : 1 mâle du 20/01 au 02/03/00 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Genusson (L.Gri & S.Mér).

CANARDS PLONGEURS (Lucien GRILLET)

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)

1998-1999 : 111

1999-2000 : 108

Migrateur, hivernant, nicheur rare.

Présent toute l'année sur les étangs du bocage et les stations d'épuration de la côte et de Noirmoutier.

Les principales concentrations d'hivernants ont été signalées le 22/01/99 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (118 ind., L.Gri & S.Mér), le 01/02/99 au Parc Soubise à Mouchamps (43 ind., T.You), le 06/09/99 à l'étang des Rochettes à Rocheservière (42 ind., L.Gri) et le 18/11/98 sur la station d'épuration de Noirmoutier (51 ind., LPO).

A partir de mai on ne mentionne plus que des mâles sur les étangs du bocage, en juillet les femelles et les immatures réapparaissent. Pourtant, aucun indice de nidification certaine n'est signalé en Vendée.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 261 ind. dont 196 sur les lacs et étangs du bocage

- janvier 2000 : 150 ind.

FULIGULE À BEC CERCLÉ (*Aythya collaris*)

1998-1999 : 3/1

1999-2000 : 2/1

Espèce soumise à homologation nationale.

Espèce nord-américaine, occasionnelle en Europe de l'Ouest, où elle semble fidèle à ses sites d'hivernage.

Les observations concernent à chaque fois 1 mâle adulte :

- du 16/01/99 au 22/02/99 au Parc Soubise à Mouchamps (T.You), données homologuées (Ornithos 7-4).
1 donnée non homologuée le 27/02.

- du 23 au 30 janvier 2000 au Parc Soubise à Mouchamps (T.Per), données homologuées (Ornithos 9-1).

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)

1998-1999 : 76

1999-2000 : 71

Nicheur rare, migrateur, hivernant.

Présent toute l'année sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson, le lac d'Albert à Xanton-Chassenon, les étangs du Parc Soubise à Mouchamps et la station de lagunage de Noirmoutier. Observé plus rarement ailleurs dans le bocage, uniquement l'hiver.

Les maxima sont observés aux Boucheries, au printemps avec 25 ind. le 04/06/99 et en hiver avec 40 ind. le 18/02/00.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 21 ind.

- janvier 2000 : 51 ind.

	Première observation (hors Boucheries)	Dernière observation (hors Boucheries)
Hiver 1998-1999		20/03, Parc Soubise, Mouchamps (T.You)
Hiver 1999-2000	12/08, étang des Mattes, Saint-Gervais (M.Cos)	25/03, Station d'épuration, Luçon (X. & M-P.Hin)

Plusieurs couples se sont reproduits à l'étang des Boucheries en 1999 et 2000.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)**1998-1999 : 2/2****1999-2000 : 25**

Hivernant et migrateur.

Observé d'octobre à mars, le plus souvent en mer à proximité des côtes, mais aussi dans les marais d'Olonne et sur les stations d'épuration de l'île de Noirmoutier. Une observation de 21 ind. le 10/02/00 à la station d'épuration de Barbâtre (M.Cos), un effectif total de 18 le 17/02/00 en baie de Bourgneuf (LPO).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 2 ind.

- janvier 2000 : 14 ind.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999*		01/02, plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer (A.Aud)
Hiver 1999-2000	17/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)	11/03, station d'épuration, Barbâtre (LPO 86)

* seulement 2 données.

EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*)**1998-1999 : 53****1999-2000 : 38**

Migrateur, hivernant, estivant, nicheur rare.

Observé toute l'année sur les côtes, parfois en groupes notables : 30 ind. le 30/11/98 aux Conches à Longeville (J. & P.Ada), 50 le 14/06/99 à l'île du Pilier (LPO Noi).

A niché en 1999 à l'île du Pilier (5 nichées). Aucun indice de reproduction en 2000, probablement suite à la marée noire de l'Erika.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 31 ind.

- janvier 2000 : 4 ind.

Espèce particulièrement touchée par la marée noire : suite au naufrage de l'Erika, une soixantaine d'oiseaux ont été collectés.

HARELDE BORÉALE (*Clangula hyemalis*)**1998-1999 : 22/7****1999-2000 : 4/3**

Migratrice, hivernante peu commune.

En 1998 et 1999, les observations, d'un seul oiseau à chaque fois, proviennent de : Brétignolles-sur-Mer (22/12/98, C.Bro), l'île d'Yeu (du 25/12/98 au 02/01/99, X. & M-P.Hin ; 19/12/99, J.Sou), La Tranche-sur-Mer (du 09/01/99 au 24/01/99, A.Tho *et al.*), Noirmoutier (du 24/01/99 au 22/04/99, LPO Noi *et al.*) et de la région des Sables-d'Olonne (04/01/99, D.Des ; 27/04/99, D.Des ; 18/06/99, M.Bib).

En 2000 deux oiseaux puis trois sont signalés à la plage des Marines à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	22/12, La Gachère, Brétignolles-sur-Mer (C.Bro)	18/06, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)*
Hiver 1999-2000	19/12, île d'Yeu (J.Sou)	18/03/, plage des Marines, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

* donnée la plus tardive du fichier LPO

Une observation inhabituelle d'un oiseau en vol le 18/06/99 aux Sables-d'Olonne (M.Bib).

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*)**1998-1999 : 49****1999-2000 : 57**

Migratrice et hivernante.

Observable surtout de septembre à mars, en mer, sur la plupart des côtes, les plus fortes concentrations (1 000 à 3 000) sont signalées au large de la plage de la Terrière en décembre et janvier.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 6 942 individus (3^e site français)- janvier 2000 : 4 731 individus (2^e site français)

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999		22/05, plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer (J.Gon)
Hiver 1999-2000	14/08, pointe des Corbeaux, Ile d'Yeu (X. & M-P.Hin)	15/04, pointe des Corbeaux, Ile d'Yeu (X. & M-P.Hin)

Quelques observations d'estivage : 3 en vol le 14/08/99 à l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin) et 2 le 08/07/00 à La Chaume, aux Sables-d'Olonne (M.Bib).

Comme l'Eider, la Macreuse noire a payé un lourd tribut à la marée noire : au moins 805 oiseaux ont été collectés sur toute la côte vendéenne entre décembre 1999 et mars 2000 (voir aussi introduction).



Macreuses noires (Melanitta nigra). Dessin © Benoît PERROTIN

MACREUSE A BEC JAUNE (*Melanitta nigra americana*)

1998-1999 : 1/1

1999-2000 : 0/0

Sous-espèce de la macreuse noire, soumise à homologation nationale.

De passage occasionnel en Europe de l'ouest, originaire d'Amérique du nord et du nord-est de l'Asie.

Une observation d'un mâle le 15/03/99 à Bouin (O.Gir / ONCFS).

Donnée homologuée en 2000 par le CHN (Ornithos 7-4).

MACREUSE À FRONT BLANC (*Melanitta perspicillata*)

1998-1999 : 4/1

1999-2000 : 2/1

Espèce soumise à homologation nationale.

Migratrice occasionnelle, originaire d'Amérique du nord.

Une femelle immature signalée par de nombreux observateurs du 29/12/98 au 30/01/99 au large de la plage de la Terrière à La Tranche-sur-Mer. Données homologuées (Ornithos 6-4).

Deux mâles adultes ont été observés le 05/12/99 (A.Tho & P.Tro). Donnée homologuée en 2001 (Ornithos 9-1).

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*)

1998-1999 : 6

1999-2000 : 8/4

Migratrice, hivernante.

Observée en petit nombre de septembre à mars, en mer, depuis les plages du sud du département, de La Faute-sur-Mer à Saint-Hilaire-de-Riez. Une concentration de 15 individus est signalée le 25/03/00 au large de la plage des Marines, à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 7 individus

- janvier 2000 : 7 individus

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	3 ind. le 22/09, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (Eq. Pointe)	16 ind. le 01/02, plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer (A.Aud)
Hiver 1999-2000	7 ind. le 05/12, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	15 ind. le 25/03, plage des Marines, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

GARROT À OEIL D'OR (*Bucephala clangula*)

1998-1999 : 18

1999-2000 : 17

Hivernant et migrateur peu commun.

Observé en mer, sur les plans d'eau proches du littoral et aussi quelques étangs du bocage, en petit nombre (1 à 6). Il s'agit souvent de femelles. Un groupe de 6 (5 femelles et 1 mâle) est signalé le 12/01/99 et le 30/01/99 dans les réservoirs à poissons de la pointe de l'Aiguillon (C. & J.Gon).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	20/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)	15/02, baie de l'Aiguillon (ONCFS)
Hiver 1999-2000	15/10/, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)	17/03, baie de l'Aiguillon (ONCFS)

HARLE PIETTE (*Mergellus albellus*)

1998-1999 : 12/3

1999-2000 : 0/0

Migrateur et hivernant irrégulier.

Une femelle présente sur l'étang des Rochettes à Rocheservière, du 11/12/98 au 19/02/99 (L.Gri).

3 femelles et/ou imm. le 31/12/98 à l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri), puis 1 fem. au même endroit le 06/01/99.

1 femelle et 1 mâle les 27 et 28/02/99 à l'étang des Cosses, Saint-Martin-des-Noyers (M.Bib).

Aucune observation n'est parvenue au fichier pendant l'hiver 1999-2000.

HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*)

1998-1999 : 51

1999-2000 : 41

Migrateur, hivernant.

Présent régulièrement, généralement de novembre à avril, le long des côtes et sur les plans d'eau salée. Les observations concernent souvent plusieurs individus pêchant ensemble.

Le groupe le plus important (16 oiseaux) est signalé le 04/02/99 au large de la plage du Devin, à l'Epine (LPO Noi).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 53 ind.

- janvier 2000 : 21 ind.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	03/11, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (A.Aud)	16/04/, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)
Hiver 1999-2000	Dernière décade d'août, L'Herbaudière	19/04, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier (M.Vas)

HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*)

1998-1999 : 8/3

1999-2000 : 0/0

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur, hivernant peu fréquent.

Une femelle présente du 25/12/98 au 02/01/99 dans les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

Une femelle observée le 07/01/99 dans les marais de Beauvoir-sur-Mer (P.Rét).

Encore une femelle, du 26/01/99 au 19/02/99, sur le lac de Tanchet aux Sables-d'Olonne (D.Des, M.Bib). ,

ÉRISMATURE ROUSSE (*Oxyura jamaicensis*)**1998-1999 : 15/4****1999-2000 : 53/1**

Espèce soumise à homologation nationale.

Espèce nord-américaine, introduite en Europe.

Observée du 6 au 9 septembre 1998 sur la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer (J.Gon & A.Tho), données homologuées.

Un individu le 22/08/99 sur l'étang des Mattes à Saint-Gervais (J-Y.Fré & A.Lar).

Présente toute l'année en 1999 et 2000 sur les étangs des Boucheries (Les Landes-Génusson), où elle a niché au printemps 2000 (7 poussins) malgré les tirs de l'ONCFS.

La majorité des observations a été homologuée par le CHN en 1999 ou 2001 (y compris les données de reproduction, Ornithos 6-4 & 7-4).

RAPACES DIURNES (Sylvain VRIGNAUD)**BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*)****1998-1999 : 28****1999-2000 : 42**

Migrateur et nicheur

En période de reproduction, les bondrées sont observées dans tout le bocage à l'exception du haut bocage.

Deux indices de reproduction certaine ont été signalés :

- le 30/07/00 à Châteauneuf : 6 individus dont des juvéniles qui quémangent (A.Gér)
- le 22/07/00 à Vairé (M.Bib)

Observée en migration sur le restant du département sauf dans le haut bocage où aucun oiseau n'a été signalé pendant cette période.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		29/10, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq. Pointe)
Saison 1999	15/04, Mouchamps (D.God)	27/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)
Saison 2000	30/04, St-Gilles-Croix-de-Vie (G.Bes)	

MILAN NOIR (*Milvus migrans*)**1998-1999 : 87****1999-2000 : 102**

Migrateur et nicheur.

Présent sur tout le département à l'exception de l'île d'Yeu (aucune observation n'est parvenue au fichier).

Aucun indice certain de reproduction n'a été signalé, toutefois quelques observations laissent supposer une nidification :

- 3 ind. parquent le 31/05/99 à La Barre-de-Monts (F.Sig)
- 1 ind. "retapant son aire" le 26/03/00 à Dompierre-sur-Yon (A.Gér)
- 1 couple ayant un vol territorial le 08/07/00 à Saint-Denis-la-Chevassse (A.Gér)
- 1 individu ayant un vol territorial le 12/07/00 au Poiré-sur-Vie (A.Gér)

Quelques rassemblements sont notés, notamment à la pointe d'Arçay (La Faute-sur-Mer) le 06/06/99 (LPO 85) et le 25/03/00 (X. & M-P.Hin), avec à chaque fois plus de 10 individus en vol, et un total de 18 oiseaux en forêt de Mervent le 16/07/00 (A.Gér).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		06/09, étang des Boucheries, Les Landes-Genusson (L.Gri)
Saison 1999	11/03, Ile-d'Olonne (M.Fou)	18/08, Jard-sur-Mer (J.Gon)
Saison 2000	04/03, Nesmy (A.Gér)	

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)**1998-1999 : 16****1999-2000 : 11**

Migrateur et hivernant peu commun.

Observé de fin septembre à début avril, principalement dans les marais côtiers et dans le sud Vendée. La majorité des observations ont lieu d'octobre à début décembre et en février, ce qui correspond très certainement à des migrateurs.

Aucune donnée d'hivernage strict n'a été transmise pour cette période.

À noter 2 groupes observés en migration :

- 6 ind. en vol vers le sud le 06/12/98 à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
- 5 ind. en vol vers le sud le 14/11/99 à la pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999		20/03, déchetterie de Talmont-St-Hilaire (J.Clo)
Hiver 1999-2000	12/10, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)	08/04, St-Mars-la-Réorthie (S.Bar)

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*)

1998-1999 : 1/1

1999-2000 : 0/0

Espèce soumise à homologation départementale

Nicheur de l'est et du nord de l'Europe, hiverne en petit nombre en France (surtout dans le nord-est).

En Vendée, hivernant occasionnel.

1 ind. a été observé le 19/12/99 à Saint-Gervais (E.Mén).

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*)

1998-1999 : 37

1999-2000 : 24

Migrateur et nicheur probable.

Présent d'avril à septembre, surtout en période de migration. Les données proviennent notamment du sud Vendée (sur un secteur allant de Saint-Denis-du-Payré / La Tranche-sur-Mer à Nalliers-Mouzeuil, ainsi que sur la forêt de Mervent), des marais d'Olonne et du marais Breton.

À noter une observation d'un oiseau avec un serpent dans le bec le 20/06/00 à Jard-sur-Mer (B.Chi & J-M.Kop). Toutefois, les observateurs ne mentionnent pas s'il était en vol et la direction de celui-ci.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		05/09, Triaize (G.Bes & P.Rou)
Saison 1999	12/06, Bouin (E.Taq)	09/09, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)
Saison 2000	02/04, Bois-de-Céné (F.Sig)	

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)

1998-1999 : 211

1999-2000 : 268

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Observé quasi exclusivement dans les marais ainsi qu'à l'île d'Yeu. Il y a quelques rares données dans la plaine et dans le bocage concernant très certainement des migrateurs.

Nidification possible (parades) à :

- Olonne-sur-mer, le 18/01/99 (D.Des)
- Machecoul, le 15/03/99 (F.Sig)
- Le Poiré-sur-Velluire, le 24/04/99 (D. & M-T.Bro)
- Bouin, le 06/03/00 (C.Gir)
- L'île-d'Yeu, le 20/04/00, avec passage de proie en vol (X. & M-P.Hin)

Nidification certaine le 15/05/00 dans les marais de la Vie (Saint-Hilaire-de-Riez), avec 4 juvéniles à l'envol (G.Bes).

À noter un groupe de 11 individus (en dortoir ?) le 04/12/99 au niveau de la digue des Wagons à Triaize (C. & J.Gon).

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*)

1998-1999 : 93

1999-2000 : 75

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Noté sur tout le département (mais aucune donnée en provenance de l'île d'Yeu), avec une concentration des observations en mai-juin dans le bocage

Indices de nidification probable :

- 3-4 couples en forêt de Grasla (Les Brouzils) en 1999 (A.Gér)
- 1 couple à Bourneau en 1999 (D. & M-T.Bro)
- 1 couple à Sainte-Pexine en 1999 (S.Vri)
- 1 couple à Pissotte en 2000 (S.Bon)
- 1 couple à Mesnard-la-Barotière en 2000 (A.Gér)
- 1 couple à Saint-Denis-la-Chevasse en 2000 (A.Gér)

Rassemblement de 13 oiseaux constaté à la digue des Wagons (Triaize) le 10/10/98 (S.Vri).

BUSARD PÂLE (*Circus macrourus*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation nationale.

Migrateur occasionnel. Nicheur en Europe de l'est

Observation d'un juvénile le 21/08/99 à la pointe de l'Aiguillon (J-Y.Fré *et al.*).

Donnée homologuée par le CHN (Ornithos 7-4).

BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*)**1998-1999 : 78****1999-2000 : 108**

Migrateur et nicheur dans le marais Breton et Poitevin, dans la plaine ainsi que sur l'île de Noirmoutier. Nicheur probable dans le bassin de Chantonay.

Effectifs 1999 : 127 couples trouvés, dont 102 en marais Poitevin et plaine sud Vendée, 15 en marais Breton et 10 sur l'île de Noirmoutier. 95 jeunes à l'envol (dont 38 élevés en centre de soins).

Effectifs 2000 : 61 couples trouvés, dont 43 en marais Poitevin et plaine sud Vendée, 19 en marais Breton et 9 sur l'île de Noirmoutier. Au moins 88 jeunes à l'envol (dont 31 élevés en centre de soins).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		02/10, Triaize (J. & P. Ada)
Saison 1999	02/04, Ile d'Olonne (ONCFS)	12/10, Péault (J. & P. Ada)
Saison 2000	04/04, Marais Breton (F. Sig)	

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)**1998-1999 : 9****1999-2000 : 11**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Observé principalement dans le bocage et plus particulièrement dans les massifs forestiers.

3 observations dans le sud Vendée :

- 1 fem. le 22/09/98 à la pointe de l'Aiguillon (S. Mai, F. Mlt & J. Men)
- 1 juv. le 02/11/98 à la pointe de l'Aiguillon (A. Aud)
- 1 plumée d'Effraye des clochers le 27/01/00 à Vix (C. Gon)

Nidification probable ou certaine :

- Mouchamps en 1999 (T. You)
- La Réorthe en 1999 (A. Gér)
- Sainte-Florence en 2000 (A. Gér)
- Mesnard-la-Barotière en 2000 (A. Gér)

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)**1998-1999 : 119****1999-2000 : 95**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Observé sur tout le département (y compris à l'île d'Yeu).

Pourtant, peu de données de nidification probable ou certaine pour ces deux années :

- Aizenay en 2000 (A. Gér)
- Brétignolles-sur-Mer en 2000 (A. Gér)
- Les Landes-Génusson en 2000 (J. Gon, L. Gri, C. Mét)
- Noirmoutier-en-l'Île en 2000 (M. Vas)

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)**1998-1999 : 394****1999-2000 : 298**

Nicheuse, hivernante et migratrice partielle, présente toute l'année en Vendée.

Une seule donnée pour l'île d'Yeu : 1 ind. en vol vers le sud le 14/09/99 à la pointe des Corbeaux (X. & M-P. Hin).

De nombreux indices de nidification sont mentionnés à partir de mars.

À noter une observation de 19 individus à Nieul-sur-l'Autize lors de la fauche d'une prairie le 08/05/99 (G. Bes).

AIGLE BOTTÉ (*Hieraaetus pennatus*)**1998-1999 : 7/6 ou 7****1999-2000 : 4/4**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur, nicheur possible.

Observé principalement lors du passage postnuptial entre fin août et septembre.

Quelques observations en période de nidification méritent d'être soulignées :

- 2 ind. le 14/05/99 à Fonteclose à La Garnache (M.Bib)
- 1 ind. en phase sombre le 12/05/00 au rond-point forestier de Saint-Luc à Pissotte (J-P.Pai & L.Gri)
- 1 imm. le 06/08/00 au pont de la Taillée à Foussais-Payré (G.Bes)

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		22/09, pointe du Payré, Jard-sur-Mer (J. & P.Ada)
Saison 1999	08/05 (probable), Mervent (M.Bib)	24/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)
Saison 2000	12/05, Pissotte (J-P.Pai & L.Gri)	

*Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus). Dessin © Benoît PERROTIN***BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*)****1998-1999 : 44****1999-2000 : 70**

Migrateur, observé surtout lors de la migration postnuptiale, principalement en bordure de mer.

Une donnée à l'intérieur des terres : 1 ind. le 08/05/00 en vol avec une buse variable à La Flocellière (F.Pap).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		19/10, Olonne-sur-Mer (D.Des)
Migr. prénuptiale 1999*	08/04, L'Aiguillon-sur-Mer (C.Gir)	
Migr. postnuptiale 1999	30/07, Châteauneuf (A.Gér)	17/11, Marais d'Olonne (ONCFS)
Migr. prénuptiale 2000**	26/03, Olonne-sur-Mer (M.Bib)	16/05, La Faute-sur-Mer (ONCFS)
Migr. postnuptiale 2000	09/08, Ile-d'Olonne (ONCFS)	

* une seule donnée

** 5 données

Une femelle équipée d'un émetteur a été observée le 21/08/99 après-midi à l'observatoire de la réserve de l'Ile-d'Olonne (D.Des). Déjà contrôlée le matin en marais Breton, le lendemain elle était à 20 km au nord-est de Biarritz.

De même, 1 immature, lui aussi équipé d'une balise Argos posée en Ecosse, a stationné à Noirmoutier-en-l'Île du 02/09 au 02/10/99 (LPO Noi). Son voyage a été suivi via Internet : après avoir traversé le Sahara, il a atteint son site d'hivernage au Mali.

FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*) **1998-1999 : 404**
1999-2000 : 315

Migrateur partiel, présent dans tout le département y compris à l'île d'Yeu et en toute saison.
Reproduction constatée de mars à juin sur tout le département.

FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*) **1998-1999 : 0/0**
1999-2000 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.
Nicheur dans l'est de l'Europe, de passage occasionnel (nicheur occasionnel).
1 seule observation : 1 juv. le 18/07/00 à Franchauvet, Saint-Hilaire-des-Loges (G.Bes)
Il n'est pas exclu, vu la date, que la dernière observation concerne un individu né à proximité.

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*) **1998-1999 : 56**
1999-2000 : 55

Migrateur et hivernant, présent en Vendée (y compris à l'île d'Yeu) de septembre à avril.
La plupart des observations ont été faites dans les marais Breton et Poitevin et dans la plaine, à l'exception de 3 données :

- 1 ind. le 27/12/98 sur le lac de Maché-Apremont (O.All)
- 1 ind. le 14/01/99 à Saint-Vincent-sur-Graon (J. & P.Ada)
- 1 ind. le 12/11/99 aux Landes-Genusson (S.Mér)

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	24/09, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq. Pointe)	08/04, Angles (M.Bib)
Hiver 1999-2000	30/09, L'Aiguillon-sur-Mer (F.Dev & C.Mer)	15/03, Champagné-les-Marais (F.Por)

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*) **1998-1999 : 80**
1999-2000 : 94

Nicheur et migrateur.
Présent sur tout le département (y compris à l'île d'Yeu).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		21/10, Noirmoutier-en-l'Île (S.Per)
Saison 1999	23/03, Champagné-les-Marais (J-P.Gué)	17/10, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq. Pointe)
Saison 2000	20/04, Barbâtre (M.Vas & N.Pra)	

FAUCON INDÉTERMINÉ (*Falco sp*) **1998-1999 : 8/1 ou 2**
1999-2000 : 0/0

Du 11/11/98 au 09/01/99, un faucon d'une espèce indéterminé a été observé à la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (A.Tho, C.Bro, S.Vri, J-Y.Fré, A.Lar). Il s'agissait d'un faucon de grande taille (de type lanier) avec un plumage proche de celui-ci. Toutefois, son plumage particulier a fait que son identification était incertaine : s'agissait-il d'un faucon lanier au plumage atypique ou d'un hybride avec une autre espèce ? Dans tous les cas, aucun indice de ne laissait soupçonner un oiseau échappé de captivité.

Un oiseau du même type a été vu le 10/01/99 sur le communal du Poiré-sur-Velluire (C. & J.Gon). S'agissait-il du même oiseau ?

FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*) **1998-1999 : 46**
1999-2000 : 45

Migrateur et hivernant peu commun.
Présent chaque année en petit nombre, principalement dans les marais Breton et Poitevin.

5 observations en dehors des marais :

- 1 fem. le 22/11/98 à Saint-Hilaire-des-Loges (G.Bes)
- 1 ind. le 27/07/99 à Corpe (S.Vri)
- 1 ind. le 13/10/99 à la pointe de la Tranche, Ile d'Yeu (M-P.Hin, C. & S.Cou).
- 1 mâle le 08/01/00 à Fontenay-le-Comte (F.Sem)
- 1 fem. immature au Parc Soubise, Mouchamps (M.Bib)

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999		29/04, Bouin (F.Sig)
Hiver 1999-2000	27/07, Corpe (S.Vri)	03/05, Noirmoutier-en-l'Île (J-C.Lem)
Hiver 2000-2001	05/08, Notre-Dame-de-Monts (M.Bib)	

DES PERDRIX À L'OUTARDE CANEPETIERE (Christophe DRAPEAU)

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*)

1998-1999 : 31

1999-2000 : 23

Nicheuse sédentaire, dont les populations sont essentiellement issues de lâchers de repeuplement.

Notée partout dans le département, sauf à l'île d'Yeu.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*)

1998-1999 : 26

1999-2000 : 19

Nicheuse sédentaire, dont les populations sont essentiellement issues de lâchers de repeuplement.

Cependant, il subsiste peut-être une souche naturelle sur l'île de Noirmoutier.

Une seule mention de reproduction à La Guérinière.

CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*)

1998-1999 : 20

1999-2000 : 6

Nicheuse et migratrice.

Observé principalement dans le sud Vendée, quelques mentions dans le bocage et sur l'île d'Yeu.

Aucune donnée de nidification n'est parvenue, vraisemblablement lié à la discrétion et à la régression de l'espèce.

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*)

1998-1999 : 34

1999-2000 : 21

Nicheur sédentaire dont les populations sont essentiellement issues de lâchers de repeuplement.

Noté partout dans le département, y compris à l'île d'Yeu.

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*)

1998-1999 : 47

1999-2000 : 31

Nicheur, migrateur partiel, également signalé en hiver.

Présent dans toutes les zones humides du département, y compris celles des îles (Yeu et Noirmoutier).

Nidification observée le 06/09/99 à la Trottinière, commune de Dompierre-sur-Yon (F.Sem) et le 09/07/00 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (F-X.Roy).

Une grande partie des données parvenues sont des observations postnuptiales (août à novembre) et plus particulièrement sur la lagune de la Belle Henriette qui fait l'objet d'une forte pression d'observation par les ornithologues à cette époque. Quelques données d'hivernage nous sont parvenues sur la réserve naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'Île, sur la mare des Agaures aux Sables-d'Olonne, sur l'étang de la Sablière à L'Île-d'Elle ; sur la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer, sur les Bourbes de l'Allerie à Olonne-sur-Mer, sur l'étang de la Tesserie à La Pommerai-sur-Sèvre. Également une donnée sur l'aérodrome de Saint-Georges-de-Montaigu le 25/02/00 (A.Dor, W.Mai & F.Ram).

MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*) 1998-1999 : 7/3**1999-2000 : 4/3**

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheuse rare, migratrice partielle, observée principalement lors de ses migrations prénuptiale et postnuptiale.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998	<i>Pas de données</i>	
Migr. prénuptiale 1999	<i>Pas de données</i>	
Migr. postnuptiale 1999	2 ind., 25/07/99, terrains LPO, Beauvoir-sur-Mer (P.Rét)	1 ind., 29/09/99, la Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer (Eq.Pointe)
Migr. prénuptiale 2000	1 seule donnée en Vendée* : 1 ind., 27/05/00, étang de Beausoleil, La Bruffière (CPN Lolayo)	
Migr. postnuptiale 2000		

MARQUETTE DE BAILLON (*Porzana pusilla*)**1998-1999 : 2/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation nationale.

Migrateur assez peu commun en Vendée, elle est observée quasi-exclusivement lors de sa migration postnuptiale.

1 juv observé le 15/08/99 et le 20/08/99 sur la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer (A.Bar, Y.Fau *et al.*).

Donnée homologuée par le CHN (Ornithos 10-2).

MARQUETTE SP (*Porzana sp.*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 0/0**

1 individu observé le 07/08/99 dans les marais salants de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire (A.Lar).

GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*)**1998-1999 : 171****1999-2000 : 180**

Sédentaire

Présente toute l'année sur l'ensemble des mares, étangs, lacs et marais du département, y compris à l'île d'Yeu.

FOULQUE MACROULE (*Fulicra atra*)**1998-1999 : 218****1999-2000 : 188**

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Présente partout dans le département, de préférence sur les étendues d'eau douce (sauf à l'île d'Yeu).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 1 377

- janvier 2000 : 1 818

Importants rassemblements postnuptiaux :

- le 01/10/98, 920 individus sur l'étang des Mattes à Saint-Gervais (F.Sig)

- le 01/07/99, 1 400 individus sur l'étang des Boucheries aux Landes Génusson (L.Gri & S.Mér)

- le 07/07/00, 1 340 individus sur l'étang des Boucheries aux Landes Génusson

- le 16/08/00, 1 080 individus sur la station de lagunage de Noirmoutier (LPO Noi).

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*)**1998-1999 : 14****1999-2000 : 28**

Migratrice, et hivernante régulière en baie de l'Aiguillon.

Ailleurs, observé essentiellement lors de la migration postnuptiale.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	10/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)	07/02, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (J. & P.Ada)
Hiver 1999-2000	17/10, digue du Maroc, L'Aiguillon-sur-Mer (GODS)	08/04, communal du Poiré-sur-Velluire (J.Gon)

Peu d'observation hors du marais Poitevin et de la baie de l'Aiguillon :

- 6 ind. en vol le 23/11/98 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie puis environ 50 le 26/11 en passage nocturne à Saint-Hilaire-de-Riez et encore 1 ind. le 06/12 à St-Gilles-Croix-de-Vie (R.Tap)
- 18 ind. le 11/11/99 à Beaulieu-sous-la-Roche (CPN Linotte)
- 1 juv. le 02/04 et le 03/04/00 dans les marais d'Olonne (O.All, ONCFS)



Grues cendrées (Grus grus). Dessin © Benoît PERROTIN

OUTARDE CANEPETIÈRE (*Tetrax tetrax*)

1998-1999 : 5/4

1999-2000 : 9/3

Nicheuse très raréfiée, migratrice.

Niche encore dans la plaine de Nalliers et dans la plaine à la limite des Deux-Sèvres (Nieul-sur-l'Autize, Saint-Hilaire-des-Loges).

En 1999, 11 mâles et 1 femelle recensée.

En 2000, 6 mâles et 4 femelles localisés.

Aucun rassemblement postnuptial n'a été noté durant cette période et plus particulièrement sur le communal du Poiré-sur-Velluire qui comptabilisait 85 individus en 1989.

DE L'HUÎTRIER PIE AUX BÉCASSEAUX (Perrine DULAC)

HUÎTRIER PIE (*Haematopus ostralegus*)

1998-1999 : 87

1999-2000 : 70

Hivernant et migrateur (quelques estivants, nicheur uniquement sur l'île du Pilier).

Présent sur tout le littoral, y compris à l'île d'Yeu, mais principalement en baie de Bourgneuf.

Effectif maximal observé pour ces deux années : environ 7 000 ind. le 19/12/98 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (R.Tap).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 1999 : 3 082 dont 2 355 en baie de Bourgneuf et 727 en baie de l'Aiguillon

- janvier 2000 : 3 001 dont 2 070 en baie de Bourgneuf et 931 en baie de l'Aiguillon

Jusqu'à 1000 ind. observés à la pointe d'Arçay en octobre 1998 (C.Gon *et al.*).

Nidification : 2 ind. ayant un comportement territorial le 08/06/00 (LPO Noi).

1 individu égaré dans les terres le 30/12/99, probablement amené par la tempête, observé sur le communal de Baude à Montreuil (C.Gon)

ÉCHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*)

1998-1999 : 112

1999-2000 : 81

Nicheuse et migratrice.

Niche dans les marais côtiers de Bouin à l'Aiguillon-sur-Mer.

Au dernier recensement des limicoles nicheurs, 349 à 396 couples ont été dénombrés en Vendée (premier département français !).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		2 ^e décade d'octobre, St-Hilaire-de-Riez
Saison 1999	3 ind. le 09/01, St-Denis-du-Payré (A.Tho, A.Lar & J-Y.Fré) puis arrivées le 10/03, La Barre-de-Monts (F.Sig)	08/10, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)
Saison 2000	12/03, Beauvoir-sur-Mer (C. & J.Ler)	

La date du 9 janvier est exceptionnelle (date la plus précoce de la base de données). L'arrivée habituelle des échasse se situe autour du 10 mars.

Premiers signes notés de nidification :

- en 1999, 1^{ère} décade d'avril, Saint-Hilaire-de-Riez, puis 1^{er} poussin le 15/05 à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).
- en 2000, 2^e décade d'avril, Saint-Hilaire-de-Riez, puis 11 poussins le 21/05 à Noirmoutier (L.Dev)

58 ind. observés le 30/07/2000 à la pointe du Devin, Noirmoutier (T.You).

Quelques lectures de bagues en marais Breton : il s'agit d'individus bagués poussins en 1992 à La Barre-de-Monts et à Bouin.

AVOCETTE ÉLÉGANTE (*Recurvirostra avoetia*)

1998-1999 : 123

1999-2000 : 127

Nicheuse, hivernante, migratrice.

Présente dans les marais côtiers, de Bouin à l'Aiguillon-sur-Mer.

Nicheuse dans le marais Breton, à Noirmoutier, dans les marais de la Vie, dans les marais d'Olonne et de la Guittière.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 9 618 dont 7 723 en baie de l'Aiguillon
- janvier 2000 : 5 600 dont 3 391 en baie de l'Aiguillon

L'effectif nicheur au dernier recensement est de 521-583 couples (premier département français).

Premiers indices de nidification :

- en 1999, 1^{ère} décade d'avril, marais de la Vie ; 1^{er} poussin observé le 12/05 à Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)
- en 2000, 2^e décade d'avril, marais de la Vie ; 1^{ers} poussins le 10/05 à La Barre-de-Monts (C.Gir).

Plus de 5 000 ind. le 17/02/00 à la digue des Wagons, Triaize (J.Gon).

Peu de données de la baie de l'Aiguillon.

Quelques rares individus à l'intérieur des terres :

- sur l'étang des Boucheries, aux Landes-Genusson : 1 ind. du 13/11 au 27/11/98 (L.Gri & S.Mér)
- sur le lac de Maché-Apremont : 3 ind. le 26/08/00 (M.Cos).

ŒDICNÈME CRIARD (*Burhinus oedicanus*)

1996-1997 : 25

1997-1998 : 45

Nicheur, migrateur, hivernant rare.

Présent essentiellement dans la plaine du sud Vendée et le haut-bocage (parfois dans les dunes). Les effectifs sont mal connus, sauf sur les rassemblements postnuptiaux :

- 134 le 19/09/98 à Bazoges-en-Paillers (S.Rap)
- au moins 75 le 22/08/99 à Saint-Martin-des-Tilleuls (S.Rap)

Une seule preuve de nidification pour la période : 1 nid dans un champ le 10/06/00 à Ardelay aux Herbiers (M.Bib).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		2 ^e décade d'octobre, Luçon
Saison 1999	27/03, entendus à Péault (J. & P.Ada)	15/09, 8 ind., l'Androdière, Les Herbiers (S.Rap)
Saison 2000	21/03, 1 ind. entendu à Péault (J. & P.Ada)	

GLARÉOLE A COLLIER (*Glareola pratincola*)

1998-1999 : 0/0

1999-2000 : 2/1

Espèce soumise à homologation départementale.

De passage occasionnel, c'est le deuxième cas signalé dans la base de données (la première observation datant de juillet 1994).

Niche dans le sud de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du nord. Hiverné au sud du Sahara.

1 ind. observé sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré les 25 et 26/04/2000 (ADEV).

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)**1998-1999 : 29****1999-2000 : 26**

Nicheur peu commun, migrateur.

Présent principalement sur la côte, mais aussi dans le bocage. En 2000, plusieurs nicheurs dans le bocage.

Effectifs nicheurs en Vendée au dernier recensement (enquête limicole nicheur 1995-1996) : moins de 20 couples.

Des preuves de nidification ont été notés :

- en 1999 à Saint-Hilaire-de-Riez (marais de la Vie, G.Bes), à Moutiers-sur-le-Lay (S.Vri)
- 2000 à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes), à La Meilleray-Tillay (S.Bar) et à Pouzauges (S.Bar)

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		22/09, marais d'Olonne (S.Mai, F.Mlt & J.Men)
Saison 1999	28/02, lac de Maché-Apremont (A.Gér)*	11/10, marais Cadrit, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 2000	11/03, étang du Moulin Bonnet, Pouzauges (S.Bar)	

* donnée la plus précoce de la base de données de la LPO Vendée.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*)**1998-1999 : 133****1999-2000 : 135**

Hivernant, migrateur, quelques estivants.

Présent sur le littoral (y compris l'île d'Yeu) et dans les marais (et sur les étangs du bocage lors de la migration).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 55
- janvier 2000 : 351 dont 294 en baie de Bourgneuf

Maxima pour la période : 460 le 26/08/99 au port du Collet, Bouin (J-B.Rou & T.You) et 1 183 sur l'ensemble de la baie de Bourgneuf ce jour-là.

Très peu de données dans le bocage, sauf sur le lac de Maché-Apremont où il est régulier en migration postnuptiale. Sinon une seule donnée le 22/08/00 sur l'étang des Rochettes, à Rocheservière (L.Gri).

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*)**1998-1999 : 27****1999-2000 : 27**

Nicheur, migrateur, hivernant rare.

Présent sur tout le littoral. Semble absente de l'île d'Yeu.

Le dernier recensement (enquête limicole nicheurs 1995-1996) fait état de moins de 25 couples en Vendée.

Peu d'indices de reproduction pour ces deux années :

- 1 couple noté sur la plage de la Terrière à La Tranche-sur-Mer le 22/05/99 (J.Gon)
- 1 ad. avec 2 poussins non volants le 03/09/99 à la pointe d'Arçay (A.Aud)
- 1 couple noté le 31/03/00 sur la lagune du Dain à Bouin (F.Sig)

Pourtant les nicheurs étaient probablement plus nombreux !

Maximum de 116 ind. observés le 05/09/99 à la pointe de l'Aiguillon (E.LeR).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		17/10, le Gois, Barbâtre (S.Per)
Saison 1999	2 ^e décade de mars, Beauvoir-sur-Mer	27/10, marais Cadrit, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 2000	11/03, pointe de l'Aiguillon (J. & P.Ada)	

Données d'hivernage :

- 2 ind. le 24/01/99 à La Tranche-sur-Mer (C. & J.Gon)
- 2 ind. le 17/02/00 à la pointe d'Arçay (ONCFS). Cette donnée correspond peut-être à un retour de migrateur...

Le milieu dans lequel cette espèce niche (haut de plage) et la période (l'été) en font une espèce très sensible aux dérangements.


**GRAVELOT MONGOL / DE LESCHENAULT (*Charadrius mongolus / leschenaultii*) 1998-1999 : 0/0
1999-2000 : 1/1**

Espèces soumises à homologation nationale.

De passage occasionnel en Europe, ces deux gravelots sont des espèces orientales (Asie centrale, Sibérie, Moyen-Orient, Afrique de l'Est, Australie...). Les deux espèces sont difficiles à différencier, surtout en plumage d'hiver.

1 ind. le 28/10/99 aux Sables-d'Olonne (O.Gir - ONCFS).

L'oiseau vu a été présenté comme un gravelot mongol, mais le CHN n'a pas tranché sur l'espèce (Ornithos 9-1).



Pointe de l'Aiguillon
Vendée
Gravelot mongol (Charadrius mongolus). Dessin © Alban LAROUSSE

**PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*) 1998-1999 : 1/1
1999-2000 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur rare (noté surtout lors de la migration postnuptiale). Niche essentiellement en Europe du nord, hiverne en Espagne et en Afrique du nord.

Observé dans la plaine, sur les dunes, dans le marais et à l'île d'Yeu (souvent sur l'aérodrome).

2 observations pour cette période :

- 2 juv. le 28/09/98 sur l'aérodrome de l'île d'Yeu (D.Des).

- 2 ind. en vol avec des pluviers argentés le 03/05/00 à la Gachère, Brétignolles-sur-Mer (M.Bib).

N.B. : l'espèce est probablement sous-prospectée en migration, notamment dans les dunes.

**PLUVIER BRONZÉ (*Pluvialis dominica*) 1998-1999 : 0/0
1999-2000 : 5/1**

Espèce soumise à homologation nationale.

Oiseau nord-américain, de passage occasionnel en Europe (principalement noté lors du passage postnuptial).

1 juv. présent du 12/10/99 au 27/10/99 dans les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes *et al.*). Donnée homologuée par le CHN (Ornithos 7-4).

**PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*) 1998-1999 : 90
1999-2000 : 46**

Hivernant et migrateur.

Observé un peu partout sur le département, même à l'île d'Yeu, mais surtout dans les marais.

Effectifs mal connus en raison de l'hivernage dans les terres.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 3 093

- janvier 2000 : 1 304

La majorité des oiseaux se trouve dans l'intérieur des terres ou dans les marais.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	19/09, lac de Maché-Apremont (A.Gér)	Encore 50 ind. le 16/03 en baie de Bourgneuf (LPO), puis quelques ind. çà et là sur la côte et sur le communal du Poiré-sur-Velluire jusqu'au 18/06*
Hiver 1999-2000	1 ind. le 26/08 au port du Collet à Bouin (J-B.Rou & T.You) puis 20 le 02/10 à la pointe de l'Aiguillon (F.Noë)	250 le 06/03 sur le communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon) puis 1 ind. le 03/04 sur le Gois à Barbâtre (M.Vas)

* date la plus tardive de la base... Estivage ??

Le communal du Poiré-sur-Velluire semble être un lieu habituel de rassemblement des hivernants : 1 500 en février 1999 et à nouveau 1 500 en décembre 1999 (C.Gon).

Peu de données dans le bocage et la plaine (sous-prospection probable) :

- régulier à l'étang des Boucheries (maximum 180 le 04/12/98, L.Gri & S.Mér)
- dans la plaine : 150 le 22/11/98 à Saint-Hilaire-des-Loges (G.Bes), 100 le 27/11/98 à Péault (J. & P.Ada)
- 1 le 19/09 puis le 28/11/98 sur le lac de Maché-Apremont (A.Gér, J.Gon)
- présent le 12/12/98 à Cugand (W.Mai)
- 300 le 01/02 à l'étang du Parc Soubise à Mouchamps (T.You)

PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*)

1998-1999 : 88
1999-2000 : 110

Hivernant, estivant régulier.

Observé sur le littoral, y compris sur l'île d'Yeu.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 3 387 dont 2 710 en baie de Bourgneuf
- janvier 2000 : 5 574 dont 3 825 en baie de Bourgneuf

Maximum de 4 000 oiseaux le 18/11/99 sur la lagune de Bouin (LPO) et 5 000 ind. le 05/12/99 au même endroit (F.Sig).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999		2 500 en baie de Bourgneuf le 14/04 (LPO), puis quelques individus jusqu'au 24/05 tout le long de la côte.
Hiver 1999-2000	1 le 18/08/99 au Marais Montportreau, Les Sables-d'Olonne (J.Gon)	Quelques ind. à la pointe de l'Aiguillon le 14/05 (L.Gri), puis estivage en baie de Bourgneuf
Hiver 2000-2001	Plus de 60 en vol à l'île d'Yeu le 13/08 (X. & M-P.Hin)	

Plusieurs dizaines d'individus ont estivé en baie de Bourgneuf en 1999 et en 2000 : 100 ind. le 18/07/99 sur le Gois à Barbâtre (J-C.Lem), 885 comptés dans la baie au mois de juillet 2000 (LPO).

Les pluviers ayant été touchés par la marée noire de l'Erika, il se peut que de nombreux individus n'aient pas migré cette année là.

VANNEAU SOCIABLE (*Chettusia gregaria*)

1998-1999 : 0/0
1999-2000 : 1/1

Espèce soumise à homologation nationale.

Migrateur occasionnel, observé surtout à l'automne.

Les nicheurs les plus proches se trouvent au nord de la mer Caspienne et migrent vers le sud par le Proche-Orient.

Un adulte observé dans les marais d'Olonne le 03/11/99 (J.Che).

Donnée homologuée par le CHN (Ornithos 7-4).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*)**1998-1999 : 282****1999-2000 : 279**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel (une partie de la population est sédentaire).

Présent partout (y compris à l'île d'Yeu) avec des effectifs importants dans les marais et nicheur dans les marais, les cultures, et probablement sur l'aérodrome de l'île d'Yeu.

Effectifs nicheurs (enquête limicole nicheurs 1995-1996) : entre 1 554 et 1 821 couples (dont 1 100 à 1 400 en marais Breton).

Pour la période 1998-2000, nicheur certain en marais Breton et Poitevin, dans les marais de la Vie, en baie de l'Aiguillon, à Brétignolles-sur-Mer et à l'île d'Yeu (aérodrome).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 25 944 dont plus de 17 000 sur les communaux du marais Poitevin

- janvier 2000 : 19 647 dont 11 600 sur les communaux du marais Poitevin

Quelques rassemblements importants :

- dans le bocage : 1 000 sur le lac de Maché-Apremont en novembre 1998 (J.Gon), 1 300 à l'étang des Boucheries lors de la vidange des étangs en décembre 1998 (L.Gri & S.Mér), 1 000 à Moutiers-les-Mauxfaits en janvier 1999 (J. & P.Ada), plus de 1 000 sur l'étang du Parc Soubise le 01/02/99 (T.You), environ 1 000 à Saint-Martin-de-Tilleuls le 26/01/00 (J-P.Nat)

- dans le marais et sur la côte : 3 000 sur le communal du Poiré-sur-Velluire le 21/12/98 et 3 500 l'année suivante (C. & J.Gon), plusieurs milliers (10 000 ?) sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré le 03/01/99 (J. & P.Ada), 7 500 à Champagné-les-Marais en janvier 1999 et 7 000 à la même époque en 2000 (J-P.Gué), 8 000 à La Tranche-sur-Mer le 04/12/99 (C. & J.Gon), 24 000 dans les marais d'Olonne le 25/02/00 (ONCFS)

Premiers indices de nidifications : premiers cantonnement pendant la 3^e décade de février au Poire-sur-Velluire et le 01/03/00 à Chasnais (J-P.Gué). Premiers poussins observés le 30/04/99 à Beauvoir-sur-Mer (F.Sig) et seulement le 22/05/00 sur le communal du Poiré-sur-Velluire ("gros poussins", C.Gon).

BÉCASSEAU MAUBÈCHE (*Calidris canutus*)**1998-1999 : 61****1999-2000 : 43**

Hivernant, estivant régulier.

Présent sur le littoral (y compris à l'île d'Yeu).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 3 305 dont 3 120 en baie de l'Aiguillon

- janvier 2000 : 2 010 dont 1 130 en baie de Bourgneuf

Effectifs maxima : 1 190 le 18/11/98 au port du Collet à Bouin (LPO), et 2 470 sur la lagune de Bouin le 03/02/00 (F.Sig).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999		900 ind. sur la lagune de Bouin le 29/04 (F.Sig), encore 40 ind. aux Sables-d'Olonne le 01/05 (G.Bul), encore présent le 24/05 sur la lagune de Bouin (A. & J.Grn)
Hiver 1999-2000	1 ad. nuptial le 13/07, pointe de l'Aiguillon (J.Gon), puis 50 le lendemain au Gois (J-C.Lem)	800 en baie de Bourgneuf le 17/05 (LPO), puis estivage*

*En 2000, individus observés en baie de Bourgneuf tout l'été (170 lors du comptage mensuel de juin).

BÉCASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*)**1998-1999 : 70****1999-2000 : 53**

Hivernant, estivant rare.

Présent sur le littoral (y compris à l'île d'Yeu).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 101

- janvier 2000 : 419

Les effectifs sont probablement en dessous de la réalité (difficulté de prospecter toutes les plages).

Effectifs maxima : 300 ind. à la pointe d'Arçay le 22/09/98 (Eq.Pointe), entre 300 et 400 au même endroit le 26/08/99 (J.Gon *et al.*)

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999		Encore 100 ind. le 11/05 sur la corniche de Sion (G.Bes) puis présent jusqu'à la 3 ^e décade de juin en baie de Bourgneuf
Hiver 1999-2000	20 ind. à Barbâtre le 22/08 (S.Hén)	23 ind. le 04/06, port du Collet, Bouin (C.Gir)
Hiver 2000-2001	2 ind. le 13/08 à l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin) puis 66 en baie de Bourgneuf 3 jours après (LPO)	

9 oiseaux mazoutés observés à l'île d'Yeu (Ker Châlon) les 28 et 29/12/99 (X. & M-P.Hin).

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ (*Calidris pusilla*)

1998-1999 : 1/1

1999-2000 : 6/2

Espèce soumise à homologation nationale.

Originaire d'Amérique du Nord, migrateur occasionnel, observé en général à l'automne.

3 individus sont passés en Vendée pendant la période 1998-2000 :

- 1 adulte le 15/08/99 à la pointe d'Arçay (A.Lar & P.Tro), donnée homologuée par le CHN (Ornithos 7-4).
- 1 juv. le 24/10/99 dans les marais Sablais, aux Sables-d'Olonne (F.Por). Donnée homologuée par le CHN (Ornithos 7-4).
- 1 ind. du 05/04/00 au 09/04/00 sur le marais Montporteau aux Sables-d'Olonne (J.Che, D.Des). Donnée homologuée par le CHN (Ornithos 9-1).

BÉCASSEAU D'ALASKA (*Calidris mauri*)

1998-1999 : 5/1

1999-2000 : 0/0

Espèce soumise à homologation nationale.

Originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord, migrateur très occasionnel.

1 juvénile présent du 9 au 12 septembre 1998 aux Sables-d'Olonne (D.Des *et al.*). Observations homologuées par le CHN (Ornithos 6-4).

Il s'agit là de la deuxième donnée vendéenne et de la troisième mention française.

BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*)

1998-1999 : 77

1999-2000 : 27

Migrateur, rare en période de reproduction et en hiver

Observé principalement dans les marais et le littoral (parfois sur les étangs du bocage).

Les effectifs sont mal connus. Les observations les plus nombreuses ont lieu en août-septembre.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		5 ind. le 29/10, Luzan, Noirmoutier (S.Per)
Migr. pré-nuptiale 1999	Hivernage	1 ind. le 23/05, marais de la Vie, Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Migr. postnuptiale 1999	42 ind. le 28/07, pointe d'Arçay (S.Vri)	1 ind. le 26/10, Marais Cadrit, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Migr. pré-nuptiale 2000*	2 ^e décade de mars, baie de l'Aiguillon	2 ind. le 26/04, Marais Montporteau, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)
Migr. postnuptiale 2000	2 ind. le 21/07, Marais des Loirs, Olonne-sur-Mer (M.Bib)	

* seulement 3 données

Hiver 1998-1999 :

- une quinzaine d'ind. sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J & P.Ada, C. & J.Gon)
- quelques ind. en baie de Bourgneuf (LPO)
- quelques ind. aux Sables-d'Olonne (D.Des)
- 1 ind. sur la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

Il est difficile de faire la part des choses entre les hivernants et l'arrivée des migrateurs.

Pas d'hivernage noté en 1999-2000.

Quelques observations dans l'intérieur des terres : jusqu'à 89 ind. sur le lac de Maché-Apremont en septembre-octobre 1998, 63 ind. sur la station d'épuration de Luçon en septembre 1998 (S.Vri), quelques ind. à Chasnaïs en mars 1999 (D.God), à nouveau quelques ind. sur le lac de Maché-Apremont (A.Gér, B.Mor) et sur la station d'épuration de Luçon (J.Gon, S.Vri) en août 1999.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*)

1998-1999 : 24

1999-2000 : 14

Espèce soumise à homologation départementale.

Rare mais régulier en période de migration postnuptiale (rarement pré-nuptiale), surtout dans les marais côtiers.

Niche dans le nord de l'Europe et hiverne sur le pourtour méditerranéen, en Italie, en Afrique du nord et au Moyen-Orient.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998	02/09, lac de Maché-Apremont (F.Por), et le même jour à la Guittière, Talmont-St-Hilaire (A.Aud)	27/09, lac de Maché-Apremont (F.Por)
Migr. pré-nuptiale 1999	1 seule donnée : 04/05, Marais Sablais, Les Sables-d'Olonne (D.Des)	
Migr. postnuptiale 1999	03/08, Réserve Naturelle, St-Denis-du-Payré (J.Gon, A.Tho <i>et al.</i>)	11/10, Marais Cadrit, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Migr. pré-nuptiale 2000	23/04, Marais Cadrit, Les Sables-d'Olonne (F.Por)	26/05, Réserve Naturelle, St-Denis-du-Payré (Ois mag)
Migr. postnuptiale 2000	12/08, base de loisirs, Luçon (M.Bib)	

BÉCASSEAU DE BONAPARTE (*Calidris fuscicollis*)

1998-1999 : 0/0

1999-2000 : 17/2

Espèce soumise à homologation nationale.

Oiseau originaire d'Amérique du Nord, de passage occasionnel en Europe.

Deux oiseaux différents observés en même temps en Vendée :

- 1 juv. présent du 23/10 au 29/10 dans les marais des Sables-d'Olonne et de l'île d'Olonne (J-Y.Fré, F.Por, Y.Tré, D.Des)
- 1 juv. présent du 27/10 au 30/10 à Saint-Hilaire-de-Riez dans les marais de la Vie (G.Bes *et al.*)

Données homologuées par le CHN (Ornithos 7-4).

BÉCASSEAU TACHETÉ (*Calidris melanotos*)

1998-1999 : 9/1

1999-2000 : 1/1

Espèce soumise à homologation nationale.

Oiseau originaire d'Amérique du Nord, de passage occasionnel.

Trois oiseaux en passage postnuptial :

- 2 juv. présents du 21/09 au 03/10/98 sur le marais salant de la Guittière, à Talmont-Saint-Hilaire (O.Gir-ONCFS *et al.*). Donnée homologuée par le CHN (Ornithos 6-4).
- 1 juv. le 19/09/99 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J-Y.Fré, A.Lar & P.Tro), donnée homologuée par le CHN (Ornithos 7-4).

BÉCASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*)

1998-1999 : 50

1999-2000 : 34

Migrateur, hivernant occasionnel.

Observé à chaque passage sur le littoral, dans les marais et parfois sur les retenues du bocage (6 observations sur le lac de Maché-Apremont entre le 05/09 et le 26/09/98 (A.Gér *et al.*), une observation au même endroit le 26/08/00 (M.Cos).

Quelques maxima :

- 19 ind. dont 18 juv. le 29/08/99 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier (E.LeR)
- 30 ind. sur le marais du Brin à Beauvoir-sur-Mer (T.You)
- une vingtaine d'ind. le 11/09/99 sur les terrains LPO à Beauvoir-sur-Mer (P.Rét)

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		04/10, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (J.Gon & J.Grn)
Migr. pré-nuptiale 1999*	01/05, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	30/06, Réserve Naturelle, Noirmoutier (LPO Noi)**
Migr. postnuptiale 1999	27/07, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	25/10, Marais Cadrit, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Migr. pré-nuptiale 2000	09/04, marais de Champclou, Olonne-sur-Mer (J.Gon)	04/06, lagune du Dain, Bouin (C.Gir)
Migr. postnuptiale 2000	18/07, lagune du Dain, Bouin (LPO)	

* trois données seulement

** donnée la plus tardive du fichier... un estivant ?

BÉCASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*)

1998-1999 : 31

1999-2000 : 31

Hivernant, migrateur.

Observé sur les rochers aux Sables d'Olonne, sur la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez, à L'Epine, sur l'île du Pilier au nord de Noirmoutier, dans quelques ports du sud et à l'île d'Yeu.

Les effectifs estimés sont compris dans une fourchette de 285 à 335 ind. (D.Des, *Ornithos* 8 (5) : 161-163).

Quelques maxima :

- 128 aux Sables-d'Olonne le 22/12/98 (C.Bro)
- 85 dans le port des Sables-d'Olonne le 06/03/99 (M.Bib)
- 80 sur la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez pendant tout l'hiver 1998-1999 (G.Bes)
- à nouveau 80 sur la corniche de Sion en décembre 1999 et en mars-avril 2000 (G.Bes)

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	29/10, Port Joinville, Ile-d'Yeu (A.Gér <i>et al.</i>)	17/05, la Paracou, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)
Hiver 1999-2000	15/10, plage de la Gournaise, Ile-d'Yeu (X. & M-P.Hin, C. & S.Cou)	23/05, la Paracou, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)

BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)

1998-1999 : 166

1999-2000 : 172

Hivernant et migrateur, quelques oiseaux estivent.

Observé principalement sur la côte (rarement à l'intérieur des terres), y compris à l'île d'Yeu.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 26 820 dont 13 760 en baie de Bourgneuf et 13 030 en baie de l'Aiguillon
- janvier 2000 : 37 685 dont 24 150 en baie de l'Aiguillon, 12 920 en baie de Bourgneuf et 615 dans les marais d'Olonne

Quelques observations dans le bocage (petits groupes réguliers sur le lac de Maché-Apremont - jusqu'à 40, étang des Boucheries aux Landes-Génusson, lac de Moulin Papon à La Roche-sur-Yon).

Les maxima observés :

- en 1998-1999 : 9 000 ind. sur la lagune de Bouin le 02/03/99 (F.Sig)
- en 1999-2000 : 8 000 ind. au même endroit le 09/02/00 (C.Gir)

Un ind. observé dans la fosse à lisier presque vide d'un élevage de canards à Mouzeuil-Saint-Martin (J-C.Lue)

BÉCASSEAU FALCINELLE (*Limicola falcinellus*)

1998-1999 : 0/0

1999-2000 : 1/1

Espèce soumise à homologation nationale.

Limicole rare et localisé du nord de l'Europe (niche dans les tourbières scandinaves, migre par l'est de l'Europe).

Migrateur occasionnel en Vendée.

1 seule observation homologuée (*Ornithos* 9-1), correspondant à 1 ind. observé le 14/05/00 dans les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

DU COMBATTANT VARIE AUX PHALAROPES (Emmanuel JOYEUX)

COMBATTANT VARIÉ (*Philomachus pugnax*)

1998-1999 : 84
1999-2000 : 43


Migrateur, hivernant rare.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		21/10, Bouin (F.Sig)
Migr. pré-nuptiale 1999	24/02, Le Poiré-sur-Velluire (C. & J.Gon)	18/06, St-Denis-du-Payré (J.Gon)
Migr. postnuptiale 1999	Dernière décade de juillet, marais Breton et Poitevin	10/10, Le Poiré-sur-Velluire (C. & J.Gon)
Migr. pré-nuptiale 2000	20/02, Bouin (F.Sig)	20/05, Réserve Naturelle, Noirmoutier (J-C.Lem)
Migr. postnuptiale 2000	Dernière décade de juillet, marais Breton, Olonne	

Le Combattant varié est observé quasiment tout au long de l'année, sauf en novembre et en décembre. Les zones préférentielles de fréquentation restent les zones humides et notamment les marais Breton et Poitevin.

Maxima :

- 18 ind. à Beauvoir-sur-Mer le 02/09/98 (F.Sig)
- 55 ind. sur les propriétés LPO de Champagné-les-Marais (J-P.Gué & C.Gon)
- 80 ind. dans les marais de la Vie le 01/05/99 (G.Bes) dont 30 ind. en plumage nuptial.



Combattants variés (*Philomachus pugnax*) et avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*). Dessin © Benoît PERROTIN

BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*)

1998-1999 : 9/7
1999-2000 : 6/5

Migratrice, hivernante probable.

Cette espèce est principalement signalée sur la bande côtière des marais Breton (terrain LPO à Beauvoir) et Poitevin (La Tranche-sur-Mer). Mais elle a également été observée plus à l'intérieur des terres, sur l'étang des Tourettes (S.Vri) et sur le lac de Maché (F.Por).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	15/11, station d'épuration, La Tranche-sur-Mer (J-M.Art)	25/04, terrains LPO, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)
Hiver 1999-2000	25/10, marais Cadrit, Les Sables-d'Olonne (D.Des)	05/03, la Boivrie, Challans (J-P.Pai & P.Tes)

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*)**1998-1999 : 144****1999-2000 : 135**

Nicheuse rare, migratrice, hivernante.

Principalement signalée dans les zones humides côtières et intérieures, elle est observable quasiment toute l'année dans le département. Cette espèce est par ailleurs nicheuse dans le marais Breton : individus observés en parade à Beauvoir-sur-Mer (F.Sig).

Les groupes les plus importants ont été observés lors de la migration post-nuptiale :

- dans les marais de La Tranche-sur-Mer (S.Vri), avec 25 ind. le 27/09/98

- dans les anciens marais salants de Champagné-les-Marais, avec 63 ind. le 06/09/99 (C. & J.Gon).

Lors de la migration pré-nuptiale, jusqu'à 40 ind. ont été vus le 02/03/00 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér).

BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)**1998-1999 : 14****1999-2000 : 6**

Nicheuse ?, migratrice et hivernante.

Cette espèce discrète est notée dans l'ensemble des espaces boisés du département. Il est difficile d'avoir une analyse fine de la phénologie de cette espèce tant les données disponibles sont peu nombreuses. Néanmoins, il semble que la présence de cette espèce aille d'octobre à mars.

BARGE À QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)**1998-1999 : 129****1999-2000 : 99**

Nicheuse, migratrice, hivernante.

Les populations nicheuses se retrouvent principalement dans les prairies humides des marais Poitevin et Breton avec près de 75 couples sur l'ensemble du département dont 45 en marais Breton. Les premiers cantonnements ont lieu dès fin mars.

Les populations hivernantes sont observées au niveau de la baie de l'Aiguillon (1^{er} site français pour l'hivernage de cette espèce avec 5 400 ind. en janvier 2000) et au niveau de la baie de Bourgneuf. Ces individus évoluent quasiment uniquement sur de vastes vasières intertidales.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 6 105 dont 5 479 en baie de l'Aiguillon

- janvier 2000 : 5 973 dont 5 572 en baie de l'Aiguillon

Lors des migrations postnuptiale et surtout pré-nuptiale, de forts effectifs peuvent être comptabilisés dans les zones de marais côtiers et vasières. 980 ind. ont été observés le 17/02/99 (J-P.Gué) à Champagné-les-Marais sur les acquisitions LPO, plus de 600 ind. le 05/03/00 sur les prairies de Triaize, des pics à 1 350 ind ont pu être observés par l'ONCFS dans les marais d'Olonne au cours des mois de février à avril.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*)**1998-1999 : 69****1999-2000 : 67**

Migratrice, hivernante, estivante.

Cette espèce fréquente quasiment uniquement les vasières du littoral vendéen. De fait, les effectifs les plus importants se retrouvent au niveau de la baie de l'Aiguillon avec 570 ind. notés en janvier 1999 (ONCFS) et 1 151 ind notés en baie de Bourgneuf (LPO).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 1 721 dont 1 151 en baie de Bourgneuf

- janvier 2000 : 533 dont 430 en baie de Bourgneuf

Outre ces sites, des observations peuvent être faites au début de la migration postnuptiale et au cours de la migration pré-nuptiale sur l'ensemble du littoral vendéen, notamment à la fin de l'été à la Belle-Henriette (La Faute-sur-Mer), dans les marais de la Vie (Saint-Hilaire-de-Riez), dans les marais de la Guittière (Talmont-Saint-Hilaire), sur les plages du Jaunay (Brétignolles-sur-Mer), dans les marais d'Olonne.

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*)**1998-1999 : 84****1999-2000 : 71**

Migrateur.

Le stationnement de migrateurs est spectaculaire lors de sa migration pré-nuptiale, notamment dans les marais d'Olonne et Poitevin, et dans une moindre mesure marais Breton d'avril à mai. La migration postnuptiale est quant à elle beaucoup plus étalée.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		18/11, baie de Bourgneuf (LPO)
Migr. pré-nuptiale 1999	11/04, Champagné-les-Marais (C. & J.Gon)	23/05, plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer (J.Gon)
Migr. postnuptiale 1999	07/07, lagune de Bouin (F.Sig)	01/11, pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe)
Migr. pré-nuptiale 2000	02/03, Noirmoutier (M.Vas)	18/05, Noirmoutier (M.Vas)
Migr. postnuptiale 2000	06/07, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)	

Des individus sont régulièrement observés entre la fin théorique de la migration pré-nuptiale et le début de la migration postnuptiale. Il est difficile d'établir le statut exact de ces ind. (erratiques, fin de migration pré ou début de migration post ?).

Cette espèce à priori côtière peut être observée bien à l'intérieur des terres : 12 ind. observés le 01/05/00 se nourrissant dans une prairie à Rocheservière (L.Gri).

COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)

1998-1999 : 94

1999-2000 : 92

Migrateur et hivernant, estivant.

Lors de la période d'hivernage, cette espèce fréquente principalement les vasières littorales et plus secondairement les zones humides adjacentes ou plus à l'intérieur des terres. Néanmoins cette espèce est observable quasiment toute l'année sur le littoral vendéen et notamment dans les baies de l'Aiguillon et Bourgneuf.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 2 117 dont 1 208 en baie de Bourgneuf et 700 en baie de l'Aiguillon

- janvier 2000 : 1 477 dont 711 en baie de Bourgneuf, 455 en baie de l'Aiguillon

L'effectif maximal a été comptabilisé le 18/11/98 lors du comptage mensuel en baie de Bourgneuf avec 1 493 ind. (LPO).

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)

1998-1999 : 47

1999-2000 : 36

Migrateur, hivernant rare.

Cet espèce fréquente principalement les zones humides côtières (Aiguillon – Bourgneuf), les marais salants et beaucoup plus rarement les zones humides intérieures (1 ind. observé le 03/02/00 par L.Gri à l'étang des Boucheries, Les Landes-Génusson). Le groupe d'arlequins le plus important observé ne dépasse pas les 25 ind. (le 30/04/99, G.Bes). L'essentiel des observations est réalisé lors du passage migratoire de printemps.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		29/10, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)
Migr. pré-nuptiale 1999	28/02, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)	01/05, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Migr. postnuptiale 1999	13/07, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)	15/11, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)
Migr. pré-nuptiale 2000	03/02, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér)	18/05, marais d'Olonne (ONCFS)
Migr. postnuptiale 2000	18/07, baie de Bourgneuf (LPO)	

Quelques ind. peuvent hiverner ici et là en petits groupes sur les grandes vasières littorales (3 ind. en janvier 2000 en baie de l'Aiguillon, ONCFS).

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)

1998-1999 : 137

1999-2000 : 141

Nicheur, migrateur, hivernant.

Cet oiseau niche principalement dans les zones de marais littoraux à savoir le marais Breton et le marais Poitevin mais également dans les marais saumâtres de la Vie (30 couples nicheurs en 1999, G.Bes). De même, 19 couples nicheurs sont notés en 2000 sur les acquisitions LPO de Champagné-les-Marais (J-P.Gué).

Les effectifs nicheurs ci-dessous ne sont en rien exhaustifs. Il s'agit simplement d'une retranscription de la base de données LPO 85. L'enquête nationale sur les limicoles nicheurs de 1995-1996 donnait un effectif de 786-951 couples.

1999 :

- Marais de la Vie : 30 couples (G.Bes)
- Terrains LPO de Beauvoir-sur-Mer : au moins 15 couples à Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)
- Marais de la Guittière, Talmont-Saint-Hilaire : 6 couples (J. & C.Gon)
- Communal du Poiré-sur-Velluire : 1 couple (J. & C.Gon)
- Champagné-les-Marais : au moins 2 couples (J-P.Gué)

2000 :

- Lagune de Bouin : 4 couples (F.Sig & P.Dul)
- La Barre-de-Monts : 1 couple (C.Gir)
- Terrains LPO Beauvoir-sur-Mer : au moins 16 couples (F.Sig)
- Marais de la Vie : 30-35 couples nicheurs (G.Bes)
- Champagné-les-Marais : 26 couples nicheurs (J-P.Gué)

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 450 (320 en baie de l'Aiguillon, 129 en baie de Bourgneuf)
- janvier 2000 : 428 (398 en baie de l'Aiguillon)

Les effectifs records observés l'ont été surtout lors des périodes de migration avec par exemple 1 500 à 2 000 ind. recensés à la pointe de l'Aiguillon le 20/09/99 (J-P.Sib).

CHEVALIER STAGNATILE (*Tringa stagnatilis*)

1998-1999 : 10/2

1999-2000 : 5/4

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur rare.

Cet oiseau relativement rare sur le littoral vendéen est principalement observé d'août à octobre sur des zones de marais salants ou lagunes.

Automne 1998 : - 1 ind. sur les terrains LPO de Beauvoir-sur-Mer le 21/09 (F.Sig).

Automne 1999 : - 1 ind. au moins (juv.) sur les marais d'Olonne, du 19/08 au 29/10 (J-P.Sib, ONCFS, D.Des *et al.*)

- 1 ind. le 09/09 sur la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer (Eq. Pointe)

- 1 ind. le 02/10 dans l'estuaire du Lay à L'Aiguillon-sur-Mer (F.Noe)

Automne 2000 : - 1 ad. le 02/08 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier (M.Vas)

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)

1998-1999 : 68

1999-2000 : 59

Migrateur, hivernant rare.

Le Chevalier aboyeur fréquente en général la Vendée de juillet à octobre et de mars à mai mais quelques ind. peuvent hiverner ici et là sur les zones littorales. Principalement maritime, il a néanmoins été observé à l'intérieur des terres et notamment au lac de Maché (5 ind. le 05/09/98, A.Gér). Cet espèce est généralement observée par petits groupes. L'effectif le plus conséquent a été compté sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier, avec 95 ind. le 02/08/00 (M.Vas).

Néanmoins, il convient de souligner la présence d'individus plus nombreux (jusqu'à 150) en migration pré-nuptiale sur les mizottes de la baie de l'Aiguillon (E.Joy). Ces effectifs correspondent à un minimum, l'ensemble des oiseaux étant répartis dans les mares à salicornes et fossés de pied de digue. Le rôle des vasières et estuaires sur les prés salés est peut-être sous-estimé.

CHEVALIER À PATTES JAUNES (*Tringa flavipes*)

1998-1999 : 0/0

1999-2000 : 6/2

Espèce soumise à homologation nationale.

Plusieurs observations d'un même individu ont eu lieu du 13 au 22/10/99 (J.Grñ, D.Des, F.Por, O.Gir) dans les marais d'Olonne. Une autre observation a eu lieu au même endroit le 27/04/00 (M.Fou).

Toutes les observations ont été homologuées par le CHN (Ornithos 7-4 & 9-1).

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)**1998-1999 : 130****1999-2000 : 93**

Migrateur, hivernant, estivant (?).

Cette espèce est signalée sur l'ensemble du département au sein des grandes zones humides ou à proximité de plans d'eau. Les effectifs hivernants sont certainement sous estimés et font simplement état de quelques individus recensés dans les principaux sites suivis. Du fait de l'observation régulière de cet oiseau tout au long de l'année, il est difficile d'identifier le début des migrations pré-nuptiale et post-nuptiale.

Les effectifs maximaux recensés ne dépassent que très rarement 10 ind. Notons néanmoins 10-15 ind. à la station d'épuration de Luçon le 26/09/98 (J.Gon & S.Vri) et plus de 20 ind. dans les marais de Bouin le 29/08/00 (T.You).

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)**1998-1999 : 31****1999-2000 : 19**

Migrateur.

Toutes les observations de ce chevalier ont été réalisées principalement en petit nombre de juillet à octobre. A noter, 1 ind. le 11/05/00 dans les marais d'Olonne (ONCFS). Les principaux sites fréquentés correspondent principalement aux zones de marais littoraux. Néanmoins, signalons plusieurs observations au lac de Maché. Les effectifs les plus importants recensés sont de 6 ind. le 10/08/99 à la pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) et de 6 ind. le 23/07/00 dans les marais d'Olonne (M.Bib).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		3 ^e décade de novembre, St-Hilaire-de-Riez
Migr. postnuptiale 1999	03/07, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)	2 ^e décade d'octobre, Olonne-sur-Mer
Migr. pré-nuptiale 2000	11/05, marais d'Olonne-sur-Mer (ONCFS)	16/06, lagune de Bouin (LPO)
Migr. postnuptiale 2000	21/07, marais des Loirs, Olonne-sur-Mer (M.Bib)	

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*)**1998-1999 : 130****1999-2000 : 122**

Migrateur, hivernant, estivant peu commun.

Cet oiseau est signalé sur l'ensemble du département (y compris sur l'île d'Yeu), à proximité de points d'eau, quasiment toute l'année. L'effectif le plus important recensé est de 5 ind. dans les marais de la Vie (G.Bes) le 10/09/98. Les mois de septembre et août correspondent généralement aux mois où l'on observe les groupes les plus importants.

CHEVALIER GRIVELÉ (*Actitis macularia*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 2/1**

Espèce soumise à homologation nationale.

Deux observations de ce petit Chevalier nord américain le 14/09/99 et le 17/09/99 sur l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin). Données homologuées par le CHN (Ornithos 7-4).

CHEVALIER SEMIPALMÉ (*Catoptrophorus semipalmatus*)**1998-1999 : 4/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation nationale.

Espèce nord-américaine, de passage occasionnel en Europe.

Plusieurs observations sur la lagune de la Belle-Henriette (La Faute-sur-Mer) le 12/09/98 et le 13/09/98, du même individu probablement, en plumage de transition vers le 1^{er} hiver (J-F.Dar, J-P.Del, J-Y.Fré, F.Pou, L.Spa *et al.*). Il s'agit de la première donnée vendéenne et de la deuxième donnée française !

Observations homologuées par le CHN (Ornithos 6-4).

TOURNEPIERRE À COLLIER (*Arenaria interpres*)**1998-1999 : 77****1999-2000 : 60**

Migrateur et hivernant, estivant peu commun.

Localisé sur l'ensemble du littoral vendéen *stricto sensu*, il est noté quasiment toute l'année le long de nos côtes.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 1999 : 88

- janvier 2000 : 181 dont 131 en baie de l'Aiguillon

L'effectif maximum recensé est de 85 ind. lors du comptage mensuel en baie de Bourgneuf le 19/12/99 (LPO).

PHALAROPE À BEC ÉTROIT (*Phalaropus lobatus*)**1998-1999 : 13/5****1999-2000 : 12/3**

Espèce soumise à homologation départementale.

L'essentiel des observations a lieu d'août à octobre. Une seule donnée en migration pré-nuptiale pour cette période. Un bel afflux l'automne 1999 (21 données sur les 25).

Les secteurs où il a pu être observé sont :

- les marais de la Guittière (Talmont-Saint-Hilaire) : 1 ind. le 03/10/98 (M.Cos & C.Poi) ;
- les terrains LPO de Beauvoir-sur-Mer : 1 ind. du 19/08/99 au 23/08/99 (E.Mar, F.Sig) ;
- les marais de la Gachère (Brétignolles-sur-Mer) : 1 juv. le 19/08/99 (J-P.Sib) ;
- les marais d'Olonne (dont la réserve ONCFS de Chanteloup) : 17 observations d'un à deux individus entre le 20/08 au 24/09 (D.Des *et al.*) ;
- la lagune de Bouin : 1 mâle nuptial les 06 et 07/05/00 (F.Sig) ;
- la lagune de la Belle-Henriette (La Faute-sur-Mer) : 1 ind. le 31/08/00 (J. & P.Ada).

DES LABBES À LA MOUETTE TRIDACTYLE (Matthieu VASLIN)**LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*)****1998-1999 : 7****1999-2000 : 4**

Espèce soumise à homologation départementale.

De passage occasionnel sur le littoral (nicheur en Sibérie, migre au large des côtes pour rejoindre l'Atlantique tropical et l'océan Indien).

Passage discret de l'espèce, avec un pic post-nuptial plus marqué que le pré-nuptial (8 observations de fin août à septembre pour 2 données en avril).

Une seule donnée concerne plusieurs oiseaux avec deux individus le 15/07/99 au phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (J.Gon).

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*)**1998-1999 : 28****1999-2000 : 44**

De passage sur le littoral.

Pratiquement toutes les observations (de 1 à 25 individus) s'inscrivent dans la phénologie de l'espèce (de fin août au début du mois d'octobre), principalement des données de guet à la mer (seawatching).

Le passage pré-nuptial est très peu marqué avec 15 observations (du 11 avril au 31 mai). Jusqu'à 25 oiseaux comptabilisés en une séance de guet à la mer le 20/09/99, sur la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

Aucune donnée hivernale.

LABBE À LONGUE QUEUE (*Stercorarius longicaudatus*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 2/2**

Espèce soumise à homologation nationale.

Oiseau arctique.

Deux données pour cette espèce occasionnelle mais annuelle, avec un oiseau juvénile observé le 08/09/99 sur le marais d'Olonne (M.Fou) et un adulte à la Chaume (Les Sables-d'Olonne) le 21/09/99 (O.Gir).

Observations acceptées par le CHN (Ornithos 7-4).

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*)**1998-1999 : 27****1999-2000 : 27**

De passage sur la côte : la majorité des observations concerne des individus isolés, observés de septembre à novembre. Quelques données hivernales, 4 en 1998-1999 et 9 en 1999-2000.

Passage pré-nuptial peu marqué (2 observations) : 1 ind. le 12/05/99 sur l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin), 1 ind. le 02/06/00 à la pointe du Payré à Jard-sur-Mer (S. Vri).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (*Larus melanocephalus*)**1998-1999 : 103****1999-2000 : 91**

Nicheuse, migratrice, hivernante peu commune.

Visiteuse régulière et sporadique ça et là sur le littoral.

Le passage pré-nuptial a été très marqué en 1999 et 2000, avec des stationnements très importants pour l'espèce : plus de 1 800 individus le 05/04/99 sur l'étang de la Rousselotière à Givrand (G.Bes), et 1 000 individus le 11/04/00 à Givrand (G.Bes).

1 seul cas de nidification a été rapporté en 1999 avec 11 couples et 9 juvéniles à Jard-sur-Mer (J.Gon), et deux cas en 2000 avec un minimum d'un couple sur le marais des Loirs à Olonne-sur-Mer le 11/04/00 (J.Gon) et jusqu'à 148 couples installés sur la lagune du Dain à Bouin le 21/05/03 (F. Sig & P. Dul).

MOUETTE ATRICILLE (*Larus atricilla*)**1998-1999 : 2/1****1999-2000 : 3/2**

Espèce soumise à homologation nationale.

Originaire d'Amérique de l'Est et d'Amérique centrale, occasionnelle en Vendée.

Un oiseau de premier hiver est observé le 31/10/98 à la Fosse, Barbâtre (J.Gon, X. & M-P.Hin & L.Pet), puis revu le 18/11/98 à la Noue Fromagette, Beauvoir-sur-Mer (C.Gon, L.Pet & B.Tes).

Un adulte est observé le 06 et 07/10/99 à la pointe de l'Aiguillon (C.Gon). Un oiseau (pas de précision sur l'âge) est présent à la pointe d'Arçay à La Faute-sur-Mer le 29/08/00 (A.Tho & P.Tro)

Observations toutes validées par le CHN (Ornithos 6-4, 7-4 & 9-1).

MOUETTE DE FRANKLIN (*Larus pipixcan*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 5/1**

Espèce soumise à homologation nationale.

Originaire d'Amérique du Nord.

Un long stationnement d'un oiseau de premier hiver, du 30/03/00 au 22/04/00 sur la réserve de Chanteloup à L'Ile-d'Olonne (M.Fou & O.Pen).

Donnée acceptée par le CHN (Ornithos 9-1).

MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*)**1998-1999 : 63****1999-2000 : 61**

Migratrice, hivernante rare.

Passages très réguliers avec des stationnement pré-nuptiaux marqués sur des bassins côtiers (lagunages ...). Effectif record de 1 500 individus à la STEP de La Tranche-sur-Mer le 04/04/99 (A.Tho) et 300 à 400 oiseaux le 10/04/00 dans les dunes du Jaunay à Brétignolles-sur-Mer (G.Bes). Très peu de données hivernales qui ne concernent que des individus isolés.

MOUETTE DE SABINE (*Xema sabini*)**1998-1999 : 8****1999-2000 : 34**

Nicheuse en Amérique du Nord, hiverne sur les côtes atlantiques européennes et africaines.

Quelques observations post-nuptiales sporadiques, cette espèce pélagique étant occasionnelle en dehors des tempêtes et des observations maritimes (bateau). L'espèce s'est montrée discrète pour la période 1998/1999.

Un passage marqué en mer le 21/08/98 avec plus de 50 oiseaux lors d'une sortie pélagique à bord du Kifanlo (F.Por).

De nombreuses observations sur le nord de la côte fin septembre 1999 suite à une tempête. Environ 150 individus le 27/09/99 lors d'une séance de seawatching depuis la Corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)**1998-1999 : 338****1999-2000 : 254**

Nicheuse, migratrice, hivernante

Omniprésente sur le littoral et régulière à l'intérieure des terres avec des dortoirs hivernaux sur les lacs et retenue : 14 000 individus le 14/01/99 sur le lac du Moulin Papon (S.Cha), 4 000 individus le 20/01/00 sur le lac de Bellenoüe à Château-Guibert (J. & P.Ada). Seulement 8 données de reproduction en 1999 et 10 en 2000 avec notamment 289 couples sur la lagune du Dain à Bouin (P.Dul & F.Sig).

GOÉLAND À BEC CERCLÉ (*Larus delawarensis*)**1998-1999 : 8/4****1999-2000 : 1/1**

Espèce soumise à homologation nationale.

Originaire d'Amérique du nord, le laridé américain le plus régulier du littoral vendéen.

Un adulte à Bouin le 18/11/99 (O.Gir), un adulte le 15/02/99 à la pointe de l'Aiguillon (M.Fou) (le même oiseau que celui observé à la pointe d'Arçay ?), un oiseau de deuxième hiver le 07/04/99 sur les marais d'Olonne (M.Fou), et le retour de l'adulte de la pointe d'Arçay du 23/08 au 04/10/98, le 30/08/99 et à partir du 30/08/00 (déjà présent à l'automne 1997, voir Gorgebleue n°17-18).

9 données acceptées par le CHN, dont 6 concernant l'adulte de la pointe d'Arçay (Ornithos 6-4, 7-4 & 9-1).

GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*)**1998-1999 : 83****1999-2000 : 67**

Migrateur et hivernant.

Passages pré-nuptiaux bien marqués avec des rassemblements réguliers sur le littoral et les retenues côtières : 500 individus du 01/04 au 05/04/99 sur l'étang de la Rousselotière à Givrand (G.Bes) et plus d'un millier d'oiseaux le 21/03/00 sur le même site (G.Bes). Une centaine d'oiseaux le 17/01/00 sur le Luzan à Noirmoutier (M.Vas).

GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*)**1998-1999 : 218****1999-2000 : 135**

Nicheur, migrateur, hivernant.

Présent sur le littoral et rassemblement hivernaux sur les retenues d'eau plus à l'intérieur des terres.

178 couples cantonnés (nids) sur l'île d'Yeu le 24/05/00 (LPO Noi) et 214 couples sur l'île du Pilier, soit un minimum de 392 couples nicheurs en Vendée en 2000.

Aucune précision dans le fichier sur les sous-espèces observées en Vendée.



Les 4 Goélands les plus communs en Vendée (de gauche à droite) : Goéland argenté *Larus argentatus*, Goéland marin *L. marinus*, Goéland brun *L. fuscus*, Goéland leucophée *L. michahellis*. Photo © Matthieu VASLIN

GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)**1998-1999 : 236****1999-2000 : 151**

Nicheur, migrateur, hivernant.

Espèce omniprésente sur le littoral, observé régulièrement ailleurs en vendée.

746 nids sur l'île d'Yeu le 24/05/00 (LPO Noi) et 702 couples sur l'île du Pilier le 23/05/00, 30 couples sur la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez le 10/06/00 (G.Bes). Soit un minimum de 1 478 couples nicheurs en Vendée en 2000.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus michahellis*)**1998-1999 : 52**
1999-2000 : 53

Nicheur, migrateur, hivernant.

Espèce aux effectifs probablement sous-estimés, notamment lors des comptage de dortoirs mixtes de laridés.

Observations principalement maritimes, et nidification irrégulière, 8 à 9 couples sur le marais d'Olonne le 01/06/00 (P.Yés), 2 couples sur l'île de Noirmoutier en 2000 (LPO Noi) et 4 couples sur l'île du Pilier le 23/05/00.

GOÉLAND À AILES BLANCHES (*Larus glaucoides*)**1998-1999 : 0/0**
1999-2000 : 1/1

Espèce soumise à homologation nationale.

Niche au Groenland, occasionnel en hiver.

1 ind. de premier hiver au Tanchet, Les Sables d'Olonne le 17/02/00 (M.Fou).

Donnée acceptée par le CHN (Ornithos 9-1).

GOÉLAND BOURGMESTRE (*Larus hyperboreus*)**1998-1999 : 2/1**
1999-2000 : 3/2

Espèce soumise à homologation départementale.

Niche au Groenland, occasionnel en hiver.

Laridé arctique, hivernant occasionnellement sur le littoral français.

Un adulte du 20/01 au 11/02/99, plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire (M.Bib).

Un oiseau de premier hiver le 21/01/00 sur le lac du Moulin Papon à La Roche-sur-Yon (S.Bar & E.Ouv).

GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*)**1998-1999 : 120**
1999-2000 : 84

Nicheur, migrateur, hivernant.

Données du fichier uniquement maritimes, avec une présence sur tout le littoral, quelques rassemblement hivernaux : 130 sur la côte nord de l'île d'Yeu le 14/08/99 (X & M-P.Hin), 60 sur la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez le 11/11/98 (G.Bes). 7 couples nicheurs sur l'île d'Yeu le 24/05/00 et 8 couples sur l'île du Pilier le 23/05/00 (LPO Noi).

Plusieurs individus, bagués dans les années 80 sur l'île de Banneg dans l'archipel de Molène (Finistère), sont observés en automne 1999 et 2000 sur le Luzan à Noirmoutier (LPO Noi).

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*)**1998-1999 : 34**
1999-2000 : 34

Nicheuse et de passage régulier.

Uniquement des données provenant du littoral avec des pics d'effectifs enregistrés lors des forts coups de vent d'ouest hivernaux, plus de 100 oiseaux tous partiellement mazoutés le 26/12/99 à Port-Joinville sur l'île d'Yeu (X & M-P.Hin).

L'unique site de nidification de l'espèce en Vendée (phare de l'Armandèche aux Sables d'Olonne) ne semble pas avoir été suivi en 1999 et 2000 (pas de données arrivées au fichier).

L'espèce a été particulièrement touchée par la marée noire de l'Erika (une centaine d'oiseaux collectés).

DES STERNES AUX ALCIDÉS (Frédéric PORTIER & Perrine DULAC)**STERNE HANSEL (*Sterna nilotica*)****1998-1999 : 1/1**
1999-2000 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice rare mais régulière sur le littoral vendéen aux 2 passages.

- Automne 1998 : absence de données
- Printemps 1999 : absence de données
- Automne 1999 : 1 le 01/08 à la pointe de l'Aiguillon (A.Tho & P.Tro)
- Printemps 2000 : 5 ad. le 18/04 en baie de Bourgneuf (ONCFS)
- Automne 2000 : absence de données

STERNE CASPIENNE (*Sterna caspia*)**1998-1999 : 42****1999-2000 : 52**

Migratrice rare mais très régulière sur le littoral vendéen, lors des 2 passages. Encore plus rare à l'intérieur des terres. 79 observations sur 97 ont été réalisées aux passages d'automne. Les sites les plus fréquentés sont : la pointe de l'Aiguillon (et la baie), la pointe d'Arçay et le marais d'Olonne.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998*		01/10, pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe)
Migr. pré-nuptiale 1999**	05/04, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (A.Tho)	28/04, pointe de l'Aiguillon (J.Bir)
Migr. postnuptiale 1999***	14/07, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (J.Gon & S.Vri)	07/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)
Migr. pré-nuptiale 2000****	25/03, estuaire du Lay (X. & M-P.Hin)	25/04, réserve de Chanteloup, L'Ile-d'Olonne (J. & P.Ada)
Migr. postnuptiale 2000*****	11/07, marais d'Olonne (ONCFS)	

* 22 obs. totalisant 36 oiseaux sur 6 sites. Les maxima sont notés à la pointe d'Arçay : 10 ind. le 06/09 (C. & J.Gon) et à la pointe de l'Aiguillon : 7 le 08/09 (Eq Pointe)

** 6 mentions, concernant de 1 à 7 ind., totalisant 10 oiseaux sur 3 sites. Maxi : 7 le 05/04 à la pointe d'Arçay (A.Tho)

*** 44 obs. totalisant pas moins de 60 oiseaux sur 6 sites. Le pic migratoire est noté classiquement en septembre (24 obs. sur 44) avec un maxi de 12 oiseaux le 22/09 à la pointe de l'Aiguillon (Eq Pointe)

A noter deux données à l'intérieur des terres à l'automne 1999 : 2 (ad nourrissant son juv volant) le 03/09 en queue du lac de Maché/Apremont et 2 ad. le 07/09 en queue du lac du Jaunay (F.Por)

**** 9 obs. pour 15 oiseaux sur 5 sites. Maxi : 9 ind. Le 08/04 à la pointe de l'Aiguillon (J. & P.Ada)

***** 13 obs. totalisant 24 oiseaux sur 5 sites. Maxi : 13 le 29/08 à la pointe de l'Aiguillon (J-P.Sib)



Sterne caspienne (Sterna caspia) au milieu de pluviers argentés (Pluvialis squatarola) et de bécasseaux variables (Calidris alpina). Photo © Matthieu VASLIN

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*)**1998-1999 : 94****1999-2000 : 114**

Migratrice, commune sur tout le littoral. Hivernante et nicheuse rare.

S'observe communément de mars à octobre le long de la côte vendéenne, y compris sur les 2 îles.

Rassemblements importants notés aux périodes pré et post-nuptiales avec par exemple 500 ind. le 28/07/99 à la pointe d'Arcay, La Faute-sur-Mer (J.Gon & S.Vri) ou encore 1 000 oiseaux le 11/04/00 sur la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

Une seule donnée à l'intérieur des terres : 5 oiseaux le 24/09/99 sur le lac de Moulin-Papon (F.Sem).

Une colonie nicheuse s'installe sur la lagune du Dain à Bouin au printemps 2000 et concerne environ 50 couples. Les premiers couples cantonnés sont observés le 11/05 (F.Sig). Les premiers pullis sont notés le 08/06 (F. Sig). Le maximum de couveurs est observé le 17/06 (50 couveurs, F.Sig). Seuls 2 poussins volants sont observés au mois de juillet.

Les mentions hivernales sont intéressantes :

- hiver 1998-1999 : 9 observations de 1 à 9 oiseaux sur 9 sites.
- hiver 1999-2000 : 8 observations de 1 à 3 ind. sur 7 sites.

STERNE "À BEC ORANGE" (*Sterna maxima / bengalensis / elegans*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 1/1**

Espèces soumises à homologation nationale.

Une donnée générique homologuée par le CHN (Ornithos 9-1) le 13/08/00 à la pointe d'Arcay, La Faute-sur-Mer (A.Tho). Il s'agit probablement d'un adulte de Sterne élégante mais "un léger doute subsiste".

STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougalli*)**1998-1999: 1/1****1999-2000 : 3/2**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice rare sur la côte.

- Automne 1999 : 8 ad le 26/08 à la pointe d'Arcay, La Faute-sur-Mer (J.Gon)
- Printemps 2000: 1 ind. les 04 et 12/06 sur la lagune du Dain à Bouin (C.Gir & F.Sig).
- Automne 2000 : 1 ad en plumage nuptial le 12/07 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier (M.Vas).

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*)**1998-1999 : 102****1999-2000 : 84**

Migratrice commune et nicheuse peu commune sur les marais du littoral vendéen. Occasionnelle en hiver.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		31/10, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (A.Aud)
Saison 1999	05/04, marais de la Guittière, Talmont-Saint-Hilaire (C. & J.Gon)	19/10, pointe de l'Aiguillon (Eq Pointe)
Saison 2000	27/03, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)	

- Nidification 1999 : cette espèce n'a pas fait l'objet de recensement exhaustif sur l'ensemble des marais vendéens. Parmi les nicheurs, on peut citer entre autre : 1 couple aux Sables d'Olonne, 1 couples sur les marais de la Vie (même site qu'en 1998), 1 couple sur les terrains LPO à Beauvoir-sur-Mer, 1 couple à Noirmoutier-en-l'Île et surtout une colonie nicheuse supérieure à 100 couples sur la lagune du Dain à Bouin, qui donne 80 juv. à l'envol (F.Si).

- Nidification 2000 : pas de recensement. Seule la lagune du Dain à Bouin est bien suivie : la colonie nicheuse est de 240 couples. La production est supérieure à 170 juv. à l'envol (F. Si). Les premiers poussins sont notés le 01/06 (P.Dul & F.Sig). Ailleurs : 3 couples nicheurs sur les terrains LPO à Beauvoir-sur-Mer.

Qu'en est-il des autres marais littoraux qui accueilleraient auparavant cette espèce ?

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisaea*)**1998-1999 : 10****1999-2000 : 43**

Migratrice peu commune mais régulière, surtout au passage postnuptial le long de la côte (sur les 53 données, 5 seulement correspondent à un passage pré-nuptial). Rentre à l'intérieur des terres quand les vents d'ouest dominant. Exceptionnelle en hiver.

- Automne 1998 : 1 seul oiseau les 24 et 25/11 à Moricq, Angles (A.Tho).
 - Printemps 1999 : 3 ou 4 ind. le 23/04, observés depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).
 - Automne 1999 : un afflux important en Bretagne et Pays de Loire, entre le 21 septembre et le 26 octobre, avec quelques observations dans les terres⁶. En Vendée, première arrivée le 06/08 avec environ 15 ind. dans l'estuaire du Lay à l'Aiguillon-sur-Mer (A.Tho *et al.*), puis de nombreuses observations pendant les mois d'août, septembre et jusqu'au 11/10 (encore 1 juv. sur la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer, Eq.pointe). Des groupes de plus de 15 observés pendant tout le mois de septembre (marais d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie). Le maximum de passages a été observé entre le 20/09 et le 04/10, avec un maximum de 50 à 60 ind. le 02/10 à Sion-sur-l'Océan, Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes & P.Rou)
 - Printemps 2000 : 3 ind. (dont 1 ad en plumage nuptial) puis 1 ad. présents à la lagune du Dain à Bouin du 30/05 au 11/06 (M.Vas & F.Sig).
 - Automne 2000 : arrivée le 20/08 au large des Sables-d'Olonne (S.Bal).
- Pas de données hivernales pour cette période.

3 données à l'intérieur des terres, toutes lors de l'"invasion" de l'automne 1999 :

- 1 juv le 23/08/99 sur le lac de Maché-Apremont (F.Por)
- 2 ad. le 22/09/99 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (A.Riv)
- 1 juv. le 26/09/99 sur le lac du Jaunay à La Chapelle-Hermier (F.Por).

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*)

1998-1999 : 52

1999-2000 : 36

Migratrice assez commune aux deux passages (avril à octobre) sur tout le littoral vendéen. Très rare en hiver. Toujours pas de preuve certaine de nidification pour la période.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		2 ^e décade d'octobre, St-Hilaire-de-Riez
Saison 1999	13/04, le Gois, Barbâtre (LPO Noi)	01/10, base de voie, L'Aiguillon-sur-Mer (J. & P.Ada)
Saison 2000	03/04, le Gois, Barbâtre (M.Vas)	

Les maxima sont notés le 04/05/99 avec 250 oiseaux posés à la pointe de l'Aiguillon (G.Bul) et 68 ind. le même jour plage des Granges à Olonne-sur-Mer (D.Des). Jusqu'à 34 ind. dans la colonie de sternes pierregarin et caugek au printemps 2000 (F.Sig & P.Dul), mais pas de signe de nidification.

4 ind. (ad. nourrissant des jeunes) entre le 7 et le 09/08/99 sur le lac de Maché-Apremont (F.Por *et al.*).

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybridus*)

1998-1999 : 19

1999-2000 : 25

Migratrice peu commune dans le département, notée surtout au passage prénuptial. Pas de données de reproduction (niche sur le lac de Grand-Lieu en Loire Atlantique).

	Première observation	Dernière observation
Migr. prénuptiale 1999	31/03, le Bout de Sac, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)	23/05, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Migr. postnuptiale 1999*	01/07, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (J. & P.Ada)	24/09, marais d'Olonne, L'Ile-d'Olonne (C.Gir)
Migr. prénuptiale 2000	05/04, marais d'Olonne (ONCFS)	02/06, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (A.Tho & S.Vri)
Migr. postnuptiale 2000	22/07, étang des Mattes, St-Gervais (M.Vas)	

* 7 données sur 5 sites, dont 25 ind. le 11/08 dans le marais de Bouin (F.Sig). La donnée du 01/07 est la plus précoce du fichier LPO.

Une donnée hivernale (!!): le 11/12/98, observation d'un juv. à Saint-Denis-du-Payré (A.Lar).

⁶ Lire à ce propos l'article paru dans *Ornithos* : REEBER S. – 2000 – *Sterna paradisaea* dans l'Ouest à l'automne 1999. *Ornithos*, 7-3 : 97-100.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)**1998-1999 : 45****1999-2000 : 49**

Migratrice commune aux deux passages. Nicheuse rare. Pas de données à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		03/10, étang des Mattes, St-Gervais (F.Sig)
Saison 1999	3 ^e décade d'avril, Noirmoutier	3 ^e décade d'octobre, St-Hilaire-de-Riez
Saison 2000	15/04, station d'épuration, Luçon (M.Bib)	

- Automne 1998 : beau rassemblement de 35 ind. le 08/09 sur la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer (J.Gon).
- Printemps 1999 : le passage s'étale de la dernière décade d'avril à la deuxième de mai. Plus de 50 ind. à Sion-sur-l'Océan (Saint-Hilaire-de-Riez) le 11/05 (G.Bes). Pas de donnée de reproduction cette année.
- Automne 1999 : une donnée isolée début juillet sur la lagune du Dain à Bouin (F.Sig), puis passage de début août à début octobre (avec des données jusque fin octobre à Sion-sur-l'Océan). 26 juv sur la station d'épuration de La Tranche le 04/09 (E.LeR).
- Printemps 2000 : le passage s'étale de mi-avril à mi-juin, avec un beau rassemblement de 19 ind. en plumage nuptial le 05/05 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér). En ce qui concerne la nidification, 14 couples sont notés sur les terrains LPO de Champagné-les-Marais (J-P.Gué). Pas de données dans le fichier sur les autres sites habituels du marais Poitevin.
- Automne 2000 : début du passage postnuptial mi-août .

GUIFETTE LEUCOPTÈRE (*Chlidonias leucoptera*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 3/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice rare. Fréquente tous types de milieux dulçaquicoles.

1 adulte sur le lac de Maché-Apremont le 11/09/98 (F.Por).

1 ind. du 08 au 12/06/00 sur la lagune du Dain à Bouin (M.Vas, C.Gir).

GUILLEMOT DE TROÏL (*Uria aalge*)**1998-1999 : 18****1999-2000 : 29**

Migrateur et hivernant peu commun le long de la côte et au large.

Données réparties sur l'ensemble de la côte, de Jard-sur-Mer à l'île d'Yeu et Noirmoutier (majorité des données provenant de l'île d'Yeu).

Saison 1998-1999 : observations allant du 28/10 au 17/05. 10 ind. le 13/05/99 posés dans le port de Port-Joinville (X. & M-P.Hin). Quelques observations estivales (le 28/07 à Sion-sur-l'Océan, Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) ; le 21/08 au large des Sables-d'Olonne (D.Des)).

Saison 1999-2000 : espèce particulièrement touchée par la marée noire de l'Erika. Suite au naufrage, des oiseaux mazoutés ont été collectés jusqu'en mai 2000. Au total, ce sont au moins 2427 oiseaux vivants et 8 835 oiseaux morts qui ont été collectés.

PINGOUIN TORDA (*Alca torda*)**1996-1997 : 17****1997-1998 : 26**

Migrateur et hivernant peu commun le long de la côte et au large. Comme pour le Guillemot, la majorité des données provient de l'île d'Yeu (27 données sur les 43).

Saison 1998-1999 : observations allant du 25/10/98 au 17/05/99, avec notamment 19 ind. le 28/10 au nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin *et al.*), au moins 15 lors de la traversée de l'île d'Yeu à Fromentine le 31/10 (X. & M-P.Hin *et al.*), 30 ind. le 11/05 au large de la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

Saison 1999-2000 : observations allant du 17/09 au 26/05, mais comme pour le Guillemot, ces observations sont biaisées par la marée noire de l'Erika. Suite au naufrage, 202 oiseaux vivants et 297 oiseaux morts ont été collectés sur la côte, entre le 27/12/99 et le 14/04/00.

MERGULE NAIN (*Alle alle*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur très rare le long de la côte.

1 ind. le 15/11/98 à la pointe du Devin, L'Epine (LPO Noi).

MACAREUX MOINE (*Fratercula artica*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Pas d'observation pour la période, si ce n'est les individus collectés suite au naufrage de l'Erika : plus d'une centaine d'oiseaux morts collectés sur la côte (voir aussi commentaires en introduction).

ALCIDÉS SP**1998-1999 : 14****1999-2000 : 7**

Quelques données d'alcidés non identifiés au large des côtes, notamment plus de 150 oiseaux au large de Brétignolles-sur-Mer le 10/04/00.

DES PIGEONS AU COUCOU GRIS (Jocelyne GUEYDAN)**PIGEON BISET (*Columba livia*)****1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 2/2**

Semi-domestiqué dans les villes, quelques souches sauvages. Habituellement sédentaire.

4 ind. le 30/08/99, 1 ind. le 06/09/99 puis 3 ind. le 25/09/99 en migration "active" vers le sud, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe). Des observations précédentes avaient été notées le 13/02/86 et le 23/06/87.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*)**1998-1999 : 24****1999-2000 : 14**

Migrateur partiel, nicheur probable.

Noté près des côtes lors de la migration et dans le sud Vendée. Une donnée à l'île d'Yeu pour la période (1 ind. le 13/10/99, X. & M-P.Hin).

Des données en période de reproduction laissent penser que l'espèce niche en Vendée :

- en 1999, le 07/05 au Bourg-sous-la-Roche (B.Poi), puis le 01/06 au Perrier (G.Bes)

- en 2000, le 08/06 au Perrier (G.Bes).

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)**1998-1999 : 383****1999-2000 : 346**

Sédentaire et migrateur.

Noté partout en toutes saisons dans tout le département, y compris sur l'île d'Yeu.

Premiers indices de nidification :

- en 1999, le 22/04 à Rocheservière (L.Gri)

- en 2000, le 31/03 à Rocheservière (L.Gri)

Derniers indices de nidification :

- en 1998, le 03/09 : un nid en construction au lycée des Etablières, La Roche-sur-Yon (S.Vri)

- en 2000 le 29/07 : 1 ou 2 juv. vus au nid au Poiré-sur-Vie (A.Gér). Un jeune né le 22/08 à Rocheservière (L.Gri)

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*)**1998-1999 : 343****1999-2000 : 255**

Sédentaire.

Notée dans tout le département en ville comme à la campagne, y compris à l'île d'Yeu.

Premiers indices de nidification en mars à Rocheservière (L.Gri) et en avril au Poiré-sur-Velluire (C.Gon).

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)**1998-1999 : 165****1999-2000 : 140**

Nicheuse et migratrice.

Notée dans tout le département, y compris l'île d'Yeu, dans les bois clairs de feuillus, les bosquets, les haies.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		10/10, L'Aiguillon-sur-Mer (J.Gon & S.Vri)
Saison 1999	20/04, L'Aiguillon-sur-Mer (C.Pac)	12/09, Saint-Mesmin (S.Bar & E.Ouv)
Saison 2000	16/04, Auzay (J.Gon)	

Dates extrêmes d'arrivée et de départ en Vendée : le 30/03/79 et le 21/10/90.

PERRUCHE À COLLIER (*Psittacula krameri*)

1998-1999 : 1/1

1999-2000 : 0/0

Echappée de captivité.

Notée le 16/09/98 lors du suivi de la migration à la pointe de l'Aiguillon (Eq Pointe).

Un mâle de la ssp. *borealis* présent de 1998 à 2002 entre la Guérinière et l'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier (M.Vas & E.Gas).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*)

1998-1999 : 91

1999-2000 : 89

Nicheur et migrateur.

Noté dans toute la Vendée, y compris à l'île d'Yeu, dans les régions boisées, cultivées, les marais, les landes côtières, de la mi-mars à début septembre.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		
Saison 1999	16/02, La Roche-sur-Yon (D.Ber)*	14/09, Bournezeau (T.You)
Saison 2000	31/03, Treize Vents (P.Dul)	

* date la plus précoce du fichier LPO Vendée.

RAPACES NOCTURNES (Sylvain VRIGNAUD)

EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*)

1998-1999 : 133

1999-2000 : 102

Nicheuse, migrateur partielle.

Fréquente l'ensemble du département (toutefois, aucune donnée pour l'île d'Yeu pour cette période).

Aucun indice de nidification signalé, très certainement en raison d'une prospection inadaptée.

PETIT-DUC SCOPS (*Otus scops*)

1998-1999 : 1/1

1999-2000 : 4/4

Espèce soumise à homologation départementale en dehors de Noirmoutier.

Nicheur rare et migrateur.

Niche à Noirmoutier et probablement ailleurs, notamment dans le sud Vendée.

Toutes les données de la période proviennent de Noirmoutier, à l'exception de celle de Fontenay-le-Comte.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1999	02/05, Noirmoutier-en-l'Île (LPO Noi)	
Saison 2000	21/04, Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas & L.Dev)	01/07, environs de l'hôpital, Fontenay-le-Comte (L.Pet)

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*)

1998-1999 : 32

1999-2000 : 34

Sédentaire.

Présente sur l'ensemble du département, aussi bien sur la côte, dans les marais que dans le bocage, mais la répartition de cette espèce est inégale (aucune donnée pour l'île d'Yeu et Noirmoutier).

Nombreuses données en provenance du marais Breton issues de l'enquête menée en 1999-2000 (environ 157 mâles chanteurs, voir aussi SIGNORET 2002⁷).

Un nid dans un transformateur EDF sur la commune du Perrier en 1997...

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*)

1998-1999 : 64

1999-2000 : 46

Sédentaire.

Relativement peu de données concernant cet oiseau qui est certainement plus répandu que ne le montrent les données.

Aucune donnée en provenance de l'île d'Yeu.

Seulement un indice de nidification : 1 adulte nourrissant 2 jeunes le 14/05/99 à Montournais (S.Bar).

Une donnée remarquable de 8 individus les 14, 15 et 18/09/98 aux Brouzils (S.Mér).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*)

1998-1999 : 53

1999-2000 : 48

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Comme la Chouette hulotte, probablement plus répandu que ne l'indiquent les données du fait du manque de prospection ciblée (et du manque d'envoi de données).

Quelques indices de nidification :

- 1 couples paradant + accouplements à La Tranche-sur-Mer le 01/03/99 (S.Dal)
- 1 nicheur (?) à Beauvoir-sur-Mer le 06/06/2000 (C.Gir)

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*)

1998-1999 : 19

1999-2000 : 53

Nicheur rare, hivernant, migrateur partiel.

Signalé uniquement sur le littoral et les marais côtiers (Breton et Poitevin), principalement observé en hiver.

Pas d'indice de nidification en 1999.

En 2000, 4 données en juin : à Bouin (nidification certaine) (S.Fra), à Noirmoutier-en-l'Île (LPO Noi) et à l'Île-d'Olonne (ONCFS).

Beaucoup plus de données pour la deuxième période mais aucun groupe n'excédant 5 individus n'a été observé.



Hibou des marais (Asio flammeus). Photo © Matthieu VASLIN

⁷ SIGNORET F. – 2002 – La Chouette chevêche *Athene noctua* en marais Breton-Vendéen : inventaire 1999-2000. *La Gorgebleue*, 17-18 : 25-30.

DE L'ENGOULEVENT D'EUROPE AUX PICS (Jocelyne GUEYDAN)

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*)

1998-1999 : 5/5

1999-2000 : 9/7

Nicheur et migrateur.

Niche dans les pinèdes claires à sol sablonneux entre Jard-sur-Mer et La Barre-de-Monts, à Noirmoutier et également dans des boisements plus clairs de feuillus et mixtes avec coupes dans les secteurs de bocage du département et en forêt (Château-Fromage près de La Chaize-le-Vicomte).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		04/09, Château-d'Olonne (D.Des)
Saison 1999	28/04, Olonne-sur-Mer (J.Che)*	30/06, St-Jean-de-Monts (F.Sig)
Saison 2000	07/05, St-Jean-de-Monts (C.Gir)	

* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée.

MARTINET NOIR (*Apus apus*)

1998-1999 : 105

1999-2000 : 143

Nicheur et migrateur.

Niche dans les villes et les villages de tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		25/09, Péault (J. & P.Ada)
Saison 1999	04/04, Noirmoutier (LPO Noi)*	18/09, Le Poiré-sur-Vie (F.Sem)
Saison 2000	11/04, La Roche-sur-Yon (M.Cos)	

* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée.

MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE (*Alcedo atthis*)

1998-1999 : 102

1999-2000 : 97

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Noté partout dans le département, près des cours d'eau, des étangs, des marais, y compris à l'île d'Yeu.

Seulement deux données de reproduction :

- le 22/05/99 à Montournais, 2 ou 3 jeunes piaillant au fond du nid (S.Bar)
- des cris incessants de jeunes le 26/07/00 à Beaufou (A.Gér)



Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*). Photo © Frédéric SIGNORET / LPO

GUÉPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 3/3**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur, nicheur probable. Pas de données de nidification pour la période considérée.

- le 07/05/99 : 3 ind. en vol vers le nord aux Sables-d'Olonne (D.Des)
- le 03/05/00 : 1 ind. à Noirmoutier (LPO Noi)
- le 27/05/00 : 1 ind. à La Guérinière (M.Vas)
- le 28/05/00 : 9 ind. à Notre-Dame-de-Monts (Répond 85)

Ces observations correspondent aux passages habituels de l'espèce dans le département.

ROLLIER D'EUROPE (*Coracias garrulus*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Niche dans le sud et l'est de l'Europe, migrateur occasionnel dans l'ouest de la France.

Le 19/06/99 : 1 ind. posé sur un fil électrique dans la réserve départementale de Nalliers-Mouzeuil (M.Gra).

Une seule autre observation en Vendée (le 20/09/95).

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*)**1998-1999 : 89****1999-2000 : 92**

Nicheuse et migratrice.

Niche dans tout le département, près des côtes, dans les marais, dans le bocage, dans les villages, près des villes. Pas de données à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		19/10, Noirmoutier (LPO Noi)
Saison 1999	07/03, La Roche-sur-Yon (D.Ber)	30/09, L'Ile-d'Olonne (ONCFS)
Saison 2000	12/03, Bouin (LPO86)	

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*)**1998-1999 : 14/11****1999-2000 : 19/12**

Nicheur peu commun, migrateur tardif (surtout en période de migration postnuptiale).

Pour cette période, noté à l'île d'Yeu, à la pointe de l'Aiguillon, au Poiré-sur-Velluire, à Velluire, à Mouzeuil-Saint-Martin, à Champagné-les-Marais, aux Sables-d'Olonne et à L'Ile-d'Olonne.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		28/09, la Tourette, Ile d'Yeu (D.Des)
Migr. pré-nuptiale 1999	05/04, Beaulieu-sous-la-Roche (CPN Linotte)	23/05, la Terrière, La Tranche-sur-Mer (J.Gon)
Migr. postnuptiale 1999	27/08, mare des Agaures, Les Sables-d'Olonne (ONCFS)	14/09, pointe de l'Aiguillon (Eq.pointe)
Migr. pré-nuptiale 2000	03/04, Péault (J. & P.Ada)*	03/06, bourg de Chantonay (G-L.Cho)
Migr. postnuptiale 2000	23/08, Petits Relais, Champagné-les-Marais (Y.Gau)	

* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée.

PIC VERT (*Picus viridis*)**1998-1999 : 200****1999-2000 : 186**

Sédentaire.

Observé dans tout le département, mais aucune donnée ne provient des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

PIC NOIR (*Dryocopus martius*)**1998-1999 : 2/2****1999-2000 : 3/3**

Nicheur probable, hivernant.

En 1999, noté sur trois sites :

- dans le Grand Bois du Pally à Chantonay le 11/05 (L.Gri) puis le 30/12 (S.Bon),
- dans le bois des Jarries à Saint-Mars-la-Réorthe le 22/08 (B.Rou) et le 12/09 (S.Bar)
- à l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson le 07/11 (J-P.Nat)

PIC ÉPEICHE (*Dendrocops major*)**1998-1999 : 147****1999-2000 : 94**

Sédentaire.

Noté dans tout le département sauf à l'île d'Yeu, dans des boisements à sapins et à pins, mais aussi dans les forêts de feuillus, les parcs et les jardins.

Nicheurs certains en 1999 à Saint-Mesmin (S.Bar) et à l'île-d'Olonne (D.Des).

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocops minor*)**1998-1999 : 28****1999-2000 : 19**

Sédentaire.

Observé un peu partout dans le département, dans des boisements de feuillus, dans les régions cultivées avec parcs et jardins, bosquets de chênes. Aucune donnée de l'île d'Yeu.

Aucune donnée de nidification pour cette période !

DES ALOUETTES AUX BERGERONNETTES (Lucien GRILLET)**ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*)****1998-1999 : 6/3 ou 4****1999-2000 : 5/2**

Nicheuse probable, migratrice.

Bien que la plupart des observations aient été faites en période de reproduction, aucune donnée de nidification certaine n'est parvenue au fichier.

Les sites fréquentés pour la période sont les dunes de la pointe de l'Aiguillon, la Belle Henriette à La Faute-sur-Mer, la pointe du Grouin du Cou à La Tranche-sur-Mer, la Grande Conche à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1999	01/05, pointe de l'Aiguillon (J. & P.Ada)	17/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)
Saison 2000	08/08, la Belle Henriette, La Tranche-sur-Mer (F.Por)	

COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*)**1998-1999 : 78****1999-2000 : 57**

Sédentaire.

Observable toute l'année sur les dunes de la côte mais aussi dans la plaine calcaire et sur les espaces dégagés des villes et des villages de la moitié sud du département.

Malgré la relative fréquence de l'espèce, deux mentions seulement de reproduction certaine à Fontenay-le-Comte (C.Gon).

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*)**1998-1999 : 25****1999-2000 : 20**

Nicheuse probable, migratrice partielle, hivernante.

En toutes saisons, la plupart des données concernent un ou plusieurs mâles chanteurs.

Surtout signalée dans le bocage, mais aussi sur les massifs dunaires et les zones viticoles.

Quelques exceptions sur la côte : 1 chanteur le 23/09/98 sur la plage de Sauveterre à Olonne-sur-Mer (S.Mai, F.Mlt & J.Men), des chanteurs le 23/12/99 à la Paracou (Les Sables-d'Olonne, S.Bon *et al.*), 1 ind. le 26/03/00 à La Gachère, Brétignolles-sur-Mer (F.Sem).

Un groupe de 15 oiseaux signalé le 10/01/99 à La Pommeraie-sur-Sèvre (E.Ouv).

Aucune mention de reproduction certaine pour cette période.



Cochevis huppé (Galerida cristata). Photo © Frédéric SIGNORET / LPO

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)

1998-1999 : 213

1999-2000 : 186

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Observée toute l'année en milieu ouvert dans tout le département. En tant que nicheuse, l'espèce se raréfie depuis plus de 10 ans.

Malgré les nombreuses observations, quelques données seulement de nidification certaine : en mai 1999 et mai 2000 à Saint-Hilaire-de-Riez, le 08/05/99 à la pointe de l'Aiguillon (C. & J.Gon), et le 15/04/99 à Beauvoir-sur-Mer (F.Sig).

La migration des alouettes s'observe à la pointe de l'Aiguillon entre le 15 octobre et la fin novembre.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*)

1998-1999 : 33

1999-2000 : 84

Migratrice, estivante rare (non nicheuse).

Quelques individus sont signalés chaque année dès le début de mars, survolant les plans d'eau durant les matinées froides de la fin de l'hiver, par contre elles sont observées en très grand nombre lors de la migration post nuptiale, à partir de la mi-août, en particulier près de la côte (plus de 5 000 à la pointe de l'Aiguillon).

Des migratrices sont encore mélangées aux vols d'hirondelles rustiques en octobre.

Aucune donnée de nidification.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		26/09, base de loisirs, Luçon (S.Vri)
Migr. pré-nuptiale 1999	16/03, lagune du Dain, Bouin (LPO)	29/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér)
Migr. postnuptiale 1999	08/07, St-Denis-du-Payré (C.Pac)	Dernière décade d'octobre, pointe de l'Aiguillon
Migr. pré-nuptiale 2000	07/03, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg (M.Cos)	04/05, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér)
Migr. postnuptiale 2000	20/07, la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer (J. & P.Ada)	

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*)

1998-1999 : 265

1999-2000 : 296

Nicheuse, migratrice.

Présente sur tout le département, de préférence à la campagne, souvent à proximité des élevages bovins. Elle aime à construire son nid dans les bâtiments d'élevage et les conduits de cheminée dans les bourgs du bocage.

Les premières sont signalées chaque année vers la fin février mais la majorité des couples ne sont installés que vers la mi-avril.

La migration post nuptiale commence dans la 1^{ère} décade de septembre. Fin octobre on observe encore quelques migratrices.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		08/11, la Garenne, Moutiers-sur-le-Lay (S.Vri)
Saison 1999	14/02, le Collet, Bouin (L.Gri)	11/11, la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer (Eq. Pointe)
Saison 2000	04/03, lagune du Dain, Bouin (F.Sig)	

Deux observations le 07/01/99 et le 20/01/99 à Beauvoir-sur-Mer (P.Rét, F.Sig)... Etait-ce la dernière de 1998, la première de 1999, ou bien un cas d'hivernage local ?

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*)

1998-1999 : 115

1999-2000 : 121

Nicheuse, migratrice.

Elle est présente sur tout le département d'avril à octobre, surtout dans les agglomérations. Bien que les premières migratrices soient signalés dès le début mars, les colonies ne sont au complet que début mai. Les premières pontes ne commencent que lorsque la température a atteint un degré élevé, rarement avant la fin de mai. Comme souvent 3 pontes successives ont lieu, les derniers jeunes ne partent parfois qu'au début d'octobre.

En 2000, du fait d'un mois de juillet exceptionnellement froid et pluvieux il n'y a eu que 2 pontes la plupart du temps.

A la pointe de l'Aiguillon on n'observe que très peu d'hirondelles de fenêtré en migration : à l'automne 1999 25 000 hirondelles rustiques ont été dénombrées, contre seulement 51 hirondelles de fenêtré.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		Régulière jusqu'au 13/10, puis encore 2 ind. le 03/11, port des Sables-d'Olonne (A.Aud)
Saison 1999	23/03, marais d'Olonne, Ile d'Olonne (M.Fou)	Régulière jusqu'au 21/09, puis 1 ind. le 09/11, la Chaume, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 2000	3 ind. le 01/03, Ile d'Olonne (J.Fra)*, puis arrivées à partir du 06/04 (ONCFS).	

* date la plus précoce du fichier LPO Vendée.

PIPIT DE RICHARD (*Anthus richardi*)

1998-1999 : 4/2

1999-2000 : 1/1

Espèce soumise à homologation nationale.

Migrateur occasionnel, et peut-être exceptionnellement hivernant. Originaire de Sibérie et d'Asie centrales

Les observations homologuées sont les suivantes (Ornithos 6-4 & 7-4) :

- 1 ind. le 07/10/98 à Château-d'Olonne (D.Des)
- 1 puis 2 ind. les 07/01, 17/01 et 24/01/99 sur l'aérodrome de La Tranche-sur-Mer (C. & J.Gon, A.Tho)
- 1 ad. le 23/12/99 à la Gachère, Brétignolles-sur-Mer (S.Vri, E.Ouv & F.Sem).

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*)

1998-1999 : 32

1999-2000 : 18

Nicheur et migrateur.

Fréquente surtout les dunes côtières. Nicheur certain sur les dunes de la pointe de l'Aiguillon, à la pointe d'Arçay et à l'Epine. Pas d'autre donnée de nidification pour la période.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		20/09, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)
Saison 1999	14/04, observatoire, Ile d'Olonne (D.Des)	24/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)
Saison 2000	18/04, la Gachère, Brétignolles-sur-Mer (F.Por)	

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*)**1998-1999 : 27****1999-2000 : 22**

Nicheur et migrateur.

N'est présent en Vendée que d'avril à octobre. Il est signalé chanteur, en parade donc nicheur probable autour des massifs forestiers et dans le marais Poitevin.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		19/10, Matte à Nauleau, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)
Saison 1999	03/04, forêt de Mervent (J. & P.Ada)	Deuxième décade d'octobre, baie de l'Aiguillon
Saison 2000	20/04, Ile d'Yeu (X. & M-P.Hin)	

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)**1998-1999 : 144****1999-2000 : 125**

Nicheur peu fréquent, migrateur, hivernant régulier.

En 1999 il est signalé nicheur certain à l'île d'Yeu, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à l'Aiguillon, aux Sables-d'Olonne, à Luçon. Pas de donnée de nidification en 2000.

On observe une migration très importante, en groupes dispersés de 3 à 100 ind., à la pointe de l'Aiguillon, de fin septembre à fin octobre. 23 500 pipits farlouses ont ainsi été dénombrés en 1999.

Ils hivernent en grand nombre dans les prairies de tout le département, ils repartent presque tous à partir de la mi-mars.

PIPIT MARITIME (*Anthus petrosus*)**1998-1999 : 39****1999-2000 : 27**

Nicheur peu fréquent, migrateur, hivernant.

Il hiverne régulièrement en petits groupes sur les côtes rocheuses des îles et du continent.

Il n'est signalé nicheur certain qu'à l'île d'Yeu le 15/05/99 (X. & M-P.Hin).

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)**1998-1999 : 19****1999-2000 : 13**

Hivernant et migrateur.

Il est signalé d'octobre à mars, en petit nombre autour des étangs du bocage, sur les pâtures de la Vie et des marais d'Olonne.

Un maximum de 20 ind. observés le 31/10/98 sur les bords du lac d'Albert à Xanton-Chassenon (G.Bes).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	31/10, lac d'Albert, Xanton-Chassenon (G.Bes)	Dernière décade de mars, St-Hilaire-de-Riez
Hiver 1999-2000	03/10, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér)	05/02, lac de Rochereau, Sigournais (S.Bon)

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*)**1998-1999 : 60****1999-2000 : 69**

Nicheuse et migratrice.

N'est présente en Vendée que de mars à octobre. Elle fréquente les marais côtiers et la plaine calcaire où elle niche.

A partir de fin août, à la pointe de l'Aiguillon, on peut observer des bandes éparpillées de 10 à 100 oiseaux migrant vers le sud à basse altitude.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		30 ind. le 29/09 à Ste-Hermine (S.Vri), puis encore notée le 15/11 à la Trottinière, Dompierre-sur-Yon (F.Sem)
Saison 1999	24/03, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	25/10, Marais Cadrit, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 2000	22/03, marais d'Olonne, Ile d'Olonne (ONCFS)	

BERGERONNETTE FLAVÉOLE (*Motacilla flava flavissima*)**1998-1999 : 2/2****1999-2000 : 10**

Migratrice.

Observée seulement en migration, au printemps et à l'automne, isolées ou en petits groupes parfois plurispécifiques.

En 1998, deux observations en septembre aux Sables-d'Olonne (S.Vri) et à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

En 1999, plusieurs passages signalés en septembre et octobre sur les cartes de Saint-Hilaire-de-Riez, Longeville-sur-Mer, Triaize et baie de l'Aiguillon.

En 2000, une dizaine d'individus en avril à la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J. & P.Ada) puis 1 ind. le 31/08 dans les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

BERGERONNETTE NORDIQUE (*Motacilla flava thunbergi*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 0/0**

Sous-espèce soumise à homologation départementale.

De passage occasionnel en Vendée, niche de la Norvège au nord de la Sibérie. Hivernent en Afrique sub-saharienne.

Une observation d'un individu le 04/09/99 à Longeville-sur-Mer (A.Aud).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)**1998-1999 : 45****1999-2000 : 36**

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Signalée au printemps et en été le long des cours d'eau, surtout dans le bocage.

Nicheuse certaine en avril et mai 1999 à l'étang de la Tesserie, La Pommeraie-sur-Sèvre (E.Ouv) et en forêt de Mervent (D.Bro & J.Gon). En 2000 pas de données de nidification certaine !

En hiver, observée çà et là, généralement isolée.

A la pointe de l'Aiguillon elle migre isolée ou en très petits groupes en septembre et en octobre.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)**1998-1999 : 251****1999-2000 : 216**

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Observée partout sur le département et en toutes saisons. En hiver les observations les plus nombreuses sont faites sur les plages et à l'île d'Yeu.

Plusieurs données de reproduction certaine.

Un dortoir d'un millier d'individus signalé le 28/11/99 à Port Bourgenay (Talmont-Saint-Hilaire) dans les jardins d'un hôtel (G.Bla). Ces individus se rapportent très majoritairement au taxon ci-dessous.

BERGERONNETTE DE YARRELL (*Motacilla alba yarrellii*)**1998-1999 : 44****1999-2000 : 27**

Hivernante, migratrice.

Présente régulièrement en Vendée d'octobre à mars-avril, sur tout le département.

Un dortoir de 500 à 700 oiseaux mélangés à des bergeronnettes grises signalé le 12/11/98 et le 16/02/99 sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (G.Bes).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	50 ind. le 18/10, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	Dernière décennie de mars, St-Hilaire-de-Riez
Hiver 1999-2000	08/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)	Régulières jusqu'au 17/02, puis 1 ind les 15 et 18/04, plage des Bossilles, Ile d'Yeu (X. & M-P.Hin)
Hiver 2000-2001	12/08, Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas)	

DU TROGLODYTE MIGNON AUX TURDIDÉS (Bernard ROUSSEAU)

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) 1998-1999 : 269
1999-2000 : 213

Sédentaire.

Présent et commun en toute saison dans le département. Nicheur partout.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) 1998-1999 : 219
1999-2000 : 135

Sédentaire.

Présent et commun en toute saison. Le plus souvent observé en couple, il se reproduit dans tout le département.

ROUGEGORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*) 1998-1999 : 332
1999-2000 : 281

Nicheur dans tout le département. Hivernant, migrateur partiel.

Effectif plus important de septembre à février, suite à l'arrivée de migrants venus des pays nordiques.

Début d'arrivée "massive" le 12/09/99 au Poiré-sur-Velluire.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) 1998-1999 : 64
1999-2000 : 67

Nicheur et migrateur.

Présent de fin mars à septembre, commun dans les haies, dans tout le département. Très repérable au printemps grâce à son chant, il est très discret ensuite.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1999	2 ^e décade de mars, baie de l'Aiguillon	25/07, pointe de l'Aiguillon (J.Gon)
Saison 2000	05/04, Venansault (F.Por) et 1 ^{ère} décade d'avril un peu partout dans le département	3 ^e décade d'août, Mouzeuil-St-Martin

GORGEBLEUE À MIROIR (*Luscinia svecica*) 1998-1999 : 36
1999-2000 : 17

Nicheuse et migratrice.

Elle est présente et se reproduit dans tous les marais côtiers : marais Breton, marais Poitevin, Jard-sur-Mer, Noirmoutier, Les Sables-d'Olonne. Absente de l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		05/10, pointe de l'Aiguillon (J. & P.Ada)
Saison 1999	18/03, pointe de l'Aiguillon (J. & P.Ada)	29/09, la Belle Henriette, La Tranche-sur-Mer (M.Cos)
Saison 2000	11/03, pointe de l'Aiguillon (J. & P.Ada)	1 ^{ère} décade de juin, St-Jean-de-Monts. Plus de données après cette date

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) 1998-1999 : 214
1999-2000 : 129

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Souvent observé seul ou en couple, il est nicheur dans tout le département : plages, côtes rocheuses, vieux villages, agglomérations.

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) 1998-1999 : 35
1999-2000 : 23

Nicheur rare, migrateur.

Observé régulièrement en Vendée en migration pré-nuptiale et post-nuptiale. Nidification à la Bernadière (La Flocellière) en 1999 et en 2000. Une femelle observée en mai et juin à Saint-Michel-Mont-Mercure, mais sans preuve de nidification.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		23/10, mare des Agaures, Les Sables-d'Olonne (J.Gon & J.Grn)
Migr. pré-nuptiale 1999	01/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér)	03/06, la Chambaudière, Saint-Michel-Mont-Mercure (C.Lau)
Migr. postnuptiale 1999	13/08, pointe de l'Aiguillon (J.Gon)	16/10, Ile-d'Yeu (X. & M-P.Hin)
Migr. pré-nuptiale 2000	1 ^{ère} décade d'avril, Brétignolles-sur-Mer	03/06, allée forestière du Douard, Mervent (L.Gri)
Migr. postnuptiale 2000	24/08, Péault (J. & P.Ada)	

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*)

1998-1999 : 30

1999-2000 : 48

Migrateur.

Il est observé en migration pré-nuptiale (avril-mai-juin) ou postnuptiale (août-septembre), mais également comme nicheur dans les marais (indices certains à Saint-Hilaire-de-Riez et au Poiré-sur-Velluire pour cette période).

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		05/10, France, Mouzeuil-St-Martin (J-C.Lue)
Saison 1999	16/03, la Guittière, Talmont-Saint-Hilaire (J. & P.Ada)	25/10, la Paracou, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 2000	1 le 21/01, France Turbot, Noirmoutier-en-l'Ile (M.Cha)* puis observé à partir de début avril à La Verrie	

* date la plus précoce du fichier LPO Vendée...



Tarier des prés (*Saxicola rubetra*). Dessin © Benoît PERROTIN

TARIER PÂTRE (*Saxicola torquata*)

1998-1999 : 124

1999-2000 : 139

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Présent toute l'année sur l'ensemble du département. Les données de reproduction concernent surtout les marais, mais il se reproduit probablement dans le bocage où des couples sont présents toute l'année.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*)**1998-1999 : 63****1999-2000 : 65**

Nicheur rare, migrateur.

Il est régulièrement observé au cours de la migration pré ou postnuptiale sur la frange côtière, plus rarement dans le bocage (observations à Montournais).

A niché à Saint-Hilaire-de-Riez en 1999. Pas d'indice de nidification de l'espèce à l'île d'Yeu (si ce n'est sa présence au mois de juin 1999).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		Encore 2 le 31/10 à l'île d'Yeu puis 1 le 24/11, la Vergne, Péault (J. & P. Ada)
Migr. pré-nuptiale 1999	01/03, pointe de l'Aiguillon (J. & P. Ada)	3 ^e décade d'avril, Brétignolles-sur-Mer
Migr. postnuptiale 1999	11/08, plage des Bossilles, Ile-d'Yeu (X. & M-P. Hin)	26/10, la Paracou, Les Sables-d'Olonne (D. Des)
Migr. pré-nuptiale 2000	09/03, France, Mouzeuil-St-Martin (J-C. Lue)	04/05, l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île (R. Tap)
Migr. postnuptiale 2000	30/07, pointe du Devin, L'Épine (T. You)	

MERLE À PLASTRON (*Turdus torcatus*)**1998-1999 : 4/2 ou 3****1999-2000 : 3/3**

Migrateur.

Quelques observations sur la côte et l'île d'Yeu au cours des migrations pré et postnuptiales (avril et octobre essentiellement). Signalons un individu observé à Saint-Michel-Mont-Mercure, dans le Haut-Bocage, le 25/04/99 (C. Lau).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998*	16/10, la Paracou, Les Sables-d'Olonne (D. Per)	29/10, île d'Yeu (X. & M-P. Hin, Gpe Jeunes)
Migr. pré-nuptiale 1999	25/04, St-Michel-Mont-Mercure (C. Lau)	
Migr. postnuptiale 1999	<i>Pas de données.</i>	
Migr. pré-nuptiale 2000**	09/04, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G. Bes)	20/04, pointe de Gilberge, île d'Yeu (X. & M-P. Hin)

*4 observations (2 sites)

** 3 observations (3 sites)

MERLE NOIR (*Turdus merula*)**1998-1999 : 330****1999-2000 : 348**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Il se reproduit dans tout le département où on le trouve toute l'année.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)**1998-1999 : 27****1999-2000 : 15**

Migratrice et hivernante.

Présente le plus souvent en groupes assez importants (plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'ind.) Peut se rencontrer dans tout le département.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	03/11, Réserve Naturelle, Noirmoutier (LPO Noi)	02/04, la Mantruère, Montournais (S. Bar)
Hiver 1999-2000	2 ^e décade d'août, Rocheservière	21/03, le Printemps, Le Poiré-sur-Vie (A. Gér)

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)**1998-1999 : 156****1999-2000 : 128**

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Elle est observée en toute saison dans tout le département. Quelques données de reproduction seulement : Rocheservière, Montournais.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)**1998-1999 : 54****1999-2000 : 13**

Hivernante et migratrice.

Présente partout en hivernage dans le département.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	19/10, Matte à Nauleau, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)	20/03, étang des Boucheries, Les Landes- Génusson (L.Gri & S.Mér)
Hiver 1999-2000	13/10, marais de la Guerche, Ile-d'Yeu (X. & M-P.Hin, C. & S.Cou)	16/03, étang des Boucheries, Les Landes- Génusson (L.Gri & S.Mér)

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*)**1998-1999 : 137****1999-2000 : 85**

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Elle est observée toute l'année et se reproduit dans l'ensemble du département.

DE LA BOUSCARLE DE CETTI AUX MÉSANGES (Didier DESMOTS)**BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*)****1998-1999 : 81****1999-2000 : 46**

Nicheuse et migratrice partielle.

Présente sur l'ensemble du département, toujours dans les zones humides, et avec une majorité d'observations en provenance du littoral.

L'espèce est notée sur tous les mois de l'année, mais aucun indice de reproduction pour ces deux saisons de nidification.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*)**1998-1999 : 48****1999-2000 : 42**

Nicheur et migrateur partiel.

En dehors des communes proches du littoral où l'espèce est notée très régulièrement sur ces deux années, la dispersion postnuptiale 1999 permet d'obtenir des contacts à Poiroux et à Maché. Au printemps 2000, des chanteurs sont entendus dans les terres : Maché, Venansault, Bournezeau et Bourneau. Aucune donnée de l'île d'Yeu.

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice.

Deux chanteurs à des dates et en des lieux classiques, témoins de la régularité du passage pré-nuptial de l'espèce sur le littoral vendéen :

- 1 chanteur le 19/04/99 à la Paracou aux Sables-d'Olonne (D.Des)
- 1 chanteur le 21/04/00 à Barbâtre (M.Vas & L.Dev)

PHRAGMITE AQUATIQUE (*Acrocephalus paludicola*)**1998-1999 : 8****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice rare, essentiellement au passage postnuptial.

Originaire de l'est de l'Allemagne et de la Hongrie à l'est de la Russie d'Europe et au nord de l'Ukraine.

Le passage postnuptial 1999 fournit une belle série de 9 observations, entre le 05/08 (1 ind. sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, A.Lar) et le 27/09 (1 ind. à l'île Charrouin, C.Gon). Sept des neuf données sont toutefois obtenues dans la première quinzaine d'août. Les observations concernent à chaque fois un seul individu et les sites d'observations sont tous situés dans les grands marais du département : 6 observations pour le marais Poitevin, 1 pour le marais Breton, 1 pour le marais d'Olonne et 1 pour les marais de Talmont. L'observation du 27/09/99 est la plus tardive actuellement enregistrée au fichier.

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*)

1998-1999 : 19
1999-2000 : 5/5

Migrateur et nicheur localisé dans certaines zones humides.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		27/09, lagune de la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer (D.God)
Saison 1999	18/04, étang Bruneau, St-Hilaire-le-Vouhis (M.Bib)	05/10, Ileau de Champclou, Olonne-sur-Mer (D.Des)
Saison 2000	24/05, Ile Charrouin, Vix (C.Gon)	

Les observations concernent essentiellement des migrateurs et aucun indice de nidification n'est obtenu sur ces deux années. Cette espèce mériterait une attention particulière des observateurs afin de mieux cerner son statut en Vendée.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)

1998-1999 : 48
1999-2000 : 40

Migratrice et nicheuse sur tout le département. Notée également à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		12/11, mare des Agaures, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 1999	15/04, étang des Boucheries, Les Landes-Genusson (L.Gri et S.Mér)	26/10, mare des Agaures, Les Sables-d'Olonne (D.Des) et observatoire de L'Ile-d'Olonne (D.Des)
Saison 2000	27/04, étang des Boucheries, Les Landes-Genusson (L.Gri & S.Mér)	

L'oiseau du 12/11 sur la mare des Agaures aux Sables-d'Olonne constitue l'observation la plus tardive du fichier. Il stationnait sur le site depuis le 10/11 au moins. Peu d'information sur la reproduction.

ROUSSEROLLE TURDOÏDE (*Acrocephalus arundinaceus*)

1998-1999 : 2/2
1999-2000 : 1/1

Migratrice et nicheuse très localisée.

Les 3 observations proviennent toutes du Perrier où un maximum de 3 chanteurs est noté le 01/06/99 (G.Bes) et de 5 à 6 chanteurs le 08/06/00 (G.Bes).

HYPOLAÏS ICTÉRINE (*Hippolais icterina*)

1998-1999 : 0/0
1999-2000 : 2/2

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice occasionnelle.

Remarquable observation printanière d'un ind. le 03/05/00 près du marais Montporteau aux Sables-d'Olonne (J.Grn, seule donnée printanière dans le fichier LPO85).

Une donnée automnale, dans la période habituelle : 1 ind. entendu puis observé dans les buissons de la digue du Collet à Bouin le 16/08/00 (T.You).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*)**1998-1999 : 43****1999-2000 : 57**

Migratrice et nicheuse, présente sur tout le département.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		-
Saison 1999	24/04, Chantonnay (S.Bon)	24/09, STEP de La Tranche-sur-Mer (C.Gir)
Saison 2000	19/04, STEP de Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas & L.Dev)	

Pas de donnée de reproduction sur ces deux années.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*)**1998-1999 : 16****1999-2000 : 12**

Hivernante et nicheuse localisée.

Les données sont toutes obtenues sur ou près du littoral (Ile d'Yeu, Brétignolles-sur-Mer, L'Île-d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire, Olonne-sur-mer, Noirmoutier et Bouin), et concernent toutes la période internuptiale. Des efforts sont à réaliser pour mieux appréhender le statut de cette espèce en Vendée.

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice occasionnelle (niche en Europe de l'est et du nord, hiverne en Afrique de l'est et dans la péninsule arabe). Un ind. le 24/10/98 près de la Bergerie à l'île d'Yeu (GpJeunes). 3^e donnée vendéenne et première donnée pour l'île d'Yeu, à une date qui cadre tout à fait avec les apparitions automnales de l'espèce sur la côte atlantique.



Fauvette babillarde (Sylvia curruca). Photo © Frédéric SIGNORET / LPO

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*)**1998-1999 : 92****1999-2000 : 66**

Migratrice et nicheuse.

Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		07/10, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier (LPO Noi)
Saison 1999	01/04, St-Vincent-Puymaufrais, Bournezeau (T.You)	18/09, Ileau de Champclou, Olonne-sur-Mer (D.Des)
Saison 2000	07/04, Mouzeuil-St-Martin (J-C.Lue)	

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*)

1998-1999 : 44

1999-2000 : 33

Migratrice et nicheuse.

Présente sur tout le département, mais nicheuse localisée sur le littoral. Pas de données de l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		06/10, mare des Agaures, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 1999	29/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér)	19/09, Chantonay (S.Bon)
Saison 2000	19/04, Ile d'Yeu (X. & M-P.Hin)	

FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)

1998-1999 : 170

1999-2000 : 129

Migratrice, nicheuse et hivernante.

Présente dans tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

POUILLOT A GRANDS SOURCILS (*Phylloscopus inornatus*)

1998-1999 : 1/1

1999-2000 : 0/0

Espèce soumise à homologation nationale.

Migrateur occasionnel.

Oiseau originaire de Sibérie septentrionale et orientale et d'Asie centrale.

Un ind. le 25/10/1998 à Port-Joinville (X.Hin & GpJeunes) : enfin un "PGS" sur l'île d'Yeu ! La date cadre parfaitement avec le pattern d'apparition de l'espèce en Vendée, les observations sont toutes comprises entre le 15/10 et le 17/11.

Observations acceptées par le CHN (Ornithos 6-4).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*)

1998-1999 : 0/0

1999-2000 : 3/3

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur et nicheur localisé.

Toutes les données sont obtenues au printemps 2000. L'une concerne un oiseau en migration pré-nuptiale : un chanteur le 01/05 à Givrand (G.Bes). Les deux autres peuvent être rattachées à une nidification possible : un chanteur le 09/05 et le 03/06 à Bourneau (L.Gri & J-P.Pai).

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*)

1998-1999 : 2/2

1999-2000 : 0/0

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur et nicheur localisé.

Deux observations au printemps 1999 : un chanteur le 21/04 à Bourneau (D. & M-T.Bro), puis 4 ind. au même endroit le 14/05 (J.Gon & D.Bro).

POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*)

1998-1999 : 284

1999-2000 : 233

Migrateur, nicheur et hivernant.

Commun partout en Vendée, y compris à l'île d'Yeu.

Noté sur l'ensemble du département, peu de fait marquants, quelques hivernants seulement sont signalés.

POUILLOT VELOCE "DE TYPE SIBERIEN"
(*Phylloscopus collybita tristis/fulvescens*)

1998-1999 : 2/1
1999-2000 : 0/0

Espèce soumise à homologation nationale.

Migrateur occasionnel.

Originaire de la Sibérie, de la Petchora et de l'Oural jusqu'au fleuve Ienisseï.

Un ind. les 25 et 26/10/98 à Port-Joinville, L'Ile d'Yeu (F.Noë).

Observation acceptée par le CHN (Ornithos 7-4).

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*)

1998-1999 : 63
1999-2000 : 46

Migrateur commun et nicheur très localisé.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		30/10, L'Ile d'Yeu (GpJeunes)
Migr. pré-nuptiale 1999	24/03, marais d'Olonne, L'Ile-d'Olonne (M.Fou)	25/04, Le Poiré-sur-Velluire (D. & M-T.Bro)
Migr. postnuptiale 1999	17/07, St-Hilaire-des-Loges (G.Bes)	26/10, observatoire de L'Ile-d'Olonne (D.Des)
Migr. pré-nuptiale 2000	01/03, La Bruffière (W.Mai <i>et al.</i>)*	20/04, Les Landes-Génusson (L.Gri & S.Mér)
Migr. postnuptiale 2000	29/07, Chantonnay (D.God)	

* donnée la plus précoce enregistrée au fichier.

Aucun indice de nidification pour la période. Un arrêt des observations est très net sur les deux années: du 25/04 au 17/07/99 et du 20/04 au 29/07/00.

ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*)

1998-1999 : 55
1999-2000 : 37

Migrateur, nicheur, hivernant.

Présent sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

Les observations sont essentiellement réalisées en période internuptiale. Des nicheurs possibles sont signalés à Rocheservière (L.Gri) et Chaillé-sous-les-Ormeaux (A.Text).

ROITELET TRIPLE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)

1998-1999 : 64
1999-2000 : 49

Migrateur, nicheur, hivernant.

Présent sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

Les observations sont essentiellement réalisées en période internuptiale.

L'île d'Yeu fournit une donnée de reproduction : 1 adulte avec 4 jeunes volants le 15/05/99.

GOBEMOUCHE GRIS (*muscapa striata*)

1998-1999 : 37
1999-2000 : 36

Migrateur et nicheur.

Présent sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		05/10, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Saison 1999	12/05, marais de la Guerche, L'Ile d'Yeu (X. & M-P.Hin)	14/10, plage des Bosilles, L'Ile d'Yeu (X. & M-P.Hin)
Saison 2000	07/05, pointe de l'Aiguillon (M.Cos)	

L'observation du 14/10/99 constitue la mention la plus tardive actuellement enregistrée au fichier.

Bien peu d'indices de reproduction sont obtenues, répartis sur trois communes : Moutiers-sur-le-Lay, Montournais, Velluire...

GOBEMOUCHE À COLLIER (*Ficedula albicollis*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur occasionnel

1 ind. le 29/08/2000 à la lagune de la Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer (J-P.Sib). Une nouvelle donnée postnuptiale en Vendée, pour une espèce d'identification particulièrement délicate à cette période de l'année...

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)**1998-1999 : 35****1999-2000 : 36**

Migrateur.

Observé essentiellement au passage postnuptial, principalement sur le littoral.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 1998		19/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)
Migr. pré-nuptiale 1999	Pas d'observation	Pas d'observation
Migr. postnuptiale 1999	09/07, plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer (J.Gon)	14/10, Ker Châlon, L'Ile d'Yeu (X. & M-P.Hin)
Migr. pré-nuptiale 2000	22/04, La Bosse, L'Epine (M.Vas)	1 ^{ère} décade de juin, Chaillé-sous-les-Ormeaux (A.Text)
Migr. postnuptiale 2000	30/07, pointe du Devin, L'Epine (T.You)	

PANURE À MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*)**1998-1999 : 1/1****1999-2000 : 0/0**

Migratrice et hivernante.

Une seule observation pour ces deux années : 3 ind. (1 mâle et 2 femelles) le 19/12/98, lagune de la Belle-Henriette, à La Faute-sur-Mer (G.Bes & P.Rou).

MÉSANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*)**1998-1999 : 149****1999-2000 : 81**

Nicheuse, hivernante et migratrice partielle.

Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

A noter, une preuve de reproduction sur l'île Yeu : 1 couple avec des jeunes volants le 14/05/99 (X. & M-P.Hin)

MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*)**1998-1999 : 34****1999-2000 : 21**

Hivernante et nicheuse localisée.

La grande majorité des observations provient de la moitié est du département. Une seule donnée de reproduction : deux couples nicheurs le 27/07/00 à Chantonnay (D.God).

MÉSANGE HUPPÉE (*Parus cristatus*)**1998-1999 : 21****1999-2000 : 6**

Nicheuse et hivernante.

En dehors du littoral où l'espèce est commune dans les forêts et bois de conifères, des ind. sont notés à La Réorthe (les Grands Bois), La Roche-sur-Yon (lac du Moulin Papon), Saint-Mars-la-Réorthe (bois des Jarries) et Montaigu (parc des Rochettes).

MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*)**1998-1999 : 1****1999-2000 : 3**

Migratrice et hivernante.

Quatre observations pour deux hivers, c'est bien maigre ! La dernière invasion significative de l'espèce remonte à l'hiver 1996/1997.

MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) **1998-1999 : 301**
1999-2000 : 222

Nicheuse et hivernante.
Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) **1998-1999 : 314**
1999-2000 : 273

Nicheuse et hivernante.
Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

DE LA SITELLE TORCHEPOT AUX BRUANTS (Théophane YOU)

SITELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) **1998-1999 : 46**
1999-2000 : 26

Sédentaire, observée dans tout le bocage, de préférence dans les grands parcs ou les forêts âgées. Observée sur le littoral sur la carte de Saint hilaire de Riez de septembre à décembre (G.B).

TICHODROME ÉCHELETTE **1998-1999 : 1/1**
1999-2000 : 0/0

Espèce soumise à homologation départementale, occasionnelle dans le département.
Cette espèce montagnarde vient parfois hiverner sur les châteaux, églises ou falaises de nos départements atlantiques.
Une seule observation le 29 décembre 1999 sur le barrage de Mervent (J.Ber). L'oiseau a peut-être hiverné sur ce site très peu prospecté, mais il peut s'agir uniquement d'un passage.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) **1998-1999 : 126**
1999-2000 : 83

Sédentaire, commun dans l'ensemble du département, observé d'abord dans le bocage mais aussi dans les forêts littorales. Les données littorales sont peu nombreuses, notamment en période de reproduction. Noté au mois d'octobre sur l'île d'Yeu.

RÉMIZ PENDULINE (*Remiz pendulinus*) **1998-1999 : 13/11**
1999-2000 : 0/0

Migratrice et hivernante rare.
Comme le précédent cru (1997-1998), la saison 1998-1999 a été remarquable par la qualité de son passage postnuptial et de son hivernage. Les deux sites principaux pour observer cette espèce sont toujours la mare des Agaures aux Sables-d'Olonne et la lagune de la Belle Henriette à La Tranche-sur-Mer. L'effectif maximum observé est de 11 individus mais le passage a très certainement été plus important.
Par contre la saison 1999-2000 n'a fourni aucune observation sur ces deux sites.

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) **1998-1999 : 52**
1999-2000 : 46

Migrateur et nicheur, présent dans l'ensemble du département (île d'Yeu comprise), dans les forêts et bois et notamment dans les peupleraies.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1999	30/04, La Réorthe (A.Gér)	30/08, Moutiers-sur-le-Lay (S.Vri)
Saison 2000	25/04, Moutiers-sur-le-Lay (S.Vri)	

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*)**1998-1999 : 25****1999-2000 : 16**

Migratrice et nicheuse, présente dans l'ensemble du bocage et le sud Vendée.

	Première observation	Dernière observation
Saison 1998		<i>Pas d'observation en septembre</i>
Saison 1999	01/05, Cheffois (S.Bar & E.Ouv)	17/09, Marais d'Olonne (ONCFS)
Saison 2000	01/05, Chantonnay (B.Per)	

La diminution des effectifs est peut-être due au manque de mobilisation mais il peut aussi y avoir une tendance à la baisse.

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*)**1998-1999 : 5/1****1999-2000 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale, occasionnelle dans le département.

Une donnée d'hivernage en 1998-1999, qui vient après une longue période d'absence. Le bocage est potentiellement très favorable pour l'hivernage de cette espèce mais ses effectifs en chute libre en France ne favorisent pas les apparitions vendéennes. Le 21 septembre 1999, un individu est observé à Saint-Maurice-des-Noues (D.Bro), ce qui correspond aux dates habituelles des observation de migration.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (*Lanius senator*)**1998-1999 : 4/1****1999-2000 : 3/3**

Migratrice, nicheuse rare.

Pour cette période les seules données proviennent d'individus en migration sur la côte :

1999 : un individu stationne du 13/08 au 16/08 à L'Ile-d'Olonne (D.Des).

2000 : 1 le 30/04 dans les marais de la Vie (G.Bes), 1 le 07/06 au Fort Larron à Noirmoutier (LPO Noi) et 1 le 11/08 à Talmont-Saint-Hilaire (F.Sal).

Pas de reproduction pour ces deux années qui semblent mauvaises pour les pies grièches.



Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator). Photo © Matthieu VASLIN

GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*)**1998-1999 : 165****1999-2000 : 176**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Commun dans l'ensemble du département, mais pas d'observation sur les îles pour cette période.

- PIE BAVARDE (*Pica pica*)** **1998-1999 : 356**
1999-2000 : 268
Sédentaire, commune dans l'ensemble du département, même sur l'île d'Yeu.
- CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrochorax pyrochorax*)** **1998-1999 : 1/1**
1999-2000 : 0/0
Espèce soumise à homologation départementale.
Nicheur des pelouses rases d'altitude ou de Bretagne, exceptionnel en Vendée.
L'observation remarquable d'un juvénile le 07/07 à La Chaize-le-Vicomte doit correspondre à de l'erratismes postnuptial d'individus bretons (C.Goy).
- CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*)** **1998-1999 : 227**
1999-2000 : 217
Sédentaire, commun dans l'ensemble du département, pas d'observation sur l'île d'Yeu.
Des individus sont observés en migration active à la pointe de l'Aiguillon. Pas de recensement des colonies.
- CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)** **1998-1999 : 138**
1999-2000 : 255
Nicheur grégaire et hivernant, commun localement dans le département (pas de donnée à l'île d'Yeu).
De nombreuses colonies dans le département avec des effectifs variant de 10 à 126 nids.
- CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*)** **1996-1997 : 381**
1999-2000 : 315
Sédentaire, commune dans l'ensemble du département.
Des individus erratiques sont observés chaque année en migration à la pointe de l'Aiguillon. Quelques rassemblements de plus de 20 individus.
- ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*)** **1998-1999 : 338**
1999-2000 : 301
Nicheur, migrateur et hivernant, présent dans l'ensemble du département.
- MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*)** **1998-1999 : 321**
1999-2000 : 273
Sédentaire, commun dans tout le département, observé le plus souvent en zone urbaine et dans les villages.
- MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*)** **1998-1999 : 93**
1999-2000 : 61
Sédentaire, noté dans l'ensemble du département (mais pas de donnée à l'île d'Yeu ni à Noirmoutier).
Un rassemblement hivernal de 20 à 50 ind. à Montournais autour d'un tas d'ensilage, en janvier et février 1999 (S.Bar).
Les alentours des fermes sont les lieux les plus favorables pour observer cette espèce qui semble avoir une distribution irrégulière.
- MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*)** **1998-1999 : 0/0**
1999-2000 : 1/1
Moineau méditerranéen sédentaire, en limite d'aire de répartition dans notre département.
Une donnée hivernale (06/11/99) d'un groupe de 40 individus dans la plaine de Bretet à Saint-Hilaire-des-Loges (G.Bes).
Pas d'observation en 2000.

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*)**1998-1999 : 377****1999-2000 : 297**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Une des espèces nicheuses les plus communes du département.

Observé en migration active à la pointe de l'Aiguillon. Les maxima ont été observés le 08/11/98 (2 056 oiseaux dans la matinée) et le 27/10/99 (5 899 oiseaux). Le total des passages de Pinson des arbres entre le 1^{er} septembre et le 30 novembre s'élève à 9 672 en 1998 et à 21 469 en 1999.**PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)****1998-1999 : 14****1999-2000 : 13**

Migrateur et hivernant, observé en migration active à la pointe de l'Aiguillon parmi les troupes de pinsons des arbres. Quelques données çà et là en hiver mais pas de grands rassemblements.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	10/10, pointe de l'Aiguillon (S.Vri)	~200, 25/02, Sainte-Pexine (S.Vri)
Hiver 1999-2000	13/10, phare de l'Armandèche (D.Des)	27/02, Forêt d'Olonne (ONCFS)

SERIN CINI (*Serinus serinus*)**1998-1999 : 83****1999-2000 : 56**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Quelques données hivernales et de reproduction, en plus grand nombre sur le littoral et dans les bourgs.

Observé en migration active à la pointe de l'Aiguillon. Les maxima ont été observés le 18/10/98 (75 oiseaux dans la matinée) et le 29/10/99 (22 oiseaux). Le total des passages de Serin entre le 1^{er} septembre et le 30 novembre s'élève à 284 en 1998 et à 146 en 1999.**VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*)****1998-1999 : 198****1999-2000 : 218**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Hivernant abondant et nicheur dans tout le département.

Observé en migration active à la pointe de l'Aiguillon. Les maxima ont été observés le 18/10/98 (287 oiseaux dans la matinée) et le 27/10/99 (399 oiseaux). Le total des passages de Verdier entre le 1^{er} septembre et le 30 novembre s'élève à 1 713 en 1998 et à 1 732 en 1999.**CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)****1998-1999 : 271****1999-2000 : 258**

Nicheur commun, hivernant et migrateur.

Observé en migration active à la pointe de l'Aiguillon. Les maxima ont été observés le 18/10/98 (2 259 oiseaux dans la matinée) et le 29/10/99 (6 219 oiseaux). Le total des passages de Chardonneret entre le 1^{er} septembre et le 30 novembre s'élève à 24 310 en 1998 et à 34 786 en 1999.**TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)****1998-1999 : 22****1999-2000 : 24**

Migrateur et hivernant en nombre irrégulier.

Observé en migration active à la pointe de l'Aiguillon. Les maxima ont été observés le 02/11/98 (98 oiseaux dans la matinée) et le 01/11/99 (2 527 oiseaux). Le total des passages de Tarin des aulnes entre le 1^{er} septembre et le 30 novembre s'élève à 626 en 1998 et à 9 503 en 1999.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	05/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)	15/03, Forêt de Grasla (A.Gér)
Hiver 1999-2000	06/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)	2/03, lac de Maché (A.Gér)

LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*)**1998-1999 : 155****1999-2000 : 109**

Nicheuse, migratrice, hivernante.

Observé en migration active à la pointe de l'Aiguillon. Les maxima ont été observés le 22/10/98 (4 130 oiseaux dans la matinée) et le 19/10/99 (6 825 oiseaux). Le total des passages de Linotte entre le 1^{er} septembre et le 30 novembre s'élève à 41 767 en 1998 et à 53 741 en 1999.

Quelques données de reproduction mais peu nombreuses, un dortoir de 300 individus à Vouvant le 14/11/99.

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*)**1998-1999 : 40****1999-2000 : 22**

Nicheur devenu rare, essentiellement hivernant et migrateur.

Signalé en période de reproduction sur uniquement trois cartes. Pas de cas de reproduction en 2000 à part sur l'île d'Yeu.

GROSBEC CASSENOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*)**1998-1999 : 5/3****1999-2000 : 5/4**

Nicheur rare, migrateur, hivernant.

Les données proviennent des alentours des sites de reproduction car il n'y a pas eu d'invasion hivernale sur cette période. Un groupe de 20 ind. en hiver sur le site habituel des Herbiers.

Oiseau à rechercher dans les bois, surtout lorsqu'ils sont composés de hêtres.

BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*)**1998-1999 : 0/0****1999-2000 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale, occasionnel dans le département.

Migrateur, hivernant rare, se nourrissant sur les chaumes.

Une observation de 5 individus le 11/10/1999 (A.Fra & F.Ren) à Noirmoutier où il doit être régulier mais sa prospection est très fastidieuse et elle nécessite une oreille aguerrie.

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*)**1998-1999 : 13/4****1999-2000 : 38**

Migrateur, hivernant rare mais régulier, se nourrissant sur les plages.

En 1998-1999, 8 individus notés sur les sites côtier habituels. L'hiver 1999-2000 n'a pas été aussi impressionnant que l'hiver 1997-1998 mais de beaux effectifs ont été contacté sur toute la côte.

Le groupe le plus important (9 ind.) a été noté le 29/11/99 à Olonne-sur-Mer. A la mi octobre c'est au moins 12 individus différents qui ont été contacté sur l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 1998-1999	21/10, digue du Dain, Bouin (F.Sig)	15/11, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes & P.Rou)
Hiver 1999-2000	02/10, lagune de Bouin (F.Sig) et estuaire du Lay, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq. Pointe)	08/03, dunes de la Paracou, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*)**1998-1999 : 64****1997-1998 : 31**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel. Observé dans tout le département hormis l'île d'Yeu.

Un rassemblement hivernale de 35 individus noté sur l'étang de la Tesserie à La Pommeraie-sur-Sèvre (S.Bar).

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirrus*)**1998-1999 : 74****1999-2000 : 46**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel. Observé dans tout le département (île d'Yeu comprise).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*)**1998-1999 : 2/2****1999-2000 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur et nicheur occasionnel.

Peu de données : l'année 1998 est alimentée uniquement par un observateur (D.Des), avec 1 individu le 17/09 aux Sables-d'Olonne et un autre le 28/09 à l'île d'Yeu.

Un individu en migration à la pointe de l'Aiguillon le 23/09/00 (Eq. Pointe).

Les données seront sûrement plus nombreuses lorsque le cri de cette espèce sera mieux connu par les ornithologues.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*)**1998-1999 : 90****1999-2000 : 52**

Nicheur, migrateur partiel, hivernant.

Observé en migration active à la pointe de l'Aiguillon. Les maxima ont été observés le 11/11/98 (417 oiseaux dans la matinée) et le 27/10/99 (368 oiseaux). Le total des passages de Bruant des roseaux entre le 1^{er} septembre et le 30 novembre s'élève à 1 158 en 1998 et à 1 432 en 1999.

Nicheur autour des étangs du bocage et dans les marais (peu de données).

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*)**1998-1999 : 49****1999-2000 : 42**

Nicheur commun dans les marais et la plaine (beaucoup plus rare ailleurs), hivernant rare et localisé, migrateur.

Quelques données en période hivernale, sinon peu d'informations sur cette espèce commune dans le sud Vendée et en marais Breton mais plus rare ailleurs.

TISSERIN SP.**1998-1999 : 5/1****1999-2000 : 0/0**

Espèce échappée de captivité se mêlant aux fringilles dans leur migration.

Observé du 17 au 30/10/98 à la pointe de l'Aiguillon.