

Une nidification réussie du Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) en Vendée

Didier DESMOTS et Frédéric PORTIER



Résumé : Didier Perrocheau et Alexandre Méra découvrent un couple de guêpiers nicheurs à Olonne-sur-Mer en juillet 2001. Ce couple, ayant donné un jeune à l'envol, apporte la troisième mention de nidification de l'espèce dans le département.

Le 22 juillet 2001 après-midi, Didier Perrocheau et Alexandre Méra prospectent les dunes de la Gachère à Brétignolles-sur-Mer (Vendée). Des cris bien connus des deux observateurs attirent leur attention : un guêpier d'Europe se manifeste bruyamment à proximité. Ils tentent alors de suivre l'oiseau et découvrent que celui-ci ravitaille des poussins au nid. La surprise passée, ils contactent les observateurs locaux et un suivi du site s'organise, jusqu'à la fin de la reproduction de ce couple isolé.

HABITAT ET EMPLACEMENT DU NID

Le site occupé par les guêpiers est situé sur la commune d'Olonne-sur-Mer, en limite de Brétignolles-sur-Mer, dans l'ancien delta du petit fleuve côtier l'Auzance. De vastes étendues de dunes grises et de prés salés confèrent un caractère très ouvert au paysage, limité au sud-est par les dunes boisées de la forêt d'Olonne.

Une ligne électrique moyenne tension et quelques clôtures en fil de fer barbelé constituent les seuls éléments rectilignes, fréquemment utilisés par les guêpiers comme poste de chasse ou de repos. Le terrier est situé à



Le site de nidification du Guêpier d'Europe (Merops apiaster) à Olonne-sur-Mer. Photo © Frédéric PORTIER

un peu moins d'un kilomètre en amont de l'estuaire, soit dans la partie maritime du fleuve. Il a été creusé dans la partie supérieure d'un sapement vif de la rive gauche du cours d'eau, à environ un mètre cinquante de hauteur.

CHRONOLOGIE PARTIELLE DE LA NIDIFICATION

Le 22 juillet, jour de la découverte de la reproduction, les adultes ravitaillent déjà un ou des poussins, qui demeurent toutefois invisibles à l'intérieur du terrier. A partir du 3 août, un jeune bien emplumé sort régulièrement la tête de l'orifice.

Le 7 août, les adultes nourrissent encore au nid, mais le 8 août le couple et le jeune volant sont observés sur la rive opposée à celle du terrier. Les oiseaux semblent désertier très rapidement le site, car les visites effectuées après le 8 août ne procurent plus aucun contact.

La durée d'incubation étant de 28 jours et l'envol se produisant 28 jours après l'éclosion (LESSELLS 1994), on peut penser que la ponte a été déposée vers le 15 juin.

Lors de la période de nourrissage des jeunes au nid, la fréquence des apports de proies est variable.

Elle peut être très élevée : six en 15 minutes le 3 août, mais elle peut aussi être complètement interrompue pendant plusieurs heures lors de journées pluvieuses ou lors de dérangements importants. C'est notamment le cas lors de la présence prolongée de "pêcheurs à pied" dans le lit de l'Auzance.

Parmi les proies rapportées au nid, il a été noté de gros hyménoptères, mais aussi des hétérocères de grande taille : le Bombyx du Chêne (*Lasiocampa quercus*) a été identifié à deux reprises.

DISCUSSION

En Vendée, le Guêpier d'Europe est un migrateur rare mais régulier aux deux passages (tableau 1) et un nicheur occasionnel. En effet, cette reproduction de 2001 constitue le troisième cas pour le département. En 1956, KOWALSKY (1980) découvre un nid dans les dunes de la Tresson sur l'île de Noirmoutier et il récupère "un jeune bien emplumé, mort sous l'entrée du nid". En 1983, Jean Daviau (*in* fichier LPO85) constate la nidification de deux couples dans des talus de cultures maraîchères à Longeville-sur-Mer. Il ne

donne toutefois aucun élément sur le succès de cette nidification.

Plus généralement, l'espèce niche communément en Europe jusqu'à l'isotherme 21°C de juillet et quelques couples atteignent plus ou moins régulièrement des pays plus nordiques : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Finlande, Suède... (KRISTIN & PETROV 1997). En France, l'espèce était considérée comme rare en tant que reproductrice au XIX^e siècle, puis a réalisé une progression remarquable après 1946, et surtout à la fin des années 1960, puis à la fin des années 1980 (DUBOIS *et al.* 2000). Le Guêpier niche actuellement communément en zone méditerranéenne et dans la vallée du Rhône jusqu'à la région lyonnaise. Des nidifications régulières ont également lieu plus au nord (Finistère, Poitou-Charentes, Aquitaine notamment) et l'espèce est aussi bien connue pour ses reproductions occasionnelles un peu partout en France (DUBOIS *et al.* 2000, LESSELLS 1994).

La situation en 2002 et 2003

Le 25 avril 2002, un oiseau est à nouveau présent sur le même site. Le fin trait noir bien net sous la gorge jaune laisse penser qu'il s'agit du mâle.

Cet oiseau au comportement curieusement discret sera observé à plusieurs reprises, jusqu'au 25 mai, au même endroit mais toujours seul.

En 2003, aucune donnée n'est obtenue.

Mois Année	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.
1995	0	1	0	0	2	0
1996	2	1	0	0	0	4
1997	1	0	0	1	1	0
1998	1	0	0	0	0	0
1999	0	1	0	0	0	0
2000	0	3	0	0	0	0
2001	0	1	1	3	5	0
2002	3	3	1	6	0	0

Tableau 1 – Nombre de données de Guêpier d'Europe en Vendée pour la période 1995-2002 (sur la base des données transmises au fichier LPO85)

CONCLUSION

Cette nouvelle nidification du Guêpier d'Europe en Vendée semble être la première à avoir produit un jeune à l'envol. Dans le contexte actuel d'expansion de cette espèce, il

est fort probable que de nouveaux cas seront enregistrés dans les prochaines années. D'ores et déjà, la relative discrétion des oiseaux dans le cas d'un couple isolé nous laisse penser que d'autres reproductions sont passées inaperçues dans le département.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier tous les observateurs qui ont participé au suivi de cette nidification et qui ont bien voulu nous transmettre leurs observations : André Barzic, Gérard Besseau, Anthony Lucas, Josiane Melier, Hélène Michaud, Yves Wilcox et plus particulièrement Alexandre Méra et Didier Perrocheau, découvreurs de cette nidification. Merci également à Christian Gonin, qui a recherché les observations disponibles dans le fichier de la LPO85.



Un guêpier adulte sortant du nid, le 26/07/03, Olonne-sur-Mer. Photo © Frédéric PORTIER

BIBLIOGRAPHIE

DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., YESOU P. & OLIOSO G. – 2000 – *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan/HER, Paris, 400 pages.

KOWALSKY S. – 1980 – Contribution à l'étude de la faune ornithologique de l'île de Noirmoutier. *Bull. des Amis de Noirmoutier*, 38 : 10-15.

KRISTIN A. & PETROV T. – 1997 – *Bee-eater Merops apiaster*. Pp 432-433. In HAGEMEIJER E.J.M. & BLAIR M.J. – 1997 – *The EBBC Atlas of European Breeding birds : their distribution and abundance*. T & AD Poyser, London, 903 pages.

LESSELLS C. – 1994 – *Guêpier d'Europe Merops apiaster*. Pages 422-423. In YEATMAN-BERTHELOT D., coord. – 1994 – *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France, 1985-1989*. Société Ornithologique de France, Paris, 776 pages.

Didier DESMOTS
Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Fort Larron
85 330 NOIRMOUTIER-EN -L'ILE
marais.mullembourg@wanadoo.fr

Frédéric PORTIER
144 rue Georges Clemenceau
85190 VENANSAULT
Frederic.PORTIER@wanadoo.fr