



Les oiseaux rares et accidentels en Vendée en 2001

Premier rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen

Julien GONIN et le CHD 85

INTRODUCTION

Voici le premier rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen. Pour cette année de lancement 82 fiches nous sont parvenues et ont été examinées. Le taux d'acceptation est de 94 %. Pour l'année 2001, le Comité se composait des membres suivants : Michel Bibard, Didier Brossard, Christian Gonin, Julien Gonin (secrétaire), Lucien Grillet, Xavier Hindermeyer, Frédéric Portier, Matthieu Vaslin, Sylvain Vrignaud, Théophile You. Sylvain Vrignaud, maintenant installé dans l'Allier, nous quitte. Le Comité le remercie vivement pour tout le travail qu'il a pu fournir, notamment lors de la création et du lancement de ce CHD. Son poste ne sera pas remplacé, le CHD se composera donc dorénavant de 9 membres.

FAITS MARQUANTS

Pour 2001, on retiendra les 2^e et 3^e mentions départementales de Bruant fou ainsi que la 3^e mention départementale d'Aigle royal. Enfin, au titre des observations à des dates peu habituelles, notons un mâle de Garrot à œil d'or en juin, un Pouillot fitis chanteur (nicheur ?) d'avril à juin et les données hivernales d'un bécasseau cocorli et de deux bihoreaux gris.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données, et celui des individus correspondants présents dans la base de données de la LPO Vendée ou dans la littérature pour le XX^e siècle

(juste avant la création du CHD). Les deux suivants représentent le nombre de données homologuées en 2001 et le nombre d'individus correspondant.

3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un seul individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Observateur(s), sauf exception limité à 3 (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe ou dessinateur).
9. Au début de chaque commentaire, la distribution générale de l'espèce et son statut en Vendée sont indiqués entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de la liste du Comité de l'Avifaune Française (CAF 1997).
11. Les données concernant les races et sous-espèces sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la race et/ou de la sous-espèce concernée.
12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à l'année 2001. Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elle doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Aigle royal - 1 juv. / 1^{ère} année, le 28 octobre 2001 à La Roche-sur-Yon, Vendée (M. South & P. Yésou *in* GONIN et le CHD Vendée 2004).

* Espèce soumise au CHD hors de certaines zones géographiques.

** Espèce soumise au CHD pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

PUFFIN CENDRE *Calonectris diomedea*

(75/1 025) (11/25)

- L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 1 et 2 le 25 avril, 1 le 1^{er} mai, 2 le 7 juin, 1 le 14 juin, 2 le 15 juin, 1 le 12 juillet, 5 le 13 juillet, 1 et 3 le 18 juillet et 6 le 02 août (M. Bibard).

(Iles méditerranéennes. La sous-espèce *borealis* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries, aux Açores et à Berlenga au large du Portugal. Migrateur peu commun mais régulier sur le littoral vendéen).

Données habituelles sur un site habituel, notons quand même les groupes de 5 et 6 individus.

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis*

(28/329) (1/1)

- L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 11 avril (O. Penard).

(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough. Migrateur très rare, observé seulement loin au large des côtes vendéennes).

Donnée exceptionnelle pour cette espèce au printemps, néanmoins sur un site classique où l'espèce est plus régulière en fin d'été.

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus*

(46/366) (5/7)

- L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 7 et 25 avril (M. Bibard).
- Depuis le bateau à environ 1 mile de Port-Joinville / Ile d'Yeu, 2 juin (F. Portier).
- L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 16 juin (M. Bibard).

L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 3 ind., 12 juillet (M. Bibard).

- Depuis le bateau "le Kifanlo", 6-7 miles au sud-ouest des Sables-d'Olonne, 17 août (A. Barzic, M. Bibard, A. Lucas et O. Penard).

(Atlantique Nord. Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes).

Espérons que la création du CHD pourra nous donner une meilleure idée du statut de cette espèce au large de notre département.

PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus*

(53/85) (2/3)

- Depuis le bateau "le Kifanlo", 6-7 miles au sud-ouest des Sables-d'Olonne, 2 ind., 17 août (A. Barzic, M. Bibard, A. Lucas et O. Penard).
- L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 13 septembre (M. Bibard).

(Niche sur quelques îles au large de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes).

"Petite année classique" pour cette espèce.

OCEANITE CUL-BLANC *Oceanodroma leucorhoa*

(66/235) (3/4)

- Port-Joinville / Ile d'Yeu, 2 ind., 1^{er} janvier (M.P. et X. Hindermeier).

- Baie des Sables-d'Olonne, 5 janvier (D. Desmots).

- L'Epine, trouvé mort, 18 décembre (M. Vaslin). (Atlantique Nord. Migrateur et hivernant rare au large des côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de vent.

Quelques données hivernales, groupées après de forts coups de vent).

CORMORAN HUPPE *Phalacrocorax aristotelis**

(3/4)* (1/1)

- L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, juv., 30 août (M. Bibard).

(Atlantique. Niche en Vendée depuis 1999. Migrateur et hivernant rare, excepté autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier où il est très régulier).

Donnée postnuptiale de dispersion d'un juvénile.

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax***

(-/-) (1/2)

- Étang des Boucheries / Les Landes-Génusson, ad. et immature, du 18 septembre au 18 décembre (L. Pavageau et S. Bioteau).

(Europe, nicheur peu commun localisé dans le marais Poitevin, migrateur, hiverne en Afrique).

Donnée intéressante qui s'inscrit dans le pattern des quelques observations hivernales de l'espèce, régulières et annuelles en France (DUBOIS *et al.* 2000).

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides*

(10/9) (1/1)

- Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, ad., 25 mai (D. Godreau).

(Bassin méditerranéen, Dombes, Brenne, Grand Lieu, migrateur, hiverne en Afrique).

Dispersion d'adulte en provenance de Grand Lieu ?

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*

(19/29) (2/2)

- Le Bout de Sac / Beauvoir-sur-Mer, ad. prob., 8 mars (P. Dulac, C. Giraud *et al.*).

- Marais des Loirs / Olonne-sur-Mer, ad., du 16 mars au 15 mai (ONCFS Champclou, M. Bibard *et al.*).

(Scandinavie, Sibérie. Hiverne en Grande-Bretagne, nord et centre de l'Europe, bord des mers Noire et Caspienne, hivernant rare, présent en période de froid).

Deux observations à suivre... S'agit-il du même oiseau qui est passé du marais Breton au marais d'Olonne ? Dans tous les cas, l'oiseau d'Olonne est resté relativement longtemps et tard, constituant le plus long séjour connu en Vendée.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

(18/28) (3/4)

Individus présentant les caractéristiques de la race *hrota*, appelée "Bernache (cravant) à ventre pâle" :

- Pointe Brémaud et Réserve Naturelle des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, ad. et juv., du 29 novembre 2000 au 3 janvier (N. de Pracantal, M. Vaslin *et al.*), le juv. se déplace ensuite sur la lagune du Dain / Bouin le 23 janvier.

- Vasières du Sébastopol / Barbâtre, 2 ad., 13 décembre (B. Isaac et C. Leray).

(Groenland, Spitzberg, hiverne en petit nombre en Grande-Bretagne et de la côte Normande au Danemark).

L'espèce deviendrait-elle régulière sur la côte vendéenne ?

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(16/13) (1/1)

- STEP de la Salaisière / Noirmoutier-en-l'Île, fem., 7 décembre (M. Vaslin).

(Niche en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, et de façon localisée en Espagne, migrateur et hivernant occasionnel en Vendée).

La station de lagunage de Noirmoutier accueille une fois de plus cette espèce.

GARROT A ŒIL D'OR *Bucephala clangula***

(0/0) (1/1)

- "Sud Vendée", mâle ad., 3 juin (F. Ducordeau *et al.*).

(Europe du nord, Scandinavie et Sibérie. Hivernant et migrateur peu commun en Vendée).

Donnée étonnante d'un mâle à une date exceptionnelle sur un site non littoral du sud Vendée !!!

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

(89/152) (2/4)

- Rivière l'Yon - Piquet / Rosnay, 3 fem., 10 novembre (P. Voné).

- Les Marines et plage des Mouettes / Saint-Hilaire-de-Riez, fem., 22 et 23 décembre (G. Besseau et P. Rouillier).

(Groenland, Grande-Bretagne, Alpes, Europe du Nord, Scandinavie et Sibérie).

Deux données pour une espèce irrégulière en hiver dans notre département, dépendant des conditions climatiques.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE

Haliaeetus albicilla

(25/11) (1/1)

- Barrage de Rochereau / Sigournais, 1^{er} hiver, phot., du 24 novembre au 3 janvier 2002 (D. Godreau *et al.*).

(Moyen-Orient, Europe de l'Est, Scandinavie et Sibérie ; hiverne en petit nombre en France).

Hivernage d'un jeune oiseau de première année bagué en septembre sur son lieu de naissance en Pologne ! (M. Vaslin, comm. pers.). L'oiseau fréquentait constamment les abords du barrage vidangé, permettant de magnifiques observations. Une fois la vidange du barrage achevée, l'oiseau s'est ensuite déplacé sur l'étang du Parc Soubise / Mouchamps (prochain rapport du CHD).

AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos*

(1/1) (1/1)

- La Roche-sur-Yon, juv. / 1^{ère} année, 28 octobre (M. South et P. Yésou).

(Sud et Est de l'Europe, Ecosse, Scandinavie, Sibérie et Moyen-Orient).

Troisième donnée départementale pour cette espèce, ici un juvénile en dispersion postnuptiale qui est reparti vivant... La première concernait 1 ind. abattu par un chasseur en 1928 à La Mainborgère (Château-Guibert) et la seconde concernait un immature le 15 juillet 1996 à Monportreau (Les Sables-d'Olonne, M. Bibard et A. Barzic). Enfin, les conditions d'observation sont tout aussi exceptionnelles, car l'oiseau à été vu au-dessus d'une rocade de La Roche-sur-Yon !

RALE DES GENETS *Crex crex*

(24/31) (1/1)

- La Taillée / La Barre-de-Monts, 12 octobre (D. Desmots).

(Europe et Russie. Nicheur rare et menacé en Vendée et en France).

Cette seule donnée concerne un oiseau en migration.

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana*

(48/49) (7/9)

- "Sud Vendée", ad., 18 août, puis 3 ad., 19 août (M. Bibard).

- La Guittière / Talmont-St-Hilaire, 1^{er} année, 29 août (F. Salmon).

- "Sud Vendée", 1^{er} et 7 septembre (C. Drapeau).

- Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 2 ind., 15 septembre (M. Bibard *et al.*).

- Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 25 septembre (A. Thomas et S. Vrignaud).

- Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 27 septembre, le même que les 15 et 25 septembre ? (G. Bouteloup, E. Giraudot, S. Maillet, S. Pollet).

(Europe et Russie. Nicheuse rare en Vendée et localisée en France).

Toutes les données concernent des oiseaux en halte migratoire post nuptiale. À noter que la lagune de la Belle Henriette a été très attractive pour les marouettes cette année, avec la présence exceptionnelle sur le site d'au moins 5 marouettes de Baillon *Porzana pusilla* (A. Faure, A. Thomas, P. Trotignon, in FREMONT & le CHN 2003).

Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) 1^{ère} année
 - Réserve de Rochereau
 MONSIEURIGNE (85)
 Dimanche 2 Décembre 2001.



Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*), 1^{er} hiver, barrage de Rochereau, Sigournais. 24 novembre 2001 au 3 janvier 2002. Dessin © Benoît PERROTIN

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus*

(45/70) (2/3)

- Dunes de la Paracou / Les Sables-d'Olonne, ad. prob., 18 septembre (M. Bibard).
 - Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, 2 ad. hiv., du 22 au 25 septembre au moins (J. Gonin, A. Thomas, S. Vrignaud *et al.*).
- (Ecosse, Scandinavie, Sibérie. Nicheur rare et localisé en France).

Classiquement quelques oiseaux en halte migratoire postnuptiale sur la côte. Il serait intéressant de rechercher cette espèce discrète plus intensément sur le littoral, dans les prairies, chaumes et labours d'intérieur de fin août à fin septembre.



Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*), ad., Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, septembre 2001.
 Photo © Sylvain VRIGNAUD

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* **

(-/-) (2/1)

- Réserve Naturelle des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, ad., 27 et 29 novembre (D. Desmots, M. Vaslin).

(Sibérie, migrateur commun en petit nombre sur le littoral). Donnée exceptionnelle d'un oiseau en début d'hiver. L'oiseau a-t-il passé tout l'hiver sur nos côtes ? En France un seul cas est mentionné à ce jour dans la littérature, dans un département voisin : 1 ind. le 27 décembre 1983 en Loire-Atlantique (DUBOIS *et al.* 2000).

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

(132/98) (5/10)

- Les Guifettes / Luçon, 2 ad., 29 avril (M. Bibard).
- "Sud Vendée", 3 juv., 30 août (J. Gonin).
- Les Guifettes / Luçon, ad., 3 septembre (C. Drapeau).

- Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, 1 ad. et 2 juv., "août" au 22 septembre au moins (J. Gonin, A. Thomas *et al.*).

- Marais des Loirs / Olonne-sur-Mer, 27 septembre (M. Bibard).

(Ecosse, Scandinavie et Sibérie).

Quelques données de ce petit bécasseau régulier en migration mais en petit nombre.

La transmission de toutes les observations au CHD pourra sans doute nous permettre d'affiner nos connaissances sur l'abondance et la fréquence de ce petit limicole dans notre département, sûrement plus commun que l'on ne pense...

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

(39/26) (2/2)

- Le Giraubeau / Beauvoir-sur-Mer, 22 juillet (G. Guédon, J.G. Robin et T. You).

- Estuaire du Lay / L'Aiguillon-sur-Mer, ad. inter-nupt., 1^{er} et 2 septembre au moins (A. Audevard, J.C Sautour *et al.*).

(Europe de l'est, Russie. Migrateur rare mais régulier en France).

2 oiseaux à des dates classiques sur des sites classiques.

PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus*

(78/43) (1/1)

- Plage de Sion / Saint-Hilaire-de-Riez, 1^{er} hiver, 4 janvier (F. Halligon).

(Irlande, Ecosse, Islande, Scandinavie, Sibérie. Migrateur occasionnel sur la côte Atlantique, plus commun en Méditerranée).

Une seule donnée, concernant en outre un oiseau observé en plein hiver.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*

(65/67) (2/2)

- L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, ad. prob., 18 juillet (M. Bibard).

- Digue du Maroc – baie de l'Aiguillon / Saint-Michel-en-l'Herm, ad., 24 octobre (T. You *et al.*).

(Sibérie. Migrateur occasionnel sur nos côtes vendéennes).

Une meilleure connaissance des ornithologues sur l'identification de cette espèce pas toujours facile à différencier du Labbe parasite pourrait sûrement nous apporter plus de données...

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*

(75/33) (3/2)

- La Paracou / Les Sables-d'Olonne, 1^{er} hiver, 21 janvier et 3 février (D. Perrocheau et B. Vallée-Mounier).

- Réserve de Champclou et marais des Grands Loirs / L'Ile-d'Olonne, imm., du 3 au 19 février (S. Poupin, D. Perrocheau *et al.*).

(Arctique. Hivernent en Islande, Grande-Bretagne et Scandinavie. Quelques oiseaux hivernent localement sur la façade Centre-Atlantique).

Une fois de plus, le secteur des Sables-d'Olonne voit la présence de deux individus différents.

STERNE HANSEL *Sterna nilotica*

(33/50) (1/1)

- Pointe de la Casie / Barbâtre, ad., 6 juillet (M. Vaslin).

(Méditerranée et Danemark, migratrice rare mais régulière en Vendée).

Une donnée en juillet pour cette espèce quasiment annuelle en migration pré et postnuptiale en très petit nombre. Est-ce un oiseau danois non reproducteur ou bien ayant terminé ou échoué sa reproduction ?

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

(14/37) (1/1)

- Réserve Naturelle des marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, ad., 18 août (M. Vaslin *et al.*).

(Grande-Bretagne et Bretagne. Migrateur occasionnel).

Un seul oiseau en halte migratoire sur Noirmoutier, l'examen attentif des reposoirs de sternes en fin d'été peut parfois donner quelques surprises...

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*

(26/13) (1/1)

- Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, ad. nupt., 4 juillet (F. Sémavoine et A. Thomas).

(Europe de l'est, Moyen-Orient, Russie. Migrateur rare).

Belle observation estivale d'un adulte en plumage nuptial.



Mergule nain (Alle alle), port des Sables-d'Olonne, novembre 2001. Photo © Pedro RODRIGUEZ

MERGULE NAIN *Alle alle*

(20/22) (1/1)

- La Grande Jetée puis le Port / Les Sables-d'Olonne, du 25 novembre au 9 décembre (H. Michaud, B. Vallée-Mounier *et al.*).

(Arctique, migrateur rare sur les côtes françaises).

Donnée exceptionnelle d'autant plus que l'oiseau est resté très longtemps dans le port des Sables avant de repartir. Habituellement les quelques observations vendéennes concernent des oiseaux de passage ou bien trouvés affaiblis voire morts sur le littoral.

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica*

(30/42) (2/2)

- Pointe des Charniers / Noirmoutier-en-l'Île, 12 novembre (M. Vaslin et J. Léauté).

- Plage de la Loire / L'Épine, ad. hiv., trouvé mort, 14 novembre (M. Vaslin).

(Islande, Grande-Bretagne, Scandinavie, Bretagne). Avec pour cette année deux données dont une mortalité à déplorer, le Macareux reste bel et bien une espèce très pélagique et donc rarement observée depuis notre littoral.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

(22/123) (2/16)

- Bourg de L'Île-d'Olonne, 13 à 15 ind. en migration, 27 mai (D. Desmots).

- La Gachère / Olonne-sur-Mer, 1 couple produit 1 juv., phot., du 26 juillet au moins au 8 août (A. Mera, D. Perrocheau, F. Portier, S. Bonifait *et al.*). (Moitié sud de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Nicheur rare en Vendée, migrateur régulier en petit nombre). Bonne année avec la découverte et le suivi d'un couple reproducteur ayant produit un jeune à l'envol.



Guêpier d'Europe (Merops apiaster) nicheur à La Gachère, Olonne-sur-Mer, été 2001. Photo © Frédéric PORTIER

PIC MAR *Dendrocopos medius*

(7/8) (1/1)

- Le Jaulard - Forêt de Mervent / Mervent, entendu, 12 juin (D. Brossard).

(Europe et Moyen-Orient. Nicheur rare en Vendée).

Une fois de plus une donnée provenant de la forêt de Mervent. Une recherche plus poussée, notamment dans les quelques petits bouts de vieilles forêts de chênes, pourrait peut-être nous permettre de préciser l'effectif de cette espèce qui restera sans doute très faible...

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*

(16/7) (1/1)

- Pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, ad. prob., du 4 au 9 novembre, (G. Bouteloup *et al.*).

(Scandinavie, Sibérie. Hiverné dans la partie nord de l'Europe).

C'est encore le site de la pointe de l'Aiguillon qui accueille cette espèce rare dans notre département, à l'automne et en hiver.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

(2/5) (1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la race *leucorhoa*, appelée "Traquet (motteux) du Groenland" :

- Pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, mâle ad., 17 septembre (G. Bouteloup, L. Grillet et G. Jardin).

(Groenland).

L'examen attentif des nombreux traquets motteux en migration sur le site de l'Aiguillon a permis la détection de cette sous-espèce pas toujours facile à différencier de la sous-espèce nominale. Sous-espèce qui doit être très certainement régulière en migration sur nos côtes (J.-Y. FREMONT comm. pers.), l'avenir nous en dira certainement plus.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

(12/10) (6/7)

- La Gachère / Brem-sur-Mer, cht., 23 avril (F. Portier).

- La Paracou / Les Sables-d'Olonne, cht., 24 avril (D. Desmots).

- Dune de la Grande Côte / La Barre-de-Monts, cht., 12 mai (J.P. Paillat et M. Vaslin).

- Forêt de Mervent, 2 ind. (cple nicheur ?), du 19 au 28 juin (D. Brossard).

- La Rente / La Barre-de-Monts, 1^{er} juillet (S. Bonifait).

- Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 1^{ère} année, capturé, phot., 18 août (C. et J. Gonin, F. Signoret et M. Vaslin).

(Europe, Russie. Nicheur irrégulier et migrateur en petit nombre dans notre département).

Très bonne année avec un minimum de 4 cht. et un total de 7 ind.

LOCUSTELLE LUCINOÏDE

Locustella luscinioides

(15/17) (2/3)

- Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, mini 2-3 cht., "juillet" (J. Gonin, F. Sémavoine, A. Thomas *et al.*)
- Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 1^{ère} année, 18 août, capturé, phot. (C. et J. Gonin, F. Signoret et M. Vaslin).

(Europe et Russie).

Même commentaire que pour la Locustelle tachetée.



Locustelle luscinioides (*Locustella luscinioides*) de 1^{ère} année, lagune de la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer, 18/08/01.

Photo © Matthieu VASLIN

PHRAGMITE AQUATIQUE

Acrocephalus paludicola

(17/17) (1/1)

- Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 1^{ère} année, 9 août (F. Portier).

(Pologne, Hongrie, Biélorussie, Russie).

Espèce mondialement menacée, migrateur régulier mais en petit nombre sur la façade Atlantique. La présence nouvelle de bagueurs dans notre département pourra sans doute nous permettre de mieux évaluer la présence en migration de cet oiseau. La période de migration de cette espèce dans notre pays se situe habituellement entre début août et fin septembre, avec un pic mi-août.

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*

(12/17) (1/2)

- Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 2 ind., 1^{er} août (F. Portier).

(Europe centrale et de l'Est, Russie. Nicheur localisé dans l'est de la France, migre vers l'est, rare dans l'ouest de l'Europe).

Belle observation de 2 ind. ensemble, sur un site qui a déjà accueilli cette espèce relativement rare sur l'Atlantique.

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

(41/50) (3/2)

- Les Minières - Forêt de Mervent / Bourneau, cht., du 6 et 19 juin (D. Brossard).
- La Grotte - Forêt de Mervent / Mervent, cht., 8 juin (D. Brossard).

(Partie sud de l'Europe, Turquie, Afrique du Nord, nicheur très localisé en Vendée).

Même commentaire que pour le Pouillot siffleur.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

(22/26) (6/7)

- Ecole des Etablières / La Roche-sur-Yon, cht., 17 avril (L. Grillet et B. Robin).
- Bois de Fourchaud / Bourneau, 2 cht., 5 juin (L. Grillet et M-O. Boulais).
- Dune de la Grande Côte / La Barre-de-Monts, cht., 12 mai (J.P. Paillat et M. Vaslin).
- Les Minières - Forêt de Mervent / Bourneau, cht., 6 juin (D. Brossard).
- La Grotte - Forêt de Mervent / Mervent, cht., 8 juin (D. Brossard).
- Le Jaulard - Forêt de Mervent / Bourneau, cht., 12 juin (D. Brossard).

(Europe. Nicheur localisé en Vendée).

Les quelques sites favorables de notre département abritent quelque couples, les données d'oiseaux en migration restent toujours rares.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus* **

(-/-) (1/1)

- Forêt de Grasla / Les Brouzils, cht., du 24 avril au 7 juin (L. Grillet).

(Partie nord de l'Europe. Migrateur commun).

Donnée très intéressante d'un oiseau chanteur sur un site favorable (GRILLET 2002).

PIE-GRIÈCHE GRISE *Lanius excubitor*

(11/6) (1/1)

- Marais du Plumet / Jard-sur-Mer, ad. prob., 10 octobre (F. Salmon).

(Nord et centre de l'Europe pour la sous-espèce nominale. Rare en migration ou en hivernage).

Une seule observation d'un oiseau en migration.

SIZERIN FLAMME / SIZERIN CABARET
Carduelis flammae / Carduelis cabaret
(8/12) (2/2)

- Pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, 20 octobre (F. Signoret, M. Vaslin).
- Venansault, entendu, 11 novembre (F. Portier).
(Massif alpin, nord de l'Europe, Scandinavie et Sibérie pour *flammae*; Grande-Bretagne pour *cabaret*, migrateur et hivernant rare en Vendée).
Rares données d'oiseaux en migration, alors que l'espèce est très certainement de passage annuellement.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*
(12/21) (1/2)

- Le Vieil / Luzay / Noirmoutier-en-l'Île, 2 mâles ad., du 12 novembre au 7 décembre (M. Vaslin, J.P. Paillat, B. Perrotin).
(Scandinavie, Sibérie. Hivernent en Russie méridionale et sur les côtes du nord de l'Europe. Hivernant occasionnel et en petit nombre sur nos côtes).
Les champs de pommes de terre de Noirmoutier ont accueilli les deux seuls hivernants cette année.

BRUANT FOU *Emberiza cia*
(2/2) (2/2)

- La Chardière / Saint-Aubin-des-Ormeaux, mâle ad., 31 mars, puis un autre ou le même ?, SO de la Grande Bouffardière / Saint-Aubin-des-Ormeaux, 14 avril (J.P. Natalis).
(Centre et sud de l'Europe).
2^e et 3^e données pour le même oiseau ? Contrairement à la première observation, effectuée en plein hiver dans une mangeoire (!), les 13 et 14 février 1991 au Poiré-sur-Velluire (C. et J. Gonin), celles-ci concernent un mâle adulte au printemps en zone bocagère !

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*
(30/51) (2/6)

- Polder de la digue du Maroc – baie de l'Aiguillon / Saint-Michel-en-l'Herm, 3 ind. dont au moins 2 fem. / 1^{ère} année, 30 août (J. Gonin).
- Fort Larron / Noirmoutier-en-l'Île, 3 fem. / 1^{ère} année, 27 octobre (M. Vaslin).
(Europe, Russie).
Nicheur et migrateur anciennement régulier sur notre département, la forte baisse des observations d'oiseaux migrants est bien représentative de la chute des effectifs de cette si belle espèce (KUTZENBERGER 1994).

**LISTE DES DONNEES NON
HOMOLOGUEES**

Le CHD rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* : 1 ind., le 04/01, baie de Sion / Saint-Hilaire-de-Riez.

Harle bièvre *Mergus merganser* : 2 m., le 10/11, Piquet / Rosnay.

Aigle botté *Hieraetus pennatus* : 1 ind., le 28/08, L'Île-d'Olonne.

Fauvette grisette *Sylvia communis* : 1 m., le 10/12, Terrier du Saint-Gré / Le Champ-Saint-Père.

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* : 1 ind., le 10/10, mare des Agaures / Les Sables-d'Olonne.

Les raisons ayant entraîné la non homologation d'une donnée ou son homologation par le CHD sont fournies aux observateurs qui ont joint une enveloppe timbrée à leur adresse.

REMERCIEMENTS

Le CHD Vendée tient à remercier :

- la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vendée, pour son aide financière nécessaire au secrétariat du Comité.
- l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHD ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE – 1997
– Liste des oiseaux de France métropolitaine.
Ornithos, 4 (1) : I-VIII.

DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., YESOU P. &
OLIOSO G. – 2000 – *Inventaire des oiseaux de
France. Avifaune de la France métropolitaine.*
Nathan/HER, Paris, 400 pages.

FREMONT J.-Y. & le CHN – 2003 – Les oiseaux
rares en France en 2001. Rapport du Comité
d'Homologation National. *Ornithos*, 10(2) : 49-83.

GRILLET L. – 2002 - Le Pouillot fitis, nicheur
possible en Vendée. *La Gorgebleue*, 17-18 : 61.

KUTZENBERGER H. – 1994 – *Ortolan Bunting*
Emberiza hortulana. Pp 432-433 In TUCKER G.M.
& HEALTH M.F. – 1994 – *Birds in Europe: their
conservation status*. BirdLife International
(BirdLife Conservation Serie no.3), Cambridge,
600 p.

CHD Vendée - Julien GONIN
4 rue du Chastelier Barlot
85 770 LE POIRÉ-SUR-VELLUIRE
Tel : 02 51 52 36 56
pgs85@aol.com