

Actualités ornithologiques en Vendée :

septembre 2000 à août 2002

Coordination et commentaires introductifs : Perrine DULAC

Rédacteurs : Didier DESMOTS, Perrine DULAC, Christian et Julien GONIN, Lucien GRILLET, Jocelyne GUEYDAN, Xavier HINDERMEYER, Emmanuel JOYEUX, Florian PICAUD, Bernard ROUSSEAU, Alain THOMAS, Matthieu VASLIN, Sylvain VRIGNAUD, Théophile YOU

Gestion de la base de données, extraction des données, cartographie : Christian GONIN

Pour la troisième fois, la synthèse a été réalisée sur deux années. Les années ont été séparées pour faciliter la lecture.

NOMBRE DE DONNÉES ET RÉPARTITION

Entre septembre 2000 et août 2001, 176 observateurs (personnes physiques ou morales) ont fait parvenir leurs données au fichier de la LPO Vendée. De septembre 2001 à août 2002, ce nombre s'élève à 194.

Sont ainsi parvenues au fichier 12 988 observations au moins⁴ en 2000-2001 et 15 441 observations au moins en 2001-2002.

Le nombre de données est inférieur aux 4 années précédentes (environ 18 500 données en moyenne). Pourtant, le nombre d'observateurs est plus important... Y aurait-il eu du "relâchement" dans l'envoi des données ?

Pour ces deux périodes trois secteurs restent totalement vierges de données (*cf.* carte 1) : le secteur de Saint-Hilaire-de-Loulay (1324.5), celui de Treize-Vents (1425.4) et, plus curieusement car il ne se trouve pas en bordure du département comme les deux précédents, celui d'Apremont (1226.1).

Plus de 20 carrés fournissent moins de 10 données chaque année (sans compter les carrés dont une majeure partie n'est pas en Vendée). Il s'agit des secteurs (à prospecter !) de : Challans (est), Commequiers, Saint-Christophe-du-Ligneron, Grand'Landes, Falleron, Les Lucs-sur-Boulogne, Chambretaud, Les Herbiers (sud), Saint-Fulgent (ouest), Mouchamps, Dompierre-sur-Yon (nord),

Mouilleron-en-Pareds, Breuil-Barret, La Chapelle-Thémér, Saint-Sulpice-en-Pareds, Saint-Cyr-des-Gâts, Puy-de-Serre, Moutiers-sur-le-Lay (est), Nieul-le-Dolent, Le Girouard, La Chapelle-Achard, Avrillé, Moutiers-les-Mauxfaits, Lande-ronde.

A l'inverse, une petite dizaine de carrés fournissent chaque année plus de 1 000 observations !

Les carrés les plus plebiscités par les observateurs se trouvent comme à l'habitude sur le littoral.

Le secteur ayant fourni le plus d'observations est celui de Beauvoir-sur-Mer (1 634 observations en 2000-2001 et 1 804 l'année suivante) suivi de celui des Landes-Génusson (1 613 et 1 575). Ceci s'explique par la présence de terrains appartenant à la LPO à Beauvoir, et des étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (suivi ornithologique effectué par la LPO).

NOMBRE D'ESPÈCES



Ont été observées :

- 295 espèces en 2000-2001,
- 291 espèces en 2001-2002.

Ceci est à peu près conforme à la situation des années antérieures (maximum : 306 en 1999-2000). Une trentaine de carrés fournit moins de 10 espèces chaque année (sans compter les carrés limitrophes dont une majorité de la superficie ne se trouve pas en Vendée).

Le secteur sur lequel le plus grand nombre d'espèces a été observé est celui de la pointe de l'Aiguillon (le camp de migration y est pour quelque chose) : 149 espèces observées en 2000-2001 et 174 en 2001-2002.

⁴ Les données sont envoyées au fichier soit par décade (indices de présence), soit avec des dates précises. En raison de ces différents systèmes de saisie, il nous est difficile de connaître exactement le nombre de données parvenues au fichier. Le nombre de données indiqué dans la synthèse correspond à un minimum.



FAITS MARQUANTS

La période 2000-2002 apporte deux nouvelles espèces pour la Vendée :

- la Rousserolle des buissons, observée le 14 novembre 2000 aux Sables-d'Olonne ;
- le Goéland pontique, observé du 11 octobre au 13 décembre 2000 à Noirmoutier. Il s'agit également de la première donnée pour le littoral atlantique. On note également la 3^e donnée vendéenne de Bécasseau d'Alaska (qui correspond aussi à la 4^e donnée française), le 19 avril 2001 à Barbâtre.

Le Pluvier fauve du 18 septembre 2000 fait partie des 5 données homologuées en France cette année là (record pour cette espèce particulièrement rare).

Parmi les hivernants rares ou exceptionnels, on note le Bihoreau gris (observé de septembre à décembre 2001 aux Landes-Génusson), le Bécasseau cocorli (observé de janvier à mars 2002 à Noirmoutier⁵), la Sterne arctique (observée en décembre 2000 à Noirmoutier et janvier 2001 à Bouin).

Notons aussi une donnée printanière de Puffin majeur en avril 2001 aux Sables-d'Olonne.

Le Flamant rose, observé en octobre 2000 à L'Ile-d'Olonne, fournit une nouvelle donnée pour la Vendée (la précédente datait de 1979). Il en va de même pour l'Aigle royal (octobre 2001), espèce pour laquelle la donnée précédente datait de... 1928 !

Enfin, le Guêpier d'Europe a niché à Brétignolles-sur-Mer⁶ (première preuve de nidification certaine pour le département).

A PROPOS DES ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION

Les observations soumises à homologation nationale n'ont été indiquées que si elles ont été homologuées par le Comité d'Homologation National (CHN). Les données non soumises ou non homologuées sont conservées dans la base de données de la LPO Vendée en vue d'un éventuel (ré)examen.

Le Comité d'Homologation Départemental (CHD) existe depuis 2001. Les données postérieures

au 1^{er} janvier 2001 répondent à la même règle que les données soumises à homologation nationale. Les données antérieures à cette date sont publiées dans cette synthèse. Contacter les observateurs en cas de doute sur ces observations.

Par ailleurs, suite aux récentes décisions du CHN et du CHD 85, les listes d'espèces homologables ont été modifiées le 1^{er} janvier 2006. La synthèse indique le changement de statut des espèces concernées.

POUR FACILITER LA LECTURE

Les données homologuées renvoient aux numéros d'*Ornithos* dans lesquels sont parus les rapports du CHN. Les références bibliographiques de ces numéros sont les suivants :

FREMONT J.-Y. & le CHN – 2002 - Les oiseaux rares en France en 2000. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 9-1 : 2-33.

FREMONT J.-Y. & le CHN – 2003 – Les oiseaux rares en France en 2001. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 10-2 : 49-83.

FREMONT J.-Y. & le CHN – 2004 - Les oiseaux rares en France en 2002. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 11-2 : 49-85.

FREMONT J.-Y. & le CHN – 2005 - Les oiseaux rares en France en 2003. 22^e Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 12-1 : 2-45.

L'ordre des espèces et les noms scientifiques utilisés sont ceux de la *Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental*, publiée par la LPO. Cette liste est disponible sur le site Internet de la LPO (<http://www.lpo.fr/>).

Les nombres indiqués en face des espèces correspondent aux nombres d'observations et de données. Par exemple, pour le Cygne chanteur, l'indication "17/2" signifie que 17 observations sont parvenues au fichier, mais qu'elles correspondent seulement à 2 données (des observateurs différents ont observé le(s) même(s) oiseaux plusieurs fois).

Lorsque qu'il est indiqué "0" pour les deux années, il s'agit d'espèces soumises à homologation départementale ou nationale, pour lesquelles des données sont parvenues au fichier mais qui n'ont pas été homologuées. Les auteurs peuvent encore établir des fiches !

⁵ Voir aussi DESMOTS D. & VASLIN M. – 2004 – Stationnement hivernal d'un bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) sur l'île de Noirmoutier. *La Gorgebleue* 19-20 : 51-52.

⁶ Voir aussi DESMOTS D. & PORTIER F. – 2004 – Une nidification réussie du Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) en Vendée. *La Gorgebleue* 19-20 : 53-55.

LISTE DES OBSERVATEURS ET CODES UTILISÉS DANS LA SYNTHÈSE

Nom	Code utilisé
John et Pamela ADAMS	J. & P.Ada
ADEV Sud Vendée	ADEV
Philippe ANGEBAUD	P.Ang
Aurélien AUDEVARD	A.Aud
Hélène BARBIER	H.Bar
Stéphane BARBIER	S.Bar
André BARZIC	A.Bar
Nicolas BERGER	N.Ber
Gérard BESSEAU	G.Bes
Michel BIBARD	M.Bib
Stéphanie BIOTEAU	S.Bio
David BLOINO	D.Blo
Laurent BOMBERAULT	L.Bom
Sylvain BONIFAIT	S.Bon
Marie-Odile BOULAIS	M-O.Bou
Guillaume BOUTELOUP	G.Bou
Alain BOURASSEAU	A.Bou
Didier BROSSARD	D.Bro
Antoine CHABROLLE	A.Cha
Michel CHARRIER	M.Cha
Stéphane CHARRIER	S.Cha
Thierry CHARRIER	T.Cha
Françoise CHÂTAIGNIER	F.Cha
M. CHAUVEAU	M.Chv
Jean CLOUTOUR	J.Clo
Club Connaître et Protéger la Nature "La Linotte" de Beaulieu-sous-la-Roche	CPN Linotte
Club Connaître et Protéger la Nature de Saint-Hilaire-de-Loulay	CPN Lolayo
Ludovic CONAN	L.Con
Eric CORDIER	E.Cor
Matthieu COSSON	M.Cos
André DARRAS	A.Dar
Jean DAVIAU	J.Dav
Joël DELATTRE	J.Del
Didier DESMOTS	D.Des
Thierry DODIN	T.Dod
Christophe DRAPEAU	C.Dra
Fabrice DUCORDEAU	F.Duc
Perrine DULAC	P.Dul
Stéphane DULAU	S.Dul
Charles DUPE	C.Dup
Nathalie DUPUIS	N.Dup
Équipe du camp de migration de la Pointe de l'Aiguillon	Eq.Pointe
Pierre-Paul ÉVRARD	P-P.Evr
Olivier FLEURY	O.Fle
Frédéric FONTENEAU	F.Fon

Nom	Code utilisé
Michel FOUQUET	M.Fou
André FRANÇOIS	A.Fra
Jean-Yves FRÉMONT	J-Y.Fre
Matthieu GAILLARD	M.Gai
Emmanuel GAS	E.Gas
Alain GÉRARD	A.Ger
Julien GERNIGON	J.Grn
Olivier GIRARD - ONCFS	O.Gir
Christophe GIRAUD	C.Gir
Laurent GODET	L.God
Didier GODREAU	D.God
Christian GONIN	C.Gon
Julien GONIN	J.Gon
Christian et Julien GONIN	C. & J.Gon
Pierre GRANAUD	P.Gra
Lucien GRILLET	L.Gri
Groupe Jeunes LPO Vendée	GpJeunes
Jean-Pierre GUÉRET	J-P.Gué
Xavier et Marie-Paule HINDERMEYER	X. & M-P.Hin
Bertrand ISAAC	B.Isa
Georges JARDIN	G.Jar
Nadine JEANDEAU	N.Jea
Gaëtan JEANNEAU	G.Jea
Frédéric JIGUET	F.Jig
Emmanuel JOYEUX	E.Joy
Christian KÖNIG	C.Kon
Rémi KUMAR	R.Kum
Olivier LAMBERT	O.Lam
Alban LAROUSSE	A.Lar
Pascal LAVOUÉ	P.Lav
Joël LEAUTE	J.Lea
Christian LERAY	C.Ler
LPO (participation collective LPO Marais Breton, LPO Noirmoutier et LPO Vendée)	LPO
LPO Noirmoutier (équipe de la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg)	LPO Noi
LPO Vendée	LPO 85
Anthony LUCAS	A.Luc
Jean-Claude LUEZ	J-C.Lue
Willy MAILLARD	W.Mai
H. MICHAUD	H.Mic
Bernard MAYOT	B.May
Alexandre MÉRA	A.Mer
Sylvie MÉRAND	S.Mer
Christian MÉTAIS	C.Met
Céline MIGNOT	C.Mig

Nom	Code utilisé
Jean-Paul NATALIS	J-P.Nat
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Chanteloup	ONCFS
Laurent PAVAGEAU	L.Pav
Jean-Paul PAILLAT	J-P.Pai
François PAPIN	F.Pap
Olivier PENARD	O.Pen
Michel PENAUD	M.Pen
Didier PERROCHEAU	D.Per
Benoît PERROTIN	B.Per
Dominique PETIT	D.Pet
Florian PICAUD	F.Pic
Julien PIETTE	J.Pie
Olivier POISSON	O.Poi
Frédéric PORTIER	F.Por
Samuel POUPIN	S.Pou
Nyls de PRACONTAL	N.Pra
Sébastien REEBER	S.Ree
Pascal RÉTIVEAU	P.Ret
Aurélien RIVALLIN	A.Riv
Benoît ROBIN	B.Rob
Jean-Guy ROBIN	J-G.Rob
Xavier ROSEC	X.Ros
Philippe ROUILLIER	P.Rou
Bernard ROUSSEAU	B.Rou

Nom	Code utilisé
Franck SALMON	F.Sal
Frédéric SÉMAVOINE	F.Sem
Frédéric SIGNORET	F.Sig
Martine SOUTH	M.Sou
Hervé SZWAICER	H.Szw
Bernadette TESSIER	B.Tes
Alain TEXIER	A.Tex
Alexandre THEME	A.The
Alain THOMAS	A.Tho
Jean-Paul TILLY	J-P.Til
Gildas TOUBLANC	G.Tou
Paul TROTIGNON	P.Tro
François TROTTET	F.Tro
Benoît VALLEE-MOUNIER	B.VaM
Daniel VALLIN	D.Val
Matthieu VASLIN	M.Vas
Annick VIVION	A.Viv
Jean VIMPERE	J.Vim
P. VONE	P.Von
Sylvain VRIGNAUD	S.Vri
Thomas WILLIAMSON	T.Wil
Pierre YÉSOU	P.Yes
Théophane YOU	T.You

OU TROUVER LES ESPÈCES ?

Des Plongeurs aux Cormorans (Xavier HINDERMEYER).....	65
Du Butor étoilé à la Spatule blanche (Perrine DULAC).....	70
Canards de surface (Christian et Julien GONIN)	74
Canards plongeurs (Lucien GRILLET).....	80
Rapaces diurnes (Sylvain VRIGNAUD)	83
Des Perdrix à l'Outarde canepetière (Florian PICAUD).....	88
De l'Huîtrier-pie aux Bécasseaux (Alain THOMAS).....	91
Du Combattant varié aux Phalaropes (Emmanuel JOYEUX).....	99
Des Labbes à la Mouette tridactyle (Matthieu VASLIN).....	104
Sternes (Xavier HINDERMEYER).....	108
Guifettes Et Alcidés (Perrine Dulac).....	110
Des Pigeons au Coucou gris (Jocelyne GUEYDAN).....	112
Rapaces nocturnes (Sylvain VRIGNAUD)	114
De l'Engoulevent d'Europe aux Pics (Jocelyne GUEYDAN)	116
Des Alouettes aux Bergeronnettes (Lucien GRILLET).....	119
Du Troglodyte mignon aux Turdides (Bernard ROUSSEAU).....	124
De la Bouscarle de Cetti aux Mésanges (Didier DESMOTS).....	127
De la Sittelle torchepot aux Bruants (Théophile YOU).....	134

DES PLONGEONS AUX CORMORANS (Xavier HINDERMEYER)

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*)

2000-2001 : 14

2001-2002 : 19

Migrateur et hivernant régulier sur tout le littoral vendéen et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Les observations ne concernent le plus souvent qu'un à trois individus, rarement plus. On note toutefois 5 individus le 01/01/01 devant Port-Joinville, île d'Yeu (X. & M-P.Hin), 7 individus le 02/02/01 à la Paracou aux Sables-d'Olonne (M.Bib) et 6 individus le 02/12/01 depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

L'espèce fréquente la côte vendéenne en nombre important à la fin du mois de décembre comme en témoigne une nouvelle observation d'un total de 38 oiseaux à Saint-Hilaire-de-Riez (corniche de Sion-sur-l'Océan, La Parée Préneau et Les Marines) le 22/12/01 (G.Bes).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	24/12, Port-Joinville, île d'Yeu (X. & M-P.Hin)	23/03, pointe des Charniers, Noirmoutier-en-l'Île (LPO)
Hiver 2001-2002	10/11, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)	10/04, pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer (J.Pie)

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*)

2000-2001 : 4

2001-2002 : 3

Migrateur et hivernant peu commun sur tout le littoral vendéen et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Très peu d'observations durant la période mais on sait que les effectifs peuvent être très variables d'une année sur l'autre. Toutes les observations ne concernent qu'un seul individu.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	22/12, pointe de la Fosse, Barbâtre (M.Vas)	24/02, base de voile, La Tranche-sur-Mer (C. & J.Gon)
Hiver 2001-2002	04/12, plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer (J.Gon)	13/03, pointe de l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île (LPO)

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*)

2000-2001 : 9

2001-2002 : 14

Migrateur et hivernant régulier en petit nombre sur tout le littoral vendéen et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Les observations ne concernent à chaque fois qu'un ou deux individus, sauf 3 oiseaux le 01/01/01 plage des Conches à l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin). Sur la période, environ 2/3 des observations proviennent des eaux de l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	24/12, plage de Ker Châlon, île d'Yeu (X. & M-P.Hin)	04/05, la Paracou, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)
Hiver 2001-2002	12/11, pointe du Devin, L'Epine (LPO)	14/04, l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (A.Bar)

Nouvelle observation début mai avec un individu, en plumage d'hiver, le 04/05/01 à la Paracou aux Sables-d'Olonne (M.Bib), seconde date la plus tardive connue à ce jour pour la Vendée.

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*)

2000-2001 : 170

2001-2002 : 204

Nicheur, migrateur et hivernant, largement répandu sur tout le département sauf à l'île d'Yeu.

On note sur la période une augmentation notable des observations de cette espèce par rapport aux deux années précédentes (+ 40% en moyenne).

Les indices de reproduction proviennent des marais et étangs du bocage (marais de la Petite Haie à La Bernardière, étang des Boucheries aux Landes-Génusson, étang des Rochettes à Rocheservière), de la station d'épuration de la Tranche-sur-Mer et des marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez.

Les maxima sont notés en août et septembre (rassemblements postnuptiaux) avec par exemple 189 individus le 17/09/01 sur la lagune de la Belle Henriette à la Faute-sur-Mer (G.Jar) et 131 individus le 30/08/02 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri & L.Pav).

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*)**2000-2001 : 208****2001-2002 : 199**

Nicheur, migrateur et hivernant, commun dans tout le département, y compris à l'île d'Yeu où l'espèce n'est toutefois présente qu'en période internuptiale.

Plusieurs indices de reproduction sur les lacs et étangs du bocage (lac de Maché-Apremont, étangs des Rochettes, des Boucheries, de la Tesserie à La Pommeraie-sur-Sèvre...). A noter qu'aucun jeune n'a été observé sur les étangs des Boucheries en 2002.

Des rassemblements postnuptiaux sont observés en août et septembre avec notamment 160 individus le 17/08/01 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri). L'espèce hiverne à l'intérieur des terres mais également sur le littoral, parfois en nombre important avec par exemple un total de 95 individus à Saint-Hilaire-de-Riez (corniche de Sion-sur-l'Océan, La Parée Préneau et Les Marines) le 22/12/01 (G.Bes) ou encore plus de 49 individus le 30/12/01 sur la côte nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps grisegena*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur et hivernant rare, noté surtout sur le littoral et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Aucune donnée homologuée par le CHD sur la période.

GRÈBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*)**2000-2001 : 4****2001-2002 : 6**

Migrateur et hivernant assez peu commun, observé en certains points du littoral vendéen mais surtout autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

En dehors des îles d'Yeu et de Noirmoutier, l'espèce a également été observée, durant l'hiver 2000-2001, depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez. Les observations ne concernent à chaque fois qu'un à deux individus, excepté 3 oiseaux le 30/12/01 sur la côte Nord-Est de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	23/11, pointe du Devin, L'Épine (F.Por)	18/02, pointe de l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas)
Hiver 2001-2002	02/12, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	04/01, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

Aucune donnée en provenance de la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer qui semblait pourtant régulièrement fréquentée par l'espèce en septembre lors de son passage postnuptial.



Grèbe esclavon *Podiceps auritus* (dessin © Benoît Perrotin)

GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)**2000-2001 : 69****2001-2002 : 63**

Nicheur très rare, migrateur et hivernant régulier.

Première preuve formelle de nidification de l'espèce en Vendée avec l'observation le 20/07/02 d'un adulte nourrissant un poussin sur l'étang de la Cailletière à La Bruffière (W.Mai).

Les observations ne concernent que très rarement plus de 10 individus. Les maxima sont de 12 et 13 oiseaux respectivement les 14 et 21/09/01 sur la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer (G.Jar) qui semble accueillir, en septembre et octobre, le principal rassemblement postnuptial.

Ce grèbe fréquente surtout les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson et la station d'épuration de la Tranche-sur-Mer qui cumulent à eux seuls près de 60% des observations. Des oiseaux sont également observés sur les stations d'épuration de Luçon et de Noirmoutier, dans les marais d'Olonne et de la Vie, sur la lagune de la Belle Henriette et en hiver sur le littoral, notamment la corniche de Sion-sur-l'Océan, la plage de la Terrière à La Tranche-sur-Mer et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

FULMAR BORÉAL (*Fulmarus glacialis*)**2000-2001 : 14****2001-2002 : 5**

Migrateur peu commun sur le littoral vendéen.

Les observations ne concernent qu'un à trois oiseaux, excepté 5 individus en 30 minutes de sea-watching le 25/04/01 devant le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (D.Des).

L'espèce est observée lors du passage prénuptial (de mars à mai), avec par exemple 2 individus le 28/03/01 et 3 individus le 24/04/01 depuis le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (M.Bib).

Quelques oiseaux fréquentent toujours la côte sauvage de l'île d'Yeu - 2 à 3 individus les 06 et 07/06/01 (F.Por) - mais toujours aucun indice de nidification.

Lors du passage postnuptial les observations sont groupées au mois d'août et au tout début de septembre. Elles sont effectuées depuis l'île d'Yeu, le phare de l'Armandèche, la corniche de Sion-sur-l'Océan ou au large de l'île de Noirmoutier et des Sables-d'Olonne (sortie Kifanlo).

Pas d'observation hivernale.

PUFFIN CENDRÉ (*Calonectris diomedea*)**2000-2001 : 14****2001-2002 : 8**

Espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006.

La sous-espèce *borealis* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries, aux Açores et à Berlenga au large du Portugal. Migrateur peu commun mais régulier sur le littoral vendéen.

L'espèce est présente de fin avril à septembre dans les eaux vendéennes.

Les observations concernent presque toujours moins d'une dizaine d'individus, sauf plus de 20 individus observés les 01/09/00 lors de la traversée Yeu-Fromentine (X. & M-P.Hin) et 01/08/02 depuis le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (M.Bib).

PUFFIN MAJEUR (*Puffinus gravis*)**2000-2001 : 1****2001-2002 : 1**

Espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006.

Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud (Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough). Migrateur très rare, observé seulement au large des côtes vendéennes.

Le nombre d'observations semble très variable d'une année sur l'autre. Ainsi, aucune observation n'est faite durant le passage d'automne 2001. En revanche, l'automne 2002 semble avoir été beaucoup plus favorable à l'observation de cette espèce dans les eaux vendéennes avec au moins 26 individus au large des Sables-d'Olonne (sortie Kifanlo) le 16/08/02 (O.Pen, F.Jig *et al.*).

A noter, une donnée exceptionnelle au printemps avec 1 individu le 11/04/01 depuis le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (O.Pen).

Ces données ont été homologuées par le CHD.

PUFFIN FULIGINEUX (*Puffinus griseus*)**2000-2001 : 3****2001-2002 : 4**

Espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006.

Niche sur quelques îles au large de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes.

Toutes les données sur la période sont des mois d'août et de septembre.

Les observations ne concernent à chaque fois qu'un à deux individus, excepté 3 oiseaux au large des Sables-d'Olonne (sortie Kifanlo) le 16/08/02 (O.Pen, F.Jig *et al.*).

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*)

2000-2001 : 7

2001-2002 : 7

Espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006.

Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes.

Les observations s'échelonnent entre les mois d'avril et d'août. A noter toutefois une donnée tardive d'un individu le 07/11/00 à l'Epine, Noirmoutier (E.Gas). Elles ne concernent à chaque fois qu'un à dix individus, maximum 12 oiseaux le 23/05/02 depuis le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (M.Bib).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		07/11, L'Epine (E.Gas)
Migr. prénuptiale 2001	07/04, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)	16/06, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)
Migr. postnuptiale 2001		17/08, en mer (sortie Kifanlo) au large des Sables-d'Olonne (A.Bar, M.Bib, A.Luc & O.Pen)
Migr. prénuptiale 2002	26/04, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)	27/05, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)
Migr. postnuptiale 2002	Aucune donnée homologuée	

PUFFIN DES BALÉARES (*Puffinus mauretanicus*)

2000-2001 : 27

2001-2002 : 26

Autrefois regroupé, avec la sous-espèce *yelkouan*, sous le nom de Puffin de Méditerranée, il s'agit désormais de deux espèces distinctes, le Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) et le Puffin yelkouan (*Puffinus yelkouan*).

Migrateur présent en grand nombre le long des côtes vendéennes de juillet à septembre.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		04/10, pointe de l'Herbaudière, Noirmoutier (M.Vas)
Saison 2001	25/04, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (D.Des)	28/12, pointe des Corbeaux, île d'Yeu (X. & M-P.Hin)
Saison 2002	14/05, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)	

Les premiers oiseaux apparaissent dès fin avril et en mai - premier le 25/04/01 depuis le phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (D.Des). Les maxima sont notés en juillet, août et septembre avec par exemple 550 individus le 24/07/02 à la Paracou aux Sables-d'Olonne (A.Bar), plusieurs centaines les 27 et 28/08/02 respectivement à la Paracou (A.Bar) et depuis la plage de l'Aubraie à Olonne-sur-Mer (D.Des). Contrairement aux années précédentes, pas de rassemblements très importants (plusieurs milliers d'oiseaux) observés depuis la côte.

A noter une nouvelle observation hivernale d'un individu en vol depuis la pointe des Corbeaux à l'île d'Yeu le 28/12/01 (X. & M-P.Hin).

Les quelques mentions de Puffin yelkouan se rapportent certainement à cette espèce.

OCÉANITE TEMPÊTE (*Hydrobates pelagicus*)

2000-2001 : 22

2001-2002 : 19

Migrateur et estivant régulier au large des côtes vendéennes.

Les observations ne concernent que rarement plus d'une trentaine d'individus ensemble, excepté en août et septembre avec plus de 50 oiseaux au large de l'île du Pilier le 03/09/00 (LPO Noi) et depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez le 10/08/02 (G.Bes).

A noter deux rassemblements remarquables depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez les 02 et 05/08/02 avec respectivement plus de 100 et 750 oiseaux (G.Bes).

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		26/12, plage de Ker Châlon, île d'Yeu (X. & M-P.Hin)
Saison 2001	01/01, Port-Joinville, île d'Yeu (X. & M-P.Hin)	15/09, lagune de la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer (Eq.Pointe)
Saison 2002	11/02, La Guérinière (LPO)	

Quelques données printanières, en avril et mai, existent mais la très grande majorité des observations est faite à partir du mois de juillet et jusqu'au mois de novembre. Les données hivernales, désormais régulières (notamment en décembre, janvier et février), correspondent très probablement pour une part à des migrateurs tardifs mais également à des oiseaux hivernant au large des côtes vendéennes.

OCÉANITE CULBLANC (*Oceanodroma leucorhoa*)

2000-2001 : 5

2001-2002 : 3

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur et hivernant rare au large des côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de vent.

Toutes les observations ne concernent à chaque fois qu'un ou deux individus. Mis à part deux données d'octobre - 1 individu le 04/10/00 pointe de l'Herbaudière à Noirmoutier (M.Vas) - et de novembre - 1 individu en baie de l'Aiguillon le 14/11/02 (B.Per) - toutes les observations sont faites en hiver (en décembre et janvier). Plusieurs d'entre elles concernent des oiseaux morts.

Aucune observation printanière homologuée par le CHD.

FOU DE BASSAN (*Morus bassanus*)

2000-2001 : 55

2001-2002 : 46

Migrateur et hivernant commun, observé toute l'année devant et au large des côtes vendéennes.

Des observations sont effectuées tout au long de l'année mais elles sont plus nombreuses de juillet à octobre (passage postnuptial) et de mars à mai (passage prénuptial). Quelques maxima sont notés à ces périodes : plus de 200 individus le 02/08/02, 400 le 08/08/02, 166 le 07/04/01 et plus de 150 le 18/05/02 depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez le 08/08/02 (G.Bes). On remarque également un groupe de plus de 150 individus posés devant la pointe de la Gournaise à l'île d'Yeu le 05/09/00 (X. & M-P.Hin).

L'observation de plus de 400 oiseaux le 12/06/01 depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) correspond peut-être au début de la dispersion postnuptiale.

Enfin, à noter une observation hivernale de plus de 100 individus le 29/12/01 au large de la côte sauvage de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)

2000-2001 : 185

2001-2002 : 281

Migrateur et hivernant, présent en Vendée tout au long de l'année.

Le passage postnuptial est sensible dès le mois d'août. Les maxima sont notés en octobre, novembre, décembre et janvier sur les dortoirs avec notamment 318 individus le 10/11/01 (L.Gri), 255 le 03/12/00 (L.Gri) et 267 le 04/02/02 (S.Mér) au dortoir des étangs des Boucheries aux Landes-Génusson, mais aussi 270 à la pointe de l'Aiguillon (parc ostréicole) le 28/10/00 (Eq. Pointe), 280 dans les marais de L'Ile-d'Olonne (O.Gir) ou encore plus de 200 le 01/01/01 sur la côte nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

Les effectifs chutent à partir de la fin du mois de février et en mars. Enfin, quelques dizaines d'oiseaux sont présents d'avril à juillet.

Aucun indice de reproduction sur la période.

CORMORAN HUPPÉ (*Phalacrocorax aristotelis*)

2000-2001 : 13

2001-2002 : 7

Espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006 (en dehors des îles d'Yeu et de Noirmoutier).

Nicheur très rare, migrateur et hivernant rare (excepté autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier où il est plus régulier).

Trois observations seulement en dehors des îles d'Yeu et de Noirmoutier (un individu à chaque fois) : deux au phare de l'Armandèche aux Sables-d'Olonne les 30/08/01 et 01/08/02 et une autre le 15/07/02 au port de Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire (M.Bib). Ces trois données ont été homologuées par le CHD.

Les autres observations concernent de un à six individus, excepté 14 oiseaux le 23/08/02 sur l'île du Pilier (D.Des & M.Vas). Elles concernent principalement la dispersion postnuptiale (août et septembre) et l'hivernage (décembre). A noter toutefois quelques observations en juin sur l'île d'Yeu notamment un adulte et deux immatures le 08/06/01 pointe des Corbeaux (F.Por).

Après 1999, un nouveau cas de reproduction de l'espèce est noté en Vendée en 2002 : un nid avec deux grands jeunes le 31/05, toujours sur l'île du Pilier (LPO).

DU BUTOR ÉTOILÉ À LA SPATULE BLANCHE (Perrine DULAC)

BUTOR ÉTOILÉ (*Botaurus stellaris*)

2000-2001 : 1/1

2001-2002 : 0

Migrateur partiel, nicheur possible.

Inféodé aux grandes roselières, il est le plus souvent signalé en Marais breton ou en Marais poitevin, quelques fois aussi sur les étangs du bocage. Pas de données de nidification sur ces deux années.

Une seule donnée d'hivernage pour toute la période considérée : 1 ind. le 23/12/2000 à Champagné-les-Marais (M.Cha).

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006. Au-delà de cette date, seules les données obtenues en dehors des sites de nidification seront soumises à homologation départementale.

Nicheur rare, migrateur.

Aucune donnée n'a été homologuée pour la période (quelques données sont pourtant arrivées au fichier).



Bihoreau gris Nycticorax nycticorax (photo © Matthieu Vaslin)

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*)

2000-2001 : 34

2001-2002 : 24

Nicheur peu commun (localisé dans le Marais poitevin), migrateur.

Pas de données de nidification dans la base pour ces deux années. Pourtant l'espèce niche dans la héronnière du Pain-Béni à Chaillé-les-Marais.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000	-	07/09, Champagné-les-Marais (J.Gon)
Saison 2001	16/04, communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon & J.Gon)	24/08, marais d'Olonne (ONCFS)*
Saison 2002	25/04, La Bruffière (W.Mai)	

* 2 individus ont été observés en septembre aux Landes-Génusson, mais ils ont ensuite hiverné, cf. remarque ci-dessous.

Une donnée d'hivernage sur les étangs des Boucheries (Les Landes-Génusson) : 1 ad. et 1 imm. présents du 18/09 au 18/12/2001 (L.Pav & S.Bio). Donnée homologuée par le CHD (espèce présente en dehors des périodes habituelles).

CRABIER CHEVELU (*Ardeola ralloides*)

2000-2001 : 1/1

2001-2002 : 2/2

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheur rare en France (localisé en Camargue principalement, quelques couples en Dombes, sur la façade atlantique et en Midi-Pyrénées) et migrateur transsaharien. En Vendée, de passage occasionnel.

Trois données, toutes homologuées, pour la période :

- 1 ind. le 25/05/01 au-dessus de la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer (D.God) ;
- 1 ind. le 24/04/02 au même endroit (P-P.Evr) ;
- 1 ad. interruptif le 07/08/02, sur les prairies bordant la station de lagunage de Luçon (F.Por).

HÉRON GARDE-BŒUFS (*Bubulcus ibis*)

2000-2001 : 102

2001-2002 : 116

Nicheur, migrateur et hivernant.

Nicheur à Saint-Hilaire-de-Riez et à Chaillé-les-Marais. En hiver, la majorité des observations proviennent de la côte et des marais, mais l'espèce est aussi présente dans l'intérieur des terres.

Effectifs nicheurs (non exhaustifs, les données de la héronnière de Chaillé-les-Marais n'étant pas parvenues à la base) :

- 2001 : 32 couples nicheurs dans les héronnières de Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
- 2002 : 27 à 30 couples nicheurs dans les héronnières de Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

A signaler également, 1 ad. en plumage nuptial dans la héronnière de La Barre-de-Monts le 22/04/02 (M.Vas). pas de nidification prouvée.

Quelques rassemblements et dortoirs de plus de 100 individus :

- 274 en dortoir le 12/12/00 dans le marais de Beauvoir-sur-Mer (F.Sig),
- plus de 130 le 21/01/01 et le 18/03/01 à la station de lagunage de Luçon (M.Bib),
- 115 le 04/02/01 dans le bocage d'Olonne-sur-Mer (D.Des),
- plus de 150 le 27/08/01 en bordure du communal de Triaize (J. & P.Ada),
- 215 le 15/11/01 à Fief Chapon, Saint-Denis-du-Payré (F.Sal).

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*)

2000-2001 : 191

2001-2002 : 263

Nicheuse et hivernante.

Niche essentiellement dans les héronnières de la côte et du Marais poitevin, en hiver elle est présente à peu près partout dans le département.

Comptages non exhaustifs des héronnières :

- 2001 : 73 à 80 couples dans la héronnière des Biches à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) ; 7 couples dans la héronnière de l'Ile de Charrouin à Vix (C.Gon). Les effectifs de la héronnière du Pain-Béni à Chaillé-les-Marais ne sont pas parvenues à la base de données.
- 2002 : 75-77 couples dans la héronnière des Biches à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) ; 8-10 couples dans la héronnière de la Grande Martinière à Notre-Dame-de-Riez (G.Bes) ; pas d'autres données pour cette année-là dans la base.

Quelques rassemblements dépassant la centaine d'individus : 179 en dortoir le 12/12/00 aux Rousselières à Beauvoir-sur-Mer (F.Sig), plus de 200 en dortoir le 01/01/01 sur la Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'Ile (B.May), 101 le 15/09/01 à nouveau sur la Réserve (LPO) et 109 le 10/07/02 sur la station de lagunage de Noirmoutier (LPO).

GRANDE AIGRETTE (*Ardea alba*)**2000-2001 : 75****2001-2002 : 43**

Hivernante et estivante rare, de plus en plus régulière. Espèce en expansion.

Plusieurs individus semblent apprécier les marais du Talmondaïs : 15 ind. observés en dortoir le 19/11/00 et 11 le 17/12/00 dans les marais de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire (M.Bib), 12 ind. le 22/11/00 puis 13 le 21/02/01 à Jard-sur-Mer. L'année suivante, des oiseaux sont à nouveau observés en "grand" nombre dans le même secteur : 45 ind. le 13/01/02 dans les marais de Jard-sur-Mer (F.Sal & J.Clo) et 24 quelques jours après (M.Bib).

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*)**2000-2001 : 349****2001-2002 : 437**

Nicheur, migrateur partiel, hivernant.

Observé partout dans le département, y compris à l'île d'Yeu. Nicheur en de nombreux endroits (Saint-Hilaire-de-Riez, Notre-Dame-de-Riez, La Barre-de-Monts, La Pommeraie-sur-Sèvre, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Mouzeuil-Saint-Martin, Chaillé-les-Marais, Vix...).

Les comptages non exhaustifs des héronnières ont permis de recenser :

- 2001 : 233 couples dans les héronnières de Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) ; au moins 8 couples à l'Etang du Blanc à Saint-Laurent-sur-Sèvre (S.Bar & S.Bon) ; 65 nids sur l'île de Charrouin à Vix (C.Gon). Peu de données précises de nidification parvenues à la base. Premiers indices de nidification dans la deuxième décade de février (Haut Bocage et marais de la Vie).
- 2002 : 200 couples dans les héronnières de Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) ; 151 nids à La Pommeraie-sur-Sèvre (S.Bar) Premiers indices de nidification observés à Vix début mars.

HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*)**2000-2001 : 35****2001-2002 : 56**

Nicheur localisé, migrateur. En période de nidification, présent essentiellement en Marais poitevin, mais aussi dans le sud du Marais breton.

En 2001, 23 couples nicheurs dans la héronnière de l'île de Charrouin à Vix (C.Gon); 4 à 6 couples nicheurs au Perrier (G.Bes & P.Rou).

En 2002, 45 couples nicheurs au Langon (C.Dra). "Une colonie" notée à l'île d'Elle (C. & J.Gon). Des individus observés au Perrier en juin.

Les effectifs de la héronnière du Pain Béni à Chaillé-les-Marais ne sont pas parvenus à la base pour ces deux ans.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		04/12, communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon)
Saison 2001	18/04, Ile de Charrouin, Vix (C.Gon)	1 ind. le 11/10 à l'île d'Olonne (ONCFS), puis 1 juv blessé le 10/11, autour de la baie de l'Aiguillon (divers observateurs)
Saison 2002	27/03, communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon)*	

* la donnée la plus précoce dans la base de données est le 22/03/86

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)**2000-2001 : 19****2001-2002 : 17**

Migratrice, observée essentiellement en migration postnuptiale.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		12 ind. le 21/09, Champagné-les-Marais (J-P.Gué)
Migr. prénuptiale 2001	Pas de donnée	
Migr. postnuptiale 2001	4 ind. le 05/07, Champagné-les-Marais (J-P.Gué)	1 ind. le 16/09, Moreilles (P.Lav)
Migr. prénuptiale 2002	1 seule donnée : 1 ind. le 10/03 à Beauvoir-sur-Mer (P.Ret)*	
Migr. postnuptiale 2002	5 ind. le 02/08 à Notre-Dame-de-Monts (F.Tro)	

* donnée la plus précoce du fichier LPO

Espèce en expansion en France (et nombre d'observations qui augmente en Vendée).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*)**2000-2001 : 69****2001-2002 : 106**

Nicheuse, migratrice, hivernante rare.

Observée ponctuellement dans tout le département. Les couples nicheurs sont surtout localisés dans les Marais poitevin et breton. Pas de donnée de nidification dans le bocage pour la période concernée.

Les effectifs nicheurs apparaissant dans le fichier sont très incomplets (moins de 10 couples alors qu'une quarantaine de couples sont présents dans les deux marais)

L'hivernage devient de plus en plus régulier en Vendée : des individus vus en novembre et décembre 2000 dans le Marais breton nord et à Saint-Denis-du-Payré, et l'année suivante au Château d'Olonne, à Sainte-Hermine et à Saint-Denis-du-Payré.

MARABOUT D'AFRIQUE (*Leptoptilos crumeniferus*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 1/1**

Espèce très probablement échappée de captivité (originale d'Afrique subsaharienne).

1 individu observé sur la réserve ornithologique de Chanteloup à l'Ile-d'Olonne le 18/07/02 (ONCFS). Une observation avait déjà été faite en juillet 1989 dans le même secteur.

IBIS SACRÉ (*Threskiornis aethiopicus*)**2000-2001 : 41****2001-2002 : 55**

Espèce sédentaire échappée de captivité (Morbihan) en 1976. Il existe désormais une population férale en expansion, nicheuse sur le lac de Grand-Lieu et en Grande Brière (44).

Pour l'instant, l'espèce est principalement observée en Marais breton (entre Bouin et Saint-Hilaire-de-Riez) et sur l'île de Noirmoutier : 36 observations sur 41 en 2000-2001, 45 observations sur 55 en 2000-2001.

Les autres données proviennent de la côte, sauf une donnée de 3 ind. le 05/03/01 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri & G.Jean).

Maxima observés : 68 ind. le 19/11/00 dans le marais de Bouin (F.Sig), 88 ind. le 28/01/01 au port du Collet à Bouin (C.Ler), 167 dans les marais de la Vie le 08/03/02 (G.Bes). Ces chiffres sont bien plus élevés que le maximum de la période précédente (33 ind., cf. Gorgebleue n°19-20).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*)**2000-2001 : 95****2001-2002 : 98**

Migratrice, de passage en période de reproduction, hivernante rare.

Présente essentiellement dans les marais et sur le littoral mais quelques données dans l'intérieur des terres : 1 ind. le 14/07/01 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri), 20 en vol le 27/02/02 à Mouilleron-le-Captif (A.Ger), 1 ind. le 15/04/02 au-dessus de la Sèvre Nantaise à Mortagne-sur-Sèvre (O.Fle & S.Bar).

Pas de données de l'île d'Yeu.

Quelques effectifs remarquables :

- 30 ind. en vol le 19/03/01 à la pointe de l'Aiguillon (M.Cos)
- 38 ind. en vol le 03/10/01 au-dessus du Daviaud à La Barre-de-Monts (J-G.Rob)
- 51 le 11/04/02 sur les marais de l'Ile-d'Olonne (ONCFS)

Des individus ont été signalés en hiver sur toute la côte, mais les observations proviennent surtout de l'île de Noirmoutier et des marais Olonnais.

FLAMANT ROSE (*Phoenicopterus roseus*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Rare sur la côte atlantique (en France, l'espèce n'est présente que sur la côte méditerranéenne).

1 ind. 02/10/00 sur le marais de l'Ile-d'Olonne (ONCFS).

La donnée précédente datait de 1979 (1 ind. à la pointe de l'Aiguillon, C.Gon).

CANARDS DE SURFACE (Christian et Julien GONIN)

CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*)

2000-2001 : 127

2001-2002 : 156

Espèce commune, sédentaire.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 166 dont 62 dans les marais d'Olonne et 46 sur les communaux du Marais poitevin ;
- janvier 2002 : 334 dont 204 sur les communaux du Marais poitevin.

Le Marais poitevin abrite le plus gros effectif d'oiseaux nicheurs de la Vendée. Les principales concentrations de fin d'été ou d'hivernage en sud-Vendée et concernant plus de 50 ind. sont : la lagune de la Belle Henriette (La Faute-sur-Mer), la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer, la base de loisirs de Luçon. On note aussi une concentration de 58 ind. dans les marais Sablais, le 29/01/2001 (D.Des).

CYGNE NOIR (*Cygnus atratus*)

2000-2001 : 35

2001-2002 : 6/4

Espèce australienne, échappée de captivité.

2000-2001 : sur la carte d'Olonne-sur-mer, le Cygne noir a été présent sur 26 des 36 décades de l'année avec un effectif maximal de 6 individus en vol vers le sud le 31/07/01, à l'observatoire de L'Ile-d'Olonne (D.Des).

8 communes (L'Herbaudière, Noirmoutier, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brem-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne, Jard-sur-Mer, Angles et L'Aiguillon-sur-Mer) ont accueilli chacune 1 ou 2 individus au moins une fois, à partir d'avril sauf pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie en novembre.

2001-2002 : 3 ind. le 06/09/01 et 5 ind. le 31/01/02, réserve de Chanteloup, L'Ile-d'Olonne (ONCFS), 1 ind. du 10/11/01 au 28/03/02, lagune de la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer (LPO, J. & P. Ada) et 1 ind. les 02 et 03/08/02, marais de la Chatte et Les Portes, Notre-Dame-de-Riez (O.Lam).

CYGNE CHANTEUR (*Cygnus cygnus*)

2000-2001 : 17/2

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation départementale, scandinave et sibérienne, hivernante rare, présente en période de froid.

- 1 ind. le 08/03/2001 au Bout de Sac à Beauvoir-sur-Mer (C.Gir, P.Dul et al.) ;
- 1 ind. du 16/03/2001 (peut-être avant) au 15/05/2001 (date la plus tardive de la base) dans les marais d'Olonne (ONCFS, D.Des, M.Bib, F.Por).

OIE DES MOISSONS (*Anser fabalis*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation départementale.

Oie scandinave et sibérienne.

Aucune donnée homologuée pour la période...

OIE RIEUSE (*Anser albifrons*)

2000-2001 : 5/3

2001-2002 : 6/2

Oie sibérienne, espèce régulière en migration et hivernage dans le sud de la Vendée, toujours en faible effectif.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International

- janvier 2001 : 2 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon et 1 sur la Réserve Naturelle de la Pointe d'Arçay.
- janvier 2002 : 40 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon

2000-2001 : 1 ad. le 16/10 (A.The) et 5 ind. le 07/02 (ONCFS), Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon et 8 en vol vers le nord-est le 22/02, réserve de Chanteloup (ONCFS).

2001-2002 : 3 ind. le 13/02 et 16 le 11/02 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (ONCFS), 2 ind. le 22/12 (C.Dra) et 6 ind. le 27/12 et 2 le 05/02 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.Gon).

OIE CENDRÉE (*Anser anser*)

2000-2001 : 134

2001-2002 : 75

La seule oie nicheuse en France, migratrice et hivernante la plus abondante.

En Vendée, migratrice et hivernante localisée dans la baie de l'Aiguillon.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	43 ind. le 06/09, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (J.Gon)	1 ind. le 26/04, marais d'Olonne (ONCFS) et 1 ind. (oiseau de la Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré ?) le 12/06, station d'épuration, La Tranche-sur-Mer (F.Sem).
Hiver 2001-2002	51 ind. le 30/08, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (J.Gon)	2 ind. le 10/05, marais Sablais, Les Sables-d'Olonne (A.Bar)
Hiver 2002-2003	25 ind. le 27/08, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (S.Bio & L.Pav)	-

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 3 889 dont 3 323 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon et 509 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré ;
- janvier 2002 : 2 078 dont 1 600 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon et 472 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré.

OIE À TÊTE BARRÉE (*Anser indicus*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Espèce d'Asie centrale. Il s'agit en Europe d'individus échappés de captivité, mais des oiseaux sauvages pourraient également s'égarer.

1 individu le 16/04/01 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (S.Bio et L.Pav).

BERNACHE DU CANADA (*Branta canadensis*)

2000-2001 : 3/1

2001-2002 : 1/1

Espèce introduite en Europe, originaire d'Amérique du Nord, nicheuse dans le nord de la France et sur le Val d'Allier.

1 ind. du 12/07/01 au 28/07/01 sur les marais d'Olonne (ONCFS, D.Des).

7 ind. le 11/11/01 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (Eq.Pointe).

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*)

2000-2001 : 7/2

2001-2002 : 9/4

Nicheuse en Nouvelle Zemble, au Spitzberg, au Groenland et plus récemment en Scandinavie et jusqu'en Hollande.

2000-2001 : 2 ind. du 04/01 au 05/02 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (E.Joy, ONCFS), 3 ind. du 09/06 au 11/07 (M.Bib, F.Sem) puis 2 ind. le 30/08 (J.Gon) sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré.

2001-2002 : 2 ind. les 05 et 06/09, marais de Jard-sur-Mer (F.Sal), 2 ind. du 22/09 au 08/11 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.Gon, J. & P.Ada, Eq.Pointe), 5 ind. le 27/12 (J.Gon) et 6 le 14/01 (ONCFS) sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon et 6 ind. les 05/02 et 19/03 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.Gon).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	2 ind. le 04/01, Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (ONCFS)	2 ind. le 05/02, Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (ONCFS)
Hiver 2001-2002	3 ind. le 09/06, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (F.Sem)	6 ind. le 19/03, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (J.Gon)

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla bernicla*)

2000-2001 : 151

2001-2002 : 170

Hivernante et migratrice

Commune sur l'ensemble de la côte vendéenne, avec 2 grands pôles que sont l'ensemble baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et l'ensemble baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 8 151 dont 5 209 en baie de Bourgneuf et 2 086 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon.
- janvier 2002 : 10 245 dont 7 189 en baie de Bourgneuf et 1 053 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	Présente toute la saison 1999-2000 sur l'île de Noirmoutier	1 ind. le 19/06, port des Brochets (LPO)
Hiver 2001-2002	2 juv., le 02/08, port des Brochets (C.Ler)	2 ind., le 15/05, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier (LPO Noi)



Bernaches cravant Branta bernicla bernicla (photo © Matthieu Vaslin)

BERNACHE DU PACIFIQUE (*Branta bernicla nigricans*)

2000-2001 : 8/2

2001-2002 : 2/1

Sous-espèce de la Bernache cravant nichant de l'Arctique canadien à la Terre de François-Joseph, soumise à homologation nationale jusqu'au 1^{er} janvier 2006, et à homologation départementale au-delà de cette date.

- 1 ind. le 29/11/00, pointe du Bouclard, Barbâtre (M.Vas, *Ornithos* 9-1) ;
- 1 ind. du 19/12/00 au 12/02/01, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas, B.May, , *Ornithos* 9-1) ;
- 1 ad. le 23/02/01, lagune du Dain, Bouin (M.Vas, *Ornithos* 9-1) ;
- 1 ind. le 23/03/01, pointe de l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île (LPO, oiseau différent de celui de Bouin, *Ornithos* 9-1) ;
- 1 ad. du 05/12/01 au 23/02/02 dans la baie de Jard-sur-Mer (F.Sal, F.Por, *Ornithos* 10-2).

BERNACHE À VENTRE CLAIR (*Branta bernicla hrota*)

2000-2001 : 6/1

2001-2002 : 1/1

Sous-espèce de la Bernache cravant nichant au Groenland et au Spitzberg, soumise à homologation départementale.

- 1 ad. et 1 ind. de 1^{er} hiver, le 29/11/00 (M.Vas), puis 1 ad. parmi les 2 700 cravants le 22/12/00, pointe du Bouclard, La Guérinière (LPO) ;
- 1 ind. les 02 et 03/01/01, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île (B.May) ;
- 1 ind. de 1^{er} hiver, le 23/01/01, lagune de Bouin (M.Vas) ;
- 2 ad. , le 13/12/01, étang du Vide, Barbâtre (B.Isa).

OUETTE D'ÉGYPTE (*Alopochen aegyptiacus*)

2000-2001 : 2/2

2001-2002 : 4/2

Espèce nicheuse en Turquie, dans la péninsule arabique et au Maroc. Population férale en Europe (Pays-Bas, Grande-Bretagne...).

2 ind. le 03/04/01 puis 1 ind. le 20/04/01 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (S.Bio, L.Pav & N.Ber).

2 ind. le 13/01/02, 1 ind. les 23 et 25/01/02 puis 2 ind. le 10/02/02 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri, F.Fon, C.Mét, L.Pav, S.Mér).

TADORNE CASARCA (*Tadorna ferruginea*)**2000-2001 : 2/1 ou 2****2001-2002 : 2/2**

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheur en Afrique subsaharienne (Haute-Égypte), introduit en Europe occidentale. Populations férales bien établies en Grande-Bretagne, Belgique, aux Pays-Bas et en France.

Les observations françaises concernent très certainement des oiseaux échappés de captivité ou issus de populations férales.

- 1 ind. les 01 et 12/10/00 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (Eq.Pointe, ONCFS) ;
- 5 ind. les 13 et 14/08/02 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.Gon, P.Tro *et al.*) ;
- 1 fem. probable le 18/08/02 sur la lagune de la Belle Henriette à La Faute-sur-Mer (J.Gon & F.Jig).

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)**2000-2001 : 210****2001-2002 : 287**

Nicheur de la côte landaise à la Scandinavie, localisé en Méditerranée et plus répandu autour de la Mer Noire et plus à l'Est. Sur la façade atlantique, les populations nordiques effectuent de petites migrations. Zone d'hivernage jusqu'en Afrique du Nord.

En Vendée, nicheur et hivernant localisé sur l'ensemble de la côte.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 7 952 dont 5 756 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (2^e site français) et 1 508 en baie de Bourgneuf ;
- janvier 2002 : 7 930 dont 4 549 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (2^e site français) et 2 291 en baie de Bourgneuf.

CANARD MANDARIN (*Aix galericulata*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 0**

Espèce originaire d'Asie orientale. Population férale bien établie en Grande-Bretagne (sud de l'Angleterre), ind. souvent échappés de captivité.

1 mâle le 13/09/00 dans le marais de L'Ile -d'Olonne (ONCFS).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)**2000-2001 : 125****2001-2002 : 105**

Canard nichant principalement en Scandinavie, en Sibérie occidentale, en Angleterre et en Islande. Hiverné dans toute l'Europe et en Afrique du Nord.

En Vendée, hivernant et migrateur.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	27 ind. le 12/09, port du Collet, Bouin (LPO)	1 mâle le 30/06, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri)*
Hiver 2001-2002	4 ind. le 06/09, terrains LPO, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)	5 ind. le 05/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri, S.Mér & L.Pav).
Hiver 2002-2003	1 m. et 2 fem. le 26/08, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes).	

* donnée la plus tardive du fichier

Observé un peu partout en hiver avec un maxi de 1 276 le 22/12/00 en baie de Bourgneuf (LPO) et noté en migration post et pré-nuptiale sur toutes les zones humides vendéennes, en groupes allant en moyenne de 3 à 70 ind.

Un maxi a été noté le 21/02/01 avec 150 ind. à Beauvoir-sur-Mer (C.Gir, T.You & D.Pet).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 2 837 dont 1 559 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon et 893 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré ;
- janvier 2002 : 3 887 dont 2 400 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon et 1 248 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré.

CANARD À FRONT BLANC (*Anas americana*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 1/1**

Espèce soumise à homologation nationale.

Niche en Amérique du Nord et hiverne en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

1 mâle adulte le 12/12/01 en baie de Bourgneuf, à Bouin (O.Gir). Donnée homologuée par le CHN (*Ornithos* 10-2).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)

2000-2001 : 65

2001-2002 : 52

Nicheur localisé en Europe de l'Ouest, plus abondant en Europe de l'Est et en Russie du sud-ouest.

En Vendée, hivernant, migrateur et nicheur rare.

Aucune nidification constatée en 2001 et en 2002 malgré la présence de l'espèce en période de reproduction :

- en 2001, 1 couple le 19/04 sur le marais de Beaumont à Champagné-les-Marais (C.Gon) et 1 couple le 28/04 à la base de loisirs de Luçon (M.Bib) ;
- en 2002, 3 ind. le 11/04 et 1 couple le 15/05 sur la station de lagunage de Noirmoutier (LPO), ainsi que 1 couple et 1 mâle le 23/04 sur le marais du Délit à L'Epine (D.Des).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	4 ind. le 23/08, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri)	1 couple le 28/04, base de loisirs de Luçon (M.Bib)
Hiver 2001-2002	2 ind. le 29/07, étang des Mattes, St-Gervais (F.Sig)	2 ind. le 15/05, station d'épuration de Noirmoutier (LPO)
Hiver 2002-2003	2 ind. le 10/07, station d'épuration de Noirmoutier (LPO)	

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 151 dont 63 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon, 30 sur les marais d'Olonne et 21 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré ;
- janvier 2002 : 108 dont 59 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon.

Le maximum concerne la présence de 114 ind. le 22/12/00 et 68 ind. le 12/12/01 en baie de Bourgneuf (LPO).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)

2000-2001 : 135

2001-2002 : 136

Nicheuse dans tout le nord de l'Europe et la Russie.

En Vendée, hivernante et parfois des individus en période de reproduction.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001		2 m. et 1 fem. Le 19/04, Beaumont, Champagné-les-Marais (C.Gon)
Hiver 2001-2002	4 ind. le 12/07, lagune de la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer (J.Gon) 2 ind. le même jour, La Tranche-sur-Mer (J.Gon)	24/04, marais de L'Ile-d'Olonne (ONCFS)
Hiver 2002-2003	4 ind. le 19/07, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri, L.Pav & L.Con)	

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 11 548 dont 9 810 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré ;
- janvier 2002 : 7 171 dont 3 812 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré et 1 747 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon.

SARCELLE À AILES VERTES (*Anas carolinensis*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 3/1

Espèce nord américaine (anciennement sous-espèce de la Sarcelle d'hiver) soumise à homologation nationale.

Toutes les données proviennent de la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré : 1 mâle adulte, du 10/11/01 au 15/01/02 (J.Gon & A.Tho). Données acceptées par le CHN (*Ornithos* 12-1).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*)

2000-2001 : 403

2001-2002 : 409

Nicheur, migrateur, hivernant.

Le plus commun des anatidés, l'espèce est présente et se reproduit sur l'ensemble du département.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 12 380 dont 5 675 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon et 4 015 en baie de Bourgneuf ;
- janvier 2002 : 17 044 dont 9 649 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon et 3 768 en baie de Bourgneuf.

CANARD PILET (*Anas acuta*)

2000-2001 : 62

2001-2002 : 84

Nicheur en Grande Bretagne, dans le nord de la France, pays du Nord de l'Europe, en Scandinavie, Islande et Russie.

En Vendée, hivernant et migrateur régulier sur l'ensemble du département.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	4 ind. le 18/09, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (M.Gai & N.Jea)	7 ind. le 12/04, la Louippe, Bouin (LPO) 1 ind. le 19/06, le Gois, Barbâtre (LPO)
Hiver 2001-2002	7 ind. le 21/09, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri) 1 ind. le même jour, Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (G.Jar)	Présent le 23/04, marais de L'Ile-d'Olonne (ONCFS)
Hiver 2002	2 ind. le 02/08, marais de la Chatte, Notre-Dame-de-Riez (O.Lam)	

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 5 327 dont 3 816 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (1^{er} site français) et 647 dans les marais d'Olonne (7^e site) ;
- janvier 2002 : 2 283 dont 1 414 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (3^e site français) et 668 dans les marais d'Olonne (6^e site).

Autres maxis : 528 ind. le 22/12/00 en baie de Bourgneuf (LPO) et 1 396 le 22/12/00 dans les marais d'Olonne (ONCFS).

SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*)

2000-2001 : 40

2001-2002 : 31

Espèce migratrice, nicheuse sur l'ensemble de l'Europe et de la Russie, hivernante en Afrique tropicale.

En Vendée, migratrice et nicheuse localisée dans les Marais breton et poitevin, en nombre restreint :

- en 2001, 6 couples nicheurs dans les marais de la Vie (G.Bes) ;
- en 2002, 3 à 5 couples dans les marais de la Vie (G.Bes) et 1 couple avec des poussins le 01/06 à la Rente, La Barre-de-Monts (F.Sig).

	Première observation	Dernière observation
Saison 2001	1 m. le 07/03, réserve de Chanteloup, L'Ile-d'Olonne (ONCFS)	2 ind. le 12/11, la Louippe, Bouin (LPO)*
Saison 2002	1 m. le 03/03, digue du Maroc, Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (F.Sal, G.Bes, P.Rou et P-P.Evr).	2 ind. le 18/10, marais d'Olonne (ONCFS)

* date la plus tardive de la base

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)

2000-2001 : 207

2001-2002 : 209

Commun sur les étendues d'eau de plaine, les prairies marécageuses ou inondées de l'ensemble de l'Europe et de la Russie.

En Vendée, le Canard souchet est nicheur, migrateur et hivernant.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 1 688 dont 416 en baie de Bourgneuf, 392 dans les marais d'Olonne, 257 en Marais breton ;
- janvier 2002 : 1 600 dont 680 en baie de Bourgneuf, 316 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon, 166 dans les marais d'Olonne.

Autres maxima : 300 ind. le 23/11/00 dans les marais d'Olonne (ONCFS), 300 le 25/11/00 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (D.God), 228 ind. le 16/11/01 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri & L.Pav) et 1 007 ind. le 11/02/02 en baie de Bourgneuf (LPO).

Des couples reproducteurs sont notés dans le marais de la Vie (G.B), dans le marais de Beauvoir-sur-Mer (F.Sig *et al.*), dans le marais de La Barre-de-Monts (F.Sig) et sur la station d'épuration de Noirmoutier (LPO Noi).

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*)

2000-2001 : 4/3

2001-2002 : 0

Nicheur méditerranéen, en vallée du Rhône, dans les pays d'Europe de l'Est et dans le sud-ouest de la Russie.

1 femelle les 22 et 28/12/00, pointe de la Fosse à Barbâtre (LPO, M.Vas).

1 couple le 17/04/01, Loirs Hermouet, Olonne-sur-Mer, présent depuis au moins le 15/04 (D.Per & D.Des).

1 ind. le 19/08/2001, station d'épuration de Luçon (M.Bib).

CANARDS PLONGEURS (Lucien GRILLET)

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)

2000-2001 : 128

2001-2002 : 98

Migrateur, hivernant, nicheur rare.

Présent toute l'année sur les étangs du bocage et certaines stations d'épuration de la côte et de Noirmoutier.

Les principales concentrations d'hivernants ont été signalées sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson et la station d'épuration de Noirmoutier : 88 ind. le 03/11/00 (L.Gri & A.Riv) et 125 ind. le 13/01/01 (L.Gri) aux Boucheries, 92 le 03/12/00 à Noirmoutier (E.Gas).

En avril et en mai des groupes de mâles sont observés aux Boucheries. A partir de juin quelques oiseaux des deux sexes fréquentent également d'autres plans d'eau. Aucun indice de nidification n'a été mentionné durant la période concernée.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 147 ind., presque tous sur les étangs du bocage (66 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson) ;

- janvier 2002 : 247 ind., dont 67 à Noirmoutier et le reste sur les étangs du bocage.

FULIGULE À BEC CERCLÉ (*Aythya collaris*)

2000-2001 : 2/2

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation nationale jusqu'au 1^{er} janvier 2006, puis à homologation départementale au-delà de cette date.

Espèce nord-américaine, occasionnelle en Europe de l'Ouest.

A été observé au printemps, le 01/04/01 à La Faute-sur-Mer (A.Tho), le 05/04/01 à La Tranche-sur-Mer (P.Yes) (*Ornithos* 10-2).

Toutes les données parvenues au fichier n'ont pas été homologuées...

FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur occasionnel (niche surtout en Europe de l'est, au Moyen-Orient et en Espagne de façon localisée).

Une seule observation d'une femelle le 07/12/01 sur la station de lagunage de Noirmoutier (M.Vas).

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)

2000-2001 : 75

2001-2002 : 65

Nicheur rare, migrateur, hivernant.

Présent toute l'année sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson, et seulement en hivernage de novembre à mars sur d'autres points d'eau du département (L'Herbaudière, Saint-Hilaire-de-Riez, Angles, L'Aiguillon-sur-Mer).

Les maxima sont observés aux Boucheries, en hivernage : 46 ind. le 22/12/00 (L.Gri), 36 ind. le 06/01/01 (L.Gri), 57 ind. le 13/01/02 (L.Gri, H.Szw & M-O.Bou).

	Première observation (hors Boucheries)	Dernière observation (hors Boucheries)
Hiver 2000-2001	19/10, marais d'Olonne (ONCFS)	23/03, station d'épuration de Noirmoutier (LPO)
Hiver 2001-2002	20/11, station d'épuration, Jard-sur-Mer (F.Sal)	09/04, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier (M.Vas)
Hiver 2002-2003	21/08, station d'épuration de Barbâtre (LPO)	

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 35, dont 21 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson ;
- janvier 2002 : 30, dont 18 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)

2000-2001 : 11/6

2001-2002 : 10/4

Hivernant et migrateur.

Observé en mer de novembre à avril, généralement à proximité des côtes.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	19/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)	03/04, baie de l'Aiguillon (A.Text)
Hiver 2001-2002	03/12, le Collet, Bouin (LPO)	13/03, station de lagunage, Noirmoutier (LPO)

EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*)

2000-2001 : 6/6

2001-2002 : 15/11

Migrateur, hivernant, estivant. Pas d'indice de nidification depuis le naufrage de l'Erika.

Observé en petit nombre, en mer ou sur les côtes, toute l'année.

Très peu d'individus observés lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 2 ind. ;
- janvier 2002 : 5 ind.

HARELDE BORÉALE (*Clangula hyemalis*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 8/1

Migratrice, hivernante peu commune.

Un individu observé du 15/12/01 au 07/03/02 depuis la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes, B.Isa).

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*)

2000-2001 : 29/18

2001-2002 : 26

Migratrice et hivernante.

Observée en hivernage, en grand nombre, près des côtes, généralement de septembre à mars. Une concentration de plus de 6 000 oiseaux le 17/02/01 au large de la plage de la Terrière à La Tranche-sur-Mer (C. & J.Gon).

Principaux points d'observation : La Faute-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer, Saint-Hilaire-de-Riez, Brétignolles-sur-Mer, Noirmoutier.

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 4 838 ind. ;
- janvier 2002 : 4 031 ind.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	17/09, pointe de l'Aiguillon (M.Gai & N.Jea)	25/03, station de lagunage, Noirmoutier (M.Vas), puis estivage au large des Sables-d'Olonne, de Brétignolles-sur-Mer et de l'Île-d'Yeu
Hiver 2001-2002	26/09, l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (S.Vri)	18/04, les Mouettes, St-Hilaire-de-Riez (P.Dul), puis estivage d'une trentaine d'individus au large de Saint-Hilaire-de-Riez

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*)**2000-2001 : 4/3****2001-2002 : 23/12**

Migratrice, hivernante.

Observée en petit nombre, en mer, de novembre à avril. Des effectifs de 40 à 50 ont été signalés le 09/02/02 et le 02/03/02 au large des Marines, à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 0 ;

- janvier 2002 : 98 ind.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	28/12, île d'Yeu (X. & M.-P.Hin)	24/03, plage des Marines, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Hiver 2001-2002	12/11, pointe du Devin, L'Epine (LPO)	30/04, plage des Marines, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* (Dessin © Benoît Perrotin)**GARROT À OEIL D'OR (*Bucephala clangula*)****2000-2001 : 16/5****2001-2002 : 17/6**

Hivernant et migrateur peu commun.

Observé en mer mais aussi sur les plans d'eau proches de la mer et quelques étangs du bocage, de novembre à mars (station de lagunage de Noirmoutier, base de voile de La Tranche, étangs des Boucheries).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	04/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)	17/03, étangs des Boucheries (L.Gri & G.Jea)
Hiver 2001-2002	04/12, base de voile de La Tranche-sur-Mer (J.Gon)	10/03, station de lagunage de Noirmoutier (M.Vas)

Une donnée estivale en 2001 : un mâle en sud Vendée le 03/06 (F.Duc *et al.*), donnée homologuée par le CHD.**HARLE PIETTE (*Mergellus albellus*)****2000-2001 : 0****2001-2002 : 2/1**

Migrateur et hivernant peu commun.

Observable parfois sur les étangs du bocage. Un seul oiseau a été observé, deux fois, le 12/01/02 et le 26/02/02 sur l'étang des Cosses à Saint-Martin-des-Noyers (M.Bib).

HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*)**2000-2001 : 49****2001-2002 : 23**

Migrateur, hivernant régulier.

Présent de septembre à avril, en mer, le long des côtes et sur les plans d'eau salée.

Souvent les observations ont concerné plusieurs individus pêchant ensemble. Ainsi, 10 oiseaux ont été signalés le 03/01/01, 12 le 06/01/01 et 20 le 27/01/01 sur la base de voile de L'Aiguillon-sur-Mer (J.&P.Ada).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 12 ind. ;
- janvier 2002 : 1 ind.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	03/10, marais de L'Ile-d'Olonne (ONCFS)	18/04, La Nouvelle Brille, Noirmoutier-en-l'Ile (N.Pra)
Hiver 2001-2002	15/09, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Ile (LPO)	03/05, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)

Une donnée d'estivage : un mâle immature observé du 15/07/00 au 02/08/00, aux alentours de la Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg (M.Vas).

HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 6/2 ou 3**

Espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006.

Migrateur, hivernant peu fréquent.

Une donnée dans les terres : 3 femelles observées sur l'Yon à Rosnay le 10/11/01 (P.Von).

Une femelle observée en mer les 22 et 23/12/01 depuis la plage des Mouettes à Saint-Hilaire-de-Riez (P.Rou & G.Bes), puis une femelle (la même) les 12 et 13/01/02 au Marais Girard à Brétignolles-sur-Mer (P.Rou).

ÉRISMATURE ROUSSE (*Oxyura jamaicensis*)**2000-2001 : 59/2****2001-2002 : 20/2**

Espèce soumise à homologation nationale.

Espèce nord-américaine, introduite en Europe.

A été observée toute l'année sur des étangs du bocage : étang des Rochettes (Rocheservière) et étangs des Boucheries (Les Landes-Génusson où elle s'est reproduite (L.Gri *et al.*). Détail des homologations parues dans *Ornithos* 9-1, 10-2, 11-2).

RAPACES DIURNES (Sylvain VRIGNAUD)**BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*)****2000-2001 : 34****2001-2002 : 18**

Migrateur et nicheur.

En période de reproduction, les bondrées sont observées dans tout le bocage à l'exception du Haut-Bocage.

Aucun indice de reproduction n'a été signalé, toutefois quelques observations laissent supposer une nidification :

- 2 ind. en vol et parade le 12/06/01 au Puy Bruret (Mervent, D.Bro) ;
- 1 ind. criant les 15 et 21/07/01 à Rocheservière (L.Gri) ;
- 1 ind. en parade territoriale le 08/07/02 au Jaulard (Mervent) et 1 ind. criant au même endroit le 18/08/02 (D.Bro).

Observée en migration sur tout le département (y compris l'île d'Yeu) à l'exception du Haut-Bocage.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		04/10, La Roche-sur-Yon (S.Bon)
Saison 2001	21/05, Noirmoutier-en-l'Ile (LPO Noi)	10/10, La Bretonnière (J.&P.Ada)
Saison 2002	11/05, Mervent (D.Bro)	

MILAN NOIR (*Milvus migrans*)**2000-2001 : 105****2001-2002 : 106**

Migrateur et nicheur.

Présent sur tout le département à l'exception de l'île d'Yeu (aucune observation n'est parvenue au fichier).

Quelques nicheurs ou supposés nicheurs ont été notés :

- 3 à 5 couples en 2001 et 4 à 5 couples en 2002 sur l'île de Charrouin (Vix, C.Gon) ;
- 1 couple à Vouvant le 26/06/01 (D.Bro) ;
- 3 à 5 couples à Mouzeuil-Saint-Martin le 02/05/02 (C.Gon) ;
- 2 ind. paradant à Vouvant le 04/05/02 (D.Bro) ;
- au moins 4 couples nicheurs dans un rayon de 700 m autour de la décharge de Givrand le 12/05/01 (G.Bes).

Quelques rassemblements ont été observés, avec notamment 28 ind. le 09/03/02 en dortoir à la décharge de La Roche-sur-Yon (halte migratoire ? C.Gon), plus de 30 le 15/06/01 au même endroit (T.You) et 21 ind. le 05/06/02 à La Bretonnière (J.&P.Ada). Il est à noter que ces deux derniers groupes ont été observés en période de nidification.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		14/10, La Guérinière (C.Gir)
Saison 2001	06/03, La Roche-sur-Yon (M.Bib)	20/11, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq.Pointe)
Saison 2002	26/02, La Bretonnière (J.&P.Ada)	

Par ailleurs 1 ind. a été observé avec des longes aux pattes (échappé de volière) le 11/09/00 à la pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe).

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)**2000-2001 : 2/3****2001-2002 : 19**

Migrateur et hivernant peu commun.

Observé de fin septembre à début avril, principalement dans les marais côtiers et dans le sud Vendée (à l'exception, pour la période, d'un oiseau le 29/11/01 aux Épesses, F.Pap). La majorité des observations ont lieu de fin octobre à fin novembre (notamment 2001 avec 13 observations sur cette période), s'agissant très certainement de migrants.

Un cas d'hivernage semble toutefois avoir été observé en 2001-2002 en Marais breton (P.Ret, F.Sig, P.Dul...).

À noter 3 groupes observés en migration :

- 2 ind. le 14/04/01 à Saint-Jean-de-Monts (C.Gir) ;
- 4 ind. le 16/11/01 aux Sables-d'Olonne (ONCFS) ;
- 2 ind. le 16/11/01 à la pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	23/12, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	14/04, St-Jean-de-Monts (C.Gir)
Hiver 2001-2002	28/10, St-Vincent-sur-Jard (J.&P.Ada)	15/02, Beauvoir-sur-Mer (M.Cos & D.Pet)

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 11/2**

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheur de l'est et du nord de l'Europe, hiverne en petit nombre en France (surtout dans le nord-est).

En Vendée, hivernant occasionnel.

1 ind. de 1^{er} hiver a été trouvé le 24/11/01 sur le lac de Rochereau à Sigournais (D.God) et a été revu jusqu'au 24/12/01 (C.Gon *et al.*).

1 ind., de 1^{er} hiver aussi (le même ?) a été vu sur l'étang du Parc Soubise à Mouchamps le 27/01/02 et le 09/02/02 (M.Bib).

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*)**2000-2001 : 25****2001-2002 : 30**

Migrateur et nicheur probable.

Présent d'avril à septembre, surtout en période de migration. Les données proviennent notamment du sud-Vendée (sur un secteur allant de Saint-Denis-du-Payré / La Tranche-sur-Mer à Nalliers-Mouzeuil), des marais d'Olonne et du Marais breton (Beauvoir-sur-Mer et La Barre-de-Monts). Par contre, aucune donnée de Mervent n'a été transmise au fichier pour cette période.

Aucun indice certain de nidification n'a été trouvé. Toutefois, quelques observations sont suspectes :

- 2 ind. paradant à Olonne-sur-Mer au lieu-dit les Granges le 15/04/01 (F.Por) ;

- 1 ind. transportant un serpent à Beauvoir-sur-Mer le 02/07/01 (P.Dul, F.Sig *et al.*)
- 2 ind. le 02/05/01 puis 1 ind. le 17/08/01 (D.Des) à L'Ile-d'Olonne, prenant à chaque fois la direction de la Vertonne.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		01/10, L'Aiguillon sur Mer (P.Ang)
Saison 2001	15/04, Olonne-sur-Mer (F.Por)	10/09, île d'Yeu (F.Por)
Saison 2002	28/03, L'Aiguillon-sur-Mer (J. & P.Ada)	

Observations remarquables d'1 ind. revu au même endroit que les années précédentes à la Bironnerie (La Réorthé) le 10/06/01 (M.Bib) ainsi qu'1 ind. à la Bergerie (île d'Yeu) le 10/09/01 (F.Por)

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)

2000-2001 : 183

2001-2002 : 218

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Observé quasi exclusivement dans les marais ainsi qu'à l'île d'Yeu. Il y a quelques rares données dans la plaine et dans le bocage (notamment autour des étangs des Boucheries aux Landes-Génusson), concernant très certainement des migrants.

Nidification possible (parades, transport de matériaux,...) à :

- la Palette (Bouin) le 16/02/01 et le 26/03/01 (C.Gir) ;
- La Barre-de-Monts le 17/03/01 (F.Sig) ;
- Le Poiré-sur-Velluire le 22/05/01 (C.Gon) ;
- Notre-Dame-de-Monts le 22/05/01 (C.Kon) ;
- Vix le 23/05/01 (C.Gon).

Nidification certaine dans les marais de la Croix (île d'Yeu) le 04/06/01 (F.Por), au Perrier le 25/06/01 (G.Bes), au polder de la Parisienne (Bouin) le 01/07/01 (S.Bon), à Triaize le 24/04/02 (C.Dra), à Moreilles le 24/04/02 (C.Dra) et le 02/05/02 à Velluire (C.Gon).

À noter un groupe de 18 individus le 14/01/02 dans la Réserve Naturelle de la Baie de l'Aiguillon (ONCFS).

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*)

2000-2001 : 120

2001-2002 : 142

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Noté sur tout le département (mais aucune donnée en provenance de l'île d'Yeu), avec une concentration des observations en mai-juin dans le bocage.

Nidification possible à :

- La Réorthé, 1 couple attaque un Circaète le 10/06/01 (M.Bib) ;
- Aizenay, le 20/06/01 (A.Gér).

Nidification certaine :

- 2 couples aux Brouzils durant le printemps 2002 (J-P.Til) : 3 poussins en duvet, 1 œuf non éclos et 5 juv. non volants le 18/05/02 ;
- 2 couples nicheurs à Bourneau le 30/06/02 (D.Bro).

BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*)

2000-2001 : 93

2001-2002 : 68

Migrateur et nicheur dans les Marais breton et poitevin ainsi que dans la plaine.

Nidification prouvée aux Brouzils durant le printemps 2002 avec 6 jeunes volants (J-P.Til)

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		07/09, Saint-Denis-du-Payré (J.Gon)
Saison 2001	01/04, Mouzeuil-Saint-Martin (J-C.Lue)	30/10, Triaize (J. & P.Ada)
Saison 2002	29/03, Froidfond (P.Dul)	

La dernière observation effectuée le 30/10/01 (J. & P.Ada) est la date la plus extrême connue à ce jour dans le fichier.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)**2000-2001 : 13****2001-2002 : 5**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Observé principalement dans le bocage et plus particulièrement dans les massifs forestiers.

Nidification constatée ou suspectée en 2001 :

- 1 mâle transportant une proie le 23/06/01 à La Tranche-sur-Mer (E.Cor) ;
- nicheur certain à La Réorthie le 25/06/01 (S.Bon & A.Gér) ;
- 1 aire à Saint-Juire-Champgillon le 23/06/01 (A.Gér).

Peu d'observations ont été faites durant la période 2001-2002, correspondant à une recherche moins accrue. Par ailleurs, les observations ont été effectuées en septembre-octobre.

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)**2000-2001 : 78****2001-2002 : 82**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Observé sur tout le département (y compris à l'île d'Yeu).

Quelques données de nidification certaine :

- 1 aire avec 3 jeunes à Noirmoutier-en-l'Île le 08/08/00 (M.Vas) ;
- 1 aire repérée à Beaufou le 26/11/00 (A.Gér) ;
- 1 aire détectée à Aizenay le 15/12/00 (A.Gér) ;
- 1 couple nicheur à Vix en 2001 (C.Gon & P.Rou) ;
- 1 mâle transportant une proie et rejoignant son aire sur l'île d'Yeu, le 07/06/01 (F.Por) ;
- Appel de juvéniles à Treize-Septiers le 24/07/01 (W.Mai) ;
- 1 juv. quasi volant à Saint-Georges-de-Montaigu le 31/07/01 (J-P.Til) ;
- 3 juv. piaillant aux Landes-Génusson en juillet et août 2001 (C.Met & L.Gri) et 2 ou 3 en août 2002 (L.Gri & L.Con) ;
- 2 couples paradant sur l'île d'Yeu le 30/03/02 (A.Gér, J-P.Pai & F.Sig) ;
- 1 couple nicheur à Bourneau le 30/06/02 (D.Bro) ;
- 2 juv. appelant les parents au Poiré-sur-Vie (A.Gér).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)**2000-2001 : 358****2001-2002 : 413**

Nicheuse, hivernante et migratrice partielle, présente toute l'année en Vendée.

Aucune donnée dans le fichier provenant de l'île d'Yeu. Une seule donnée sur l'île de Noirmoutier : 1 ind le 29/03/02 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg (D.Des).

Une observation de 11 oiseaux ensemble sur le marais de Noailles (La Bretonnière) le 07/02/02 (J&P.Ada).

AIGLE ROYAL (*Hieraetus chrysaetos*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Oiseau du sud et de l'est de l'Europe, présent également en Ecosse, Scandinavie, Sibérie. Migrateur exceptionnel en Vendée.

Observation remarquable (homologuée par le CHD) le 28/10/01 au rond point de la Courtaisière à La Roche-sur-Yon (P.Yes & M.Sou).

La précédente donnée date de 1928 où un chasseur avait abattu un oiseau à La Mainborgère (Château-Guibert) (Coll. Payraudeau).

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*)**2000-2001 : 33****2001-2002 : 50**

Migrateur, observé surtout lors de la migration postnuptiale, principalement en bordure de mer. Observation hivernale rare.



Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (photo © Emile Barbelette)

Quelques données à l'intérieur des terres :

- 1 ind. le 21/04/01 à Chantonay (B.Per) ;
- 1 ind. le 09/09/01 à La Ferrière (E.Gas) ;
- 1 ind. le 12/09/01 à Thouarsais-Bouildroux (T.You) ;
- 1 ad. sur les étangs des Boucheries (Les Landes-Génusson) le 12/10/01 (W.Mai) ;
- 1 ind. le 06/04/02 à Foussais-Payré (G.Bes) ;
- 1 ind. le 21/04/01 à Chantonay (B.Per) ;
- 1 ind. le 21/04/02 à Chantonay, soit un an jour pour jour, après celui du 21/04/01 (B.Per) ;
- 1 ind. le 18/08/02 à Saint-Martin-des-Noyers (M.Bib).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		25/10, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Migr. prénuptiale 2001	26/03, Olonne-sur-Mer (M.Bib)	21/04, Chantonay (B.Per)
Migr. postnuptiale 2001	06/07, L'Aiguillon-sur-Mer (F.Sem)*	25/10, L'Ile-d'Olonne (ONCFS)
Migr. prénuptiale 2002	05/04, Olonne-sur-Mer (C.Dup & S.Pou)	21/04, Chantonay (B.Per)
Migr. postnuptiale 2002	04/08, Bouin (D.Pet)	

Observations remarquables de 3 oiseaux ensemble le 02/09/00 à la pointe d'Arçay (La Faute-sur-Mer, M.Bib) et d'un individu le 17/12/01 à L'Ile-d'Olonne (ONCFS).

* La donnée d'un individu le 06/07/01 à L'Aiguillon-sur-Mer (F.Sem) est la plus précoce de la migration postnuptiale connue au fichier.

FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*)

2000-2001 : 363

2001-2002 : 409

Migrateur partiel, présent dans tout le département y compris à l'île d'Yeu et en toute saison.

Reproduction constatée de mars à juin sur tout le département.

Observation remarquable d'environ 15 oiseaux le 20/09/01 à la pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe).

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*)

2000-2001 : 60

2001-2002 : 51

Migrateur et hivernant, présent en Vendée (y compris à l'île d'Yeu) de septembre à avril.

La plupart des observations ont été faites dans les Marais breton et poitevin et dans la plaine, à l'exception des données suivantes :

- 1 ind. le 19/10/00 sur les étangs des Boucheries (Les Landes-Génusson, L.Gri & A.Riv)
- 1 ind. le 03/11/00 à La Boissière-de-Montaigu (L.Gri) ;
- 1 mâle adulte le 15/12/00 au Poiré-sur-Vie (A.Gér) ;
- 1 fem. immature le 02/08/02 à La Mothe-Achard (M.Bib).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	12/09, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)	08/04, Triaize (M.Bib)
Hiver 2001-2002	25/09, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq.Pointe)	07/04, L'Aiguillon-sur-Mer (J.Pie)
Hiver 2002-2003	02/08, La Mothe-Achard (M.Bib)	

L'observation du 02/08/02 à La Mothe-Achard (M.Bib) est la plus précoce reçue jusqu'alors au fichier. Cette donnée a fait l'objet d'une homologation par le CHD.

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*)

2000-2001 : 88

2001-2002 : 69

Nicheur et migrateur.

Présent sur tout le département (y compris à l'île d'Yeu).

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		28/11, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq.Pointe)
Saison 2001	12/04, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)	22/10, 1 juv à La Faute-sur-Mer (Eq. Pointe)
Saison 2002	09/04, La Faute-sur-Mer (J.Pie)	

FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*)

2000-2001 : 29

2001-2002 : 48

Migrateur et hivernant peu commun.

Présent chaque année en petit nombre (y compris sur l'île d'Yeu), principalement dans les Marais breton et poitevin.

Quelques observations en dehors des marais et du littoral :

- 1 imm. sur les étangs des Boucheries (Les Landes-Génusson) le 12/10/00 (A.Riv) ;
- 1 ind. à La Roche-sur-Yon le 28/10/01 (F.Pic) ;
- 2 imm. sur les étangs des Boucheries (Les Landes-Génusson) le 02/12/01 (M.Pen) ;
- 1 mâle à Saint-Hilaire-des-Loges le 02/01/02 (G.Bes) ;
- 1 jeune de la sous-espèce nordique *calidus* (qui niche de l'arctique à l'est du Finnmark) trouvé mort à Aubigny le 29/01/02 (M.Vas).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001		25/04, 1 ind. à La Barre-de-Monts (F.Sig)
Hiver 2001-2002	05/09, 1 ind. à L'Aiguillon-sur-Mer (Eq.Pointe)	17/04, 1 fem. à Bouin (O.Pen)
Hiver 2002-2003	31/07, 1 juv (?) à L'Île-d'Olonne (ONCFS)	

Observation d'un mâle immature le 03/07/01 à l'Armandèche (Les Sables-d'Olonne, M.Bib).

Le jeune trouvé mort à Aubigny, une femelle de la sous-espèce *calidus*, le 29/01/02 (M.Vas) a en fait été trouvé par un agriculteur. Il portait une bague du muséum zoologique d'Helsinki (Finlande) depuis le 21/07/01. Il avait donc été bague 192 jours plus tôt, à Pelkosenniemi (Lappland), et avait parcouru 2567 km.

DES PERDRIX À L'OUTARDE CANEPETIÈRE (Florian PICAUD)

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*)

2000-2001 : 18

2001-2002 : 43

Nicheuse sédentaire, dont les populations sont essentiellement issues de lâchers de repeuplement.

Notée partout dans le département, sauf à l'île d'Yeu.


PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*)

2000-2001 : 12

2001-2002 : 5

Nicheuse sédentaire, dont les populations sont essentiellement issues de lâchers de repeuplement.

Cependant, il subsiste peut-être une souche naturelle sur l'île de Noirmoutier.
Une seule mention de reproduction à Saint-Jean-de-Monts.



Perdrix grise Perdix perdix, mâle et femelle (photo © Matthieu Vaslin)

CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*)

2000-2001 : 15

2001-2002 : 15

Nicheuse et migratrice.

Observée principalement dans le sud-Vendée, quelques mentions dans le bocage. Aucune mention sur l'île d'Yeu.
Aucune donnée de nidification n'est parvenue, vraisemblablement lié à la discrétion et à la régression de l'espèce.

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*)

2000-2001 : 17

2001-2002 : 38

Nicheur sédentaire dont les populations sont essentiellement issues de lâchers de repeuplement.

Noté partout dans le département, y compris à l'île d'Yeu.

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*)

2000-2001 : 29

2001-2002 : 41

Nicheur, migrateur partiel, également signalé en hiver.

Présent dans toutes les zones humides du département, y compris celles des îles (Yeu et Noirmoutier).

Pas de nidification observée. Une grande partie des données parvenues sont des observations postnuptiales (août à novembre) et plus particulièrement sur la lagune de la Belle Henriette qui fait l'objet d'une forte pression d'observation par les ornithologues à cette époque.

Quelques données d'hivernage nous sont parvenues de la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'Île, des étangs des Boucheries aux Landes-Génusson, des marais de la Guerche à l'île d'Yeu, de Beauvoir-sur-Mer et de Bouin, de l'Île de Charrouin à Vix, ainsi que des marais de Jard-sur-Mer et des marais salants de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire. Egalement une donnée sur l'aérodrome de Saint-Georges-de-Montaigne le 25/02/01 (W.Mai).

RÂLE DES GENÊTS (*Crex crex*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale, et à partir du 1^{er} janvier 2006 seulement hors des sites de nidification.

Migrateur, nicheur probable mais rare.

1 ind. observé le 12/10/01 en plein jour sur le bord de la D38 au lieu-dit la Taillée à La Barre-de-Monts (D.Des).

Donnée homologuée par le CHD 85.

MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*)**2000-2001 : 2/2****2001-2002 : 7/5**

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheuse rare, migratrice partielle, observée principalement lors de ses migrations prénuptiale et postnuptiale.

Des données seulement lors des migrations postnuptiales :

- 3 ad. le 19/08/01 sur la station d'épuration de Luçon (M.Bib) ;
- 1 ind. le 29/08/01 dans les marais de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire (F.Sal) ;
- 1 ind. les 01 et 07/09/01 sur la station d'épuration de Luçon (C.Dra) ;
- 2 ind. le 15/09/01 sur la lagune de la Belle Henriette à La Faute-sur-Mer (M.Bib *et al.*) ;
- 1 ind. les 25 et 27/09/01 sur la lagune de la Belle Henriette à La Faute-sur-Mer (S.Vri & A.Tho, G.Bou *et al.*) ;
- 1 ind. le 03/08/02 sur la station de lagunage de Luçon (M.Bib) ;
- 1 ind. le 22/08/02 sur le Marais Montportreau aux Sables-d'Olonne (M.Bib, A.Bar).

MARQUETTE POUSSIN (*Porzana parva*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 1/1**Espèce soumise à homologation nationale jusqu'au 1^{er} janvier, et à homologation départementale au-delà de cette date.

Migrateur rare, observé surtout en migration prénuptiale.

1 mâle adulte observé le 2/12/01 à Barbâtre (A.Dar).

Donnée homologuée par le CHN (*Ornithos* 10-2)**MARQUETTE DE BAILLON (*Porzana pusilla*)****2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 4/1**

Espèce soumise à homologation nationale.

Migrateur assez peu commun en Vendée, elle est observée quasi-exclusivement lors de sa migration postnuptiale.

2 ind. observés du 31/08/01 (J.Gon.) au 9/09/01 (G.Jar) sur la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer. Données homologuées par le CHN (*Ornithos* 10-2).**GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*)****2000-2001 : 170****2001-2002 : 234**

Sédentaire.

Présente toute l'année sur l'ensemble des mares, étangs, lacs et marais du département, y compris à l'île d'Yeu.

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*)**2000-2001 : 186****2001-2002 : 244**

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Présente partout dans le département, de préférence sur les étendues d'eau douce (sauf à l'île d'Yeu).

Effectif total en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 1 567 ;
- janvier 2002 : 2 407.

Importants rassemblements postnuptiaux et hivernaux :

- le 14/07/01, 1 800 individus sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri) ;
- le 19/07/01, 1 030 individus sur la station d'épuration de Barbâtre (LPO Noi) ;
- le 11/01/02, 1 420 individus dans les marais de L'île-d'Olonne (O.Gir) ;
- le 26/07/02, 1 030 individus sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (L.Gri).

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*)**2000-2001 : 54****2001-2002 : 40**

Migratrice, et hivernante régulière en baie de l'Aiguillon.

Ailleurs, observée essentiellement lors de la migration postnuptiale.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	08/10, Puyravault (T.Dod & A.Fra)	04/03, communal de Mouzeuil-St-Martin (C.Dra)
Hiver 2001-2002	27/10, pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe)	20/03, Champagné-les-Marais (M.Chv)

Quelques observations hors du Marais poitevin et de la baie de l'Aiguillon :

- 1 ind. le 15/12/00, décharge de Basse Barbonte, La Roche-sur-Yon (T.You) ;
- 15 ind. le 22/12/00, la Godinière, Beaulieu-sous-la-Roche (CPN Linotte) ;
- 3 ind. le 6/01/01, Sallertaine (A.Bou).

Pour l'hiver 2000-2001, de nombreuses observations de grues en migration active ont été faites, surtout sur l'ouest du département.

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : seulement 24 ind. ;
- janvier 2002 : 85 ind.

OUTARDE CANEPETIÈRE (*Tetrax tetrax*)

2000-2001 : 9/3

2001-2002 : 16/6

Espèce soumise à homologation départementale à partir du 1^{er} janvier 2006 (hors des sites de nidification seulement).

Nicheuse très raréfiée, migratrice.

Pas de nidification prouvée durant la période.

En 2001, 5 mâles dont 1 chanteur et 1 femelle recensés.

En 2002, 6 mâles dont 2 chanteurs et 4 femelles recensés.

1 rassemblement postnuptial a été observé le 14/09/00 sur le communal du Poiré-sur-Velluire avec au moins 3 individus (C.Gon). A noter que ce site comptabilisait 85 individus en 1989.

DE L'HUÎTRIER PIE AUX BÉCASSEAUX (Alain THOMAS)

HUÎTRIER PIE (*Haematopus ostralegus*)

2000-2001 : 90

2001-2002 : 113

Hivernant et migrateur, mais visible toute l'année. Une donnée de nidification en provenance de l'île du Pilier : 1 nid garni d'un œuf le 31/05/02 (LPO).

Présent sur tout le littoral, y compris à l'île d'Yeu mais l'essentiel des huîtres se concentre en baie de Bourgneuf et de façon secondaire dans le complexe pointe d'Arçay / baie de l'Aiguillon.

Effectif maximal observé pour ces deux années : 2 167 ind. le 25/11/00 lors du comptage mensuel baie de Bourgneuf et île de Noirmoutier (LPO).

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : total Vendée 1 954 ind. dont 1 534 en baie de Bourgneuf et 420 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay.
- janvier 2002 : total Vendée 2 337 ind. dont 1 825 en baie de Bourgneuf et 512 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay.

ÉCHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*)

2000-2001 : 90

2001-2002 : 140

Nicheuse et migratrice.

Niche dans les marais côtiers de Bouin à L'Aiguillon-sur-Mer et arrière littoraux en Marais breton et Marais poitevin.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000	-	1 ind. le 08/11, marais de L'Île-d'Olonne (ONCFS)
Saison 2001	3 ind. le 14/03, terrains LPO de Beauvoir-sur-Mer (C.Ler)	1 ind. le 03/10, marais de L'Île-d'Olonne (ONCFS)
Saison 2002	1 mâle le 14/03, la Petite Maladrerie, Beauvoir-sur-Mer (M.Cos)	

Premières données de nidification parvenues au fichier :

- en 2001, 2 poussins le 14/06, les Terres, Beauvoir-sur-Mer (P.Dul).
- en 2002, 1 couveur le 17/04, les Chêtres, Saint-Urbain (F.Sig).

AVOCETTE ÉLÉGANTE (*Recurvirostra avosetta*)

2000-2001 : 170

2001-2002 : 246

Nicheuse, hivernante, migratrice.

Présente dans les marais côtiers, de Bouin à L'Aiguillon-sur-Mer. Effectif record sur la période de 5 944 individus en baie de l'Aiguillon le 14/01/02 (ONCFS).

Nicheuse dans le Marais breton, à Noirmoutier, dans les marais de la Vie, dans les marais d'Olonne et de la Guittière. Dans le Marais poitevin, elle ne se reproduit que sur la rive charentaise maritime de la Sèvre Niortaise, à Landelène.

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : total en Vendée 4 658 ind. dont 1 900 en baie de Bourgneuf (LPO) et 2 400 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay (ONCFS)
- janvier 2002 : total en Vendée 8 555 ind. dont 2 514 en baie de Bourgneuf (LPO) et 5 944 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay (ONCFS).

Premiers indices de nidification :

- en 2001, 1 couveur le 06/04 sur la lagune de Bouin (F.Sig).
- en 2002, construction d'un nid le 22/03 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg (D.Des), 1 couveur le 12/04 à la Petite Maladrie, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig) et 4 couples avec poussins le 25/05, aux Menotones, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig). Poussins d'environ 20 jours le 29/05/02, au Marais Moine à La-Barre-de-Monts (F.Sig).

Quelques effectifs importants : 1 161 ind. en reposoir sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg lors du comptage mensuel du 12/12/01 (LPO) et 1 657 le 31/01/02 sur le même site (D.Des).

Excepté lors des comptage Wetlands, peu de données proviennent de la baie de l'Aiguillon qui reste pourtant un des sites majeurs d'hivernage pour l'espèce en France.

ŒDICNÈME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*)

2000-2001 : 33

2001-2002 : 47

Nicheur, migrateur, hivernant rare.

Présent essentiellement dans la plaine du sud-Vendée et le Haut-Bocage (parfois dans les dunes), aucune donnée relative à la nidification ou aux rassemblements postnuptiaux n'est parvenue au fichier !!

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000	-	1 ind. le 18/12, France, Mouzeuil-St-Martin (J-C.Lue)
Saison 2001	Présence notée le 21/03, étang de Beausoleil, La Bruffière (CPN Lolayo)	2 à 3 entendus le 14/08, La Verrie (J.Gon)
Saison 2002	2 + chanteur le 27/02, Ranfray, Nalliers (D.Val)	-

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)

2000-2001 : 27

2001-2002 : 39

Nicheur peu commun, migrateur.

Noté en migration sur tous les marais littoraux et sur de nombreux plans d'eau intérieurs.

Les données de nidification certaines proviennent pour ces deux années de la plage de la Gachère (Brétignolles-sur-Mer), des marais de la Vie (Saint-Hilaire-de-Riez) et la nidification est probable dans les marais des Loirs (Olonne-sur-Mer), sur les marais Sablais (Les Sables-d'Olonne), à l'étang de la Cailletière (La Bruffière) et au Plessis Robineau (La Tardière).

Données de reproduction certaine :

- 1 couple avec 2 très jeunes poussins, plage de la Gachère le 22/05/01, probablement les mêmes les 20/05 et 01/06, puis 1 couple et 1 gros poussin non volant sur le même site le 08/06 (D.Des).
- 2 couples marais de la Vie le 03/06/01 (G.Bes).
- 3 couples nicheurs dans les marais de la Vie le 20/05/02 (G. Bes).
- 1 couple alerte très vivement le 08/06/02, plage de La Gachère (D.Des).

Très peu de données de reproduction arrivées au fichier et notamment aucune en provenance du Marais poitevin où le Petit Gravelot niche pourtant sur les berges des plans d'eau de chasse, les lagunages et sur divers bassins de décantation.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000	-	4 ind. le 21/09, Réserve Naturelle, St-Denis-du-Payré ; et 1 ind. le même jour, La Prée, St-Denis-du-Payré (J.Gon)
Saison 2001	1 ind. le 12/03, Marais Cadrit, Les Sables-d'Olonne (D.Des)	1 ind. le 17/10, marais de L'Ile-d'Olonne (ONCFS)
Saison 2000	1 ind. le 06/03, marais salants de la Guittière, Talmont-St-Hilaire (F.Sal)	-

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*)**2000-2001 : 181****2001-2002 : 254**

Hivernant, migrateur, quelques estivants.

Présent sur tout le littoral. Les seules données non littorales proviennent de Bois-de-Céné, Luçon, Maché et de Saint-Denis-du-Payré.

Les effectifs maxima du fichier pour les deux années sont de 1 347 ind. le 12/09/00 lors du comptage mensuel baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO) et de 1 338 le 21/05/01, toujours pendant le comptage mensuel baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO).

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 913 ind. dont 446 en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO) ;
- janvier 2002 : 666 ind. dont 322 en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO).

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*)**200-2001 : 46****2001-2002 : 104**

Nicheur, migrateur, hivernant rare.

Présent sur tout le littoral. Semble absent de l'île d'Yeu.

Deux données hivernales :

- 1 ad. à la pointe de l'Aiguillon le 08/01/01 (W.Mai)
- 1 ad. sur la base de voile de L'Aiguillon-sur-Mer le 25/12/01 (W.Mai)

Le groupe de 13 ind. noté le 22/02/01 aux Onchères (Barbâtre) est peut-être constitué de migrants (LPO).

Les données de reproduction proviennent de Noirmoutier (le Luzan, pointe de La Fosse, marais salants), du littoral du Marais breton (la Grande Côte, la Bergère, la Louippe, polder du Dain), de la plage du Jaunay et de la Gachère (Brétignolles-sur-Mer), du littoral des Sables-d'Olonne (les Granges, plage de l'Aubraie).

	Premier cantonnement	Première et dernière ponte	Premier et dernier poussin
Saison 2001	1 couple le 19/03, les Granges, Olonne-sur-Mer (D.Des)	3 œufs le 12/05, la Grande Côte, La Barre-de-Monts (C.Gir). Nids le 06/06, plage de l'Aubraie, Les Sables-d'Olonne (D.Des)	1 couple et 3 poussins le 12/05, la Grande Côte, La Barre-de-Monts (C.Gir). 2 poussins le 26/07, plage de l'Aubraie, La Barre-de-Monts (D.Des)
Saison 2002	Parades le 31/03, la Grande Côte, La Barre-de-Monts (B.Isa)	2 nids le 23/04, pointe de la Fosse, Barbâtre (M.Vas). 1 mâle couve le 17/07, marais de Bonne Pogne, Noirmoutier-en-l'Île (D. Des)	1 poussin le 12/06, pointe de la Fosse, Barbâtre (LPO). 1 jeune volant le 26/06, même endroit (D.Des). 2 poussins le 04/08, plage de l'Aubraie, Les Sables-d'Olonne (D.Des)

Maximum de 121 ind. observés le 07/09/00 à la pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe).

PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*)**2000-2001 : 5/1****2001-2002 : 6/4**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur rare (noté surtout lors de la migration postnuptiale). Niche essentiellement en Europe du nord, hiverne en Espagne et en Afrique du nord.

Observé dans la plaine, sur les dunes, à l'île d'Yeu (souvent sur l'aérodrome), dans les marais le Pluvier guignard affectionne les vastes ensembles de prairies naturelles sèches et rases en août - septembre.

- 1 adulte en plumage hivernal près de l'aérodrome de l'Île d'Yeu du 2 au 7/09/00 (X. & M-P.Hin) ;
- 1 ind. dans la dune de la Paracou (Les Sables-d'Olonne) le 18/09/01 (M.Bib) ;
- 2 ad. sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré du 22 au 25/09/01 (J.Gon, A.Tho, S.Vri *et al.*).

PLUVIER FAUVE (*Pluvialis fulva*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation nationale.

Espèce orientale particulièrement rare dans notre pays. L'adulte observé à la pointe d'Arçay le 18/09/00 (M.Gai & N.Jea) fait partie des cinq données homologuées en France cette année-là, ce qui constitue un record (*Ornithos* 10-2).

PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)

2000-2001 : 77

2001-2002 : 72

Hivernant et migrateur, les observations pour ces deux années vont de la mi-août à la fin mars.

Observé dans tout le département, même sur l'île d'Yeu et Noirmoutier. Des groupes de plus de 500 ind. ont été observés sur six localités du département, toutes situées dans le Marais poitevin, ce qui semble bien refléter la répartition départementale de cette espèce : marais communal du Poiré-sur-Velluire, prairies de La Tranche-sur-Mer, marais de Chasnaïs / Triaize / Saint-Denis-du-Payré, marais communal de Mouzeuil-Saint-Martin, Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, Réserve Naturelle de la Baie de l'Aiguillon.

La très large répartition de l'espèce et la mobilité des groupes rendent difficile l'évaluation de la population hivernante de notre département.

Pour les autres régions naturelles, les groupes les plus importants sont : en Marais breton 430 ind. au Collet le 07/01/01 (C.Gir), en marais d'Olonne 50 ind. au Loir Hermouet le 27/02/01 (D.Des) et dans le bocage 135 ind. sur les étangs des Boucheries (Les Landes-Génusson) le 20/12/01 (S.Mer).

Les groupes les plus importants sont :

- 10 350 le 07/02/01 dans les marais de La Tranche-sur-Mer / Angles (ONCFS) ;
- 3 000 le 07/02/01 dans les marais de Triaize / Chasnaïs / Saint-Denis-du-Payré (ONCFS) ;
- 1 770 le 14/01/02 sur la Réserve Naturelle de la Baie de l'Aiguillon (ONCFS).

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 6 164 ind. ;
- janvier 2002 : 3 942 dont 1 770 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay (ONCFS).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	2 ind. le 07/09, le Gois, Barbâtre (M.Vas)	plus de 40 ind. le 20/03, communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon)
Hiver 2001-2002	1 ind. le 17/08, le Collet, Bouin (LPO)	6 ind. le 27/03, communal de Nalliers (C.Gon)

PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*)

2000-2001 : 107

2001-2002 : 175

Hivernant et migrateur abondant du littoral, estivant régulier.

Observé sur le littoral, y compris sur l'île d'Yeu et dans les terres mais plus occasionnellement.



Pluvier argenté Pluvialis squatarola (photo © Matthieu Vaslin).

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 5 118 ind. dont 2 555 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay (ONCFS) et 2 542 en baie de Bourgneuf (LPO) ;
- janvier 2002 : 5 635 ind. dont 3 910 en baie de Bourgneuf (LPO) et 1 611 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay (ONCFS).

Maximum de 5 884 ind. le 22/12/00 en baie de Bourgneuf (LPO).

Plusieurs dizaines sont notées en mai et juin 2001 et 2002 en baie de Bourgneuf, maximum de 372 le 12 juin 2002 (LPO).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*)

2000-2001 : 278

2001-2002 : 344

Nicheur, hivernant, migrateur partiel (une partie de la population est sédentaire).

Le Vanneau huppé est visible dans tout le département, très souvent en bandes comptant plusieurs centaines ou milliers d'oiseaux.

Des données de plus de 5 000 ind. nous proviennent de trois sites :

- 6 550 sur le marais communal du Poiré-sur-Velluire le 27/12/00 (C.Gon)
- 25 500 ind. dans les marais d'Angles / Longeville / La Tranche-sur-Mer le 07/02/01 (ONCFS)
- plus de 10 000 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré le 01/12/01 (J.Gon)

Quelques rassemblements importants :

- dans le bocage : 2 000 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson le 30/11/01 (L.Gri & S.Mér), 700 sur l'étang des Rochettes à Rocheservière le 03/12/01 (L.Gri), 3 000 sur les étangs des Boucheries le 13/01/02 (L.Gri, H.Szw, M-O.Bou).
- dans le Marais breton et sur la côte : 3 000 à la Charraud Berbe à Sallertaine le 16/01/01 (P.Ret), 950 dans le marais de L'Ile-d'Olonne le 11/01/02 (O.Gir).

Effectif dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : total Vendée 32 799 ind. dont 12 532 en Marais breton (LPO) ;
- janvier 2002 : total Vendée 21 927 ind. dont 5 330 en Marais breton (LPO).

Reproduction constatée dans les Marais breton et poitevin ainsi que dans les petits marais littoraux (Olonne, Guittière, marais de La Vie) et sur l'île d'Yeu.

Les premiers comportements reproducteurs sont notés en janvier mais deviennent fréquents en février.

Premiers œufs :

- 2 couveurs le 20/03/01, les Grands Coteaux, L'Ile-d'Olonne (D. Des) et 6 couveurs le même jour sur le marais communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gon), 2 couveurs le 22/03/02 sur le marais communal de Nalliers (C. Gon)

Premiers poussins :

- 4 poussins le 16/04/01, les Terres, Beauvoir-sur-Mer (P.Dul & F.Sig) et 1 poussin le 08/05/02 sur l'aérodrome de l'île d'Yeu (X & M-P.Hin).

BÉCASSEAU MAUBÈCHE (*Calidris canutus*)

2000-2001 : 80

2001-2002 : 89

Hivernant, migrateur et estivant régulier.

Présent sur le littoral (y compris à l'île d'Yeu).

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 6 952 dont 6 450 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay ;
- janvier 2002 : 5 110 dont 4 100 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay (ONCFS) et 1 010 en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO).

Toutes les données du fichier proviennent du littoral à l'exception d'un oiseau présent sur la base de loisirs des "Guifettes" à Luçon le 12/05/02 (C.Dra). En dehors des complexes baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay, une seule donnée dépasse les 5 ind. avec 96 oiseaux le 30/08/01 dans les marais de la Vie (G.Bes).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001		12 ind. le 23/05, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes) Estivant en baie de Bourgneuf, notamment 71 oiseaux le 06/06, le Collet, Bouin (C.Ler)
Hiver 2001-2002	174 ind. le 08/07, pointe de l'Aiguillon (W.Mai)	1 ind. le 16/05, Réserve Naturelle de la Baie de L'Aiguillon (P.Gra) Estivant en baie de Bourgneuf, notamment 125 oiseaux le 12/06, la Noue Fromagette, Beauvoir-sur-Mer (LPO)
Hiver 2002-2003	1 ind. le 29/08, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	

BÉCASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*)

2000-2001 : 77
2001-2002 : 103

Hivernant et migrateur.

Présent sur le littoral (y compris à l'île d'Yeu). Aucune donnée de commune non littorales.

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 326 ind. ;
- janvier 2002 : 1 349 ind. dont 299 ind. baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO).

Effectifs maxima : 1 691 le 13/03/02 en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO), plus de 500 le 01/12/01 sur la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes) et 650 le 14/01/02 sur la plage des Marines à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

BÉCASSEAU D'ALASKA (*Calidris mauri*)

2000-2001 : 5/1
2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation nationale.

Originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord, migrateur très occasionnel.

Un oiseau en plumage de premier été, le 19/04/01, à Barbâtre (O.Pen). Donnée homologuée par le CHN (*Ornithos* 10-2). Il s'agit de la troisième donnée vendéenne et de la quatrième donnée française.

BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*)

2000-2001 : 31
2001-2002 : 65

Migrateur, rare en hiver.

Observé principalement dans les marais et le littoral (parfois sur les étangs du bocage).

En hiver :

- 1 le 31/12/00 et le 09/01/01 sur le marais communal du Poiré-sur-Velluire (C. & J.Gon)
- 2 puis 3 les 18 et 22/02/01 aux Loirs Bauduère à Olonne-sur-Mer (D.Des)
- jusqu'à 5 ensemble dans le Marais breton et sur l'île de Noirmoutier en décembre 2001 et janvier 2002 (LPO)
- 25 le 24/11/01 et 9 le 01/01/02 à la base de loisirs "les Guifettes" à Luçon (C.Dra)

Hors marais, les seules observations dans l'intérieur des terres nous viennent du lac de Maché-Apremont avec 12 ind. le 03/09/00 (T.You), 4 ind. le 24/09/01 (A.Ger) et 10 ind. le 29/09/01 (S.Vri).

Les groupes les plus importants sont :

- 40 à 50 ind. les 23 et 25 /09/01 à la base de loisirs "Les Guifettes" de Luçon (Eq. Pointe, C.Dra)
- 25 ind. le 24/11/01 à la base de loisirs "Les Guifettes" de Luçon (C.Dra)
- 20 ind. le 09/05/02 à la base de loisirs "Les Guifettes" de Luçon (C.Dra)

BÉCASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*)

2000-2001 : 10/8
2001-2002 : 11/4

Espèce soumise à homologation départementale.

Rare mais régulier en période de migration postnuptiale (plus rarement prénuptiale), surtout dans les marais côtiers.

Niche dans le nord de l'Europe et hiverne sur le pourtour méditerranéen, en Italie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

La plus grande partie des données provient du Marais poitevin et en particulier de la base de loisirs "les Guifettes" à Luçon (ancien communal) et de la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré. Le Bécasseau de Temminck y trouve un milieu prairial et des petites zones d'eau douce peu profondes qu'il affectionne.

Toutes les données de groupes sont issues du Marais poitevin. A souligner les effectifs remarquables observés sur la base de loisirs "les Guifettes" avec 3 juv. le 30/08/01 (J.Gon), 12 ind. le 07/05/02 (F. Sal) et 13 ind. le 12/05/02 (C. Dra).

L'observation du 27 avril constitue l'observation la plus précoce du fichier.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000	-	1 le 20/09, lac de Maché-Apremont (G.Bes)
Migr. prénuptiale 2001	2 ind. le 29/04, base de loisirs, Luçon (M.Bib)	Pas d'autre donnée homologuée pour la saison
Migr. postnuptiale 2001	3 juv. le 30/08, base de loisirs, Luçon (J.Gon)	1 ind. le 27/09, marais de L'Ile-d'Olonne (M.Bib)
Migr. prénuptiale 2002	1 ind. le 27/04, base de loisirs, Luçon (F.Sal)	13 ind. le 12/05, base de loisirs, Luçon (C.Dra)

BÉCASSEAU DE BONAPARTE (*Calidris fuscicollis*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation nationale.

Oiseau originaire d'Amérique du Nord, de passage occasionnel en Europe.

Pas de donnée homologuée pour la période...

BÉCASSEAU TACHETÉ (*Calidris melanotos*)

2000-2001 : 4/3

2001-2002 : 10/4

Espèce soumise à homologation nationale jusqu'au 1^{er} janvier 2006, et à homologation départementale au-delà de cette date.

Oiseau originaire d'Amérique du Nord et de l'extrême Est sibérien, de passage occasionnel.

Six oiseaux observés et homologués, tous au passage postnuptial.

- 1 ind. le 31/10/00, les Loirs, Olonne-sur-Mer (J.Grn, *Ornithos* 9-1) ;
- 1 ad. du 29 au 31/08/01, Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (P.Tro, A.Tho, *Ornithos* 10-2) ;
- 1 juv. du 6 au 12/09/01, la Petite Maladrerie, Beauvoir-sur-Mer (M.Vas, J-Y.Fre, F.Sig, J-G.Rob, *Ornithos* 10-2) ;
- 1 ad. du 20/07 au 01/08/02, lagune de la Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer (P.Tro, A.Tho *et al.*, *Ornithos* 11-2) ;
- 1 ad. le 19/08/02, Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (L.God, P.Tro, *Ornithos* 11-2).

BÉCASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*)

2000-2001 : 34

2001-2002 : 59

Migrateur, exceptionnel en hiver.

Observé à chaque passage sur le littoral, dans les marais et parfois sur les retenues du bocage, notamment le lac de Maché-Apremont

1 ind. sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg du 28/01/02 au 14/03/02 (D.Des, M.Vas, La Gorgebleue n°19-20-juin 2004).

Les maxima :

- plus de 25 ind. le 05/09/00, lagune de la Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer (J.Gon)
- 25 ind. le 15/09/01, plage de la Tresson, La Guérinière (LPO)
- 11 ind. le 26/09/01, marais de L'Ile-d'Olonne (S.Vri)
- 10 ind. le 22/08/02, lagune de la Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer (C.Dra)
- 10 ind. le 25/08/02, marais salants de la Guittière, Talmont-Saint-Hilaire (A.Ger)

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000	-	4 ind. le 12/10, polder de Sébastopol, Barbâtre (LPO)
Migr. pré-nuptiale 2001	1 ind. le 12/04, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île (LPO)	1 ind. le 27/05, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Migr. postnuptiale 2001	1 ind., le 19/07, la Noue Fromagette, Beauvoir-sur-Mer (LPO)	1 ind. le 29/11, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île (D.Des)*
Migr. pré-nuptiale 2002	2 ind. le 18/04, lagune de Bouin (O.Pen)	2 ind. le 15/05, le Gois, Barbâtre (LPO)
Migr. postnuptiale 2002	1 ind. le 28/07, lagune de la Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer (L.Bom)	-

* donnée homologuée par le CHD85.

BÉCASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*)

2000-2001 : 31

2001-2002 : 51

Hivernant, migrateur.

Inféodé au littoral rocheux et aux ports et jetées. Les zones principales d'hivernage sont le littoral des Sables-d'Olonne, la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez et l'île d'Yeu.

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 154 ind. ;

- janvier 2002 : 137 ind.

Quelques maxima :

- 94 ind. le 28/01/01, corniche de Sion-sur-l'Océan, Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

- 120 à 140 ind. le 25/02/01, baie des Sables-d'Olonne (D.Des)

- 85 ind. le 29/04/01, corniche de Sion-sur-l'Océan, Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

- 80 ind. le 02/01/02, corniche de Sion-sur-l'Océan, Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

- 91 ind. le 27/02/02, port des Sables-d'Olonne (D.Des)

- 75 ind. le 30/04/02 corniche de Sion-sur-l'Océan, Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	1 ind. le 12/10, pointe de l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île (F.Sig)	85 ind. le 29/04, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Hiver 2001-2002	3 ind. le 20/10, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)	20 ind. le 05/05, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Hiver 2002-2003	2 ind. le 21/08, pointe du Devin, L'Epine (LPO)	-

BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)

2000-2001 : 238

2001-2002 : 290

Hivernant et migrateur, quelques oiseaux estivent.

Commun sur le littoral et les marais côtiers, régulier sur l'île d'Yeu mais en tous petits effectifs. Observé aussi dans les prairies naturelles humides des Marais breton et poitevin, ainsi qu'en divers points du bocage : 25 ind. sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson le 08/12/00 (L.Gri), 9 ind. sur la queue du lac de Maché-Apremont le 12/01/01 (F.Por), 445 ind. sur le marais communal de Mouzeuil-Saint-Martin le 16/02/01 (C.Gon)...

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 30 598 ind. dont 15 150 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay et 13 463 ind. en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO) ;

- janvier 2002 : 46 999 ind. dont 22 078 en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO), 21 840 en baie de l'Aiguillon (ONCFS) et 1 200 dans les marais d'Olonne (O.Gir).

BÉCASSEAU FALCINELLE (*Limicola falcinellus*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation nationale.

Migrateur occasionnel en Vendée, niche en Scandinavie et hiverne en Afrique de l'Est.

Une observation homologuée (*Ornithos* 9-1) d'un adulte, le 10/05/01, en baie de l'Aiguillon, sur les vasières de Saint-Michel-en-l'Herm (O.Gir).

BÉCASSEAU ROUSSET (*Tryngites subruficollis*)**2000-2001 : 4/1****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation nationale.

Limicole d'Amérique du Nord, migrateur occasionnel en France.

Une donnée homologuée par le CHN (*Ornithos* 10-2) d'un oiseau présent du 06 au 20/09/00, sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.Gon., A.Tho, P.Tro, S.Vri).**DU COMBATTANT VARIÉ AUX PHALAROPES (Emmanuel JOYEUX)****COMBATTANT VARIÉ (*Philomachus pugnax*)****2000-2001 : 55****2001-2002 : 82**

Migrateur, hivernant rare.

Cet oiseau est signalé principalement dans les zones de marais et sur les côtes. Il existe quelques données sur les plans d'eau intérieurs (lac de Maché-Apremont).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		26/10, marais de L'Ile-d'Olonne (ONCFS)
Migr. prénuptiale 2001	Données hivernales	21/05, 5 mâles, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez(G.Bes)
Migr. postnuptiale 2001	04/07, 2 ind., Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (J.Gon)	Données hivernales
Migr. prénuptiale 2002	Données hivernales	15/05, 3 ind. station d'épuration de Noirmoutier (LPO)
Migr. postnuptiale 2002	07/07, 2 ind., lagune de Bouin (M.Cos & F.Pic)	

Au cours des hivers 2000-2001 et 2001-2002, plusieurs données sont signalées sur le lac de Maché-Apremont (8 ind. le 16/01/01, A.Ger), dans le marais de Sallertaine (1 ind. le 16/01/01, P.Ret), sur le communal de Mouzeuil-Saint-Martin (3 ind. le 19/01/01, C.Gon), sur le communal de Nalliers (4 ind. le 19/01/01, C.Gon), sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (2 ind. les 27 et 28/12/02, W.Mai, L.Gri & S.Mer), sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (1 ind. le 14/01/02, ADEV), dans le marais de Beauvoir-sur-Mer (7 ind. le 29/01/02, F.Sig).

Aucun indice de nidification n'a été détecté au cours de la période considérée.

BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocryptes minimus*)**2000-2001 : 20****2001-2002 : 21**

Migratrice, hivernante.

Pour la période cette espèce a été principalement signalée sur la côte (Noirmoutier, Marais breton, pays des Olonnes, Jard-sur-Mer, Marais poitevin). Quelques données proviennent de l'intérieur des terres (3 données en 2000-2001 et 2 données dans la période suivante) : Saint-Mesmin (S.Bar), étang des Boucheries aux Landes-Génusson (A.Riv), zone humide de l'aérodrome de Saint-Georges-de-Montaigu (W.Mai, J-P.Til), La Chapelle-aux-Lys (C.Dra).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	15/11, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Ile (M.Vas)	15/04, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Hiver 2001-2002	5/11, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Ile (D.Des)	25/03, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Ile (D.Des)

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*)**2000-2001 : 150****2001-2002 : 167**

Nicheuse rare, migratrice et hivernante.

Cette espèce est signalée sur toutes les zones humides du département. Elle est également notée sur l'île d'Yeu.

En période de reproduction, elle est notée uniquement dans le Marais breton (plusieurs données de couples alarmant et en parade à Beauvoir-sur-Mer en 2001 et 2002, F.Sig & P.Dul).

En période migratoire, des effectifs d'environ 200 ind. ont été notés le 28/11/00 dans les marais d'Olonne (ONCFS). Des effectifs de plus de 30 ind. sont régulièrement notés sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré ou bien dans les marais de la Vie.

BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)

2000-2001 : 3/3

2001-2002 : 8/8

Nicheuse ?, migratrice et hivernante.

Cette espèce est notée dans les principales forêts du département.

Au cours de la saison 2000-2001, les observations ont été réalisées à Chaillé-sous-les-Ormeaux, en forêt d'Aizenay et au lac de l'Angle Guignard (limite Chantonnay – La Réorthe), entre le 01/12 et le 21/01.

Au cours de la saison 2001-2002, les observations ont été faites entre le 02/11 et le 18/02, dans les forêts côtières (pointe d'Arçay, dune du Jaunay à Brétignolles, forêt d'Olonne), sur la Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg à Noirmoutier et sur quelques points de l'intérieur du département : Rocheservière, Les Landes-Génusson, Saint-Georges-de-Montaigu et Saint-Mars-la-Réorthe

Notons, néanmoins, le faible nombre d'observations de cette espèce. Sa présence est donc certainement sous-estimée. Au regard des données recueillies, aucun indice de nidification n'a été trouvé.

BARGE À QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)

2000-2001 : 131

2001-2002 : 199

Nicheuse, migratrice et hivernante

La Barge à queue noire niche dans les prairies humides des Marais breton et poitevin. En 2000-2001, les principaux sites de nidification sont :

- dans le Marais poitevin, les grands marais de Triaize, le plan d'eau de Luçon, la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré et le communal du Poiré-sur-Velluire ;
- dans le Marais breton, le marais de La Barre-de-Monts et Beauvoir-sur-Mer (terrains LPO notamment).

Les premiers cantonnements sont observés dès le 25/03 en 2001 (F.Sig) et dès le 01/04 en 2002 (M.Cos & B.Isa), à Beauvoir-sur-Mer.

En hivernage, le secteur privilégié reste la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon, avec 7 900 individus comptabilisés le 14/01/02 (ONCFS).

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 6 717 ind. dont 6 706 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay ;
- janvier 2002 : 7 994 ind. dont 7 950 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay.

En période de migration prénuptiale, des groupes dépassant les 15 000 individus sont notés sur le communal de Lairoux les 02 et 03/03/02 (J-P.Gue). Mais des groupes supérieurs à 50 individus sont régulièrement observés dans les marais de la Vie et dans le Marais breton. En période de migration postnuptiale, les premiers groupes importants d'oiseaux sont observés dès le mois de juillet sur l'estuaire du Lay, la lagune de la Belle-Henriette, la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré et en baie de Bourgneuf.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*)

2000-2001 : 84

2001-2002 : 149

Migratrice et hivernante.

Cette espèce fréquente principalement la zone côtière et notamment les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon.

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 2 121 ind. dont 1 830 ind. en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et 289 en baie de l'Aiguillon ;
- janvier 2002 : 1 777 ind. dont 1 025 en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et 752 en baie de l'Aiguillon.

En période de migration prénuptiale, des groupes de 550 individus ont été observés le 13/03/02 sur la lagune de Bouin alors qu'en période de migration postnuptiale, des groupes de 420 ind. ont été comptés dès le 12/06/02 en baie de Bourgneuf (LPO).

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*)

2000-2001 : 95

2001-2002 : 104

Migrateur, estivant, hivernant très rare.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		16/09, marais de L'Ile-d'Olonne (ONCFS)
Migr. prénuptiale 2001	23/03, 5 ind., lagune de Bouin (LPO)	Données estivales
Migr. postnuptiale 2001	Données estivales	03/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)
Migr. prénuptiale 2002	26/03 marais de L'Ile-d'Olonne (ONCFS)	12/06, baie de Bourgneuf (LPO)
Migr. postnuptiale 2002	08/07, Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon (P.Gra)	

Les principales observations ont lieu d'avril à mai dans les secteur Marais poitevin / baie de l'Aiguillon, Marais breton / baie de Bourgneuf et dans les marais d'Olonne. Des observations sont faites sur tout le littoral vendéen lors de la migration postnuptiale de juillet à novembre.

L'effectif maximal recensé est de 426 ind. pour la période, le 21/04/02 à L'Aiguillon-sur-Vie (G.Bes). Il faut rappeler que la Vendée est une des principales zones de stationnement de courlis corlieux en Europe. Il est donc probable que les effectifs maxima recensés ici soient bien en deçà des effectifs se regroupant en dortoir lors de la migration prénuptiale, notamment autour de L'Ile-d'Olonne.



Courlis corlieux Numenius phaeopus (photo © Matthieu Vaslin)

COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)

2000-2001 : 114

2001-2002 : 168

Migrateur et hivernant.

En hiver, les courlis sont localisés principalement en baie de l'Aiguillon et en baie de Bourgneuf. Les autres sites fréquentés par cette espèce sont les communaux du Marais poitevin et les prairies humides du Marais breton.

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 1 695 ind. dont 776 ind. en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et 762 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay ;
- janvier 2002 : 1 609 ind. dont 985 en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et 465 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay.

Lors de la saison 2000-2001, l'effectif le plus important est comptabilisé en baie de Bourgneuf, avec 1 030 ind. le 12/09/00 (LPO). Lors de la saison 2001-2002, l'effectif le plus important est de 1 004 ind. le 14/10/01, également en baie de Bourgneuf (LPO).

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)**2000-2001 : 48****2001-2002 : 59**

Migrateur et hivernant rare.

L'essentiel des stationnements a été observé sur les zones humides littorales (marais d'Olonne, baie de l'Aiguillon, marais de la Vie, lagune de Bouin...) ou rétro-littorales (Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré). Mais cette espèce a également été vue sur des zones humides plus intérieures comme le lac de Maché-Apremont par exemple. La majorité des observations est faite entre avril et juin. Des données isolées d'individus observées au mois de janvier existent notamment sur les marais de la Vie et sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		Données hivernales
Migr. prénuptiale 2001	Données hivernales	02/05, 1 ind., marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.Bes)
Migr. postnuptiale 2001	19/06, 1 ind., lagune de Bouin (LPO)	Données hivernales
Migr. prénuptiale 2002	Données hivernales	19/05, 1 ind., marais Sablais, Les Sables-d'Olonne (A.Bar)
Migr. postnuptiale 2002	12/06, 1 ind., lagune de Bouin (LPO)	

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)**2000-2001 : 217****2001-2002 : 251**

Nicheur, migrateur et hivernant.

Cette espèce niche dans les marais littoraux (Marais poitevin, Marais breton). Néanmoins, l'essentiel des mentions d'individus nicheurs est noté, sur la période considérée, dans le Marais breton. Il faut noter que jusqu'à 29 couples sont mentionnés au lieu-dit "Le Bout de Sac" à Beauvoir-sur-Mer et de 20 à 30 couples dans les marais de la Vie en 2000-2001. Il faut rappeler que l'enquête "limicoles nicheurs" 1995-1996 avait permis d'obtenir un effectif de 786-951 couples pour l'ensemble de la Vendée.

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 393 ind. dont 263 en baie de l'Aiguillon / pointe d'Arçay ;
- janvier 2002 : 690 ind. dont 234 en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et 402 en baie de l'Aiguillon.

Les effectifs maxima en période de reproduction sont de 484 ind. le 17/08/01 en baie de Bourgneuf et de 295 ind. le 09/08/02 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg (Noirmoutier).

CHEVALIER STAGNATILE (*Tringa stagnatilis*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 2/2**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur rare mais régulier.

1 seul contact homologué en 2000-2001 : 1 ind. sur les terrains LPO à Beauvoir-sur-Mer le 22/07/01 (G.Gue, J-G.Rob & T.You.).

En 2001-2002, seules deux données homologuées (sur 7 arrivées au fichier !!) :

- 1 ind. les 01 et 02/09/01 dans l'estuaire du Lay (A.Aud *et al*) ;
- 1 ind. sur la station d'épuration de Luçon du 11 au 27/04/02 (J.Pie, F.Sal).

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)**2000-2001 : 70****2001-2002 : 93**

Migrateur et hivernant rare.

Cette espèce est principalement observée sur les zones humides littorales.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		25/11, 83 ind., le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île (LPO)
Migr. prénuptiale 2001	22/02, 2 ind., le Tamarin, La Barre-de-Monts (C.Gir)	22/05, 6 ind., marais des Loirs, Olonne-sur-Mer (M.Bib)
Migr. postnuptiale 2001	14/06, 2 ind., marais de Noirmoutier (LPO)	Données hivernales
Migr. prénuptiale 2002	Données hivernales	15/05, 4 ind., station d'épuration de Noirmoutier-en-l'Île (LPO)
Migr. postnuptiale 2002	11/07, 2 ind., port du Collet, Bouin (C.Ler)	

Dans cette base de donnée, le "record" enregistré est de 84 ind. le 09/08/02 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier (D.Des).

En hivernage, quelques individus ont été notés dans le Marais breton en 2002.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)

2000-2001 : 111

2001-2002 : 144

Migrateur et hivernant.

Ce chevalier est noté sur quasiment tout le département autour des zones humides (lacs, marais, rivières...). En 2002, en hivernage (comptage Wetlands International), l'effectif était de 31 ind. répertoriés principalement dans le Marais breton et sur l'île de Noirmoutier.

Des données éparses sont observées quasiment tous les mois de l'année. Il est donc délicat de préciser les périodes précises de migration pré-nuptiale et post-nuptiale. Lors de la saison 2000-2001, le nombre maximum d'individus observés est de 15 oiseaux dans les marais de la Vie le 27/08/01 (G.Bes). Lors de la saison 2001-2002, un effectif de 20-25 ind. est noté dans les marais de la Vie le 10/10/01 (G.Bes). Il ne s'agit toutefois pas d'oiseaux observés ensemble.

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)

2000-2001 : 16

2001-2002 : 12

Migrateur.

L'essentiel des observations a été réalisé sur les zones humides littorales et rétro-littorales. Le nombre maximal d'individus observés est de 8 le 29/08/02 dans les marais de la Vie (G.Bes).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		12/10, 1 ind., Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île (LPO)
Migr. pré-nuptiale 2001	Pas de données	
Migr. postnuptiale 2001	12/07, 1 ind., marais salants de la Guittière, Talmont-St-Hilaire (J.Gon)	10/10, 1 ind., marais Guilloteau, Jard-sur-Mer (F.Sal)
Migr. pré-nuptiale 2002	22/02, 4 ind., étang des Mattes, St-Gervais (M.Vas)*	27/04, 3 ind., base de loisirs de Luçon (F.Sal)
Migr. postnuptiale 2002	25/07, le Querry Margot, La Barre-de-Monts (A.Bar)	

* donnée la plus précoce du fichier LPO

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*)

2000-2001 : 114

2001-2002 : 145

Migrateur et hivernant.

A l'instar du Chevalier culblanc, il est observé sur toutes les zones humides du département (y compris sur l'île d'Yeu) et ce, tous les mois de l'année lors des saisons 2000-2001 et 2001-2002. Au cours de l'hivernage 2002, 4 ind. sont notés sur le département. L'effectif maximum recensé est d'une vingtaine d'individus dans les marais de la Vie, le 29/08/02 (G.Bes).

TOURNEPIERRE À COLLIER (*Arenaria interpres*)

2000-2001 : 81

2001-2002 : 113

Migrateur et hivernant.

Cet oiseau est essentiellement noté sur les zones littorales (y compris sur l'île d'Yeu).

Effectif total dénombré en Vendée lors des comptages Wetlands International :

- janvier 2001 : 2 121 ind. dont 1 830 ind. en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et 289 en baie de l'Aiguillon ;
- janvier 2002 : 1 777 ind. dont 1 025 en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier et 752 en baie de l'Aiguillon.

L'effectif maximum recensé en 2000-2001 et en 2001-2002 est respectivement de 181 ind. le 20/01/01 (comptage Wetlands 2001) et de 162 ind. (comptage Wetlands 2002) sur le site baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (LPO).

PHALAROPE À BEC ETROIT (*Phalaropus lobatus*)**2000-2001 : 6/3****2001-2002 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Oiseau du nord de l'Europe, migrateur occasionnel sur nos côtes.

En 2000-2001, l'essentiel des données émane d'observations réalisées sur la lagune de la Belle-Henriette entre le 01/09 et le 09/09 (J. & P. Ada *et al.*). Mais, il existe 2 mentions le 20/12/00 sur la lagune de Bouin (F. Sig) et le 4/01/01 sur la plage de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez (F. Hal). Seule la dernière donnée est homologuée (le CHD n'existait pas en 2000).

En 2001-2002, observation d'un individu à la pointe de l'Aiguillon le 08/09/01 (G. Bou, S. Bon & B. Per).

PHALAROPE À BEC LARGE (*Phalaropus fulicarius*)**2000-2001 : 17****2001-2002 : 2/2**

Migrateur rare mais régulier.

En 2000-2001, 3 individus ont été observés simultanément les 15 et 17/12/01 sur l'île de Noirmoutier (M. Vas *et al.*, A. Ger). Plusieurs observations sont également à noter sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier (LPO, M. Vas *et al.*) et les marais d'Olonne (M. Bib, ONCFS). En 2001-2002, le 14/10/01, 9 individus sont observés sur la plage de la Tresson à La Guérinière (D. Des & N. Pra) et 1 individu en vol est noté le 27/12/01 à Port Joinville, sur l'île d'Yeu (X. & M-P. Hin).

DES LABBES A LA MOUETTE TRIDACTYLE (Matthieu VASLIN)**LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*)****2000-2001 : 5/4****2001-2002 : 3/3**

Espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006.

De passage occasionnel sur le littoral.

Espèce discrète plus pélagique en Atlantique que ses cousins le Grand Labbe et le Labbe parasite, les observations concernent essentiellement des oiseaux vus en fin d'été et en automne. Une mention hivernale cependant le 30/12/00 depuis la plage des Conches sur l'île d'Yeu (X. & M-P. Hin).

Une seule donnée concerne plusieurs oiseaux avec 2 ind. le 02/09/00 à la pointe des Corbeaux sur l'île d'Yeu (X. & M-P. Hin).

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*)**2000-2001 : 23/18****2001-2002 : 28/15**

Migrateur assez commun sur la côte.

Pratiquement toutes les observations (de 1 à 25 ind.) s'inscrivent dans le passage postnuptial, essentiellement des données de guet à la mer (sea-watching).

Le passage prénuptial est très peu marqué avec 11 observations (du 12 mars au 19 mai). Maximum de 6 oiseaux comptabilisés en une séance de guet à la mer les 09/09/01 et 02/08/02 depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez (G. Bes).

Une rare donnée hivernale, un individu le 08/01/01 sur la lagune de Bouin (F. Sig).

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*)**2000-2001 : 28/26****2001-2002 : 22/21**

De passage sur la côte.

La majorité des observations concerne essentiellement des individus isolés, observés aux deux passages (prénuptial et postnuptial). Habituellement les données prénuptiales sont peu nombreuses mais ce passage est bien marqué dans les deux périodes considérées (2000-2001 et 2001-2002), avec 11 données de début de printemps (mars à mai). Quelques données hivernales : 8 en 2000-2001 et 3 en 2001-2002.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (*Larus melanocephalus*)**2000-2001 : 87****2001-2002 : 108**

Nicheuse, migratrice, hivernante peu commune.

Visiteuse régulière et sporadique, çà et là sur le littoral.

Le passage prénuptial est généralement moins abondant que le passage postnuptial, pourtant 500 individus sont observés le 11/03/01 à Givrand (G. Bes) et 450 le 29/03/02 dans les dunes du Jaunay à Brétignolles-sur-Mer (G. Bes).

2 cas de nidification ont été rapportés en 2001 avec 30 couples sur la Lagune de Bouin (C.Gir) et 46-51 couples dans les marais d'Olonne (P.Yes). Un cas possible en 2002 avec un minimum d'une soixantaine de couples présents sur le marais de L'Ile-d'Olonne le 05/05/02 (P.Yes).

L'espèce est de plus en plus contactée en hiver avec des petits groupes allant jusqu'à une cinquantaine d'individus sur le littoral, essentiellement sur l'île de Noirmoutier (M.Vas). De très nombreux individus bagués sont régulièrement observés. En plus de l'origine des oiseaux, les renseignements issus de ces données de baguage permettent de mieux appréhender les mouvements des oiseaux (échanges, dispersion...).

MOUETTE ATRICILLE (*Larus atricilla*)

2000-2001 : 1/1

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation nationale.

Originaire d'Amérique de l'Est et d'Amérique centrale.

Un oiseau adulte est observé toute la soirée du 28/08/01 sur la vasière du Luzan à Noirmoutier-en-l'Île (D.Des & M.Vas). Cette observation a été acceptée par le CHN (*Ornithos* 10-2).

MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*)

2000-2001 : 69

2001-2002 : 43

Migratrice, hivernante rare.

Passages très réguliers avec des stationnements pré-nuptiaux marqués sur les bassins côtiers (lagunes en particulier). Effectif record de 1 800 individus sur la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer le 15/04/01 (ONCFS) et 300 à 400 oiseaux le 10/04/00 dans les dunes du Jaunay à Brétignolles-sur-Mer (G.Bes). Très peu de données hivernales, qui concernent généralement des individus isolés. Néanmoins, deux observations hivernales de groupes importants poussés à la côte à la faveur de tempêtes : plus de 57 ind. le 20/01/01 sur la lagune de la Belle Henriette à La Faute-sur-Mer (C.Gon & M.Bib) et 50 ind. dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 04/01/01 (F.Hal).



Mouette pygmée Larus minutus (dessin © Benoît Perrotin)

MOUETTE DE SABINE (*Xema sabini*)**2000-2001 : 6/6****2001-2002 : 4/4**

Nicheuse en Amérique du Nord, hivernant sur les côtes atlantiques européennes et africaines.

Quelques observations postnuptiales sporadiques, cette espèce pélagique étant occasionnelle en dehors des tempêtes et des observations maritimes (bateau). L'espèce s'est montrée très discrète pour les deux périodes considérées.

Maximum de 10 individus au large de l'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier le 26/11/00 (M.Vas) et 5 individus le 27/08/02 à la Paracou aux Sables-d'Olonne (A.Bar).

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)**2000-2001 : 237****2001-2002 : 350**

Nicheuse, migratrice, hivernante.

Omniprésente sur le littoral et régulière à l'intérieur des terres, avec des dortoirs hivernaux sur les lacs et retenues : 10 000 ind. le 10/01/01 sur le lac de barrage de Moulin Papon à La Roche-sur-Yon (S.Cha), 4 500 ind. le 16/01/01 sur le lac de Maché-Apremont (A.Ger).

Seulement 6 données de reproduction en 2001 et 9 en 2002, avec notamment 136 couples sur la lagune de Bouin le 12/05/01 (C.Gir).

GOÉLAND RAILLEUR (*Larus genei*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation nationale en dehors des zones méditerranéennes jusqu'au 1^{er} janvier 2006, et à homologation départementale au-delà de cette date.

Oiseau méditerranéen.

Observation d'un ad. le 23/03/01 dans les marais de L'Epine, sur l'île de Noirmoutier (M.Vas).

Donnée acceptée par le CHN (*Ornithos* 11-2).

GOÉLAND À BEC CERCLÉ (*Larus delawarensis*)**2000-2001 : 7/2****2001-2002 : 19/3**

Espèce soumise à homologation nationale jusqu'au 1^{er} janvier 2006, et à homologation départementale au-delà de cette date.

Originaire d'Amérique du Nord, le laridé américain le plus régulier du littoral vendéen.

Deux oiseaux observés en 2000-2001, avec l'adulte régulier de la pointe d'Arçay (La Faute-sur-Mer), de retour le 27/09/00 (A.Lar) et un oiseau de premier été du 08/07 au 30/08/01 au Gois, à Barbâtre (M.Vas, F.Por).

En 2001-2002, retour de l'adulte de la pointe d'Arçay du 02/09/01 au 23/10/01 (A.Tho). Sur l'île de Noirmoutier, long stationnement d'un oiseau, arrivé en plumage de deuxième hiver, du 18/10/01 au 21/07/02 (D.Des & M.Vas).

Un adulte est à nouveau présent à la pointe d'Arçay le 28/08/02 (A.Cha).

Données acceptées par le CHN (*Ornithos* 9-1, 10-2, 11-2).

GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*)**2000-2001 : 38****2001-2002 : 53**

Migrateur et hivernant.

Passages moins marqués pour ces deux périodes que pour les périodes précédentes, quelques rassemblements réguliers sur le littoral et les retenues côtières : 266 le 10/03/02 à la Biochetterie, Saint Gervais (F.Sig).

Quelques dortoirs hivernaux, avec par exemple une cinquantaine d'oiseaux le 04/01/01 dans la baie des Sables-d'Olonne (D.Des).

GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*)**2000-2001 : 119****2001-2002 : 169**

Nicheur, migrateur, hivernant.

Présent sur le littoral et rassemblements hivernaux sur les retenues d'eau plus à l'intérieur des terres. Jusqu'à 2 000 oiseaux observés en dortoir dans la baie des Sables-d'Olonne le 13/01/01 (D.Des).

361 couples sur l'île du Pilier en 2002 (LPO Noi), ce qui représente la majorité de l'effectif nicheur vendéen, estimé à environ 500 couples.

Aucune précision dans le fichier sur les sous-espèces observées en Vendée.

GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)**2000-2001 : 121****2001-2002 : 177**

Nicheur, migrateur, hivernant.

Espèce omniprésente sur le littoral, observée régulièrement ailleurs en Vendée.

1 027 nids sur l'île du Pilier en 2002 (LPO Noi).

Jusqu'à deux adultes de la sous-espèce nordique *argentatus* étaient présents lors de l'hiver 2001-2002 sur la vasière du Luzan à Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas). Cette sous-espèce est rare sur la façade atlantique.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus michahellis*)**2000-2001 : 51****2001-2002 : 53**

Nicheur, migrateur, hivernant.

Espèce aux effectifs probablement sous-estimés, notamment lors des comptages de dortoirs mixtes de laridés.

Observations principalement maritimes et nidification irrégulière : 7 à 8 couples sur le marais d'Olonne le 01/06/01 (P.Yes), 4 couples sur l'île de Noirmoutier en 2002 et 4 couples sur l'île du Pilier le 31/05/02 (LPO Noi).

Passage postnuptial marqué par l'arrivée d'oiseaux des colonies méridionales en dispersion post-nidification : par exemple 25 oiseaux le 26/09/00 sur le polder du Dain à Bouin (P.Dul).

GOÉLAND PONTIQUE (*Larus cachinnans*)**2000-2001 : 2/1****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation départementale à partir du 1^{er} janvier 2006.

Originaire d'Europe de l'Est, laridé très rare sur le littoral atlantique.

Un adulte stationne du 11/10/00 au 13/12/00 sur la vasière du Luzan à Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas). Cette donnée constitue la première mention de l'espèce en Vendée et sur le littoral atlantique français.

GOÉLAND À AILES BLANCHES (*Larus glaucooides*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 1/1**

Espèce soumise à homologation nationale.

Niche au Groenland, occasionnel en hiver.

Un ind. de 1^{er} hiver sur la plage des Sables-d'Olonne le 13/01/01 (D.Des) et un autre ind. de 1^{er} hiver le 28/03/02 à Port Joinville sur l'île d'Yeu (A.Tho).

Données acceptées par le CHN (*Ornithos* 10-2 et 11-2).

GOÉLAND BOURGMESTRE (*Larus hyperboreus*)**2000-2001 : 10/3****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Niche au Groenland, occasionnel en hiver.

Laridé arctique, hivernant occasionnellement sur le littoral français

Un ind. de 1^{er} hiver du 21/01 au 03/02/01, à la Paracou aux Sables-d'Olonne (D.Per, B.VaM). Un ind. de 2^e hiver du 03 au 19/02/01 sur la réserve de Chanteloup à L'Île-d'Olonne (ONCFS). Enfin, un oiseau de 2^e hiver du 05/02 au 11/02/01 sur le marais des Loirs à Olonne-sur-Mer (D.Des, M.Bib).

GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*)**2000-2001 : 59****2001-2002 : 78**

Nicheur, migrateur, hivernant.

Données du fichier uniquement maritimes, avec une présence sur tout le littoral, quelques rassemblement hivernaux : 125 sur la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez le 12/11/00 (G.Bes). Au moins 16 couples nicheurs entre l'île d'Yeu (2 couples) et l'île du Pilier (14 couples) en 2002 (LPO Noi, X. & M-P.Hin).

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*)**2000-2001 : 34****2001-2002 : 41**

Nicheuse et de passage régulier.

Uniquement des données provenant du littoral, avec des pics d'effectifs enregistrés lors des forts coups de vent d'ouest hivernaux : par exemple 120 ind. le 13/12/00 en baie de Bourgneuf (ONCFS).

Aucune donnée de nidification au phare de l'Armandèche (Les Sables-d'Olonne) pour 2001 et 2002.

STERNES (Xavier HINDERMEYER)

STERNE HANSEL (*Sterna nilotica*)

2000-2001 : 3/3

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice rare mais régulière sur le littoral vendéen aux deux passages.

Deux données lors du passage postnuptial 2000 avec 2 individus le 17/09 pointe de l'Aiguillon puis 1 individu le 18/09 pointe d'Arçay à La Faute-sur-Mer (M.Gai & N.Jea).

Ensuite deux données seulement ont été homologuées par le CHD :

- 1 adulte pointe de la Casie à Barbâtre (île de Noirmoutier) le 06/07/01 (M.Vas) ;
- 1 adulte en plumage nuptial plage de la Grande Côte à La Barre-de-Monts le 10/07/02 (F.Pic).

STERNE CASPIENNE (*Sterna caspia*)

2000-2001 : 28

2001-2002 : 50

Migratrice peu commune mais régulière en petit nombre sur le littoral vendéen, plus rare à l'intérieur des terres, observée aux deux passages.

Le site le plus fréquenté est le complexe de la baie de l'Aiguillon (pointe de l'Aiguillon, pointe d'Arçay, estuaire du Lay) qui cumule à lui seul plus de 80% des données. Quelques oiseaux sont également notés dans les marais de L'Ile-d'Olonne, les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez mais aussi à Bouin et à Noirmoutier.

A noter deux observations à l'intérieur des terres : 1 individu sur le lac du Jaunay à La Chapelle-Hermier le 06/09/00 (G.Bes & P.Rou) et 1 individu sur la base de loisirs de Luçon le 16/04/01 (M.Bib).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		19/10, pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq.Pointe)
Migr. prénuptiale 2001	11/04, réserve de Chanteloup, L'Ile-d'Olonne (ONCFS, M.Bib & D.Des)	16/04, base de loisirs de Luçon (M.Bib)
Migr. postnuptiale 2001	17/08, pointe d'Arcay, La Faute-sur-Mer (ONCFS)	15/10, pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer (ONCFS)
Migr. prénuptiale 2002	07/04, pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer (J.Pie)	10/06, lagune de Bouin (M.Cos)
Migr. postnuptiale 2002	08/08, pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer (ONCFS)	

Plus de 80% des observations sont réalisées lors du passage postnuptial. Celui-ci débute en août et se poursuit jusqu'en octobre. Les observations concernent un à sept individus, par exemple 7 oiseaux les 02/09/00 à la pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (M.Bib) et 07/10/01 à la pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe).

Très peu de données lors du passage prénuptial et toutes en avril, excepté un individu tardif le 10/06/02 sur la lagune de Bouin (M.Cos.). Toutes ces observations ne concernent le plus souvent qu'un ou deux oiseaux, excepté 4 individus le 12/04/02 à la pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (ONCFS).

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*)

2000-2001 : 115

2001-2002 : 138

Migratrice commune sur tout le littoral vendéen. Hivernante régulière et nicheuse rare.

S'observe communément de mars à octobre le long de la côte vendéenne, y compris sur les deux îles.

Les seuls rassemblements importants sont notés lors du passage postnuptial avec par exemple 300 individus les 31/08 et 09/09/01 depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes & P.Rou) ou encore 246 individus le 10/07/02 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier (LPO).

Une seule donnée à l'intérieur des terres : 1 individu le 27/07/02 sur les étangs des Boucheries aux Landes-Génusson (C.Met).

Peu d'informations en période de reproduction. On note tout de même 24 couples le 27/05/01 (C.Gir & C.Ler) puis 71 individus cantonnés le 29/04/02 (O.Pen) et 31 individus avec des parades le 09/06/02 (T.Cha & M.Vas) sur la lagune de Bouin mais sans indication d'une éventuelle reproduction sur place. Première preuve de reproduction réussie sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier avec 1 jeune volant le 02/07/02 (D.Des).

Les mentions hivernales sont de plus en plus nombreuses :

- hiver 2000-2001 : 11 observations de 1 à 3 oiseaux en décembre et janvier. L'observation du 2 individus le 24/02/01 pointe du Grouin du Cou à La Tranche-sur-Mer (M.Bib) peut correspondre au tout début du passage prénuptial.
- hiver 2001-2002 : 9 observations de 1 à 2 oiseaux en décembre.

STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougalli*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice rare sur la côte vendéenne.

Deux données seulement homologuées par le CHD sur la période :

- 1 adulte le 18/08/01 sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier (M.Vas) ;
- 1 adulte le 19/05/02 sur la lagune de Bouin (S.Ree *et al.*).

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*)**2000-2001 : 90****2001-2002 : 135**

Migratrice commune sur le littoral vendéen. Nicheuse peu commune dans les marais littoraux, occasionnelle en hiver.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		20/09, station d'épuration, La Tranche-sur-Mer (M.Gai & N.Jea)
Saison 2001	23/03, le Luzan, Noirmoutier (M.Vas)	26/10, la Chenollette, La Faute-sur-Mer (P.Gra)
Saison 2002	25/02, marais sablais, Les Sables-d'Olonne (A.Bar)	

A noter l'arrivée précoce de 4 individus dans les marais sablais aux Sables-d'Olonne le 25/02/02 (A.Bar). Il faut ensuite attendre le 23/03/02 pour observer de nouveaux oiseaux à Noirmoutier (M.Vas).

- Nidification 2001 : cette espèce n'a pas fait l'objet de recensement exhaustif sur l'ensemble des marais vendéens. Parmi les nicheurs, on peut tout de même citer : 1 couple aux Sables-d'Olonne et 3 couples dans les marais de l'Ecluse à Olonne-sur-Mer (D.Des), 1 couple dans les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez qui a niché sans succès (G.Bes), 3 couples sur les terrains de la LPO et 5 autres couples aux Neuf Vingt à Beauvoir-sur-Mer (C.Gir) et surtout un maximum de 267 couples le 27/05/01 sur la lagune de Bouin (C.Gir & C.Ler).

- Nidification 2002 : pas de recensement exhaustif non plus cette année. On peut citer : 1 couple sur les marais de la Cochetière (D.Des) et 2 ou 3 couples dans les marais de l'Ecluse (A.Bar) à Olonne-sur-Mer, 5 ou 6 couples sur les terrains de la LPO à Beauvoir-sur-Mer, 2 couples à la Platte à Bouin (F.Sig) et surtout 173 couveurs le 09/06/02 sur la lagune de Bouin (T.Cha & M.Vas).

Les maxima sont notés lors du passage postnuptial en particulier sur la Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg à Noirmoutier avec par exemple 244 individus le 17/08/01 (LPO) et surtout 626 oiseaux le 09/08 (D.Des) et 747 le 21/08/02 (LPO).



Sterne pierregarin Sterna hirundo (photo © Matthieu Vaslin)

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisaea*)**2000-2001 : 9****2001-2002 : 11**

Migratrice peu commune mais régulière le long des côtes vendéennes, surtout lors du passage postnuptial. Peut rentrer à l'intérieur des terres quand les vents d'ouest dominant. Exceptionnelle en hiver.

Retour à deux années plus "classiques" pour cette espèce après l'afflux important de l'automne 1999.

L'essentiel des observations a lieu lors du passage postnuptial en août, septembre et octobre. Toutes les observations ne concernent qu'un individu, excepté deux oiseaux sur la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier le 06/09/01 (M.Vas).

Le passage prénuptial est beaucoup plus discret avec 1 adulte le 19/05 (S.Ree *et al.*) et 1 1^{er} été (plumage rarement observé en France) le 09/06/02 (M.Vas) sur la lagune de Bouin.

Deux données hivernales pour la période, ce qui est exceptionnel :

- 1 oiseau de 1^{er} hiver blessé (aile cassée) récupéré dans le port du Devin à l'Epine (Noirmoutier) le 18/12/00 (M.Vas & P.Rét) ;
- 1 ind. le 08/01/01 sur la lagune de Bouin (F.Sig).

Aucune donnée à l'intérieur des terres.

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*)**2000-2001 : 36****2001-2002 : 57**

Migratrice assez commune aux deux passages sur tout le littoral vendéen. Très rare en hiver. L'espèce est également présente en période de reproduction mais ne niche toujours pas en Vendée.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		25/09, pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer (Eq.Pointe)
Saison 2001	21/04, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier (M.Vas)	02/10, pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer (J. & P.Ada)
Saison 2002	14/04, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne (A.Bar)	

L'espèce est observée d'avril à octobre mais les maxima sont notés lors du passage prénuptial avec 150 individus le 10/05/01 et 141 individus le 15/05/02 pointe d'Arçay à La Faute-sur-Mer (ONCFS) et du passage postnuptial avec 125 individus le 13/08/02 sur la Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon à Saint-Michel-en-l'Herm (P.Gra).

Jusqu'à 27 individus sont présents dans la colonie de sternes de la lagune de Bouin le 09/06/02 (T.Cha & M.Vas), mais pas de signe de nidification.

GUIFETTES ET ALCIDÉS (Perrine DULAC)**GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybridus*)****2000-2001 : 17****2001-2002 : 9**

Migratrice peu commune mais régulière dans le département, notée surtout au passage prénuptial. Pas de données de reproduction (niche sur le lac de Grand-Lieu, en Loire-Atlantique).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		Dernière décade de septembre, St-Hilaire-de-Riez
Migr. prénuptiale 2001	29/03, station de lagunage, Beauvoir-sur-Mer (F.Sig)*	Des données régulières jusque fin mai puis 3 ind. le 23/06, barrage de Moulin Papon, La Roche-sur-Yon (S.Bar, S.Bon & F.Sem)
Migr. postnuptiale 2001**	05/08, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (N.Ber & C.Met)	2 ^e décade de septembre, Olonne-sur-Mer
Migr. prénuptiale 2002	04/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (S.Mer)	09/05, station de lagunage, Luçon (C.Dra)

* donnée la plus précoce du fichier LPO à cette date.

** seulement 2 données pour la migration 2001

Max 12 individus observés sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré le 26/05/01 (M.Bib).

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)**2000-2001 : 47****2001-2002 : 60**

Migratrice commune aux deux passages. Nicheuse rare. Pas de données de l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		12/10, Marais Sablais, Les Sables-d'Olonne (M.Bib)
Saison 2001	2 ^e décade d'avril, Angles	27/10, lagune de la Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer (C.Dra)
Saison 2002	31/03, traversée Ile d'Yeu – Fromentine (O.Pen & N.Pra)	

- Automne 2000 : 30 ind. le 17/09 à la pointe de l'Aiguillon (M.Gai & N.Jea)
- Printemps 2001 : 30 ind. à Sion-sur-l'Océan (Saint-Hilaire-de-Riez) le 03/06 (G.Bes). Des juvéniles signalés sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré en juillet (poussins nés en Marais poitevin ?)
- Automne 2001 : 20-30 ind. le 28/09 sur la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer (S.Vri).
- Printemps 2002 : Pas de données de nidification dans le fichier pour cette année.
- Automne 2002 : c'est à nouveau la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer qui accueille le plus grand nombre d'individus ensemble (34 le 13/08, ONCFS).

GUIFETTE LEUCOPTÈRE (*Chlidonias leucoptera*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 1/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice rare. Fréquente tous types de milieux dulçaquicoles.

Deux données homologuées pour la période :

- 1 ad. en plumage nuptial, Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré le 04/07/01 (F.Sem & A.Tho),
- 1 ind. le 22/08/02, station de lagunage de La Tranche-sur-Mer (C.Dra & X.Ros).

GUILLEMOT DE TROÏL (*Uria aalge*)**2000-2001 : 15****2001-2002 : 19**

Migrateur et hivernant peu commun le long de la côte et au large.

Données réparties sur l'ensemble de la côte, mais la majorité des données provient du nord du département (île d'Yeu et côte entre Saint-Hilaire-de-Riez et Noirmoutier).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	11/12, baie de l'Aiguillon (ONCFS)	des données régulières jusqu'au 31/01, puis deux données au printemps*
Hiver 2001-2002	12/11, baie de Bourgneuf (LPO)**	12/04, plus de 10 ind., plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer (J.Pie)
Hiver 2002-2003	Une donnée mi-août au large des Sables (sortie Kifanlo, O.Pen), et deux données fin août au large de St-Hilaire-de-Riez (G.Bes) et d'Olonne-sur-Mer (D.Des)	

* puis deux données au printemps :

- 7 ind. à l'Armandèche (Les Sables-d'Olonne) le 07/04/01, suite à de forts vents (M.Bib)
- 1 ind. à la plage des Granges (Olonne-sur-Mer) le 22/05/01 (D.Des)

** record d'affluence ce jour-là en baie de Bourgneuf : 237 individus comptés au large de Noirmoutier et dans la baie (par groupes de 20 à 90 ind.). C'est l'effectif le plus important de la base de données.

Plusieurs individus mazoutés observés ou trouvés morts pendant l'hiver 2001-2002, à l'île d'Yeu (au moins 4, X. & M-P.Hin) et à Saint-Jean-de-Monts (J-P.Til).

PINGOUIN TORDA (*Alca torda*)**1996-1997 : 21****1997-1998 : 29**

Migrateur et hivernant peu commun le long de la côte et au large. La majorité des données provient de l'île d'Yeu (27 données sur les 50).

Saison 2000-2001 : une observation dans la dernière décade de septembre, puis de nombreuses observations fin décembre à l'île d'Yeu (plus de 10 ind. le 26/12, X. & M-P.Hin). Il n'y a ensuite plus de données jusqu'en avril. Observations au large des Olonnes et à Saint-Hilaire-de-Riez du 25/04 au 25/06.

Saison 2001-2002 : 2 observations en août-septembre (île d'Yeu et La Faute-sur-Mer), puis observations régulières du 10/11 au 03/01 (maximum 32 ind. le 28/12 à l'île d'Yeu, X. & M-P.Hin) et du 14/03 au 15/06 (plus de 20 plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer, le 12/04, J.Pie).

MERGULE NAIN (*Alle alle*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur très rare le long de la côte.

Une seule donnée homologuée pour la période : 1 ind. du 25/11 au 09/12/01 dans le port des Sables-d'Olonne (H.Mic, B.VaM *et al.*).

MACAREUX MOINE (*Fratercula artica*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 2/1 ou 2

Espèce soumise à homologation départementale.

Seules deux données homologuées pour la période :

- 1 ind. le 12/11/01, pointe des Charniers, Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas & J.Lea),
- 1 ad. en plumage d'hiver trouvé mort le 14/11/01 (le même ?), plage de la Loire, Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas).

Des données n'ont pas été homologuées !!

DES PIGEONS AU COUCOU GRIS (Jocelyne GUEYDAN)

PIGEON BISET (*Columba livia*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Sédentaire. Noté généralement sur les côtes et aussi dans les villes où il est semi-domestiqué dans les villes.

3 ind. en migration à la pointe de l'Aiguillon le 29/09/01 (Eq. Pointe).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*)

2000-2001 : 14

2001-2002 : 15

Migrateur partiel, nicheur peu commun.

Noté près des côtes lors de la migration et dans le sud-Vendée. Pas de données à l'île d'Yeu pour cette période.

La plupart des observations ont été réalisées de septembre à mai.

Des données en période de reproduction font penser que l'espèce niche en Vendée :

- le 13/06/01 à Boufféré (J-P.Til),
- les 14/05 et 30/05/02 à Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes).

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)

2000-2001 : 368

2001-2002 : 407

Sédentaire et migrateur.

Noté en toutes saisons dans tout le département, y compris sur l'île d'Yeu.

Premiers indices de nidification :

- en 2001, dans la première décade de février à Rocheservière (L.Gri) ;
- en 2002, dans la deuxième décade de mars à Chaillé-les-Marais.

Un chanteur le 25/08/02 à Mervent (D.Bro).

TOURTERELLE RIEUSE (*Streptopelia roseogrisea*)

2000-2001 : 1/1

2001-2002 : 0

Echappée de captivité.

3 ind. parmi un groupe de 17 tourterelles turques à l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île (M.Vas).



Pigeon colombin Columba oenas (photo Matthieu Vaslin)

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*)

2000-2001 : 270

2001-2002 : 315

Sédentaire.

Notée dans tout le département en ville comme à la campagne, y compris à l'île d'Yeu.

Un couveur le 06/02/02 à la gare de Challans (B.Isa).

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)

2000-2001 : 157

2001-2002 : 168

Nicheuse et migratrice.

Notée dans tout le département, y compris l'île d'Yeu, dans les bois clairs de feuillus, les bosquets, les haies.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		18/09, pointe de l'Aiguillon (M.Gai & N.Jea)
Saison 2001	21/04, 4 observations le même jour en différents endroits du département : Moulin Papon, La Roche-sur-Yon (F.Sem), Mouzeuil-St-Martin (J-C.Lue), lac de Finfarine, Poiroux (F.Por), Le Poiré-sur-Vie (F.Sem)	22/10, pointe de l'Aiguillon (P.Gra)
Saison 2002	17/04, Mouzeuil-St-Martin (J-C.Lue)	

PERRUCHE À COLLIER (*Psittacula krameri*)

2000-2001 : 1/1

2001-2002 : 0

Echappée de captivité, considérée comme introduite.

Notée le 10/09/00 à Beauvoir-sur-Mer (C.Gir), 1 mâle de la sous-espèce *borealis* le 24/05/01 à Luzérone (Noirmoutier-en-l'Île, M.Vas), le 24/05 à l'Herbaudière (Noirmoutier-en-l'Île, M.Vas), le 14/06/02 à Chantonay (S.Bon).

COUCOU GEAI (*Clamator glandarius*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation départementale, de passage occasionnel dans notre département.

Nicheur et migrateur dans la plus grande partie de la péninsule ibérique. En France, le Coucou geai s'est répandu, surtout depuis 1950, dans la zone des plaines méditerranéennes : Roussillon, Languedoc, Camargue et Provence.

Pas de données homologuées pour cette période...

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*)**2000-2001 : 88****2001-2002 : 86**

Nicheur et migrateur.

Noté dans toute la Vendée, y compris à l'île d'Yeu, dans les régions boisées, cultivées, les marais, les landes côtières, de la mi-mars à début septembre.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		Dernière décade de septembre, La Verrie*
Saison 2001	09/03, Olonne-sur-Mer (ONCFS)	21/08, île de Charrouin, Vix (C.Gon)
Saison 2002	10/03, L'Ile-d'Olonne (O.Gir)	

* l'une des données les plus tardives du fichier LPO.

RAPACES NOCTURNES (Sylvain VRIGNAUD)**EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*)****2000-2001 : 126****2001-2002 : 106**

Nicheuse, migratrice partielle.

Fréquente l'ensemble du département (toutefois, aucune donnée pour l'île d'Yeu pour cette période), avec quelques indices de nidification :

- "chuintements" entre 3 ind. à Saint-Martin-des-Tilleuls le 12/04/01 (J-P.Nat) ;
- à La Chaize-le-Vicomte le 01/06/01 (J.Vim) ;
- cris de jeune à Saint-Julien-des-Landes le 12/04/02 (N.Dup).

Observations remarquables :

- 1 ind. de type *guttata* (forme rousse) à La Roche-sur-Yon le 16/02/01 (C.Gon) ;
- 1 oiseau euthanasié le 02/11/01 à Rocheservière (L.Gri). Cet individu portait une bague du muséum d'Arnhem (Hollande) ;
- 1 ind. de type *guttata* trouvé mort le 04/01/02 entre Les Landes-Génusson et La Boissière-de-Montaigu (L.Gri).

PETIT-DUC SCOPS (*Otus scops*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 3/3**

Espèce soumise à homologation départementale en dehors de Noirmoutier.

Nicheur rare et migrateur.

Niche à Noirmoutier et probablement ailleurs, notamment dans le sud-Vendée.

Toutes les données de la période proviennent de Noirmoutier (bois de la Chaize).

	Première observation	Dernière observation
Saison 2001	Une seule donnée : 12/05/01, Noirmoutier-en-l'Ile (N.Pra)	
Saison 2002	31/03, Noirmoutier-en-l'Ile (E.Gas)	08/07, Noirmoutier-en-l'Ile (M.Vas)

Seuls 2 chanteurs au maximum ont été observés (le 12/05/01 et le 08/07/02). L'observation du 31/03/02 est la plus précoce connue jusqu'alors dans le fichier.



Petit-duc scops Otus scops (photo © Matthieu Vaslin).

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*)

2000-2001 : 33

2001-2002 : 37

Sédentaire.

Présente sur l'ensemble du département, aussi bien sur la côte, dans les marais que dans le bocage, mais la répartition de cette espèce est inégale (aucune donnée pour l'île d'Yeu et Noirmoutier).

Observation anecdotique à Beauvoir-sur-Mer d'un juvénile bagué, le 31/08/02, qui se pose près d'une boîte aux lettres puis sur la voiture de l'observateur (F.Sig *et al.*).

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*)

2000-2001 : 50

2001-2002 : 37

Sédentaire (migrateur partiel).

Relativement peu de données concernant cet oiseau qui est certainement plus répandu que ne le montrent les données.

Quelques données de nidification dans le bocage ou sur le littoral.

Observation remarquable d'un chanteur à l'île d'Yeu le 02/06/01 (F.Por).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*)

2000-2001 : 54

2001-2002 : 40

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Comme la Chouette hulotte, le Hibou moyen-duc est probablement plus répandu que ne l'indiquent les données du fait du manque de prospection ciblée (et du manque d'envoi de données). Aucune donnée en provenance de l'île d'Yeu et Noirmoutier. Indices de nidification un peu partout dans le département.

Quelques observations d'individus morts suite à des collisions routières.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*)

2000-2001 : 67

2001-2002 : 34

Nicheur rare, hivernant, migrateur partiel.

Signalé uniquement sur le littoral et les marais côtiers, principalement observé en hiver.

Nidification possible sur la réserve de Chanteloup (L'Île-d'Olonne) durant le printemps 2001 (ONCFS).

Nidification possible à Bois-de-Céné en 2002 (F.Sig) et sur le communal des Magnils-Régniers (S.Bar).

1 ind. trouvé mort accroché aux barbelés, communal des Magnils-Régniers le 22/07/02 (S.Bar).

Peu de gros rassemblements sur la période. Maximum : 12 oiseaux le 31/12/00 à Saint-Urbain (F.Sig).

DE L'ENGOULEVENT D'EUROPE AUX PICS (Jocelyne GUEYDAN)

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*)

2000-2001 : 14

2001-2002 : 12

Nicheur et migrateur.

Niche dans les pinèdes claires à sol sablonneux entre Longeville-sur-Mer et La Barre-de-Monts, à Noirmoutier, également dans des boisements plus clairs de feuillus et mixtes avec coupes dans les secteurs de bocage du département, et en forêt de Mervent.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		02/08, colonie de Blanc-Mesnil, La Barre-de-Monts (C.Gir)
Saison 2001	05/05, la Davière, St-Jean-de-Monts (C.Gir)	21/07, la Grande Herse, Le Perrier (G.Bes & P.Rou)
Saison 2002	11/05, Notre-Dame-de-Monts (M.Cos)	

Une donnée de collision routière à Cugand le 14/05/02 (W.Mai).

Un recensement a été effectué en forêt des pays de Monts en juin 2002, de Saint-Hilaire-de-Riez à L'Epine⁷. Ce recensement a permis de découvrir l'espèce sur l'île de Noirmoutier (au moins 1 chanteur à Barbâtre). L'effectif de la forêt de Monts est estimé pour l'année 2002 à 100 - 150 couples. Les colonies les plus denses se trouvent en forêt de Sion, en forêt d'Orouet (22 chanteurs le 15/06/02 aux Chaumes à Saint-Jean-de-Monts), derrière le golf de Saint-Jean-de-Monts.

MARTINET A VENTRE BLANC (*Apus melba*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur de passage occasionnel en Vendée.

Sa limite nord de nidification, en France, va des Pyrénées au Massif Central et au Jura (Doubs).

1 ind. le 23/04/02 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au-dessus de la plage (B.Rob).

MARTINET NOIR (*Apus apus*)

2000-2001 : 118

2001-2002 : 114

Nicheur et migrateur.

Niche dans les villes et les villages de tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		Dernière décade de septembre, baie de l'Aiguillon
Saison 2001	15/04, La Barre-de-Monts (F.Sig)	22/09, réserve de Chanteloup, L'Île-d'Olonne (ONCFS)
Saison 2002	11/04, 2 données : Barbâtre (J-G.Rob) port des Brochets, Bouin (LPO)	

Aucune donnée de nidification certaine n'est parvenue au fichier pour 2001. En revanche, plusieurs données en 2002 (dont celles récoltées pendant les prospections Hirondelles et Moineau soulcie) :

- au moins 62 nids dans les bourgs situés au sud-est de Fontenay-le-Comte jusqu'à Saint-Hilaire-des-Loges et Benet (18 nids dans le bourg de Benet le 15/06, R.Kum),
- 1 nid à Mouilleron-en-Pareds le 12/06 (S.Bar),
- 5 nids dans le centre de La Roche-sur-Yon le 25/06 (D.Blo),
- 1 nid à Pouzauges le 01/07 (F.Cha),
- 1 nid à Rocheservière le 10/07 (L.Gri).

⁷ DULAC P. – 2004 – L'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) en forêt de Monts : recensement 2002. *La Gorgebleue*, 19-20 : 19-28.

400 ind. en migration le 04/08/02 à la pointe de l'Aiguillon (G.Tou).

MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE (*Alcedo atthis*)

2000-2001 : 102

2001-2002 : 101

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Noté partout dans le département, près des cours d'eau, des étangs, des marais, y compris à l'île d'Yeu.

Une seule donnée de reproduction est parvenue au fichier pour la période : 1 nid occupé le 18/06/02 au Poiré-sur-Vie (F.Por).

GUÊPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*)

2000-2001 : 8/2

2001-2002 : 12

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur, nicheur probable.

En 2001, l'espèce a niché à Brétignolles-sur-Mer⁸ : découverte d'un couple ravitaillant des poussins le 22/07 (D.Per & A.Mer), et observation des adultes et d'1 juv. volant jusqu'au 08/08 (D.Des *et al.*).

L'année suivante, 1 mâle cantonné est observé à plusieurs reprises sur le site du 25/04 au 30/05, sans qu'aucune nidification n'ait été observée (D.Des, F.Por, A.Bar, M.Bib).

Quelques autres données (homologuées) d'individus en passage migratoire :

- 13 à 15 ind. le 27/05/01 à L'Ile-d'Olonne (D.Des),
- 2 ad. le 23/04/02 à Barbâtre (M.Vas),
- 1 mâle probable le 13/06/02 sur l'île d'Yeu (F.Por),
- 1 ind. le 13/07/02 à Soullans (B.Isa),
- 1 ind. le 14/04/02 sur la Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'Ile (D.Des).

Des données n'ont pas été soumises à homologation.

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*)

2000-2001 : 118

2001-2002 : 99

Nicheuse et migratrice.

Niche dans tout le département, près des côtes, dans les marais, dans le bocage, dans les villages, près des villes. Pas de données à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		13/09, Beauvoir-sur-Mer (C.Gir)
Saison 2001	1 ind. le 20/01 sur le lac de la Vouraie à St-Hilaire-le-Vouhis (S.Bon)* puis arrivée des oiseaux le 15/03 où plusieurs observations ont été réalisées : Luçon (J.&P.Ada) L'Ile-d'Olonne (ONCFS) Péault (J.&P.Ada)	03/10, lycée des Etablières, La Roche-sur-Yon (C.Mig) puis 1 ind. le 21/12/01, rocade nord-ouest de La Roche-sur-Yon (H.Bar)**
Saison 2002	11/03, Morteveille, La Bretonnière (J.&P.Ada)	

* donnée la plus précoce du fichier

** donnée la plus tardive du fichier. Un hivernage occasionnel est observé dans le sud de la France. Il existe quelques données hivernales en Loire-Atlantique et Charente-Maritime⁹.

⁸ Voir aussi DESMOTS D. & PORTIER F. – 2004 – Une nidification réussie du Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) en Vendée. *La Gorgebleue*, 19-20 : 53-56.

⁹ DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., YESOU P. & OLIOSSO G. – 2000 – *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan/HER, Paris, 400 pages.



Huppe fasciée Upupa epops (dessin © Benoît Perrotin)

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*)

2000-2001 : 7/4

2001-2002 : 7/7

Nicheur peu commun, migrateur tardif (surtout en période de migration postnuptiale).

Pour cette période, noté à l'île d'Yeu, à la pointe de l'Aiguillon, à la lagune de la Belle-Henriette (La Faute-sur-Mer), à Noirmoutier, à Givrand, à Jard-sur-Mer, à La Bretonnière, à L'Ile-d'Olonne, aux Sables-d'Olonne, et à Château-d'Olonne.

Un maximum de 4 individus observés en même temps à Luzéronde (Noirmoutier-en-l'Ile) le 04/09/00 (M.Vas).

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		21/09, L'Ile-d'Olonne (ONCFS)
Migr. prénuptiale 2001	Pas de données	
Migr. postnuptiale 2001	03/09, lagune de la Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer (F.Por)	12/10, pointe de l'Aiguillon (P.Gra)
Migr. prénuptiale 2002	Pas de données	
Migr. postnuptiale 2002	23/08, St-Jean-d'Orbestier, Château-d'Olonne (B.VaM)	

PIC VERT (*Picus viridis*)

2000-2001 : 219

2001-2002 : 238

Sédentaire.

Observé dans tout le département, mais aucune donnée ne provient des îles d'Yeu et Noirmoutier.

Peu de preuves de nidification !! Pour la période, nicheur noté seulement à Bourneau, Notre-Dame-de-Monts, Le Champ-Saint-Père, La Chaize-le-Vicomte.

PIC NOIR (*Dryocopus martius*)**2000-2001 : 4/4****2001-2002 : 11/5**

Nicheur rare (en expansion), hivernant.

Fin 2000, l'espèce a été observée :

- dans le bois des Jarries à Saint-Mars-la-Réorthe le 01/09 (B.Rou),
- en forêt de Grasla aux Brouzils le 12/11 (M.Cos).

En 2001, l'espèce a été observée en 5 endroits :

- dans le bois de Doux à Chavagnes-en-Paillers (1 ind. alarmant) le 24/02 (J-P.Til) ;
- en forêt de Mervent (le Jaulard) le 12/06 (D.Bro) ;
- en bordure de la Maine à Saint-Georges-de-Montaigu le 11/09, où 2 ind. avaient ébauché une cavité sans toutefois nicher (J-P.Til) ;
- en forêt de La Chaize-le-Vicomte les 26 et 27/10 (J.Dav) ;
- dans le bois de la Baugisière à Foussais-Payré le 28/10 (G.Bes), où le mâle semblait cantonné (plusieurs loges dans un merisier).

Entre janvier et août 2002, l'espèce n'a été notée qu'en forêt de Mervent les 02/02, 03/03 et 23/06 (D.Bro) et le 16/05 où 2 ou 3 petits ont été observés à l'envol (J.Del).

PIC ÉPEICHE (*Dendrocopos major*)**2000-2001 : 109****2001-2002 : 147**

Sédentaire.

Noté dans tout le département sauf à l'île d'Yeu, dans des boisements à sapins et à pins, mais aussi dans les forêts de feuillus, les parcs et les jardins.

Peu de données de nidification !!

Nicheurs certains en 2001 :

- à l'île de Charrouin, Vix (C.Gon),
- aux Minières, Bourneau (D.Bro),
- en la Millarge et au Douard, Vouvant

Nicheurs certains en 2002 :

- à Fontenay-le-Comte (C.Dra),
- au Jaulard et à la Grotte, Mervent (D.Bro),
- aux Minières, Bourneau (D.Bro).

PIC MAR (*Dendrocopos medius*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheur probable (rare), hivernant, migrateur partiel.

1 ind. entendu le 12/06/01 au Jaulard, en forêt de Mervent (D.Bro).

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*)**2000-2001 : 25****2001-2002 : 37**

Sédentaire.

Observé un peu partout dans le département (mais les données restent peu nombreuses !), dans des boisements de feuillus, dans les régions cultivées avec parcs et jardins, bosquets de chênes. Aucune donnée de l'île d'Yeu.

Quelques données de nidification pour cette période :

- en 2001 : le 23/06 à l'observatoire de L'île-d'Olonne, 1 juvénile tout juste volant, encore nourri par une femelle (D.Des),
- en 2002 : le 23/06 à Mervent (D.Bro) et le 15/08 à Soullans (adultes et jeunes, B.Rou).

DES ALOUETTES AUX BERGERONNETTES (Lucien GRILLET)

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*)**2000-2001 : 3/3****2001-2002 : 5/2**

Nicheuse probable, migratrice.

Observée en août et en octobre à la Belle Henriette (La Faute-sur-Mer, Eq. Pointe, F.Por) ; le 05/06/01 à la pointe de la Fosse à Barbâtre (M.Vas) puis le 07/06/02 à la pointe de la Gournaise sur l'île d'Yeu (X. & M.-P. Hin). Mais aucun indice de reproduction n'a été signalé

COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*)**2000-2001 : 54****2001-2002 : 49**

Sédentaire, nicheur probable.

Observable toute l'année sur les dunes de la côte et la plaine calcaire mais aussi sur les grandes places des villes et des villages côtiers et du sud du département.

Aucun indice de reproduction certaine n'a été signalé malgré la fréquence relative de l'espèce.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*)**2000-2001 : 22****2001-2002 : 44**

Migratrice partielle, hivernante, nicheuse probable.

La plupart des données concernent un ou plusieurs mâles chanteurs, elles proviennent des dunes côtières mais aussi des coteaux du bocage plantés de vigne.

La migration a lieu vers la mi-octobre, les alouettes lulu sont souvent mélangées aux vols de pinsons ou de pipits.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)**2000-2001 : 218****2001-2002 : 276**

Migratrice partielle, hivernante, nicheuse certaine.

Les observations proviennent de tout le département.

La migration a lieu de la dernière décade d'octobre à la mi-novembre, les alouettes passent en bandes silencieuses, peu compactes, parfois nombreuses. Il semble que la migration nocturne soit importante.

ALOUETTE HAUSSECOL (*Eremophila alpestris*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 3/1**

Espèce soumise à homologation départementale.

Oiseau du nord de l'Europe (niche en Scandinavie et Sibérie, descend jusqu'au sud de l'Europe en hiver).

Hivernante rare en Vendée.

Un oiseau a été observé du 04/11 au 09/11/01 à la pointe de l'Aiguillon, en compagnie de cochevis huppés (G.Bou *et al.*).**HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*)****2000-2001 : 48****2001-2002 : 69**

Migratrice, non nicheuse en Vendée.

Les premières migratrices ont été signalées dès fin février, souvent au-dessus des plans d'eau, d'abord près de la côte puis dans l'intérieur des terres. Les premières migratrices postnuptiales ont été observées dès la fin juin dans les marais de l'île d'Yeu, la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré puis à la pointe de l'Aiguillon.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		>100 le 15/10, plage de St-Jean-de-Monts (C.Gir)
Migr. prénuptiale 2001	1 ind. le 18/02 à Chambretaud (T.Wil) puis 3 ind. le 12/03, polder de Bouin (F.Sig)	"beaucoup" le 27/04, la Sarrazine, St-Jean-de-Monts (C.Gir)
Migr. postnuptiale 2001	1 ind. le 04/07, Réserve Naturelle de St-Denis-du-Payré (J.Gon)	13/10, Ile de Charrouin, Vix (C.Gon)
Migr. prénuptiale 2002	1 ind. le 08/03, Bouin (O.Pen)	1 ind. le 16/04, le Daviaud, La Barre-de-Monts (S.Bar)
Migr. postnuptiale 2002	2 ind. le 14/07, pointe de la Fosse, Barbâtre (B.VaM)	

Deux données début juin 2001 à l'île d'Yeu (F.Por) et sur la digue des Wagons à Triaize (M.Bib).

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*)**2000-2001 : 297****2001-2002 : 267**

Nicheuse, migratrice.

Présente sur tout le département, principalement dans les zones rurales. Elle construit son nid à l'intérieur des bâtiments et parfois dans les conduits de cheminée des bourgs du bocage.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		27/12, La Chapelle-Hermier (M.Cos)
Saison 2001	07/03, St-Michel-en-l'Herm (ONCFS)	07/12, lagune de la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer (B.Tes)
Saison 2002	04/03, St-Christophe-du-Ligneron (F.Sig)	

Des données tout l'hiver en décembre 2000 et janvier 2001 à Bouin (C.Gir, F.Sig).

HIRONDELLE ROUSSELINE (*Hirundo daurica*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.

Nicheuse dans le sud de l'Europe (rare en France, Espagne, Italie, Roumanie, Grèce...). En Vendée, migratrice très rare. Une seule observation le 23/04/02 d'une migratrice en compagnie d'hirondelles rustiques à la pointe des Sableaux, Noirmoutier-en-l'Île (D.Des).

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*)

2000-2001 : 145

2001-2002 : 335

Nicheuse, migratrice.

Présente sur tout le département, fréquente principalement les agglomérations. A la différence de l'Hirondelle rustique, elle construit son nid à l'extérieur des bâtiments.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		21/10, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)
Saison 2001	22/03, cité des Forges, La Roche-sur-Yon (S.Bar)	20/10, Le Poiré-sur-Vie (A.Ger)
Saison 2002	20/03, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Pav)	

PIPIT DE RICHARD (*Anthus richardi*)

2000-2001 : 3/3

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation nationale jusqu'au 1^{er} janvier 2006, et à homologation départementale au-delà de cette date.

Migrateur occasionnel et peut-être exceptionnellement hivernant. Originaire de Sibérie et d'Asie centrales.

Trois données homologuées pour la période (*Ornithos* 10-2) :

- une observation le 04/01/01 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.Gon) ;
- une autre le 24/01/01 sur le polder de Saint-Cérans à Bouin (J.Grn) ;
- une dernière le 11/05/01 à la pointe du Devin à L'Epine (S.Dul).

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*)

2000-2001 : 38

2001-2002 : 18

Nicheur et migrateur.

Bien qu'il soit présent d'avril au début d'octobre sur les dunes côtières, aucun indice de reproduction n'a été signalé au cours des saisons concernées.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		3 ^e décade de septembre, Brétignolles-sur-Mer
Saison 2001	26/04, les Granges, Olonne-sur-Mer (D.Des)	05/10, pointe de la Fosse, Barbâtre (P.Lav)
Saison 2002	14/04, pointe de la Fosse, Barbâtre (B.VaM)	

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*)

2000-2001 : 36

2001-2002 : 35

Nicheur probable, migrateur.

Présent en Vendée d'avril à mi-octobre, à proximité des zones boisées excepté à l'île d'Yeu où il n'est observé qu'en migration. Bien que plusieurs données datent encore d'octobre, le plus gros de la migration a lieu début septembre. Les pipits des arbres migrent isolément ou en très petits groupes épars.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		3 ^e décade d'octobre, L'Aiguillon-sur-Mer
Saison 2001	05/04, le Pontreau, Chantonay (S.Bon)	19/10, pointe de l'Aiguillon (P.Gra)
Saison 2002	01/04, Bourneau (D.Bro) et digue des Wagons, Triaize (C.Gon)	

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)

2000-2001 : 142

2001-2002 : 215

Nicheur peu commun, migrateur, hivernant régulier.

La migration très importante à la pointe de l'Aiguillon a lieu à partir de la mi-septembre et dure plus d'un mois. 3 400 migrateurs ont été dénombrés à l'automne 2001. Ils passent en formations dispersées, souvent à basse altitude, parfois en bandes d'une centaine d'individus.

Pour cette période, les indices de nidification proviennent de la région de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Poiré-sur-Velluire.

PIPIT MARITIME (*Anthus petrosus*)

2000-2001 : 14

2001-2002 : 20

Nicheur peu commun, migrateur, hivernant.

Il hiverne régulièrement en petits groupes sur les côtes rocheuses des îles et du continent.

Pour la période il est signalé nicheur certain à l'île d'Yeu et à l'Herbaudière (Noirmoutier-en-l'Île).



Pipit maritime Anthus petrosus (photo © Matthieu Vaslin)

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)

2000-2001 : 9

2001-2002 : 31

Migrateur, hivernant assez régulier d'octobre à avril.

Les données d'hivernage les plus nombreuses proviennent de la région de Xanton-Chassenon, avec par exemple : 1 groupe de 30-40 ind. observé le 19/11/01 au pont de la Taillée à Foussais-Payré (J.Gon).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	28/10, lac d'Albert, Xanton-Chassenon (G.Bes)	1 ^{ère} décade de mars, St-Hilaire-de-Riez
Hiver 2001-2002	19/09, pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe)	13/04, étang de la Cailletière, La Bruffière (W.Mai)

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*)**2000-2001 : 79****2001-2002 : 64**

Migratrice, nicheuse certaine dans les Marais poitevin et breton.

Présente en Vendée de fin mars à octobre.

Les bandes de bergeronnettes printanières comprenant parfois une centaine d'individus commencent à migrer très tôt le matin, à partir de fin août à la pointe de l'Aiguillon.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		22/10, marais d'Angles (J. & P. Ada)
Saison 2001	26/03, L'Ile-d'Olonne (D. Des)	2 ^e décade d'octobre, baie de l'Aiguillon
Saison 2002	17/03, le Cul de Truie, Noirmoutier-en-l'Ile (M. Vas)	

Une donnée le 15/12/00 à Noirmoutier (E. Gas), donnée la plus tardive du fichier.

BERGERONNETTE FLAVÉOLE (*Motacilla flava flavissima*)**2000-2001 : 5/4****2001-2002 : 8**

Migratrice, de passage en Vendée en très petit nombre, surtout en avril, observée également lors de la migration postnuptiale.

BERGERONNETTE NORDIQUE (*Motacilla flava thunbergi*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 0**

Sous-espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006.

De passage occasionnel en Vendée, niche de la Norvège au nord de la Sibérie. Hiverné en Afrique sub-saharienne.

Une observation de 2 individus le 12/09/00 au Gois à Barbâtre (M. Vas).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)**2000-2001 : 58****2001-2002 : 66**

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Nicheuse peu abondante le long des cours d'eau et de certains plans d'eau.

La migration observée en octobre à la pointe de l'Aiguillon concerne des oiseaux isolés ou en très petits groupes épars.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)**2000-2001 : 238****2001-2002 : 319**

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Observée couramment sur tout le département.

La migration a lieu en octobre, les bandes de bergeronnettes en formations éparses, d'importance moyenne de quelques dizaines d'individus sont souvent mélangées à d'autres migrateurs.

Un dortoir de 2 000 ind. est signalé au port de Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire (O. Poi).

BERGERONNETTE DE YARRELL (*Motacilla alba yarrellii*)**2000-2001 : 20****2001-2002 : 28**

Hivernante, migratrice.

Présente régulièrement en Vendée d'octobre à mars.

Un indice de reproduction probable a été signalé dans la 2^e décade de mai à Port-la-Roche, en limite de la Vendée et de la Loire-Atlantique (S. Ree).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	11/10, corniche de Sion, St-Hilaire-de-Riez (G. Bes)	02/03, Fontenay-le-Comte (J. Gon)
Hiver 2001-2002	08/11, quartier de la Garenne, La Roche-sur-Yon (S. Bon)	19/04, la Coupelasse, Bouin (W. Mai)

DU TROGLODYTE MIGNON AUX TURDIDÉS (Bernard ROUSSEAU)

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*)

2000-2001 : 278

2001-2002 : 343

Sédentaire.

Présent et commun en toute saison dans le département. Nicheur partout.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*)

2000-2001 : 175

2001-2002 : 213

Sédentaire.

Présent et commun en toute saison.

Le plus souvent observé au sol, en couple, il se reproduit dans tout le département.

ROUGEGORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*)

2000-2001 : 329

2001-2002 : 399

Nicheur dans tout le département. Hivernant.

Effectifs plus importants de novembre à février, suite à l'arrivée de migrants venus des pays nordiques.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*)

2000-2001 : 86

2001-2002 : 80

Nicheur et migrateur.

Présent de fin mars à septembre, commun dans les haies, dans tout le département. Très repérable au printemps grâce à son chant, mais très discret ensuite.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2001	05/03, la Brunetière, Château-Guibert (B.Rob)	31/08, station d'épuration, Velluire (J.Gon)
Saison 2002	27/03, marais de Noailles, La Couture (J.&P.Ada)	02/06, Venansault (F.Por)

GORGEBLEUE À MIROIR (*Luscinia svecica*)

2000-2001 : 24

2001-2002 : 41

Nicheuse et migratrice.

Elle est présente et se reproduit dans tous les marais côtiers : Marais breton, Marais poitevin, Jard-sur-Mer, Noirmoutier, Les Sables-d'Olonne. Absente de l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		17/09, pointe de l'Aiguillon (M.Gai & N.Jea)
Saison 2001	09/03, la Rente, La Barre-de-Monts (F.Sig) 09/03, pointe de l'Aiguillon (J. & P.Ada)	17/10, réserve de Chanteloup, L'Île-d'Olonne (ONCFS)
Saison 2002	12/03, pointe de l'Aiguillon (J. & P.Ada)	

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*)

2000-2001 : 139

2001-2002 : 147

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Souvent observé seul ou en couple, il est nicheur dans tout le département : plages, côtes rocheuses, vieux villages, agglomérations. Souvent sur les toits.

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*)

2000-2001 : 12

2001-2002 : 31

Nicheur rare, migrateur.

Observé régulièrement en Vendée en migration prénuptiale et postnuptiale.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		19/10, lycée des Etablières, La Roche-sur-Yon (S.Bon)
Migr. prénuptiale 2001	24/04, Le Fenouiller (G.Bes)	15/06, marais de Ste-Christine, Benet (LPO85)
Migr. postnuptiale 2001	10/09, Grotte de Belle Maison, L'Ile-d'Yeu (F.Por)	25/10, communal de Baude, Montreuil (F.Por)
Migr. prénuptiale 2002	24/03, Luzéronde, Noirmoutier (M.Vas)	Dernière décade de juillet, forêt de Mervent (D.Bro)
Migr. postnuptiale 2002	30/08, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Ile (D.Des)	

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*)

2000-2001 : 35

2001-2002 : 55

Migrateur, nicheur rare.

Observé en migration prénuptiale (avril-mai-juin) ou postnuptiale (août-septembre), également nicheur dans les marais (indices certains à Saint-Hilaire-de-Riez et au Poiré-sur-Velluire pour cette période).

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		10/11, L'Aiguillon-sur-Mer (J. & P.Ada)*
Saison 2001	01/04, pointe de l'Aiguillon (J. & P.Ada)	27/10, la Paracou, Les Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 2002	01/04, chenal Vieux, Triaize (F.Por)	

* date la plus tardive du fichier LPO

TARIER PÂTRE (*Saxicola torquata*)

2000-2001 : 143

2001-2002 : 245

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Présent toute l'année sur l'ensemble du département. Les données de reproduction concernent surtout les marais, mais il se reproduit également dans le bocage où des couples sont présents toute l'année.



Traquet motteux Oenanthe oenanthe (photo Matthieu Vaslin)

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*)

2000-2001 : 62

2001-2002 : 80

Nicheur rare, migrateur.

Régulièrement observé au cours de la migration pré ou postnuptiale sur la frange côtière, plus rarement dans le bocage.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		24/10, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)
Saison 2001	12/03, la Paracou, Les Sables-d'Olonne (D.Des)	17/11, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)
Saison 2002	09/03, les Terres, Beauvoir-sur-Mer (M.Vas)	

Une donnée hivernale le 31/12/00 à Bouin (F.Sig).

MERLE À PLASTRON (*Turdus torcatus*)

2000-2001 : 1/1

2001-2002 : 5/4

Migrateur.

Quelques données chaque année.

	Première observation	Dernière observation
Migr. pré-nuptiale 2001	1 seule observation de 2 ind. en vol le 24/04, la Paracou, Les Sables-d'Olonne (D.Des)	
Migr. postnuptiale 2001	21/09, marais Guilloteau, Jard-sur-Mer (F.Sal)	02/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. pointe)
Migr. pré-nuptiale 2002	16/03, La Châtaigneraie (M-O.Bou)	08/04/, marais de la Vie, Saint-Hilaire-de-Riez (G.Bes)

MERLE NOIR (*Turdus merula*)

2000-2001 : 364

2001-2002 : 422

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Il se reproduit dans tout le département où on le trouve toute l'année.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)

2000-2001 : 9

2001-2002 : 27

Migratrice et hivernante.

Présente le plus souvent en groupes assez importants (plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'ind.) Peut se rencontrer dans tout le département.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	Deuxième décade de décembre, Mouzeuil-St-Martin	01/04, la Touche, Le Poiré-sur-Vie (T.You)
Hiver 2001-2002	04/11, le Haut-Salin, Notre-Dame-de-Riez (B.Isa)	27/03, communal Nalliers (C.Gon)

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)

2000-2001 : 183

2001-2002 : 224

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Elle est observée en toute saison dans tout le département.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)

2000-2001 : 18

2001-2002 : 59

Hivernante et migratrice.

Présente en hivernage partout dans le département.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	Dernière décade d'octobre, Luçon	Dernière décade d'avril
Hiver 2001-2002	Deuxième décade d'octobre, Les Landes-Génusson	23/03, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île (D.Des)

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*)**2000-2001 : 80
2001-2002 : 103**

Nicheuse, hivernante, migratrice partielle.

Elle est observée toute l'année et se reproduit dans l'ensemble du département.

DE LA BOUSCARLE DE CETTI AUX MÉSANGES (Didier DESMOTS)**BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*)****2000-2001 : 47
2001-2002 : 86**

Nicheuse et migratrice partielle.

Présente sur l'ensemble du département, toujours dans les zones humides, et avec une majorité d'observations en provenance du littoral. Le nombre de données est relativement stable depuis quelques années.

L'espèce est notée sur tous les mois de l'année, des indices de reproduction ne sont obtenus que sur l'île d'Yeu, en juin 2001, où l'espèce est notée abondante. Ce qualificatif est également utilisé fin mars 2001 au niveau des anciens jardins dunaires enfrichés des dunes de la Paracou (Les Sables-d'Olonne), inondés cette année là et donc particulièrement favorable à la Bouscarle.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*)**2000-2001 : 82
2001-2002 : 116**

Nicheuse et migratrice partielle.

La Cisticole poursuit son retour dans le département : le nombre d'observations croît de façon importante, concernant la plupart des communes du littoral, et le nombre de sites recolonisés dans les terres s'accroît également. Au printemps 2001, 6 communes sont concernées (Bazoges-en-Pareds, Chantonnay, La Couture, Mouzeuil-Saint-Martin, Saint-Georges-de-Montaigu et Vix), puis 11 communes "continentales" au printemps 2002. Sur l'île d'Yeu, le retour n'est pas encore d'actualité et seule la dispersion postnuptiale 2000 permet d'obtenir des contacts avec un individu au Marais de la Guerche les 5 et 6/09/00 (X. & M-P.Hin).

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*)**2000-2001 : 7/7
2001-2002 : 9/6**Espèce soumise à homologation départementale jusqu'au 1^{er} janvier 2006.

Migratrice.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		-
Migr. prénuptiale 2001	23/04, dunes de la Gachère, Brétignolles-sur-Mer (F.Por)	12/05, dunes de la Grande Côte, La-Barre-de-Monts (J-P.Pai & M.Vas)
Migr. postnuptiale 2001	Une seule observation : 18/08, lagune de la Belle-Henriette, La-Faute-sur-Mer (M.Vas, C.Gon & F.Sig)	
Migr. prénuptiale 2002	08/04, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île (D.Des)	24/04, la Millarge, Vouvant (D.Bro)
Migr. postnuptiale 2002	06/08, étang de Mort à l'âne, Talmont-Saint-Hilaire (M.Bib)	

Sensible augmentation du nombre de données, liée certainement à une plus grande attention de la part des observateurs. L'espèce est ainsi notée sur tous les passages migratoires (hormis le postnuptial 2000). Des indices de nidification possible sont obtenus en forêt de Mervent : 1 à 2 chanteurs les 19 et 28/06/01 (D.Bro) et en forêt de Monts : 1 chanteur le 01/07/01 (S.Bon). La reproduction dans notre département reste toutefois à prouver !

Observations acceptées par le CHD.

LOCUSTELLE LUSCINOÏDE (*Locustella luscinioides*)**2000-2001 : 3/2
2001-2002 : 0**Espèce soumise à homologation départementale (seulement hors des sites de nidification à partir du 1^{er} janvier 2006).

Migratrice.

Deux à trois chanteurs sont contactés les 4 et 12/07/01 sur la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer (J.Gon, F.Sem, A.Tho). Un autre individu est capturé sur ce même site le 18/08/01 (M.Vas, C.Gon, J.Gon & F.Sig). L'espèce reste d'une grande rareté en Vendée.

Observations acceptées par le CHD.

PHRAGMITE AQUATIQUE (*Acrocephalus paludicola*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 3/3**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur rare, essentiellement au passage postnuptial.

Originaire de l'est de l'Allemagne et de la Hongrie à l'est de la Russie d'Europe et au nord de l'Ukraine.

Deux années consécutives avec des observations de Phragmite aquatique au passage postnuptial, c'est inhabituel... Les dates, lieux et effectifs concernés restent cependant très classiques : un seul individu à chaque fois, sur la lagune de la Belle-Henriette (09/08/01 et 07/08/02, F.Por ; 19/08/02, J.Gon & M.Vas) et sur la station d'épuration de Luçon (17/08/02, M.Bib).

Observations acceptées par le CHD.

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*)**2000-2001 : 10****2001-2002 : 20**

Migrateur et nicheur localisé dans certaines zones humides.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		22/10, station d'épuration, La Tranche-sur-Mer (M.Bib)*
Saison 2001	10/04, mare des Agaures, Les-Sables-d'Olonne (D.Des)	27/09, lagune de la Belle-Henriette, La-Faute-sur-Mer (Eq.Pointe)
Saison 2002	31/03, marais du Plumet, Jard-sur-Mer (F.Por)	

* donnée la plus tardive enregistrée au fichier.

Les observations concernent essentiellement des migrants. Seules les observations de l'île de Charrouin à Vix (un couple le 23/05/02 et deux couples le 20/06/02, C.Gon) peuvent concerner des nicheurs potentiels... Le statut du Phragmite des joncs en Vendée reste donc à définir plus précisément !

ROUSSEROLLE DES BUISSONS (*Acrocephalus dumetorum*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation nationale.

Migratrice occasionnelle.

Nord-est de l'Europe, Sibérie, Asie centrale

Première observation de cette espèce en Vendée : 1ad. le 14/11/00 au phare de l'Armandèche, Les-Sables-d'Olonne (A.Bar & D.Des). Cette donnée est à resituer dans un contexte très particulier : quatre observations de Rousserolle des buissons ont été réalisées en France au cours de cet automne 2000, ce qui est peut-être lié à une année de reproduction exceptionnelle pour cette espèce en Finlande (R. Jordan *in litt.*).

Observation acceptée par le CHN (*Ornithos* 9-1).**ROUSSEROLLE VERDEROLLE (*Acrocephalus palustris*)****2000-2001 : 0****2001-2002 : 0**

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice occasionnelle, est de la France.

Pas de données homologuées pour la période...

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)**2000-2001 : 47****2001-2002 : 67**

Migratrice et nicheuse sur tout le département. Notée également à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		07/10, digue de la Jabrée, Saint-Michel-en-l'Herm (J.Gon)
Saison 2001	23/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Gri)	06/11, La Roche-sur-Yon (F.Pic)
Saison 2002	05/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.Pav)	

Il faut noter que les observations d'octobre voire novembre sont désormais plus régulières, illustration de l'amorce d'une meilleure prospection des passereaux migrateurs dans notre département en cette saison.
Peu d'informations sur la reproduction.

ROUSSEROLLE TURDOÏDE (*Acrocephalus arundinaceus*)

2000-2001 : 4/4

2001-2002 : 2/2

Migratrice et nicheuse très localisée.

En dehors du site traditionnel du Perrier, où un maximum de 3 chanteurs est noté en 2001 (G.Bes) et de 2 chanteurs en 2002 (G.Bes), la Rousserolle turdoïde est également contactée le 01/06/01 avec 1 chanteur à Olonne-sur-Mer (M.Fou) et le 19/06/01 avec 2 chanteurs à la Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer (P.Gra).

HYPOLAÏS ICTÉRINE (*Hippolais icterina*)

2000-2001 : 1/1

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice occasionnelle.

Une donnée pour chacune des deux périodes postnuptiales concernées :

- 2 ind. le 01/08/01 à la lagune de la Belle-Henriette, La-Faute-sur-Mer (F.Por)
- 1 juv. le 07/08/02, même lieu (F.Por).

La donnée de 2001 est la plus précoce enregistrée au fichier. Un effort de prospection plus soutenu en automne devrait permettre d'obtenir bien d'autres données...

Observations acceptées par le CHD.

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*)

2000-2001 : 46

2001-2002 : 52

Migratrice et nicheuse, présente sur tout le département.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		-
Saison 2001	12/04, la Maladrie, Palluau (F.Por)	28/09, pointe de l'Aiguillon (S.Vri)
Saison 2002	27/04, France, Mouzeuil-Saint-Martin (J-C.Lue)	

Quelques données de reproduction sont enregistrées pour cette espèce présente partout en Vendée, mais plus ou moins abondante. Sur l'île de Noirmoutier, par exemple, l'Hypolaïs n'est présente qu'au sud de l'île, essentiellement vers la Tresson et le polder de Sébastopol.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*)

2000-2001 : 5/4

2001-2002 : 16/4

Hivernante et nicheuse localisée.

Les données sont toutes obtenues sur le littoral (Château-d'Olonne, île d'Yeu, L'Aiguillon-sur-Mer, île de Noirmoutier et Bouin), et concernent principalement la période internuptiale, avec un maximum d'au moins 8 ind. le 04/09/00 sur la côte sauvage de l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin). Ce site fournit d'ailleurs quelques données en période de reproduction, mais une seule preuve de nidification est obtenue en Vendée, avec 1 couple et 2 juvéniles le 30/06/02 sur les landes d'Orbestier au Château-d'Olonne (B.VaM).

Des efforts sont à réaliser pour mieux appréhender le statut de cette espèce en Vendée.

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation départementale.

Migratrice occasionnelle, originaire du nord et de l'est de l'Europe, de Russie, du Moyen-Orient.

Pas de données homologuées pour la période...

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*)**2000-2001 : 76****2001-2002 : 89**

Migratrice et nicheuse.

Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		29/09, Ileau de Champclou, Olonne-sur-Mer (D.Des)
Saison 2001	25/03, 1 chanteur à L'Ile-d'Olonne (D.Des) et 1 chanteur à Venansault (F.Por)	20/10, phare de l'Armandèche, Les-Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 2002	31/03, 2 chanteurs à Jard-sur-Mer (F.Por) et 1 chanteur à Chasnaïs (D.God)	

Il y a curieusement bien peu de données tardives (dernière quinzaine d'octobre).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*)**2000-2001 : 41****2001-2002 : 45**

Migratrice et nicheuse.

Présente en migration et en nidification sur tout le département.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		20/09, pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe)
Saison 2001	13/04, forêt de Ste-Gemme-la-Plaine (J. & P.Ada)	26/10, pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe)
Saison 2002	01/05, la Grotte, Mervent (D.Bro)	

Les données de nidification obtenues au cours de la période traitée concernent essentiellement l'intérieur du département, avec tout de même des observations de nicheurs possibles sur l'île d'Yeu en 2001 et 2002 et à Olonne-sur-Mer en 2001. Pour cette espèce encore, les données de migration postnuptiale reflètent un manque d'intérêt pour les passereaux migrateurs et bien peu d'observations sont obtenues après la fin du mois de septembre...

FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)**2000-2001 : 161****2001-2002 : 204**

Migratrice, nicheuse et hivernante.

Présente dans tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

POUILLOT A GRANDS SOURCILS (*Phylloscopus inornatus*)**2000-2001 : 1/1****2001-2002 : 1/1**Espèce soumise à homologation nationale jusqu'au 1^{er} janvier 2006, et à homologation départementale au-delà de cette date.

Migrateur occasionnel.

Oiseau originaire de Sibérie septentrionale et orientale et d'Asie centrale.

La régularité de l'espèce en Vendée au passage postnuptial se révèle d'année en année. Les deux observations présentées ici correspondent parfaitement avec le pattern d'apparition du Pouillot à grands sourcils dans notre département, aussi bien en ce qui concerne les dates que les lieux :

- 1 ind. le 24/10/00 sur la mare des Agaures aux Sables-d'Olonne (M.Bib), 11^e individu pour ce site qui reste donc le plus favorable (ou le mieux prospecté !) ;
- 1 ind. le 27/10/01, Bourgenay, Talmont-Saint-Hilaire (A.Luc), site ayant déjà été fréquenté par un "PGS" en 1996.

Observations acceptées par le CHN (*Ornithos* 9-1 et 10-2).**POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*)****2000-2001 : 4/3****2001-2002 : 6/1**Espèce soumise à homologation départementale (seulement hors des sites de nidification à partir du 1^{er} janvier 2006).

Migrateur et nicheur localisé.

Les observations concernent uniquement la forêt de Mervent, où l'espèce est détectée au printemps 2001 et où 7 couples minimum sont recensés en 2002 (D.Bro).

L'absence de données en migration postnuptiale, notamment sur le littoral, est étonnante.

Observations acceptées par le CHD.

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*)**2000-2001 : 7/7****2001-2002 : 2/2**

Espèce soumise à homologation départementale (seulement hors des sites de nidification à partir du 1^{er} janvier 2006).
Migrateur et nicheur localisé.

L'automne 2000 permet d'obtenir l'une des trop rares données de l'espèce en migration postnuptiale : 1 ind. le 12/09/00 à Mouzeuil-Saint-Martin (J-C. Lue).

Deux observations au passage prénuptial 2001 :

- 1 ind. le 17/04 près du local LPO à La Roche-sur-Yon (!) (L.Gri & B.Rob)
- 1 ind. le 12/05 à la Grande Côte, La-Barre-de-Monts (J-P.Pai & M.Vas)

Une observation au passage prénuptial 2002 :

- 1 ind. le 12/04 à la pointe de l'Aiguillon (J.Pie)

Quant aux deux saisons de nidification 2001 et 2002, elles permettent de confirmer la présence de l'espèce en forêt de Mervent en période de reproduction (5 données en mai et juin, D.Bro et L.Gri).

Observations acceptées par le CHD.



Pouillot véloce Phylloscopus collybita (photo © Matthieu Vaslin)

POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*)**2000-2001 : 307****2001-2002 : 349**

Migrateur, nicheur et hivernant.

Commun partout en Vendée, y compris à l'île d'Yeu.

Noté sur l'ensemble du département, peu de faits marquants. Les mentions hivernales restent peu nombreuses.

Une seule observation attribuée à la sous-espèce nordique *abietinus* : 1 ind. capturé le 17/11/00 dans la dune de la Tresson à La Guérinière (M.Vas).

POUILLOT VELOCE "DE TYPE SIBERIEN"**(*Phylloscopus collybita tristis/fulvescens*)****2000-2001 : 0****2001-2002 : 1/1**

Espèce soumise à homologation nationale jusqu'au 1^{er} janvier 2006 et à homologation départementale au-delà de cette date.

Migrateur occasionnel.

Originaire de la Sibérie, de la Petchora et de l'Oural jusqu'au fleuve Ienisseï.

Un ind. le 28/12/01 à Olonne-sur-Mer (P.Yes) : une date et un lieu qui ne surprennent pas pour cette sous-espèce d'identification délicate...

Observation acceptée par le CHN (*Ornithos* 10-2).

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*)

2000-2001 : 47

2001-2002 : 47

Migrateur commun et nicheur très localisé.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		14/10, pointe de l'Aiguillon (J.&P.Ada)
Migr. prénuptiale 2001	21/03, étang de Beausoleil, La Bruffière (CPN Lolay)	24/04, Le Poiré-sur-Vie (A.Ger)
Migr. postnuptiale 2001	31/07, L'Ile-d'Olonne (D.Des)	28/10, mare des Agaures, Les-Sables-d'Olonne (D.Des)
Migr. prénuptiale 2002	24/03, Luzéronde, Noirmoutier-en-l'Ile (M.Vas)	16/05, capturé, Réserve Naturelle des marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Ile (M.Vas)
Migr. postnuptiale 2002	27/07, Mouzeuil-Saint-Martin (J-C.Lue)	

En dehors des très nombreuses observations en migration pré et postnuptiale, il faut noter le stationnement d'un chanteur du 24/04/01 au 07/06/01 en forêt de Grasla (L.Gri)¹⁰, ce qui constitue l'un des rares indices de nidification pour notre département (donnée acceptée par le CHD).

ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*)

2000-2001 : 55

2001-2002 : 61

Migrateur, nicheur, hivernant.

Présent sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

Les observations sont essentiellement réalisées en période internuptiale. Des nicheurs possibles sont signalés dans le secteur de la forêt de Mervent (D.Bro), à Saint-Michel-Mont-Mercure (B.Rou) et sur l'île d'Yeu (F.Por).

ROITELET TRIPLE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)

2000-2001 : 58

2001-2002 : 92

Migrateur, nicheur, hivernant.

Présent sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

Les observations sont essentiellement réalisées en période internuptiale, mais des indices de nidification possibles sont obtenus un peu partout sur le département, y compris sur l'île d'Yeu.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*)

2000-2001 : 40

2001-2002 : 44

Migrateur et nicheur.

Présent sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2000		30/09, mare des Agaures, Les-Sables-d'Olonne (D.Des)
Saison 2001	09/05, forêt de Grasla, Les Brouzils (L.Gri)	10/10, La Bretonnière (J.&P.Ada)
Saison 2002	06/05, Rocheservière (L.Gri)	

En période de nidification, aucun indice n'est obtenu à l'ouest d'une ligne reliant Rocheservière à Luçon... Des preuves de reproduction sont obtenues à Saint-Georges-de-Montaigu (J-P.Til), Vouvant (D.Bro), Mervent (D.Bro) et aux Magnils-Reigniers (S.Bar).

¹⁰ cf. GRILLET L. – 2002 – Le Pouillot fitis, nicheur possible en Vendée. *La Gorgebleue* 17-18 : 61.

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)**2000-2001 : 40****2001-2002 : 49**

Migrateur.

Observé essentiellement au passage postnuptial, principalement sur le littoral.

	Première observation	Dernière observation
Migr. postnuptiale 2000		09/10, mare des Agaures, Les-Sables-d'Olonne (D.Des)
Migr. prénuptiale 2001	Pas d'observation	
Migr. postnuptiale 2001	26/07, dunes de la Gachère, Brétignolles-sur-Mer (F.Por)	18/10, bois de la Clère, Noirmoutier-en-l'Île (D.Des) et dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.Bes)
Migr. prénuptiale 2002	Pas d'observation	
Migr. postnuptiale 2002	25/07, Venansault (F.Por)	

Une espèce bien suivie en migration postnuptiale, parfois abondante sur le littoral, mais toujours aussi rare en migration prénuptiale.

PANURE À MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*)**2000-2001 : 0****2001-2002 : 1/1**

Migratrice et hivernante.

A nouveau une seule observation sur deux années : 1 ind. le 28/10/01 sur la mare des Agaures aux Sables-d'Olonne (D.Des). L'espèce semble être de plus en plus rare dans notre département.

MÉSANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*)**2000-2001 : 133****2001-2002 : 153**

Nicheuse, hivernante et migratrice partielle.

Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

A noter : au moins 60 ind. le 17/12/00 à La Ferrière (F.Pic).

MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*)**2000-2001 : 37****2001-2002 : 31**

Hivernante et nicheuse localisée.

Les observations proviennent presque toutes de la moitié est du département, où un indice de nidification certaine est obtenu le 06/06/01 à Bourneau (D.Bro). Les deux seules mentions à l'ouest de la Vendée sont très intéressantes puisqu'elles concernent des nicheurs certains ou possibles :

- 1 chanteur le 18/03/01 sur les bords de l'Auzances à Vairé (D.Des),
- 1 famille en forêt d'Aizenay le 20/06/01 (A.Ger).

C'est deux données devraient nous encourager à rechercher davantage la "nonnette" dans les sites favorables proches du littoral...

MÉSANGE HUPPÉE (*Parus cristatus*)**2000-2001 : 9****2001-2002 : 10**

Nicheuse et hivernante.

En dehors du littoral où l'espèce est commune dans les forêts et bois de conifères, des indices de nidification possible sont obtenus à Bourneau, La Ferrière, L'Orbrerie, Rocheservière et Saint-Mars-la-Réorthie. Les preuves de nidification concernent trois communes de l'intérieur du département :

- le 21/03/01 dans le parc des Rochettes à Montaigu (J-P.Til),
- le 20/06/2001 en forêt d'Aizenay (A.Ger),
- le 08/07/2002 à Mervent (D.Bro).

Aucune donnée en provenance de l'île d'Yeu ou de l'île de Noirmoutier.

MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*)**2000-2001 : 12****2001-2002 : 49**

Migratrice et hivernante, sujette à des afflux plus ou moins importants.

	Première observation	Dernière observation
Hivernage 2000-2001	26/10, Rocheservière (L.Gri)	21/03, parc des Rochettes, Montaigu (J-P.Til)
Hivernage 2001-2002	15/10, Mervent (J. & P.Ada)	08/04, Saint-Julien-des-Landes (N.Dup)

Ces deux hivers fournissent un nombre d'observations supérieur aux trois précédents, mais n'ont pas été marqués par des afflux importants : les données concernent un effectif maximum de 3 oiseaux vus simultanément.

MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*)

2000-2001 : 285

2001-2002 : 325

Nicheuse et hivernante.

Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*)

2000-2001 : 323

2001-2002 : 385

Nicheuse et hivernante.

Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu.

DE LA SITELLE TORCHEPOT AUX BRUANTS (Théophane You)

SITELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*)

2000-2001 : 28

2001-2002 : 59

Sédentaire, observée dans tout le bocage, de préférence dans les grands parcs ou les forêts âgées. Observée sur le littoral, sur la carte de Saint-Hilaire-de-Riez, hors période de reproduction (G.Bes). Par contre deux observations en février et mars au Château-d'Olonne (D.Des), dont une donnée de deux oiseaux chanteurs permettrait de supposer une reproduction dans les forêts littorales.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*)

2000-2001 : 91

2001-2002 : 113

Sédentaire, commun dans l'ensemble du département, observé d'abord dans le bocage mais aussi dans les forêts littorales. Une donnée littorale en période de reproduction (2002) mais sans preuve de reproduction à La Barre-de-Monts (B.Isa). Même en période internuptiale, très peu de données littorales.

RÉMIZ PENDULINE (*Remiz pendulinus*)

2000-2001 : 2/2

2001-2002 : 2/2

Migratrice et hivernante rare.

Le site de la lagune de la Belle Henriette à La Faute-sur-Mer est le seul à fournir des données pour cette espèce qui est normalement observée aussi sur la mare des Agaures (Les Sables-d'Olonne) ou dans le bois des Bourbes à Olonne-sur-Mer. L'effectif maximum observé est de 10 individus le 18/11/00 (Eq. Pointe) mais le passage a très certainement été plus important. Pas d'hivernage signalé pour cette période. En revanche les deux données de 2001-2002 sont de décembre et février, ce qui tend à prouver l'hivernage d'une petite troupe d'oiseaux.

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*)

2000-2001 : 55

2001-2002 : 79

Migrateur et nicheur.

Présent dans l'ensemble du département (île d'Yeu comprise), dans les forêts et bois et notamment dans les peupleraies. Les dates d'arrivée des loriot en 2001 sont conformes aux données antérieures (mi-avril), par contre en 2002 les arrivées sont très précoces puisque deux individus sont observés fin mars et début avril par deux observateurs différents. Ces observations sont les données les plus hâtives de la base (réchauffement climatique ?, ce n'est pas sûr car ensuite toutes les autres observations rentrent dans les normes).

	Première observation	Dernière observation
Saison 2001	21/04, La Roche-sur-Yon et Le Poiré-sur-Vie (F.Sem)	21/08, Vix (C.Gon)
Saison 2002	31/03, Benet (F-M.Pel) ; 01/04, Chantonay (B.Per)	23/08, Les Landes-Génusson (L.Gri)

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*)

2000-2001 : 29

2001-2002 : 20

Migratrice et nicheuse.

Présente dans l'ensemble du bocage de façon localisée, et dans le sud Vendée.

Pas d'observations en septembre ces deux années. Des effectifs assez faibles comme en 1999 et 2000.

	Première observation	Dernière observation
Saison 2001	20/04, Le Poiré-sur-Vie (F. Sem)	31/08, L'Île-d'Elle (J. Gon)
Saison 2002	20/05, Réaumur (S. Bar)	

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale

Espèce du Nord et de l'Est de l'Europe, occasionnelle dans le département.

Une donnée dans les périodes habituelles de migration, le 10/10/01 dans le marais de Jard-sur-Mer (F.Sal). Donnée homologuée.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (*Lanius senator*)

2000-2001 : 4/3

2001-2002 : 3/3

Migratrice, nicheuse rare.

Pour cette période les seules données proviennent d'individus en migration sur la côte, comme pour la période précédente:

- 1 mâle adulte le 05/05/01 sur le rocher de la Dive à L'Aiguillon-sur-Mer (C.Dra),
- 1 mâle le 27/05/01 dans les dunes du Jaunay à Brétignolles-sur-Mer (F.Por),
- 1 juv. du 28 au 31/08/01 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.Gon),
- 1 juv. le 06/09/01 à la pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe),
- 1 juv. le 19/08/02 sur la Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg à Noirmoutier (D.Desj)
- 1 juv. le 23/08/02 sur la base de loisirs de Luçon (C.Dra).

GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*)

2000-2001 : 171

2001-2002 : 221

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Commun dans l'ensemble du département, une observation d'un individu de passage au mois de septembre 2000 sur l'île d'Yeu (X. Hin).

PIE BAVARDE (*Pica pica*)

2000-2001 : 296

2001-2002 : 400

Sédentaire, commune dans l'ensemble du département, même sur l'île d'Yeu.

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*)

2000-2001 : 233

2001-2002 : 239

Sédentaire, commun dans l'ensemble du département, pas d'observation sur l'île d'Yeu.

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)**2000-2001 : 203****2001-2002 : 209**

Nicheur grégaire et hivernant, commun localement dans le département (pas de donnée à l'île d'Yeu, rare sur l'île de Noirmoutier).



Corbeau freux Corvus frugilegus (photo © Matthieu Vaslin)

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*)**2000-2001 : 380****2001-2002 : 446**

Sédentaire, commune dans l'ensemble du département.

Un rassemblement d'environ 50 individus en février 2002 à Saint-Urbain (B.Isa).

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*)**2000-2001 : 339****2001-2002 : 425**

Nicheur, migrateur et hivernant, présent dans l'ensemble du département.

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*)**2000-2001 : 343****2001-2002 : 382**

Sédentaire, commun dans tout le département, observé le plus souvent en zone urbaine et dans les villages.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*)**2000-2001 : 75****2001-2002 : 89**

Sédentaire, noté de préférence à l'intérieur des terres et bien présent dans le sud-Vendée, curieusement pas d'indices de présence sur les cartes littorales.

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*)**2000-2001 : 4/3****2001-2002 : 6/4**

Moineau méditerranéen sédentaire, en limite d'aire de répartition dans notre département.

Les sites habituels de reproduction se maintiennent (Benet, Saint Hilaire des Loges, Fontenay le comte,...).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*)**2000-2001 : 342****2001-2002 : 428**

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Une des espèces nicheuses les plus communes du département.

TISSERIN SP.

2000-2001 : 0
2001-2002 : 1/1

Espèce échappée de captivité se mêlant aux fringilles dans leur migration.
 Observé le 6/09/01 à la pointe de l'Aiguillon après deux saisons d'absence.

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)

2000-2001 : 5
2001-2002 : 21

Migrateur et hivernant, observé en migration active à la pointe de l'Aiguillon parmi les troupes de pinsons des arbres. La saison 2000-2001 n'a pas été favorable à cette espèce avec seulement 5 données dont une en migration, et des effectifs de l'ordre de l'unité. Par contre en 2001-2002 une belle migration est notée, ainsi que l'observation la plus précoce qui devance d'un jour l'ancien record. L'hivernage reste modeste, quelques individus ça et là et un groupe de 20 à 30 oiseaux à Mouzeuil-Saint-Martin (C. Dra).

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	Dernière décade d'octobre, baie de l'Aiguillon	13/03, 1 ind., Château-d'Olonne (D.Des)
Hiver 2001-2002	09/10, Noirmoutier (D.Des)	16/03, La Châtaigneraie (M-O.Boul)

SERIN CINI (*Serinus serinus*)

2000-2001 : 57
2001-2002 : 57

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.
 Les données au mois de janvier sont rares. La reproduction est plus importante sur le littoral et dans les bourgs.

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*)

2000-2001 : 232
2001-2002 : 319

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.
 Hivernant abondant et nicheur dans tout le département.

CHARDONNET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)

2000-2001 : 272
2001-2002 : 313

Nicheur commun, hivernant et migrateur.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)

2000-2001 : 18
2001-2002 : 45

Migrateur et hivernant en nombre irrégulier.
 Pas de gros hivernage, bien que la saison 2001-2002 soit plus importante que la précédente.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	12/10, Barbâtre (M. Vas)	23/02, Olonne-sur-Mer (D.Des)
Hiver 2001-2002	03/10, Noirmoutier (D. Des)	31/03, Ile d'Olonne (D.Des)

LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*)

2000-2001 : 96
2001-2002 : 157

Nicheuse, migratrice, hivernante.
 Quelques données de reproduction mais surtout observée en migration et en hivernage.

SIZERIN FLAMME / CABARET (*Carduelis flammea / cabaret*)

2000-2001 : 0
2001-2002 : 2/2

Espèce soumise à homologation départementale.
 Originaire du Massif Alpin, du Nord de l'Europe, de Sibérie, migrateur et hivernant rare dans le département.
 Se mêlent aux bandes de fringilles, surtout tarins des aulnes.

Deux observations pour la saison 2001-2002, une à la pointe de l'Aiguillon, de 2 individus le 18/10/01 (M. Vas & F.Sig), où il doit être régulier mais n'est pas noté car sa détermination nécessite une oreille aguerrie.
Une autre observation plus surprenante par sa localité, Venansault le 11/11/01 (F.Por), mais qui montre bien que l'oiseau peut être observé dans tout le département lorsque l'on connaît parfaitement son cri.

BEC-CROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)

2000-2001 : 3/3

2001-2002 : 21

Nicheur rare, migrateur, "hivernant".

Les nombreux oiseaux de la période 2001-2002 (plus de 100) proviennent d'une première invasion commençant en août 2001, entraînant une reproduction possible en janvier-février sur l'île de Noirmoutier. Puis une seconde vague beaucoup plus importante en août 2002 avec de nombreux groupes de 10 oiseaux et certains de plusieurs dizaines dont un de 40 ind. sur l'île d'Yeu (X. & M-P.Hin).

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*)

2000-2001 : 20

2001-2002 : 22

Nicheur devenu rare. Aujourd'hui essentiellement hivernant et migrateur.

Espèce nicheuse rare, sauf à l'île d'Yeu, à rechercher dans tous les boisements humides au mois de juin pour confirmer sa reproduction.

GROSBEC CASSENOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*)

2000-2001 : 19

2001-2002 : 3/3

Nicheur rare, migrateur, hivernant.

Une belle invasion hivernale pour l'hiver 2000-2001, où les grosbecs ont pu être observés un peu partout dans le département, de préférence dans les parcs mais aussi parfois sur les mangeoires de certains chanceux, comme au Relais Pleine Nature de la Chevalerie à La Roche-sur-Yon (S.Cha.).

Reproduction certaine dans le massif forestier de Mervent et dans les bois alentours.

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*)

2000-2001 : 8/6 ou 7

2001-2002 : 2/2

Migrateur, hivernant rare mais régulier, se nourrissant sur les plages.

L'hiver 2000-2001 fait partie des années moyennes avec 12 individus au moins observés plutôt à l'automne. En revanche la saison 2001-2002 est une des périodes les moins bonnes avec uniquement 2 observations et 3 individus.

	Première observation	Dernière observation
Hiver 2000-2001	03/10, La Guérinière (LPO)	28/12, Barbâtre (M. Vas)
Hiver 2001-2002*	14/10, digue du Dain, Bouin (B.Isa <i>et al.</i>)	02/02, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (J.Vim)

* seulement 2 données

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*)

2000-2001 : 43

2001-2002 : 66

Nicheur, hivernant, migrateur partiel. Observé dans tout le département hormis l'île d'Yeu.

Pas de grands rassemblements hivernaux pour cette période.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirrus*)

2000-2001 : 60

2001-2002 : 67

Nicheur, hivernant, migrateur partiel.

Observé dans tout le département (île d'Yeu comprise mais pas de données dans cette période).

BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*)

2000-2001 : 0

2001-2002 : 1/1

Espèce soumise à homologation départementale.

Oiseau scandinave et sibérien, hivernant dans le nord de l'Europe.

Hivernant très rare, se nourrissant sur les chaumes.

Les champs de pommes de terre de Noirmoutier sont une nouvelle fois le lieu de plusieurs observations : 2 mâles adultes sont notés du 12/11 au 07/12/01 (M.Vas, J-P.Pai & B.Per).

BRUANT FOU (*Emberiza cia*)

2000-2001 : 2/1 ou 2

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation départementale.

Originaire de l'Europe Centrale et Méridionale, occasionnel dans le département.

Hivernant rare, pouvant être observé dans tout le département.

Deux observations de fin de printemps provenant du Haut-Bocage où il est peut-être plus régulier que l'on ne le croit du fait du manque d'observateurs (31/03 & 14/04, J-P.Nat).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*)

2000-2001 : 6/4

2001-2002 : 0

Espèce soumise à homologation départementale.

Migrateur et nicheur occasionnel.

Une année avec de nombreux individus observés surtout sur l'île d'Yeu, avec au moins 12 sujets les 04 et 05/09/00 (X. & M-P.Hin). 3 ind. le 30/08/01 à Saint-Michel-en-l'Herm (J.Gon). En revanche, l'année suivante est "blanche".

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*)

2000-2001 : 64

2001-2002 : 95

Nicheur, migrateur partiel, hivernant.

Nicheur autour des étangs du bocage et dans les marais.



Bruant proyer Miliaria calandra (photo © Matthieu Vaslin)

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*)

2000-2001 : 72

2001-2002 : 77

Nicheur commun dans les marais et la plaine (beaucoup plus rare ailleurs), hivernant rare et localisé, migrateur.

Deux données en période hivernale dans le sud Vendée : le 26/11/01 à Chasnaïs (D.God) et le 12/02/01 à Mouzeuil-Saint-Martin (J-C.Lue). Sinon, peu d'informations sur cette espèce commune dans le sud Vendée et en Marais breton mais plus rare ailleurs. Un mâle chanteur observé au Château-d'Olonne, les deux années (D. Des).