

Les oiseaux rares et accidentels en Vendée en 2002 et 2003

Deuxième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen

Julien GONIN, Xavier HINDERMEYER, Frédéric PORTIER & le CHD 85

INTRODUCTION

Voici le deuxième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen. Il porte sur les années 2002 et 2003. Pour ces deux années 185 fiches nous sont parvenues (106 fiches pour 2002 et 79 fiches pour 2003) et ont été examinées. Le taux d'acceptation est de 92% (89% pour 2002 et 97% pour 2003). Quelques fiches en retard de 2001 nous sont également parvenues.

Pour les années 2002 et 2003, le Comité se composait des neuf membres suivants : Michel Bibard, Didier Brossard, Christian Gonin, Julien Gonin (secrétaire), Lucien Grillet, Xavier Hindermeyer, Frédéric Portier, Matthieu Vaslin et Théophile You.

DÉCISIONS DU CHD

Secrétariat et composition du CHD

Depuis le mois d'avril 2005, Julien Gonin a cédé la place de secrétaire du CHD à Xavier Hindermeyer. Lucien Grillet et Théophile You ont quitté le CHD en février 2006. Il a été décidé de faire désormais fonctionner le CHD avec 7 membres seulement.

Espèces soumises à homologation départementale

Le Comité d'Homologation National (CHN) a révisé récemment la liste des espèces soumises à homologation nationale (CROUZIER & LE CHN 2006). Ainsi, seize taxons ont été supprimés de la liste et ne sont donc plus soumis à homologation nationale : Bernache (cravant) du Pacifique *Branta bernicla nigricans*, Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, Faucon crécerellette *Falco naumanni*, Faucon d'Éléonore *Falco eleonora*, Marouette poussin *Porzana parva*, Talève sultane *Porphyrio porphyrio* (sous-espèce type), Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, Goéland railleur *Larus genei*, Goéland d'Audouin *Larus*

audouinii, Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, Pipit de Richard *Anthus richardi*, Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*, Pouillot (véloce) de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* (et Pouillot véloce de type sibérien), Gobemouche nain *Ficedula parva*, Etourneau unicolore *Sturnus unicolor*. Cette décision a pris effet au 1^{er} janvier 2006.

Les données concernant ces espèces sont désormais collectées par le Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR) et, lorsqu'ils existent, les comités d'homologation régionaux et départementaux.

A l'inverse, un taxon a été ajouté à la liste nationale et est donc à homologuer depuis le 1^{er} janvier 2006, l'Oie des moissons de la taïga *Anser fabalis fabalis*.

Le CHD a donc décidé d'intégrer ces seize taxons à la liste des espèces soumises à homologation en Vendée et de supprimer le nouveau taxon soumis à homologation nationale.

Après cinq années de fonctionnement, le CHD85 a décidé de profiter de cette occasion pour apporter d'autres modifications à la liste des espèces soumises à homologation départementale.

Ainsi, sont supprimés de la liste des espèces à homologuer : Puffin cendré *Calonectris diomedea*, Puffin des Anglais *Puffinus puffinus*, Puffin fuligineux *Puffinus griseus*, Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*, Harle bièvre *Mergus merganser*, Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*, Guêpier d'Europe *Merops apiaster*, Locustelle tachetée *Locustella naevia*. Pour le Traquet oreillard il est précisé que n'est soumise à homologation départementale que la sous-espèce *hispanica* qui n'est pas soumise à homologation nationale.

De même, sont supprimés de la liste des sous-espèces à homologuer : la Bergeronnette ibérique *Motacilla flava iberiae*, la Bergeronnette nordique *Motacilla flava thunbergi* et la Bergeronnette d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla*. Pour le

Traquet motteux du Groenland *Oenanthe oenanthe leucorhoa*, suite aux récentes publications qui indiquent l'impossibilité de reconnaître cette sous-espèce hors capture et mesure, il est décidé de n'homologuer que les oiseaux capturés et mesurés. Est ajouté un (3) signifiant "uniquement capturés et mesurés".

Il a également été décidé de ne plus soumettre à homologation certaines espèces sauf en dehors des sites de nidification. Pour ces espèces (Blongios nain *Ixobrychus minutus*, Râle des genêts *Crex crex*, Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides*, Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*, Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*), il est ajouté un (1) signifiant "hors sites de nidification".

Enfin sont ajoutés à la liste des espèces à homologuer l'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* (hors sites de nidification seulement) et le Goéland pontique *Larus cachinnans* (élevé récemment au rang d'espèce et non soumis à homologation nationale).

L'ensemble de ces modifications prend effet rétroactivement au 1^{er} janvier 2006.

Fiches d'homologation

Face aux importantes difficultés pour juger les fiches auditives, le CHD a décidé de ne plus homologuer les fiches seulement auditives (oiseau non vu) à partir du 1^{er} janvier 2006. Le critère auditif est cependant toujours important pour juger de la validité d'une fiche.

Il a également été décidé de ne plus homologuer les fiches sans description, fondées uniquement sur une ou plusieurs photos.

Le CHD rappelle que la fiche doit être rédigée le plus tôt possible après l'observation. Face au constat que certaines données ne sont pas transmises et dorment toujours dans des carnets, il lance un nouvel appel aux observateurs qui ne rédigent pas de fiches d'homologation. En effet, ces données ne seront pas reprises dans les synthèses départementales, régionales ou nationales (rapports du Comité de suivi des Migrateurs Rares), ce qui est fort regrettable eu égard au statut des espèces considérées.

Enfin, le CHD se félicite de la qualité croissante des fiches qui lui sont soumises et remercie l'ensemble des observateurs qui ont transmis des fiches.

La liste des espèces soumises à homologation départementale et le modèle de fiche d'homologation ont donc été modifiés et sont disponibles sur le site Internet de la LPO Vendée

(<http://vendee.lpo.fr/>, rubrique "communiquer vos observations") ou sur simple demande au secrétaire. Elles sont également jointes en annexe de cet article.

FAITS MARQUANTS

Les années 2002 et 2003 ont vu l'ajout d'une nouvelle espèce pour la Vendée, l'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* qui fournit sa première mention en 2002 et sa seconde mention en 2003. Le Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* fournit quant à lui sa seconde mention départementale en 2003 et le Martinet à ventre blanc *Apus melba* sa troisième mention en 2002.

Parmi les espèces notées à des dates inhabituelles, il faut mentionner un Faucon émerillon *Falco columbarius* début août 2002 et une Bergeronnette de Yarell *Motacilla alba yarrellii* en juin 2003.

Enfin, le Cygne de Bewick *Cygnus colombianus* fournit une nouvelle mention en 2003, après plus de 16 années d'absence.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données et celui des individus correspondants homologués depuis la création du CHD. Les quatre suivants représentent le nombre de données homologuées en 2002 et le nombre d'individus correspondant puis le nombre de données homologuées en 2003 et le nombre d'individus correspondant.
3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un seul individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Observateur(s), sauf exception limités à 3 (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe ou dessinateur).
9. Distribution générale de l'espèce et son statut en Vendée (entre parenthèses), puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste du Comité de l'Avifaune Française (CAF 1997).

Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la race concernée.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : **Martinet à ventre blanc** - 1 individu le 23 avril 2002, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée (B. Robin, in GONIN, HINDERMEYER, PORTIER & le CHD Vendée 2006).

* Espèce soumise au CHD hors de certaines zones géographiques.

** Espèce soumise au CHD pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

(0/0) (0/0 ; 5/6)

2003 – port / Les Sables-d'Olonne, ad., 23 février (A. Barzic) ; lagunage / Jard-sur-Mer, ad., 16 mars (F. Portier, G. Besseau, P. Rouillier) ; plage du Marais Salé / L'Ile-d'Yeu, 9 novembre (C. Couartou, X. Hindermeyer) ; pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 15 novembre (G. Barguil) ; plage des Ovais, des Iliaux et du Marais Salé / L'Ile-d'Yeu, minimum 2 ad., 30 et 31 décembre (M.-P. & X. Hindermeyer, C. Lanzani).

(Europe de l'Est. Migrateur et hivernant rare sur le littoral vendéen).

Après deux années "blanches", l'espèce est de nouveau observée sur le littoral vendéen en 2003 avec un record de 5 données pour au moins 6 oiseaux.

PUFFIN CENDRE *Calonectris diomedea*

(11/25) (13/45 ; 0)

2002 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 2 ind., 24 mai (M. Bibard), 11 juin (M. Bibard), 6 ind., 2 juillet (M. Bibard), 3 juillet (M. Bibard), 12 juillet (M. Bibard), minimum 20 ind., 1 août (M. Bibard), 2 ind., 9 août (M. Bibard) ; la Gachère / Brem-sur-Mer, 27 août (M. Bibard) ; île d'Yeu : pointe des Corbeaux, 6 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer), 2 ind., 8 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer), 6 ind., 11 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer), 13 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer) ; Port-Joinville, 13 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer).

(Iles méditerranéennes. La sous-espèce *borealis* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries, aux Açores et à Berlenga au large du Portugal. Migrateur peu commun mais régulier sur le littoral vendéen).

Deux années très contrastées pour cette espèce : une bonne année 2002 sur deux sites classiques de sea-watching mais aucune donnée en 2003. Cette situation, que l'on retrouve chez d'autres espèces d'oiseaux de mer, peut s'expliquer par l'augmentation importante de la température de l'eau de mer lors de la canicule de l'été 2003, ayant entraîné les oiseaux plus au nord.

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis*

(1/1) (3/30 ; 0)

2002 – en mer depuis le *Kifanlo*, minimum 26 ind., phot., 16 août (O. Penard, F. Jiguet *et al.*), 2 ind., phot., 8 septembre (M. Bibard *et al.*) ; pointe des Corbeaux / L'Ile-d'Yeu, 2 ind., 8 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer).

(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough. Migrateur très rare, observé seulement loin au large des côtes vendéennes).

La fin de l'été 2002 semble avoir été très favorable à l'observation de cette espèce pélagique dans les eaux vendéennes. Les deux observations depuis la côte sont également remarquables. Comme pour le Puffin cendré, et pour la même raison, aucune donnée en 2003.

PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus*

(2/3) (4/6 ; 1/1)

2002 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 2 août (M. Bibard) ; en mer depuis le *Kifanlo*, 3 ind., 16 août (O. Penard, F. Jiguet *et al.*), 8 septembre (M. Bibard *et al.*) ; pointe des Corbeaux / L'Ile-d'Yeu, 11 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer).

2003 - en mer depuis le *Kifanlo*, 2 août (B. Isaac *et al.*).

(Niche sur quelques îles au large de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes).

Comme pour les autres puffins, l'année 2002 est plutôt bonne alors que l'année 2003 n'enregistre qu'une observation d'un seul individu. La multiplication des séances de sea-watching en fin d'été et à l'automne devrait permettre de se faire une idée plus précise du statut de l'espèce dans les eaux vendéennes.

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus*

(6/8) (8/40 ; 1/2)

2002 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 7 ind., 26 avril (M. Bibard), 28 avril (M. Bibard), 4 ind., 30 avril (M. Bibard), 9 ind., 1^{er} mai (M. Bibard), 10 mai (M. Bibard), 12 ind., 23 mai (M. Bibard), 2 ind., 27 mai (M. Bibard) ; pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, 4 ind., 30 septembre (G. Bouteloup *et al.*).

2003 – Phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 2 ind., 30 avril (M. Bibard).

(Atlantique Nord. Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes).

Situation semblable à celle observée chez les autres puffins : une bonne année 2002 et une année 2003 presque vierge d'observation.

OCEANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa*

(3/4) (2/2 ; 1/1)

2002 – plage de la Barrique / La Faute-sur-Mer, affaiblie et blessée puis morte, juv., 25 janvier (F. Salmon *et al.*) ; baie de l'Aiguillon / Saint-Michel-en-l'Herm, 14 novembre (B. Perrotin).

2003 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 31 octobre (M. Bibard).

(Atlantique Nord. Migrateur et hivernant rare au large des côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de vent).

Quelques données classiques de passage post-nuptial et d'hiver pour cette espèce dont les apparitions sur la côte, parfois sous forme de cadavres, restent souvent liés à des conditions météorologiques perturbées.

CORMORAN HUPPE

Phalacrocorax aristotelis*

(1/1) (2/2 ; 1/1)

2002 – entre Baie de Cayola et Port Bourgenay / Talmont-Saint-Hilaire, imm., 15 juillet (M. Bibard) ; phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 1^{er} août (M. Bibard).

2003 – port / Jard-sur-Mer, ad., 25 janvier (A. Virondeau, R. Bussière).

(Atlantique. Niche en Vendée depuis 1999.

Migrateur et hivernant rare, excepté autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier où il est régulier).

Avec seulement une ou deux données par an, l'espèce est toujours aussi rare sur le littoral vendéen en dehors des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides*

(1/1) (2/2 ; 0)

2002 – lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, ad., 24 avril (P.-P. Evrard) ; lagunage / Luçon, phot., 7 août (F. Portier).

(Bassin méditerranéen, Dombes, Brenne, Grand Lieu. Migrateur rare en Vendée, hiverne en Afrique).

Si l'espèce est de nouveau présente en 2002, avec un individu noté lors de chaque passage, l'année 2003 est en revanche vierge d'observation.

CYGNE DE BEWICK *Cygnus colombianus*

(0/0) (0/0 ; 1/1)

2003 – lagunage de Bourgenay puis Mort à l'Ane / Talmont-Saint-Hilaire, H2, phot., 22 décembre 2003 au 3 janvier 2004 au moins (M. Bibard, F. Portier, Franck Salmon *et al.*).

(Sibérie arctique. Hiverne en Grande-Bretagne, nord de l'Europe et ponctuellement plus au sud. Hivernant très rare en Vendée).

Enfin une nouvelle donnée de Cygne de Bewick ! Cela faisait depuis mars 1987, soit plus de 16 ans, que l'espèce n'avait pas été observée en Vendée. L'oiseau est resté plus de 10 jours sur le site, ce qui a permis à de nombreux observateurs de venir le voir.



Cygne de Bewick (Cygnus colombianus), Talmont-Saint-Hilaire (photo Frédéric Portier).

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*

(2/2) (1/5 ; 0)

2002 – Noirmoutier-en-l'Île, 5 puis 1 ind., 27 octobre au 4 mars (E. Gas *et al.*).

(Islande, Scandinavie, Sibérie. Hiverne en Grande-Bretagne, nord et centre de l'Europe, mers Noire et Caspienne. Hivernant rare en Vendée).

L'afflux important d'oiseaux à la fin octobre 2002 sur les côtes bretonnes et la façade atlantique, faisant suite à de forts vents de nord-ouest, a donc également été ressenti en Vendée (ZUCCA & LE CMR 2005). De plus, 6 individus auraient également été observés sur l'île d'Yeu mais n'ont pas encore fait l'objet d'une fiche d'homologation.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

(0/0) (0/0 ; 2/2)

2003 – pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, 24 octobre (J. Gonin) ; communal / Le Poiré-sur-Velluire, ad. *rossicus*, 8 et 9 décembre (C. Gonin).

(Nord de la Norvège et Carélie jusqu'en péninsule de Kola pour *A. f. fabalis* et Sibérie pour *A. f. rossicus*. Migratrice et hivernante rare en Vendée).

Peu de données pour cette espèce qui est à rechercher, afin de préciser son statut, dans les sites favorables (notamment en baie de l'Aiguillon).

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

(3/4) (0/0 ; 2/5)

Individus montrant les caractéristiques de la sous espèce "hrota", appelée Bernache à ventre pâle.

2003 – plage de Sion-sur-l'Océan / Saint-Hilaire-de-Riez, 2 ad. et 2 juv., phot., 18 septembre (B. Isaac) ; le Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard, ad., 14 décembre 2003 au 18 février 2004 (F. Salmon, M. Bibard *et al.*).

(Groenland, Spitzberg. Hiverné en petit nombre en Grande-Bretagne et du Danemark à la côte normande).

Cette sous-espèce semble désormais régulière sur les côtes vendéennes, plusieurs individus étant présents chaque hiver.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(1/1) (1/1 ; 3/3)

2002 – lagunage / Jard-sur-Mer, mâle ad., phot., 15 décembre 2002 au 24 février 2003 (F. Salmon, F. Portier *et al.*).

2003 – lagunage / Jard-sur-Mer, fem. imm., 10 et 11 novembre (F. Portier, M. Bibard) ; étang du parc Soubise / Mouchamps, mâle ad., 26 janvier (M. Bibard) ; lagunage de la Salaisière /



Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*),
Jard-sur-Mer (photo Frédéric Portier).

Noirmoutier-en-l'Île, mâle ad., 29 et 30 décembre (M. Vaslin, D. Quinton).



Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*), Jard-sur-Mer (photo
Frédéric Portier)

(Niche en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et de façon localisée en Espagne. Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée).

Le lagunage de Jard-sur-Mer est à l'honneur pour ces deux hivers et constitue désormais un nouveau spot pour cette espèce. Celui de Noirmoutier est plus classique. L'apparition de ce fuligule demeure néanmoins rare et irrégulière en hiver dans notre département.

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

(2/4) (1/1 ; 1/2)

2002 – Marais Girard / Brétignolles-sur-Mer, fem., 12 et 13 janvier (P. Rouillier, G. Besseau).

2003 – étang des Cosses / Saint-Martin-des-Noyers, 2 fem., 23 février (M. Bibard).

(Groenland, Grande-Bretagne, Alpes, Europe du Nord, Scandinavie et Sibérie. Hivernant rare en Vendée).

Avec une donnée par hiver pour les deux années concernées, cette espèce reste occasionnelle dans notre département.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE

Haliaeetus albicilla

(1/1) (2/2 ; 1/1)

2002 – étang du parc Soubise / Mouchamps, H1, 27 janvier et 9 février (M. Bibard) ; lagunage puis Marais Guilloteau et les Grands Prés de la Grange / Jard-sur-Mer, H1, phot., 14 au 23 décembre (F. Salmon, F. Portier).

2003 – Port-Joinville / L'Île-d'Yeu, H1, 13 novembre (M. de Gabriel, G. Barguil).

(Moyen-Orient, Europe de l'Est, Scandinavie et Sibérie. Hivernant rare en Vendée).

La présence de cette espèce deux, voire trois hivers consécutifs en comptant 2001, est remarquable pour notre département occidental. Pour l'île d'Yeu, il

n'existait jusqu'à présent qu'une seule donnée connue d'un adulte observé durant l'hiver 1940-1941 (MENAGER 1971, HINDERMEYER & HINDERMEYER 2006).

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

(0/0) (1/1 ; 1/2)

2002 – digue des Wagons / Saint-Michel-en-l'Herm, mâle ad., 15 septembre (J.-C. & F. Bertrand).

2003 – communal / Les Magnils-Reigniers, 1 mâle imm. et 1 fem., 13 mai (F. Salmon).

(Niche de la Hongrie aux environs du fleuve Lena, en Russie, vers 120°Est. A niché avec succès en Vendée en 1993. Migrateur occasionnel aux deux passages).

Avec seulement une observation par an, l'espèce reste occasionnelle en Vendée aux deux passages. Une recherche plus attentive permettrait sans doute d'affiner ce statut.

FAUCON EMERILLON *Falco columbarius***

2002 – La Mothe-Achard, fem. imm. prob., **2 août** (M. Bibard).

(La sous-espèce nominale *F. c. aesalon* niche du nord de l'Europe à la Sibérie centrale et *F. c. subaeson* en Islande, aux Iles Féroé et au nord de la Grande-Bretagne. Hivernant régulier en Vendée).

Cette donnée post-nuptiale est remarquable par sa précocité.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana*

(7/9) (2/2 ; 5/5)

2002 – lagunage / Luçon, 3 août (M. Bibard) ; Marais Montporteau / Les Sables-d'Olonne, 22 août (M. Bibard).

2003 – le Pâtis / La Barre-de-Monts, ad., 24 avril (M. Vaslin) ; étang des Boucheries / Les Landes-Genusson, 15 août (S. Brin) ; lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 1 ad. au moins, 20 au 26 août (P. Granaud), 21 août (A. Barzic, J.-M. Lepage, A. Thomas *et al.*) ; Marais Montporteau / Les Sables-d'Olonne, 10 septembre (M. Bibard).

(Europe et Russie. Nicheuse rare en Vendée. Migratrice régulière observée surtout lors du passage post-nuptial).

Cette espèce discrète mérite d'être recherchée plus intensément notamment en août et septembre dans notre département.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus*

(2/3) (2/2 ; 0)

2002 – côte sauvage / L'Ile-d'Yeu, juv., 3, 5 et 6 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer) ; ad., 10 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer).

(Ecosse, Scandinavie, Sibérie. Nicheur rare et localisé en France. Migrateur rare mais régulier en Vendée aux deux passages).

L'île d'Yeu reste le site le plus favorable pour détecter cette espèce mythique et ce malgré des recherches intensives sur le continent mais peut-être pas sur les bons sites (à rechercher notamment à l'intérieur des terres).

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

(5/10) (7/13 ; 6/7)

2002 – base nautique / Luçon, ad., 27 avril (F. Salmon), 2 ad., 3 mai (F. Salmon), 3 ad., 6 mai (F. Salmon), 9 ad., 7 mai (F. Salmon), 5 ad., 8 mai (F. Salmon, M. Bibard), 13 ad., phot, 12 mai (C. Drapeau, X. Rosec) ; lagunage / Luçon, 3 ad., 7 mai (F. Salmon).

2003 – lagunage / Luçon, 2 ad., 25 avril (F. Salmon) ; les Tendes / La Barre-de-Monts, ad. nupt., 12 juillet (M. Vaslin) ; le Querry Margot / Notre-Dame-de-Monts, ad., 11 août (M. Vaslin, A. Servain) ; lac de Maché-Apremont, ad., 26 août (M. Vaslin), ad. internupt., 31 août (F. Portier) ; Bouin, 10 septembre (J. Gonin, C. Ravaut).

(Ecosse, Scandinavie et Sibérie. Migrateur rare en Vendée, le plus souvent en petit nombre, aux deux passages).

Les chiffres du printemps 2002 sont vraiment remarquables. Le nombre total de 13 individus, retenu dans cette synthèse, est un minimum et ne correspond sans doute pas au nombre réel d'oiseaux qui se sont succédés sur le site de Luçon entre le 27 avril et le 12 mai.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

(2/2) (2/2 ; 4/4)

2002 – lagunage / Luçon, 11 avril (J. Piette) ; lagunage puis base nautique / Luçon, ad., 27 avril (F. Salmon).

2003 – marais des Loirs / Olonne-sur-Mer, ad. internupt., 20 au 25 mars (A. Barzic) ; marais de la Rivière / L'Epine, ad., 23 et 24 avril (W. Raitière, R. Tapin, M. Vaslin) ; les Menotones / Beauvoir-sur-Mer, ad., 17 juillet (M. Vaslin, A. Servain) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 21 juillet au 11 septembre (M. Vaslin *et al.*).

(Europe de l'est, Russie. Migrateur rare mais régulier en Vendée aux deux passages).

Cette espèce affectionne les marais littoraux saumâtres ou salés de notre département. Les données sur les eaux douces demeurent exceptionnelles. A noter le stationnement prolongé de l'oiseau de Noirmoutier.



De gauche à droite : Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*, Chevalier gambette *Tringa totanus* et Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île (photo © Matthieu Vaslin)

PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus*
(2/2) (0/0 ; 1/1)

2001 – pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, H1, 8 septembre (G. Bouteloup, B. Perrotin, S. Bonifait).

2003 – lac de Maché-Apremont, H1, phot., 6 septembre (F. Maillot, B. Isaac, J.-M. Guilpain). (Irlande, Ecosse, Islande, Scandinavie, Sibérie. Migrateur occasionnel sur la côte Atlantique, plus commun en Méditerranée. Migrateur rare et irrégulier en Vendée, surtout au passage post-nuptial).

La donnée du lac de Maché est remarquable par sa situation. Une donnée en retard de 2001, plus classique, sur le littoral. L'espèce reste d'apparition occasionnelle dans notre département.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*
(2/2) (4/5 ; 0)

2002- phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, ad. prob., 26 mai (M. Bibard) ; la Gachère / Brem-sur-Mer, juv., 27 août (M. Bibard) ; pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, ad. et juv., 10 septembre (M.-P. & X. Hindermeier) ; phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, ad. ou subad., 16 octobre (M. Bibard). (Sibérie. Migrateur peu commun sur les côtes vendéennes).

Comme pour d'autres espèces d'oiseaux pélagiques, aucune donnée en 2003 pour ce Labbe d'habitude régulier, surtout lors du passage post-nuptial. Une donnée très intéressante d'un oiseau au passage pré-nuptial.

GOELAND BOURGMESTRE

Larus hyperboreus

(2/2) (0/0 ; 1/1)

2003 – plage du Tanchet / Les Sables-d'Olonne, H1, 24 février (A. Barzic).

(Arctique. Hiverné en Islande, Grande-Bretagne et Scandinavie. Quelques oiseaux hivernent localement sur la façade atlantique).

La commune des Sables-d'Olonne obtient une fois de plus le monopole des observations. A noter aussi l'année "blanche" de 2002.

STERNE HANSEL *Sterna nilotica*

(1/1) (1/1 ; 6/7)

2002 – plage de la Grande Côte / La Barre-de-Monts, 10 juillet (F. Picaud).

2003 – plage des Ovaires / L'Île-d'Yeu, 2 ad., 7 et 8 mars (M.-P. & X. Hindermeier) ; traversée Fromentine – île d'Yeu, ad, 4 avril (F. Portier) ; le

Luzan / Noirmoutier-en-l'île, E2 prob., 23 mai (D. Desmots, W. Raitière), ad., 30 mai (T. Hérault) ; station de lagunage / Noirmoutier-en-l'Île, 3 et 4 juin (W. Raitière, T. Hérault, R. Tapin) ; Réserve Naturelle / Saint-Denis-du-Payré, ad., 10 juin (J. Gonin, A. Thomas).

(Méditerranée et Danemark. Migratrice rare mais régulière en Vendée).

La donnée de 2002 n'est pas sans rappeler celle de 2001 par la date et la localisation (6 juillet à Barbâtre). L'année 2003, avec 6 individus, constitue un record. Toutes les données concernent des oiseaux en migration pré-nuptiale. A noter la donnée exceptionnellement précoce de l'île d'Yeu.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

(1/1) (1/1 ; 0)

2002 - lagune du Dain / Bouin, 19 mai (S. Reeber *et al.*).

(Grande-Bretagne et Bretagne. Migrateur occasionnel en Vendée).

Les données pré-nuptiales sont rares, l'espèce étant plutôt observée en fin d'été. Le site du Dain semble par ailleurs très attractif pour les sternes.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*
(1/1) (3/3 ; 0)

2002 – station de lagunage / La Tranche-sur-Mer, ad., 22 août (C. Drapeau, X. Rosec *et al.*) ; lagunage / Luçon, H1, 12 septembre (F. Salmon) ; marais salants / L'Ile-d'Olonne, ad., 21 septembre (D. Desmots).

(Europe de l'est, Moyen-Orient, Russie. Migrateur occasionnel dans l'ouest de l'Europe).

Année plutôt classique avec trois données concernant des oiseaux en migration post-nuptiale.

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*
(0/0) (0/0 ; 1/1)

2003 – pinède des Ovaires / L'Ile-d'Yeu, ad., 8 mars (M.-P. & X. Hindermeyer).

(Méditerranée. Migrateur ou nicheur rare sur la côte atlantique).

Une nouvelle donnée, classiquement sur le littoral, à une date un peu précoce pour le département mais correspondant totalement aux arrivées sur les côtes méditerranéennes françaises. A rapprocher de l'observation d'un individu le 5 mars 2003 sur l'île de Ré (F. Le Guillou, comm. pers).

MARTINET SP. *Apus sp.***

2002 – Bel Air de la Mouée / Chantonay, 23 décembre (D. Godreau).

Date exceptionnelle pour cette observation de Martinet. Dommage que l'oiseau n'ait pas été observé dans de meilleures conditions car les données tardives concernent souvent le Martinet pâle *Apus pallida*, jamais observé en Vendée jusqu'à présent.

MARTINET A VENTRE BLANC *Apus melba* (0/0)
(1/1 ; 0)

2002 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 23 avril (B. Robin).

(Méditerranée et massifs montagneux de France et d'Europe de l'est. Migrateur très rare sur la côte atlantique).

Observation exceptionnelle de cette espèce d'apparition très rare sur notre partie de littoral atlantique. Avant la création du CHD, seules deux données avaient été obtenues. La date est classique, proche des deux précédentes (04/04/88 et 20/04/96), pour ce migrateur en dépassement d'aire de nidification (overshooting).

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*
(3/36) (5/6 ; 0)

2001 – centre équestre / L'Ile-d'Yeu, une vingtaine, 29 août (A. Sournia).

2002 – dune de la Fosse / Barbâtre, 2 ad., 23 avril (M. Vaslin) ; dune de la Gachère / Brétignolles-sur-Mer, ad., mâle prob., 25 avril au 30 mai (D. Desmots, F. Portier, A. Barzic *et al.*) ; Caillou

Blanc puis pointe du But / L'Ile-d'Yeu, ad., mâle prob., 13 juin (F. Portier) ; route du Perrier / Soullans, 13 juillet (B. Isaac) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Ile, 14 juillet (D. Desmots).

(Moitié sud de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique du nord. Nicheur rare en Vendée, migrateur régulier en petit nombre).

Bien qu'un des oiseaux de la Gachère semble être revenu sur le site où un couple avait niché en 2001, aucune preuve de nidification n'a pu être apportée en 2002. Etrangement aucune donnée ne nous est parvenue pour 2003. En revanche, une donnée en retard d'une vingtaine d'oiseaux (chiffre élevé pour le département) en migration active au-dessus de l'île d'Yeu.

PIC MAR *Dendrocopos minor*
(1/1) (0/0 ; 2/2)

2003 – forêt de Mervent, entendu, 2 février (D. Brossard), entendu, 17 mars (D. Brossard).

(Europe et Moyen-Orient. Nicheur rare et localisé en Vendée).

Même constat qu'en 2001 : la forêt de Mervent semble pour le moment être le seul bastion, très localisé, de l'espèce dans le département. Il est tout de même toujours intéressant de rechercher activement cette espèce dans les quelques vieux boisements du reste du département.

HIRONDELLE ROUSSELIN *Hirundo daurica*
(0/0) (1/1 ; 1/1)

2002 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Ile, ad., 23 avril (D. Desmots).

2003 – la Girvière / Olonne-sur-Mer, mâle ad., 10 avril (A. Barzic).

(Méditerranée et Moyen-Orient. Migrateur rare sur la façade atlantique).

Première et seconde observation connue de cette espèce en Vendée. Avec une donnée par an, l'espèce serait-elle plus régulière sur la façade atlantique au printemps ou est-ce seulement dû à une recherche plus systématique ? Dans tous les cas, l'examen attentif des groupes d'hirondelle en avril-mai peut parfois porter ses fruits.

PIPIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*
(0/0) (0/0 ; 1/1)

2003 – lac de Maché-Apremont, mâle prob. en plum. nupt., 26 août (M. Vaslin).

(Scandinavie et Sibérie. Migrateur très rare sur la façade atlantique).

Deuxième observation de ce pipit dans notre département, après celle du 24 septembre 1995 sur les Loirs à Olonne-sur-Mer (Didier Desmots, comm. pers). Cette donnée post-nuptiale est en cohérence avec son pattern d'apparition sur la façade atlantique où les oiseaux sont

observés à l'automne plutôt qu'au printemps (ZUCCA & LE CMR, 2005). Une recherche plus assidue en fin d'été et à l'automne sur des sites favorables permettrait sans doute de détecter de nouveau cette espèce.

BERGERONNETTE DE YARELL

*Motacilla alba yarrellii***

2003 – étang des Boucheries / Les Landes-Genusson, mâle ad., **15 juin** (C. Marchet). (Grande-Bretagne. Hivernant commun en Vendée). Date exceptionnelle pour cette espèce nichant quasi exclusivement en Grande-Bretagne. Cette observation n'est pas sans rappeler celle d'un mâle nourrissant une nichée sans que la femelle n'ait pu être observée durant l'été 2000 (S. Reeber, com. pers.).

LOCUSTELLE TACHETÉE *Locustella naevia*

(6/7) (6/8 ; 8/12)

2002 – Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, cht., 8 et 9 avril (D. Desmots *et al.*), 19 avril (D. Desmots, B. Vallée-Mounier, M. Vaslin) ; forêt de Mervent, 3 cht., 21 et 24 avril (D. Brossard) ; lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 11 août (C. & J. Gonin, F. Jiguet) ; juv., capt., phot., 19 août (J. Gonin *et al.*) ; la Paracou / Les-Sables-d'Olonne, 31 août (D. Desmots).

2003 – forêt de Mervent, 2 cht., 30 mars et 13 avril (D. Brossard) ; chemin de l'Agas / Notre-Dame-de-Monts, mâle ad., cht., 18 avril au 2 juin (M. Vaslin) ; rue Georges Clemenceau / Venansault, cht., 18 avril (F. Portier) ; lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 4 ind. dont 2 juv., capt., 16 août (J. Gonin, C. Ravaud) ; le Braud / Grues, juv., capt., 18 août (F. Salmon), juv., capt., phot., 20 août (J. Gonin, F. Salmon), juv., capt., 3 septembre (F. Salmon) ; rue Roger Solengro / La Roche-sur-Yon, juv., trouvé mort, phot., 4 septembre (F. Picaud).

(Europe, Russie. Nicheur irrégulier et migrateur en petit nombre dans notre département).

En période de nidification l'espèce semble à priori bien localisée au littoral nord et à la forêt de Mervent au sud. Comme pour le Phragmite aquatique, le baguage démontre le passage régulier de l'espèce dans notre département.

LOCUSTELLE LUSCINOÏDE

Locustella luscinioides

(2/3) (0/0 ; 1/1)

2003 – lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, ad., capt., phot., 18 août (J. Gonin, N. Thuaire).

(Europe, Russie. Nicheur irrégulier et migrateur en petit nombre dans notre département).

La capture d'un adulte en mue complète à cette période laisse à penser que la Locustelle luscinoïde a probablement niché sur le site en 2003. Malheureusement pas d'information sur l'éventuelle nidification sur ce même site en 2002.

PHRAGMITE AQUATIQUE

Acrocephalus paludicola

(1/1) (3/3 ; 7/17)

2002 – lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, juv., 7 août (F. Portier), juv., capt., phot., 19 août (J. Gonin *et al.*) ; lagunage / Luçon, 17 août (M. Bibard).

2003 – Orouet / Saint-Jean-de-Monts, ad., capt., 3 août (M. Vaslin *et al.*) ; lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 2 juv., 6 août (F. Portier), juv. et ad., capt., phot., 16 août (J. Gonin, C. Ravaud), ad. prob. fem., phot., 18 août (J. Gonin, N. Thuaire) ; le Braud / Grues, 7 juv. et 2 ad., capt., phot., 19 août (J. Gonin, F. Salmon), juv., capt., phot., 21 août (J. Gonin, F. Salmon), juv., capt., phot., 22 août (J. Gonin, F. Salmon). (Pologne, Hongrie, Biélorussie, Russie. Migrateur



Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, Orouet, Saint-Jean-de-Monts (photo © Matthieu Vaslin).

régulier mais en faible effectif dans l'ouest de la France dont la Vendée au passage post-nuptial). Comme prévu, le suivi par baguage de nos roselières en août confirme le passage tout de même important dans notre département de cette espèce fortement menacée. Les données visuelles restent par ailleurs toujours aussi rares mais là encore des efforts restent à faire au lever du jour sur les roselières pour tenter de contacter cette espèce emblématique.

HYPOLAÏS ICTERINE *Hippolais icterina*

(1/2) (1/1 ; 2/2)

2002 - lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, juv., 7 août (F. Portier).

2003 - Marais de la Guerche / L'Ile-d'Yeu, ad., 3 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer) ; mare des Agaures / Les Sables-d'Olonne, 5 septembre (M. Bibard).

(Europe centrale et de l'Est, Russie. Nicheur localisé dans le nord-est de la France, migre vers l'est, rare dans l'ouest de l'Europe).

La donnée de 2002 n'est pas sans rappeler celle de 2001 par le lieu, la date et même l'observateur. Les vents d'est prolongés ont sans doute favorisé les deux observations groupées de 2003. Cependant, avec seulement une ou deux données par an, l'Hypolaïs icterine reste toujours très rare au passage dans notre département.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

(0/0) (1/1 ; 0)

2002 - côte sauvage / L'Ile-d'Yeu, juv., 4 octobre (F. Portier).

(Nord et est de l'Europe, Russie et Moyen-Orient. Migrateur occasionnel sur la façade atlantique).

Une fois de plus c'est sur l'île d'Yeu et à l'automne que cette fauvette, plutôt rare dans notre département, a été observée.

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

(2/2) (1/7 ; 1/11)

2002 - forêt de Mervent, 7 cht., 1^{er} mai au 8 juillet (D. Brossard).

2003 - forêt de Mervent, 11 cht., 27 avril au 17 juin (D. Brossard).

(Sud de l'Europe, Turquie, Afrique du Nord. Nicheur très localisé en Vendée).

L'espèce semble plutôt bien se porter dans son seul site de nidification régulier.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

(6/7) (3/5 ; 1/1)

2002 - pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, 12 avril (J. Piette) ; forêt de Mervent, 3 cht., 5 mai (D. Brossard) ; pinède des Conches / L'Ile-d'Yeu, 10 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer).

2003 - la Parée Grollier - forêt de Monts / Notre-Dame-de-Monts, mâle cht., 11 avril (M. Vaslin). (Europe. Nicheur très localisé en Vendée).

Enfin des données d'oiseaux en halte migratoire, l'espèce semblant étrangement peu observée en dehors de ses sites de nidification. Concernant les nicheurs, il faut noter la baisse des effectifs en forêt de Mervent. Des efforts de prospection des massifs boisés restent à faire pour apprécier l'importance de la nidification de cette espèce dans notre département.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

(1/1) (1/1 ; 0)

2002 - pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 30 septembre (E. Ouvrard, G. Bouteloup, M.-L. Menesson).

(Nord et centre de l'Europe pour la sous-espèce nominale. Très rare en migration ou en hivernage en Vendée).

Donnée intéressante montrant que fin septembre - début octobre reste une des meilleures périodes pour observer cette espèce peu commune dans notre département.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*

(2/2) (1/2 ; 0)

2002 - mare des Agaures / Les Sables-d'Olonne, 2 ind. entendus, 16 novembre (F. Portier).

(Massif alpin, nord de l'Europe, Scandinavie et Sibérie pour *flammea* ; Grande-Bretagne pour *cabaret*. Migrateur et hivernant rare en Vendée).

Donnée auditive montrant que l'espèce doit certainement être plus régulière qu'on ne le pense. Elle doit toutefois souvent passer inaperçue pour celui qui ne connaît pas son cri typique.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(1/2) (0/0 ; 2/2)

2003 - le Coton / La Barre-de-Monts, mâle, 11 janvier (M. Vaslin) ; Jetée Jacobsen / Noirmoutier-en-l'Île, 7 mars (M. Vaslin).

(Scandinavie, Sibérie. Hivernant occasionnel en Vendée).

Aucune donnée en 2002. L'année 2003 est plus classique avec deux données. L'observation de Noirmoutier concerne clairement un oiseau en halte migratoire ayant probablement hiverné plus au sud...

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

(2/6) (4/4 ; 5/8)

2002 - île d'Yeu : côte Nord, ad., 2 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer), juv., 5 au 7 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer), ad., 13 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer) ; la Bergerie, ad., 12 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer).

2003 - île d'Yeu : dune de la Grande Conche, 2 ind., 25 août (M.-P. & X. Hindermeyer), 4 sep-

tembre (M.-P. & X. Hindermeyer) ; centre équestre, ad. et au moins 2 juv., 27 août (M.-P. & X. Hindermeyer) ; côte sauvage, juv., 1^{er} septembre (M.-P. & X. Hindermeyer) ; la Bergerie, ad., 4 septembre (M.-P. & X. Hindermeyer).

(Europe, Russie. Migrateur peu commun en Vendée).

Il reste encore un peu de Bruant ortolan ! L'île d'Yeu concentre toutes les observations (effectuées uniquement lors du passage post-nuptial) sur ces deux années.

Annexe 1 - Espèces dont l'origine naturelle n'est pas établie

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

(0/0) (2/6 ; 1/1)

2002 – Réserve Naturelle / Saint-Denis-du-Payré, 5 ind., 13 et 14 août au moins (J. Gonin, P. Trotignon *et al.*) ; lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, fem. ad. prob., 18 août (J. Gonin, F. Jiguet).

2003 – lac de Maché-Apremont, 25 septembre (M. Bibard).

Niche ponctuellement en Afrique du Nord, et de la Grèce à l'Asie centrale, la Mongolie, le nord de la Chine, en Sibérie au nord jusqu'au lac Baïkal).

Quelques observations sur deux mois classiques d'apparition de l'espèce dans notre département qui a connu cependant plus de régularité les années précédentes.

LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHD rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, à priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

2002

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* : plage du Midi / Barbâtre, 11 février.

Faucon kobez *Falco vespertinus* : digue du Maroc / Saint-Michel-en-l'Herm, imm., 11 septembre ; pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, juv., 12 septembre.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* : plage de la Paracou / Olonne-sur-Mer, 30 juillet.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : La Roche-sur-Yon, mâle ad., 5 janvier.

Locustelle tachetée : étang de Mort à l'Ane / Talmont-Saint-Hilaire, 6 août ; lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 11 août ; zone du nain Fief Monsieur / Les Sables-d'Olonne, 23 septembre.

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* : La Roche-sur-Yon, 6 octobre.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* : marais du Plumet / Jard-sur-Mer, cht, 13 mars. 2003

Guifette leucoptère *Chlidonia leucoptera* : station d'épuration / La Tranche-sur-Mer, 18 septembre.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* : Chantonay, ad., 27 décembre.

Les raisons ayant entraîné la non homologation d'une donnée ou son homologation par le CHD peuvent être fournies aux observateurs qui le désirent. Il suffit pour cela de le demander au secrétaire en indiquant si vous préférez une réponse par courrier postal (joindre alors une enveloppe timbrée à votre adresse) ou électronique (indiquez seulement votre adresse).

REMERCIEMENTS

Le CHD Vendée tient à remercier :

- la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vendée, pour son aide financière nécessaire au secrétariat du Comité ;
- l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHD ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE – 1997
– Liste des oiseaux de France métropolitaine.
Ornithos, 4 (1) : I-VIII.

CROUZIER P. & LE CHN – 2006 – Liste des
oiseaux de France métropolitaine. *Ornithos*, 13-3 :
145.

HINDERMEYER M.-P. & HINDERMEYER X. – 2006
– Avifaune de l'île d'Yeu : synthèse
ornithologique - partie 3. *La Gorgebleue* 21-22 :
3-22.

MENAGER V. – 1971 – *Ces oiseaux qu'on ne
chasse pas*. France-Empire, 251 p.

ZUCCA M. & LE CMR – 2005 – Les observations
d'oiseaux migrateurs rares en France. 2^e rapport du
CMR (janv. 2001-déc. 2002). *Ornithos*, 12-5 :
233-260.

Julien GONIN
199 rue des Frères Jamain
17 300 ROCHEFORT
pgs85@aol.com

Frédéric PORTIER
114 rue Georges Clemenceau
85 190 VENANSAULT
frederic.portier@wanadoo.fr

Xavier HINDERMEYER
CHD Vendée
2 rue des Volontaires
75 015 PARIS
mpxhindermeyer@yahoo.fr

Espèces soumises à homologation départementale en Vendée au 01/01/2006

Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Blongios nain (1)	<i>Ixobrychus minutus</i>	Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Jaseur boréal	<i>Bombicylla garrulus</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica hispanica</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	Locustelle lusciniioïde (1)	<i>Locustella luscinioides</i>
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	Lusciniolle à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Faucon d'Eléonore	<i>Falco eleonora</i>	Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Râle des genêts (1)	<i>Crex crex</i>	Pouillot de Bonelli (1)	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Pouillot siffleur (1)	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Outarde canepetière (1)	<i>Tetrax tetrax</i>	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Chevalier stagnatilis	<i>Tringa stagnatilis</i>	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Goéland railleur	<i>Larus genei</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Etourneau unicolore	<i>Sturnus inicolor</i>
Sterne hansel	<i>Sterna nilotica</i>	Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammia</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Petit-duc scops (2)	<i>Otus scops</i>	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>		
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>		
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>		
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>		
Pic cendré	<i>Picus canus</i>		

(1) hors sites de nidification

(2) hors Noirmoutier

Sous-espèces soumises à homologation

Oie des moissons de la taïga	<i>Anser fabalis fabalis</i>	(et Pouillot véloce de type sibérien)	
Bernache cravant à ventre pâle	<i>Branta bernicla hrota</i>	Choucas des tours	<i>Corvus monedula somerenghi</i>
Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	Choucas des tours	<i>Corvus monedula monedula</i>
Gorgebleue à miroir roux	<i>Luscinia svecica svecica</i>	Corneille mantelée	<i>Corvus corone cornix</i>
Traquet motteux du Groenland (3)	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>		
Pouillot (véloce) de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>		


(3) uniquement capturé et mesuré

Espèces dont l'origine naturelle n'est pas établie

Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>
--------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------

• Plus toutes les espèces plus rares qui ne figurent pas dans la liste des oiseaux soumis à homologation nationale ainsi que les espèces observées à une date inhabituelle.

Fiches à renvoyer à : Xavier HINDERMEYER - CHD85 - 2, rue des Volontaires - 75015 PARIS

**ESPÈCE PROPOSÉE****Nom français*****Nom scientifique***

Nombre d'individus :

Sexe :

Age :

Date (s) d'observation :

Durée des observations :

Première et dernière dates connues :

Localité (lieu-dit et commune) :**Rédacteur de la fiche** (nom, adresse, téléphone, e-mail) :

Autres observateurs :

Qui l'a trouvé ?

Qui l'a d'abord identifié ?

Matériel optique utilisé :

Distance d'observation :

L'oiseau a-t-il été photographié ?

Par qui ?

L'oiseau a-t-il été capturé ?

Par qui ?

L'oiseau a-t-il été conservé ?

Par qui ?

Conditions météorologiques :Connaissance antérieure de l'espèce :Connaissance d'espèces voisines :

Utiliser le verso de la présente fiche pour la description de l'observation et de l'oiseau



Description de l'observation et de l'oiseau (avant recours aux guides d'identification) : indiquer les conditions dans lesquelles l'oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix ...); Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout document graphique (dessin, photo...) ou sonore.