



Les oiseaux rares et accidentels en Vendée en 2004 et 2005

Troisième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen

Frédéric PORTIER, Didier DESMOTS & le CHD 85

INTRODUCTION

Voici le troisième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen. Il porte sur les années 2004 et 2005 et intègre quelques données des années 2002 et 2003, reçues tardivement.

Pour ces deux nouvelles années, 121 fiches nous sont parvenues (56 fiches pour 2004 et 65 fiches pour 2005) et ont été examinées. Le taux d'acceptation est de 94 % (93 % pour 2004 et 95 % pour 2005).

DÉCISIONS DU CHD

Evolution du CHD et renouvellement de ses membres

En 2004, le Comité se composait des 9 membres suivants : Michel Bibard, Didier Brossard, Christian Gonin, Julien Gonin (secrétaire), Lucien Grillet, Xavier Hindermeyer, Frédéric Portier, Matthieu Vaslin et Théophile You.

Au mois d'avril 2005, Julien Gonin a cédé la place de secrétaire du CHD à Xavier Hindermeyer.

Lucien Grillet et Théophile You ont quitté le CHD en février 2006.

En fin d'année 2007, plusieurs membres du CHD ont fait connaître leur intention de quitter celui-ci, à savoir : Didier Brossard, Christian Gonin, Julien Gonin et Xavier Hindermeyer (secrétaire).

Ceci est apparu comme une bonne occasion de redynamiser le CHD pour les années à venir.

C'est pourquoi des ornithologues qui observent très régulièrement en Vendée et qui ont une bonne connaissance de l'avifaune départementale ont été sollicités pour faire partie de ce comité. Ainsi, Didier Desmots a rejoint le CHD à l'automne 2007 suivi en fin d'année par André Barzic, Yves Gaugris, Bertrand Isaac et Pierre-Paul Evrard.

Le CHD est donc composé, depuis le 1^{er} janvier 2008, des 8 membres suivants : André Barzic,

Michel Bibard, Didier Desmots, Pierre-Paul Evrard, Yves Gaugris, Bertrand Isaac, Frédéric Portier (secrétaire) et Matthieu Vaslin.

Espèces soumises à homologation départementale : rappels

Le Comité d'Homologation National (CHN) a révisé en janvier 2006 la liste des espèces soumises à homologation nationale (CROUZIER & LE CHN 2006). Seize taxons ont été supprimés de la liste et ne sont donc plus soumis à homologation nationale : Bernache (cravant) du Pacifique *Branta bernicla nigricans*, Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, Faucon crécerellette *Falco naumanni*, Faucon d'Éléonore *Falco eleonora*, Marouette poussin *Porzana parva*, Talève sultane *Porphyrio porphyrio* (sous-espèce type), Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, Goéland railleur *Larus genei*, Goéland d'Audouin *Larus audouinii*, Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, Pipit de Richard *Anthus richardi*, Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*, Pouillot (véloce) de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* (et Pouillot véloce de type sibérien), Gobemouche nain *Ficedula parva*, Etourneau unicolore *Sturnus unicolor*.

Les données concernant ces espèces sont désormais collectées par le Comité de suivi des Migrateurs Rares (ZUCCA & LE CMR 2004, ZUCCA *et al.* 2008) et, lorsqu'ils existent, les comités d'homologation régionaux et départementaux.

A l'inverse, un taxon a été ajouté à la liste nationale et n'est donc plus à homologuer en Vendée depuis le 1^{er} janvier 2006, l'Oie des moissons de la taïga *Anser fabalis fabalis*.

Le CHD vendéen a décidé d'intégrer les seize taxons à la liste des espèces soumises à homologation en Vendée et de supprimer le nouveau taxon soumis à homologation nationale.

Après cinq années de fonctionnement, le CHD a également profité de cette occasion pour appor-

ter d'autres modifications à la liste des espèces soumises à homologation départementale.

Ainsi, ont été supprimés de la liste : le Harlebièvre *Mergus merganser*, le Puffin cendré *Calonectris diomedea*, le Puffin des Anglais *Puffinus puffinus*, le Puffin fuligineux *Puffinus griseus*, le Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*, le Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*, le Guêpier d'Europe *Merops apiaster*, la Locustelle tachetée *Locustella naevia*. Pour le Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*, n'est soumise à homologation départementale que la sous-espèce *hispanica* qui ne relève pas du CHN.

De même, ont été ôtées de la liste des sous-espèces : la Bergeronnette nordique *Motacilla flava thunbergi*, la Bergeronnette d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla* et la Bergeronnette ibérique *Motacilla flava iberiae*. Pour le Traquet motteux du Groenland *Oenanthe oenanthe leucorhoa*, suite aux récentes publications qui indiquent l'impossibilité de reconnaître cette sous-espèce hors capture et mesure, ne seront homologués que les oiseaux capturés et mesurés. Un "3", signifiant "uniquement capturés et mesurés" a été ajouté.

Il a également été décidé de ne plus soumettre à homologation certaines espèces, sauf en dehors des sites de nidification. Pour ces espèces (Blongios nain *Ixobrychus minutus*, Râle des genêts *Crex crex*, Locustelle lusciniotide *Locustella luscinioides*, Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*, Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*), il est ajouté un "1", signifiant "hors sites de nidification".

Enfin, sont ajoutés à la liste des espèces à homologuer l'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* (hors sites de nidification seulement) et le Goéland pontique *Larus cachinnans* (élevé au rang d'espèce et non soumis à homologation nationale).

L'ensemble de ces modifications a pris effet rétroactivement au 1^{er} janvier 2006.

Fiches d'homologation

Face aux importantes difficultés pour juger les fiches auditives, le CHD a décidé de ne plus homologuer les fiches seulement auditives (oiseau non vu) à partir du 1^{er} janvier 2006. Le critère auditif est cependant toujours important pour juger de la validité d'une observation.

Il a également été choisi de ne plus homologuer les fiches sans description, contenant uniquement des photos.

Le CHD rappelle que la fiche doit être rédigée le plus tôt possible après l'observation. Face au constat que certaines données ne sont pas transmises et dorment toujours dans des carnets, il lance un nouvel appel aux observateurs qui ne rédigent pas de fiches d'homologation. En effet, ces données ne seront pas reprises dans les synthèses départementales, régionales ou nationales (rapports du Comité de suivi des Migrateurs Rares), ce qui est fort regrettable eu égard au statut des espèces considérées.

Enfin, le CHD se félicite de la qualité croissante des fiches qui lui sont soumises et remercie l'ensemble des observateurs qui ont transmis les leurs.

La liste des espèces soumises à homologation départementale et le modèle de fiche d'homologation sont disponibles sur le site Internet de la LPO Vendée (<http://vendee.lpo.fr/>), rubrique "homologation départementale", ou sur simple demande au secrétaire dont les coordonnées figurent à la fin de cet article. Elles sont également jointes en annexe de cet article.

FAITS MARQUANTS

L'année 2005 a vu l'ajout de deux nouvelles espèces pour la Vendée : le Martinet pâle *Apus pallidus* et la Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* (1^{ère} donnée homologuée depuis la création du CHD). Deux nouvelles sous-espèces ont été notées en 2004 et 2005 : la Bergeronnette ibérique *Motacilla flava iberiae* et le Choucas des tours oriental *Corvus monedula soemmerringii*.

L'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) fournit sa deuxième mention en 2004, l'Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*) ses troisième et quatrième mentions en 2004 et 2005, et le Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) sa troisième mention en 2005.

A noter également : les deux premières données homologuées depuis la création du CHD pour l'Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*), avec 7 individus en 2005 ; la première donnée homologuée pour l'Aigle botté (*Aquila pennata*), avec un couple cantonné à l'intérieur des terres en 2005.

Parmi les espèces signalées à des dates inhabituelles, il faut mentionner une Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) très précoce, en février 2004, et surtout une première observation hivernale de Mouette de Sabine (*Larus sabini*), avec un oiseau mi-janvier 2004.

En terme d'effectif record, soulignons le passage exceptionnel de Puffins cendrés

(*Calonectris diomedea*) devant l'île d'Yeu (pointe du But), le 19 d'août 2005, avec plus de 900 individus en une heure quinze !

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Consignes de lecture

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique (les espèces sont classées selon l'ordre de la Liste officielle des Oiseaux de France, CAF 2007).
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données et celui des individus correspondants homologués depuis la création du CHD. Les quatre suivants représentent le nombre de données homologuées en 2004 et le nombre d'individus correspondant puis le nombre de données homologuées en 2005 et le nombre d'individus correspondant.
3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un seul individu), âge et sexe si connus.
5. L'oiseau a-t-il été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur ?
6. L'oiseau a-t-il été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.) ?
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) de l' (des) observateur(s) ayant rédigé une fiche ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique). La mention "*et al.*" indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseaux en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CHD est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou fourni une photo).
9. Distribution générale de l'espèce et son statut en Vendée (entre parenthèses), puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste du Comité de l'Avifaune Française (CAF 2007).

Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la race concernée.

Les données présentées sont la propriété entière de l'(des) observateur(s). Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : **Martinet pâle** – 1 individu les 31 octobre et 1^{er} novembre 2005, Barbâtre, Vendée (M. Vaslin *et al.*, in PORTIER *et al.* 2008).

* Espèce soumise à homologation départementale hors de certaines zones géographiques.

** Espèce soumise à homologation départementale pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

(5/9) (1/1 ; 4/5)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce hrota, appelée "Bernache à ventre pâle".

2004 – le Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard, ad., du 14 décembre 2003 au 18 février 2004 (C. Lartigau *et al.*).

2005 – le Luzan / Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., du 4 février au 8 mars (M. Vaslin, D. Desmots) ; Cailla / Barbâtre, phot., 31 octobre (M. Vaslin *et al.*), 2 ind., phot., 24 novembre (M. Vaslin) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, phot., 14 novembre (M. Vaslin).

(Groenland, Spitzberg. Hiverné en petit nombre en Grande-Bretagne et du Danemark à la côte normande. Sous-espèce hivernant de plus en plus régulièrement, en petit nombre, en Vendée).

L'île de Noirmoutier reste le site le plus attractif pour cette sous-espèce en hiver.



Bernache à ventre pâle Branta bernicla hrota, Noirmoutier-en-l'Île, 14/11/2005 (photo © M. Vaslin)

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

(4/7) (1/1 ; 0/0)

2004 – la Paracou / Les Sables-d'Olonne, fem. imm. probable, du 12 au 24 novembre (M. Bibard).

(Groenland, Grande-Bretagne, Alpes, Europe du Nord, Scandinavie et Sibérie. Hivernant rare en Vendée).

Une seule donnée pour la période, mais en automne et sur un site très atypique (en mer !).

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

(5/6) (1/1 ; 1/1)

2004 – pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, ad., 17 février (X. Hindermeyer).

2005 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, 7 novembre (D. Desmots).

(Europe de l'Est. Migrateur et hivernant rare sur le littoral vendéen).

Avec une seule donnée par an, cette espèce reste rare en hiver dans notre département.

PUFFIN CENDRE *Calonectris diomedea*

(24/70) (2/3 ; 4/907)

2004 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 2 ind., 7 juillet (M. Bibard) ; Pierre des Amporelles / L'Île-d'Yeu, 15 août (X. Hindermeyer).

2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 22 mai (M. Bibard), 1^{er} juillet (M. Bibard), 5 ind., 18 juillet (M. Bibard) ; pointe du But / L'Île-d'Yeu, 900 ind. au moins, 19 août (X. Hindermeyer, A. Sournia) ; pointe de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'Île, 17 octobre (E. Gas).

(Îles méditerranéennes. La sous-espèce *borealis* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries, aux Açores et à Berlenga, au large du Portugal. Migrateur peu commun mais régulier sur le littoral vendéen).

Petite année 2004 mais millésime 2005 exceptionnel pour cette espèce, avec ce passage de plus de 900 oiseaux devant l'île d'Yeu, en une heure quinze de sea-watching. Ceci constitue un effectif record pour la Vendée.

PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus*

(7/10) (3/4 ; 8/13)

2004 – pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 2 ind., 14 août (A. Sournia) ; pointe de la Gournaise / L'Île-d'Yeu, 18 et 23 août (X. Hindermeyer).

2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 20 juillet (M. Zucca *et al.*) ; en mer (traversée vers l'île d'Yeu) / Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 11 août (F. Portier) ; pointe du But / L'Île-d'Yeu, 2 ind., 19 août (X. Hindermeyer) ; en mer, à bord du Kifanlo / Les Sables-d'Olonne, 2 ind., 27 août (M. Bibard), 3 septembre (A. Virondeau, F. Desage) ; en mer (traversée vers l'île d'Yeu) / Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2 ind., 29 septembre (F. Portier) ; pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 25 octobre (X. Hindermeyer, F. Portier) ; plage de la Borgne / L'Île-d'Yeu, 3 ind., 25 octobre (X. Hindermeyer, F. Portier).

(Niche sur quelques îles au large de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes).

L'année 2004 est dans la moyenne, mais 2005 est une très bonne année pour ce puffin qui passe trop souvent le long des côtes sans être regardé.



Ibis falcinelle Plegadis falcinellus, Jard-sur-Mer, 03/04/05 (photo © Frédéric Portier)

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus*

(17/50) (4/4 ; 2/2)

2004 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 1^{er} juin (M. Bibard), 7 juillet (M. Bibard) ; pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 19 août (X. Hindermeyer) ; pointe de la Gournaise / L'Île-d'Yeu, 19 août (X. Hindermeyer).

2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 8 avril (M. Bibard) ; pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 19 août (X. Hindermeyer).

(Atlantique Nord. Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes).

Deux petites années pour cette espèce de Puffin.

OCEANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa*

(6/7) (0/0 ; 1/1)

2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 4 décembre (A. Barzic).

(Atlantique Nord. Migrateur et hivernant rare au large des côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de vent).

Pendant la période considérée, une seule donnée pour cette espèce dont les apparitions sur la côte, parfois sous forme de cadavres, restent souvent liées à des conditions météorologiques perturbées.

CORMORAN HUPPE *Phalacrocorax aristotelis**

(4/4) (0/0 ; 1/1)

2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, imm., 18 décembre (F. Portier).

(Atlantique. Niche en Vendée depuis 1999. Migrateur et hivernant rare, excepté autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier où il est régulier).

Avec seulement une donnée pour les deux années 2004 et 2005, l'espèce est toujours aussi rare sur le littoral vendéen en dehors des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*

(0/0) (0/0 ; 2/7)

2005 – les Grands Prés de la Grange / Jard-sur-Mer, ad., phot., du 6 mars au 3 avril (F. Portier) ; Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré / Saint-Denis-du-Payré, 6 ad., phot., du 5 au 23 juillet (K. Schmale *et al.*).

(La sous-espèce nominale *P. f. falcinellus* se reproduit sporadiquement dans le Sud de l'Europe, mais aussi en Afrique du Nord, Asie centrale, Amérique du Nord et Grandes Antilles. Espèce occasionnelle en Vendée).

Ces données sont les deux premières homologuées depuis la création du CHD ; elles s'ajoutent aux 8 mentions homologuées par le CHN entre 1982 et 1993 dans le département de la Vendée.

AIGLE BOTTE *Aquila pennata*

(0/0) (0/0 ; 1/2)

2005 – localité tenue secrète, mâle et fem., du 14 juillet au 3 septembre (M. Bibard).

(Europe, Afrique du Nord, jusqu'en Asie centrale. Migrateur rare en Vendée. Nidification non encore prouvée).

Première donnée homologuée depuis la création du CHD, avec en prime un couple cantonné, nicheur possible à l'intérieur des terres.

AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos*

2004 – pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, subad., 20 novembre (C. Lartigau *et al.*)

(Sud et Est de l'Europe, Ecosse, Scandinavie, Sibérie et Moyen-Orient. Occasionnel en Vendée).

Deuxième donnée homologuée depuis la création du CHD, après celle d'un juvénile le 28 octobre 2001 au-dessus de La Roche-sur-Yon. Cette fois il s'agissait d'un subadulte migrant à la pointe de L'Aiguillon.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana*

(14/16) (1/1 ; 2/2)

2004 – la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, ad., du 12 au 16 septembre (C. Lartigau *et al.*).

2005 – la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, ad. probable, 13 juillet (K. Schmale) ; le Braud / Grues, phot., capt., 17 août (F. Salmon, L. Chaillot).

(Europe et Russie. Nicheuse rare en Vendée. Migratrice rare mais régulière, observée surtout lors du passage post-nuptial).

Seulement trois données pour la période considérée, à des dates classiques, mais loin de refléter le passage postnuptial de cette espèce discrète, qui mérite d'être

recherchée plus intensément dans le département.



Marouette ponctuée *Porzana porzana*, Grues, 17/08/05
(photo © Franck Salmon)

RALE DES GENETS *Crex crex*

(1/1) (1/6 ; 0/0)

2004 – le Grand Marais / Le Mazeau, 6 mâles chanteurs, du 6 mai au 8 juin (E. Séchet *et al.*).

(Europe et Russie. Migrateur occasionnel, nicheur très rare et menacé en Vendée comme partout en France).

Deuxième donnée depuis la création du CHD, mais cette fois-ci il s'agit d'individus nicheurs d'une espèce toujours plus rare.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus*

(4/5) (2/3 ; 1/1)

2004 – les Grands Loirs / Olonne-sur-Mer, 2 ad., 24 avril (M. Bibard) ; côte sauvage / L'Île-d'Yeu, juv. probable, phot., 10 septembre (F. Portier).

2005 – la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, juv., 3 septembre (A. Virondeau *et al.*).



Pluvier guignard *Charadrius morinellus*, L'Île-d'Yeu, 10/09/04 (photo © Frédéric Portier)

(Ecosse, Scandinavie, Sibérie. Nicheur rare et localisé en France. Migrateur rare et irrégulier en Vendée).

Cette espèce reste rare aux deux passages en Vendée, malgré des recherches intensives sur les îles et sur le continent mais peut-être pas sur les bons sites (à rechercher notamment à l'intérieur des terres plutôt que sur les dunes).

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*
(18/30) (1/1 ; 0/0)

2004 – la Couvée / Beauvoir-sur-Mer, 2 ind., 28 avril (W. Raitière) ; lac de Maché-Apremont / Maché, ad., phot., 30 août (F. Portier).

2003 – étang de la Cailletière / La Bruffière, ad., 9 juillet (W. Maillard).

(Ecosse, Scandinavie et Sibérie. Migrateur rare en Vendée, le plus souvent en petit nombre, aux deux passages).

Avec une seule donnée en 2004 et aucune en 2005, on est bien loin des chiffres records de 2002 et même de 2003 pour cette espèce migratrice discrète.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*
(8/8) (0/0 ; 0/0)

2004 – la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 13 août (L. Moussiégot).

2005 – vallée de l'Auzance / Vairé, 27 juillet (D. Desmots) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., du 26 août au 24 septembre (D. Desmots *et al.*) ; loirs de Champclou / Olonne-sur-Mer, juv., 3 septembre (D. Desmots).

(Europe de l'Est, Russie. Migrateur rare mais régulier en Vendée aux deux passages, de préférence sur les marais littoraux saumâtres ou salés).

Seulement quatre données pour les deux années, toutes en période post-nuptiale.

PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus*
(3/3) (0/0 ; 1/1)

2005 – Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, juv., 26 août (D. Desmots).

2003 – étang des Mattes / Saint-Gervais, ad., 20 avril (W. Maillard).

(Irlande, Ecosse, Islande, Scandinavie, Sibérie. Migrateur occasionnel sur la côte atlantique, plus commun en Méditerranée. Migrateur rare et irrégulier en Vendée, surtout au passage postnuptial).

Donnée printanière remarquable. Toujours très peu d'observations de cette espèce rare en Vendée.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*
(6/7) (2/2 ; 3/4)

2004 – l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 13 janvier (M. Bibard) ; pointe du But / L'Île-d'Yeu, 19 août (A. Sournia).

2005 – pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 25 août (X. Hindermeyer) ; l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 4 décembre (A. Barzic) ; plage au sud du port / Jard-sur-Mer, 2 ad., 4 décembre (Th. Brugerolle).

(Sibérie. Migrateur peu commun sur les côtes vendéennes, noté surtout au passage postnuptial).

Trois données hivernales très intéressantes.



Grand gravelot Charadrius hiaticula (à gauche) et Bécasseau de Temminck Calidris temminckii (à droite), lac de Maché-Apremont, 30/08/2004 (photo © Frédéric Portier)

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini*
(0/0) (1/1 ; 0/0)

2004 – l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 1^{er} hiver, 14 janvier (M. Bibard).

(Niche en Alaska, Arctique canadien, Groenland,... Migratrice postnuptiale régulière, habituellement au large, mais parfois sur les côtes en petit nombre. Affluence remarquable en 1993 et 1999 sur les côtes de Vendée. Beaucoup plus rare à l'intérieur des terres).

Première mention hivernale en Vendée.

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*
(3/3) (3/3 ; 4/5)

2004 – plage des Bossilles et pointe de la Gournaise / L'Île-d'Yeu, 1^{er} hiver, 2 janvier (M.-P. et X. Hindermeyer) ; zone portuaire / Les Sables-d'Olonne, 2^e hiver, 23 février (A. Barzic) ; le Luzan / Noirmoutier-en-l'Île, 1^{er} été, phot., 6 mai (D. Desmots *et al.*).

2005 – plage des Présidents / Les Sables-d'Olonne, 1^{er} hiver, phot., 24 janvier (D. Desmots) ; zone portuaire / Les Sables-d'Olonne, 2 ind. de 1^{er} hiver, phot., du 31 janvier au 20 février (A. Barzic, F. Portier *et al.*) ; plage du Tanchet / Les Sables-d'Olonne, 1^{er} hiver, 30 mars (M. Bibard) ; île du Pilier / Noirmoutier-en-l'Île, 1^{er} hiver, 30 mars (D. Desmots).

(Arctique. Hiverné en Islande, Grande-Bretagne et Scandinavie. Hivernant assez régulier en Vendée).

Belle série de données pour les deux années concernées. La commune des Sables-d'Olonne demeure le site privilégié pour observer cette espèce en hiver.

STERNE HANSEL *Gelodelichon nilotica*

(8/9) (1/1 ; 1/2)

2004 – le Paracaud / Bouin, ad., 1^{er} juin (O. Penard).

2005 – route de Saint-Denis-du-Payré / Triaize, 2 ad., 15 août (M. Bibard).

(Méditerranée et Danemark. Migratrice rare mais régulière en Vendée).

Deux années très classiques, tant par le nombre de données que par la localisation des observations.



Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*, Les Sables-d'Olonne, 13/02/05 (photo © André Barzic), en compagnie d'autres laridés



Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*, Les Sables-d'Olonne, 20/02/05 (photo © Frédéric Portier)

STERNE DE DOUGALL *Sterne dougallii*

(2/2) (3/4 ; 3/3)

2004 – lagune du Dain / Bouin, 2 ind., 2 juillet (M. Cosson *et al.*) ; 1 ad., phot., 21 juillet (F. Portier, M. Vaslin) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, 29 août (C. Ferté *et al.*).

2005 – anse du Gois / Barbâtre, ad., 30 juin (D. Desmots) ; pointe de la Casie / Barbâtre, ad., phot., 6 juillet (D. Desmots *et al.*) ; pointe

d'Arçay / La Tranche-sur-Mer, phot., 22 juillet (M. Zucca *et al.*).

(Grande-Bretagne et Bretagne. Migrateur occasionnel en Vendée).

Le secteur baie de Bourgneuf - île de Noirmoutier confirme son attractivité pour l'espèce.

MERGULE NAIN *Alle alle*

(1/1) (1/1 ; 2/2)

2004 – plage de Sion-sur-l'Océan / Saint-Hilaire-de-Riez, 19 décembre (B. Isaac).

2005 – pointe de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'Île, 1^{er} novembre (E. Gas) ; port du Morin / L'Épine, 1^{er} hiver, trouvé mort, phot., 21 décembre (M. Vaslin).

(Arctique, migrateur rare sur les côtes françaises. Occasionnel en Vendée).

Une belle série d'observations pour une espèce qui n'est pas annuelle dans le département.

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*

(1/1) (0/0 ; 2/2)

2005 – polder de Sébastopol / Barbâtre, ad., 7 et 8 avril (R. Marty, F. Signoret) ; les Petits Relais / Champagné-les-Marais, ad., 16 mai (Y. Gaugris). (Méditerranée. Migrateur ou nicheur rare sur la côte atlantique).

Deux données tout à fait classiques en période pré-nuptiale.

MARTINET PALE *Apus pallidus*

(0/0) (0/0 ; 1/1)

2005 – polder de Sébastopol / Barbâtre, 31 octobre et 1^{er} novembre (M. Vaslin *et al.*).

(Europe du Sud, surtout les côtes et îles de la Méditerranée, et jusqu'à l'est du Pakistan. Migrateur très rare sur la façade atlantique).

Première mention vendéenne de cette espèce, réalisée dans un contexte d'afflux dans le nord de l'Europe.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

(8/42) (5/21 ; 1/8)

2004 – bourg / Saint-Denis-du-Payré, 6 ind., 16 avril (C. Pacteau) ; bourg / Barbâtre, 2 ind., 26 avril (J.-L. Arnault) ; pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, ad., 30 avril (D. Desmots *et al.*) ; bourg / L'Île-d'Olonne, 4 ind., 2 mai (D. Desmots *et al.*) ; entre la Croix et Saint-Sauveur / L'Île-d'Yeu, 8 ind., 6 mai (M.-P. Hindermeyer).

2005 – marais du Plumet / Jard-sur-Mer, 8 ind., 3 septembre (R. Bussière *et al.*).

(Moitié sud de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Nicheur rare en Vendée, migrateur régulier en petit nombre).

Une belle série d'observations au passage pré-nuptial 2004 sur l'ensemble du littoral. Aucune donnée de nidification.

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbicum***
(0/0) (1/1 ; 0/0)

2004 – place du Château / Noirmoutier-en-l'Île, 21 février (R. Tapin).

(Nicheur et migrateur commun en Vendée).

Une donnée particulièrement précoce.

HIRONDELLE ROUSSELINE *Cecropis daurica*
(2/2) (1/1 ; 1/1)

2004 – dunes de la Gachère / Brétignolles-sur-Mer, 24 avril (D. Desmots).

2005 – jetée Jacobsen / Noirmoutier-en-l'Île, ad., 12 mai (P. Werquin, K. Poiroux).

(Méditerranée et Moyen-Orient. Migrateur rare sur la façade atlantique ; espèce occasionnelle en Vendée).

Une donnée par an depuis quatre ans... L'Hirondelle rousseline va-t-elle devenir une "classique de printemps" sur le littoral vendéen ?

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*
(1/1) (0/0 ; 1/1)

2005 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, ad., 19 octobre (M. Vaslin).

(Scandinavie et Sibérie. Migrateur rare sur la façade atlantique, surtout à l'automne ; espèce occasionnelle en Vendée).

Troisième observation départementale, à une date conforme au passage postnuptial de l'espèce en France.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava*
Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce iberiae, appelée "Bergeronnette ibérique".

(0/0) (1/1 ; 0/0)

2004 – station de lagunage / Barbâtre, mâle ad. probable, 20 avril (W. Raitière *et al.*).

(Niche dans le Sud-Ouest de la France, l'Espagne et le Nord-Ouest de l'Afrique).

Première donnée homologuée par le CHD. Cette sous-espèce mérite plus d'attention de la part des observateurs dans notre département.

LOCUSTELLE TACHETÉE *Locustella naevia*
(20/27) (2/5 ; 0/0)

2004 – forêt de Mervent / Mervent, 4 chanteurs, 23 juin (E. Séchet *et al.*) ; barrage de la Vouraise / Saint-Hilaire-le-Vouhis, juv. probable, 3 octobre (M. Bibard).

(Europe, Russie. Nicheur irrégulier et migrateur en petit nombre dans notre département).

Toujours bien peu de données pour un migrateur qui doit pourtant être très régulier dans notre département...

LOCUSTELLE LUSCINOÏDE

Locustella luscinioides

(3/4) (1/1 ; 2/5)

2004 – lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 3 mâles, 24 avril (J. Ventroux *et al.*), 2 mâles chanteurs, du 11 au 28 juillet (F. Portier).

2005 – la Grande Herse / Le Perrier, 2 juv., phot., capt., 15 août (M. Vaslin *et al.*).

(Europe, Russie. Nicheur irrégulier et migrateur en petit nombre dans notre département).

À nouveau des observations printanières en provenance de la Belle-Henriette, laissant supposer une possible nidification.

PHRAGMITE AQUATIQUE

Acrocephalus paludicola

(11/21) (1/8 ; 2/16)

2004 – le Braud / Grues, 8 ind., capt., du 14 août au 8 septembre (F. Salmon, L. Chaillot).

2005 – le Braud / Grues, 14 ind., phot., capt., du 11 août au 3 septembre (F. Salmon, L. Chaillot) ; la Grande Herse / Orouet, 1 ad. et 1 juv., phot., capt., 19 août (M. Vaslin).

(Pologne, Hongrie, Biélorussie, Russie. Migrateur régulier mais en faible effectif dans l'Ouest de la France, dont la Vendée, au passage postnuptial).

La roselière du Braud est décidément très attractive pour l'espèce. Toujours aussi peu d'observations en dehors des campagnes de baguette.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE

Acrocephalus palustris

(0/0) (0/0 ; 1/1)

2005 – polder de Sébastopol / Barbâtre, ad., 31 octobre (M. Vaslin, G. Corsand).

(Niche du Nord-Ouest de la France jusqu'à la Caspienne et l'est de l'Oural).

Première mention homologuée par le CHD.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

(1/1) (0/0 ; 2/2)

2005 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, 10 octobre (D. Desmots) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, 11 octobre (D. Desmots).

(Nord et Est de l'Europe, Russie et Moyen-Orient. Migrateur rare en Vendée).

Deux oiseaux différents, pratiquement au même endroit et sur deux journées consécutives, mais à des dates classiques (octobre), pour une espèce qui reste bien rare dans notre département.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

(10/13) (1/1 ; 0/0)

2004 – Piquet / Le Tablier, 4 avril (M. Pirio).

(Europe. Nicheur très localisé en Vendée).

Une seule donnée pour ces deux années... Pas d'information en provenance des sites de nidification.

PIE-GRIÈCHE GRISE *Lanius excubitor*

(2/2) (1/1 ; 1/1)

2004 – marais de Noailles / Rosnay, ad., 5 novembre (J. et P. Adams).

2005 – les Ringerdières / Rosnay, ad., phot., du 7 décembre 2005 au 10 février 2006 (J. et P. Adams, F. Portier).

(Nord et Centre de l'Europe pour la sous-espèce nominale. Très rare en migration ou en hivernage en Vendée).

Très intéressante donnée d'hivernage.



Pie-grièche grise *Lanius excubitor*, 10/02/06, Rosnay
(photo © Frédéric Portier)

CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce soemmerringii, appelée "Choucas des tours oriental".

(0/0) (0/0 ; 1/1)

2005 – Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, ad., 15 décembre (M. Vaslin).

(De l'Est de l'Europe à l'Asie centrale).

Première mention vendéenne d'un oiseau de type oriental. La description laisse penser qu'il s'agit plutôt d'un individu intermédiaire entre les sous-espèces *monedula* et *soemmerringii*, qui serait originaire de l'Est de la Pologne où les deux sous-espèces se côtoient.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(3/4) (0/0 ; 1/2)

2005 – Pelfrey / Barbâtre, 2 ind., 1^{er} hiver, 1^{er} novembre (M. Vaslin *et al.*).

(Scandinavie, Sibérie. Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée).

Une seule donnée pour ces deux années, à nouveau sur l'île de Noirmoutier. Une plus grande attention des observateurs aux bandes d'alouettes, sur le littoral, en période automnale, permettrait certainement d'augmenter le nombre de contacts.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

(12/19) (0/0 ; 2/2)

2005 – Marais Salé / L'Île-d'Yeu, 24 août (X. Hindermeyer) ; la Bergerie / L'Île-d'Yeu, 1^{er} hiver, 12 septembre (F. Portier).

2003 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, 1^{er} hiver, 29 août (D. Desmots).

2002 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, 1^{er} hiver, 13 septembre (D. Desmots).

(Europe, Russie. Migrateur peu commun en Vendée).

Les îles d'Yeu et de Noirmoutier restent des valeurs sûres pour l'observation postnuptiale de ce Bruant.

Espèces dont l'origine naturelle n'est pas établie

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

(4/3) (3/2 ; 0/0)

2004 – digue des Prises / Saint-Michel-en-L'Herm, 4 janvier (J. Gonin *et al.*) ; réserve de Chanteloup / L'Île-d'Olonne, 2 ind., 10 septembre (J. Mélier).

2003 – station d'épuration / L'Île-d'Olonne, du 1^{er} au 9 octobre (D. Desmots *et al.*).

(Niche ponctuellement en Afrique du Nord, et de la Grèce à l'Asie centrale, la Mongolie, le Nord de la Chine, en Sibérie, au nord jusqu'au lac Baïkal. Apparitions automnales irrégulières en Vendée).

Quelques observations postnuptiales de l'espèce dans notre département, qui a cependant connu des apparitions plus régulières il y a quelques années. La donnée hivernale est nettement plus rare.

LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHD rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec un maximum d'informations, même si, à priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée. Pour la plupart des données,

les raisons ayant entraîné la non-homologation sont succinctement indiquées entre parenthèses.

2003

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* : plage de la Grande Côte / La-Barre-de-Monts, 3 mai (absence de description).

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* : pointe de L'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'Île, 8 septembre (description trop légère).

2004

Aigle royal *Aquila chrysaetos* / **Pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* : étang du parc Soubise / Mouchamps, 27 novembre (les éléments fournis ne permettent pas de trancher en faveur d'un Pygargue, encore moins d'un Pygargue à queue blanche, et pas non plus en faveur d'un Aigle royal).

Traquet motteux du Groenland *Oenanthe oenanthe leucorrhoa* : digue du Maroc / Saint-Michel-en-l'Herm, 2 ind., 20 et 21 octobre (eu égard aux variations importantes, avec notamment le problème des oiseaux islandais de la zone d'intergradation entre *leucorrhoa* et *oenanthe*, le CHD ne peut homologuer que des oiseaux capturés (bague) ou trouvés morts).

Locustelle tachetée *Locusta naevia* : Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, 10 septembre (observation trop rapide à l'œil nu).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* : lagune du Dain / Bouin, 27 août (description ambiguë qui ne permet pas de trancher en faveur de cette espèce).

2005

Puffin cendré *Calonectris diomedea* : pointe de L'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'Île, 17 octobre (description très légère, critère de taille / Goéland argenté qui n'est pas bon, et date d'observation tardive pour cette espèce).

Guifette leucoptère *Chlidonia leucoptera* : Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg /

Noirmoutier-en-l'Île, 16 mai (plusieurs éléments dans la description ne correspondent pas réellement à l'espèce proposée).

REMERCIEMENTS

Le CHD Vendée tient à remercier :

- la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée (LPO Vendée) pour la publication du rapport dans la revue La Gorgebleue et pour la récente page Internet dédiée au Comité qui figure sur son site ;

- l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHD ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE (CAF), 2007. En direct de la CAF. Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). *Ornithos*, 14-4 : 234-246.

CROUZIER P. & LE CHN, 2006. Modification de la liste des espèces soumises à homologation en France. *Ornithos*, 13-3 : 145.

DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., YESOU P. & OLIOSO G., 2000. *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan/HER, Paris, 400 pages.

ZUCCA M. & LE CMR, 2007. Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 3^e rapport du CMR (janv. 2003-déc. 2004). *Ornithos*, 14-1: 2-33.

ZUCCA M., PAUL J.-P. (coord.) & LE CMR, 2008. Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 4^e rapport du CMR (année 2005). *Ornithos*, 15-1: 2-33.

Frédéric PORTIER
CHD Vendée
114 rue Georges Clémenceau
85190 VENANSAULT
frederic-nadege.portier@orange.fr

Didier DESMOTS
9 rue du Petit Fief
85340 L'ILE-D'OLONNE
chalexin@yahoo.fr

Espèces soumises à homologation départementale en Vendée au 01/01/2006

Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i>	Jaseur boréal	<i>Bombicilla garrulus</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Blongios nain (1)	<i>Ixobrychus minutus</i>	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica hispanica</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	Monticole de roche	<i>Monticola saxatalis</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	Locustelle lusciniolide (1)	<i>Locustella luscinioides</i>
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	Lusciniolide à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennata</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciata</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
Faucon d'Eléonore	<i>Falco eleonora</i>	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Râle des genêts (1)	<i>Crex crex</i>	Pouillot de Bonelli (1)	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Pouillot siffleur (1)	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Outarde canepetière (1)	<i>Tetrax tetrax</i>	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincta</i>	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Goéland railleur	<i>Larus genei</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	Chocard à bec jaune	<i>Pyrhacorax graculus</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Crave à bec rouge	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Sterne hansel	<i>Gelodolichon nilotica</i>	Etourneau unicolore	<i>Sturnus inicolor</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Petit-duc scops (2)	<i>Otus scops</i>	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>		
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	(1) hors sites de nidification	
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	(2) hors Noirmoutier	
Pic cendré	<i>Picus canus</i>		

Sous-espèces soumises à homologation

Bernache cravant à ventre pâle	<i>Branta bernicla hrota</i>	Pouillot (véloce) de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>
Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	(et Pouillot véloce de type sibérien)	
Gorgebleue à miroir roux	<i>Luscinia svecica svecica</i>	Choucas des tours	<i>Corvus monedula soemmerrengii</i>
Traquet motteux du Groenland (3)	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	Choucas des tours	<i>Corvus monedula monedula</i>

(3) uniquement capturé et mesuré

Espèces dont l'origine naturelle n'est pas établie

Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>
--------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------

► Plus toutes les espèces plus rares qui ne figurent pas dans la liste des oiseaux soumis à homologation nationale ainsi que les espèces observées à une date inhabituelle.

Fiches à renvoyer à : Frédéric PORTIER, 144 rue Georges Clémenceau, 85190 VENANSULT



Comité d'Homologation Départemental

Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce inhabituelle en Vendée

à retourner à M. Frédéric PORTIER, 144 rue Georges Clemenceau – 85190 VENANSAULT

ESPÈCE PROPOSÉE

Nom français

Nom scientifique

Nombre d'individus :

Sexe :

Age :

Date (s) d'observation :

Durée des observations :

Première et dernière dates connues :

Localité (lieu-dit et commune) :

Rédacteur de la fiche (nom, adresse, téléphone, e-mail) :

Autres observateurs :

Qui l'a trouvé ?

Qui l'a d'abord identifié ?

Matériel optique utilisé :

Distance d'observation :

L'oiseau a-t-il été photographié ?

Par qui ?

L'oiseau a-t-il été capturé ?

Par qui ?

L'oiseau a-t-il été conservé ?

Par qui ?

Conditions météorologiques :

Connaissance antérieure de l'espèce :

Connaissance d'espèces voisines :

Utiliser le verso de la présente fiche pour la description de l'observation et de l'oiseau



Description de l'observation et de l'oiseau (avant recours aux guides d'identification) : indiquer les conditions dans lesquelles l'oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix ...) ; Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout document graphique (dessin, photo...) ou sonore.