



3^e recensement national des laridés hivernant en France (hiver 2011-2012)

Ornithos, en collaboration avec l'Atlas des oiseaux en hiver

Après ceux des hivers 1995-1996 (*Ornithos* 4-4: 174-183, 1997) et 2004-2005 (*Ornithos* 13-3: 146-157), *Ornithos* propose un nouveau recensement des laridés hivernant en France. Nous nous associons cette fois-ci au travail effectué pour l'Atlas des oiseaux en hiver. En effet, à la suggestion des responsables de cet atlas, les données recueillies lors de ce décompte national permettront d'enrichir la base servant à l'élaboration de ce projet, et ce autour d'une famille souvent laissée pour compte dans les recensements.

Comme pour les recensements précédents, les comptages pourront être effectués entre la mi-décembre et la mi-janvier. Avec ce troisième recensement, nous aurons une nouvelle image instantanée de la population de goélands, mouettes, sternes et guifettes hivernant en France.

COMMENT PROCÉDER ?

- Une première annonce a été publiée récemment (*Ornithos* 18-4: 259). De nombreuses associations ont déjà manifesté leur intérêt. Rappelons que les personnes physiques peuvent également se porter candidate pour ce recensement. Les lecteurs d'*Ornithos* qui sont intéressés pour y participer voudront bien se mettre en contact, soit avec le coordinateur régional (s'il existe), soit directement avec les coordinateurs nationaux.
- Toutes les espèces de goélands et de mouettes, mais aussi les labbes, sternes et guifettes sont concernés (voir fiche d'enquête page suivante).
- Il faut compter les laridés au moment de leur arrivée au dortoir, c'est-à-dire avant le crépuscule et jusqu'à la nuit : par comptage direct du dortoir lorsque c'est possible ou par comptage sur les différentes voies d'arrivée si le comptage direct n'est

pas possible. Pour des espèces dont la présence en dortoir n'est pas évidente (Mouette pygmée par exemple), il faudra mentionner les effectifs observés à d'autres occasions dans la journée. Il sera donc parfois utile de repérer les dortoirs avant la période de comptage et de se familiariser avec leur fonctionnement : identifier les voies d'accès empruntées par les laridés, les sites précis de pose, les prédortoirs, repérer également les points d'observation les plus favorables.

- L'idéal serait de réaliser un décompte coordonné, mais les conditions météorologiques hivernales rendent aléatoire une telle opération. Les mois les plus favorables sont décembre et janvier. L'enquête aura donc lieu au cours de l'hiver 2011-2012, de préférence entre le 15 décembre et le 15 janvier (les week-ends des 17-18 décembre 2011 et 14-15 janvier 2012 seraient parfaits, car les plus proches possibles de ceux choisis majoritairement par les observateurs pour les précédentes enquêtes). Si un événement climatique inhabituel (vague de froid) survenait et que le recensement ait déjà été fait, il serait nécessaire d'effectuer un nouveau comptage, afin de comparer les effectifs.
- Il est utile d'apprendre à identifier les laridés au vol dans de mauvaises conditions d'éclairage, à estimer des groupes de dix, cent ou mille oiseaux, mais aussi de repérer les sites potentiels et de prendre contact avec les responsables régionaux ou les coordinateurs nationaux (adresses ci-dessous).

Philippe J. Dubois
104 rue Saint-Jean, 95300 Pontoise
(pjdubois@orange.fr)

Nidal Issa, LPO, « Recensement laridés »
BP 90263, 17305 Rochefort Cedex
(nidal.issa@lpo.fr)

3^e RECENSEMENT DES LARIDÉS HIVERNANT EN FRANCE

HIVER 2011-2012

Localité précise :	Département :
Type de site ⁽¹⁾ : étang/lac, gravière/sablière, fleuve, toits d'édifices, port, estuaire, plage, rivage.	
Autre type de site (préciser) :	Surface (facultatif) :
Date du décompte :	Heure :
Observateur(s) :	Décompte ⁽¹⁾ : partiel, total
Adresse :	

Espèces	Effectif recensé	Effectif estimé	Validité ⁽²⁾
Grand Labbe			
Labbe			
Goéland marin			
Goéland brun ⁽³⁾			
Goéland argenté ⁽⁴⁾			
Goéland leucopnée			
Goéland pontique			
Goéland bourgmestre			
Goéland d'Audouin			
Goéland railleur			
Goéland cendré			
Goéland			
Mouette rieuse			
Mouette mélanocéphale			
Mouette pygmée			
Mouette tridactyle			
Mouette			
Sterne caugek			
Sterne			
Guifette moustac			
Total			

⁽¹⁾ Rayer les mentions inutiles. ⁽²⁾ Indiquer si le dénombrement est : 1 = exhaustif, 2 = bon ou 3 = incomplet. ⁽³⁾ Estimer éventuellement la proportion des diverses sous-espèces chez les adultes. ⁽⁴⁾ Si possible, préciser les sous-espèces (*argentatus*, *argenteus*) identifiées avec certitude et leur proportion chez les adultes.

Toutes indications complémentaires (âge-ratio, etc.) seront les bienvenues. Merci de votre collaboration.

Fiche à retourner avant le 31 janvier 2012, soit par mail à nidal.issa@lpo.fr ou pjdubois@orange.fr, soit par courrier à Nidal Issa, LPO, « Recensement laridés », BP 90263, 17305 Rochefort Cedex.