



Rappel des news

L'actualité ornithologique a été particulièrement riche en ce mois de novembre !

[ICI](#) Tonn, l'Aigle criard équipé d'une balise, a de nouveau survolé notre département.

[ICI](#) et [LA](#) Pendant ce temps, un afflux de Sizerins touche l'Europe et la France. A ce jour au 1er novembre, déjà 16 observations ou contacts auditifs de Sizerin cabaret ou de Sizerin sp. ont été rapportés dans le département (3 données par an en moyenne sur les 7 derniers hivers). Les semaines qui arrivent seront très propices à la recherche du rare Sizerin flammé boréal, désormais considéré comme une espèce à part entière.

[ICI](#) Pour participer au recensement national des Grands Cormorans en dortoir.

[ICI](#) Si vous désirez prendre en charge un SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs). C'est simple et cela ne prend pas beaucoup de temps ! [Résultats depuis 2014.](#)

[ICI](#) Pour en savoir plus [et pour utiliser](#) l'outil de saisie par formulaire.

Bouvreuil « trompetant » : quésaco ?

Vous l'avez sûrement remarqué depuis quelques jours, les observations de Bouvreuil « trompetant » se multiplient sur la base. Déjà [29 contacts](#) cet automne !

Origine et taxonomie

Sur votre Guide Ornitho, aucun Bouvreuil « trompetant » ou « trompetteur » à l'horizon... pourtant, il est fait état dans le paragraphe **VOIX**

du Bouvreuil pivoine une « variante rappelant une trompette d'enfant » qui « pourrait provenir du Nord de la Russie ». Le voilà donc, notre Bouvreuil, parfois aussi appelé « des Komis », des oiseaux à cri de trompette ayant été enregistrés dans [cette province](#) en période de nidification.

D'autres sources mentionnent ce taxon comme nicheur dans le Nord de l'Europe, en Scandinavie, en Russie / Sibérie jusqu'au nord de la Mongolie et jusqu'aux côtes de la mer d'Okhotsk.

Il ne s'agit pas d'une espèce à part entière, mais juste d'une sous-espèce, d'ailleurs la sous-espèce nominale, au nom latin répétitif *Pyrrhula pyrrhula*.

Identification et comportement

Le [cri de contact](#) est le principal critère permettant d'identifier ce taxon. Il diffère nettement de la [note douce et flûtée](#) de nos bouvreuils.

Mais les Bouvreuils trompetants sont également plus grands et les mâles d'un rouge légèrement plus intense. La barre alaire serait aussi plus évidente, plus blanche, et le bec plus gros. Ces critères morphologiques ne permettent toutefois pas une identification sans le cri.

Les Bouvreuils trompetants seraient enclin à voler et à se nourrir dans des strates plus élevées que nos bouvreuils. Leur régime alimentaire est davantage orienté vers les samares (érables, frênes...) ou vers les baies de viorne (*Viburnum opulus*).

Statut en Cote-d'Or

Il existe à ce jour 105 mentions de Bouvreuil

trompetant en Côte-d'Or. L'hiver en cours est déjà, au 1^{er} décembre seulement, l'épisode le plus prolifique jamais enregistré en Côte-d'Or, avec l'hiver 2005-2006 (29 données également) et devant 2012-2013 (28). Si un afflux impressionnant a bel et bien lieu actuellement, il ne fait toutefois aucun doute que la pression d'observation plus accrue que par le passé joue un rôle déterminant dans cette détection élevée. A vous de prêter l'oreille afin de quantifier au mieux le phénomène !


Au cours des 13 derniers hivers, les épisodes 2005-2006, 2012-2013 et 2017-2018 (en cours) représentent à eux seuls 82 % des données. Le Bouvreuil trompetant est donc soumis à des irrptions, sa présence hivernale en France n'étant pas régulière, un peu à l'image du Jaseur boréal, encore plus rare cependant. On remarque également que les bons hivers à trompeteurs sont également de bons hivers à Bouvreuils « normaux » (graphique 1).



Bouvreuil trompetant mâle, Tailly, 2010 (B.Fontaine)



Bouvreuil pivoine mâle, Pasques, 2017 (S.Baschung)



Graphique 1 : Variations interannuelles hivernales des Bouvreuils pivoines « normaux » et trompetants en Côte-d'Or depuis 2005.

Notons pour finir que l'afflux de Bouvreuils trompetants en cours s'inscrit dans un contexte d'apparition très élevé d'autres espèces forestières, rares et moins rares, et potentiellement septentrionales : [Grosbec casse-noyaux](#), [Mésange noire](#), [Bouvreuil pivoine](#), [Sizerins](#), [Bec-croisé perroquet](#)...

Ce début d'hiver est donc très intéressant et invite à prospecter autre chose que les zones humides !

Bonnes observations à toutes et tous,
Antoine ROUGERON
LPO Côte-d'Or



*Bouvreuil trompetant femelle, Tailly, 2015
(B.Fontaine)*



Bouvreuil pivoine femelle, Spoy, 2015 (R.Soudagne)

Avec le soutien financier de :

